838

Jan Muszyński

JAN MUSZYŃSKI

Bibljoteka
Jana Muszynskiego

D. GUIL. DAN. JOS. KOCH

SYNOPSIS
FLORAE GERMANICAE ET HELVETICAE.

PARS SECUNDA.

SYNOPSIS

FLORAE GERMANICAE

ET

HELVETICAE,

EXHIBENS

STIRPES PHANEROGAMAS ET VASCULARES CRYPTOGAMAS RITE COGNITAS,

QUAE IN

GERMANIA, HELVETIA, BORUSSIA ET ISTRIA

SPONTE CRESCUNT ATQUE IN HOMINUM USUM COPIOSIUS COLUNTUR,

SECUNDUM SYSTEMA CANDOLLEANUM DIGESTAS,

PRAEMISSA GENERUM DISPOSITIONE

SECUNDUM CLASSES ET ORDINES SYSTEMATIS LINNAEANI CONSCRIPTA:

AUCTORE

D. GUIL. DAN. JOS. KOCH,

AUGUSTISS. REG. BAV. A CONSIL. AULIC. MED. ET BOT. P. P. O. HORT. REG. BOT. ERLANG. DIRECTOR. PLURIMARUM SOCIETATUM LITERATARUM SODALI.

EDITIO TERTIA.

PARS SECUNDA.

LIPSIAE

SUMPTIBUS GEBHARDT ET REISLAND.

MDCCCLVII.

Ord. LXIV. AMBROSIACEAE. Link. Handb. z. Erkenn. d. Gew. 1. p. 816.

Flores diclini: masculi in capitulum, involucro polyphyllo vel multifido cinctum, collecti; feminei solitarii, vel gemini, involucro inclusi. Masc. Perigon. 1 phyllum, 5 dentatum, dentibus aestivatione valvatis. Stam. 5, fundo perigonii inserta, libera vel monadelpha. Stylus filiformis; stigma obtusum, integrum. Fem. Perig. nullum. Ovarium nudum; styl. 1; stigm. 2, elongata. *Fructus involucro indurato, nucem spuriam referente, inclusus,* siccus.

1. XANTHIUM (L. gen. n. 1056.) Monoicum. Mas. invol. polyphyllum. Flores tubulosi, paleis separati. Fem. Invol. 1 phyllum, biloculare, 2 florum, denique induratum. Perigon. o.

1. **X. strumarium** (L. sp. 1400.) *inerme,* fructibus pubescentibus rostris rectis subconniventibus, *spinis rectis apice uncinatis.* ☉. In agris, ruderatis, ad vias, (zerstreut durch d. ganze Geb.) Jul.-Oct. Schk. t. 291. Flores virides.

2. **X. macrocarpum** (DC. fl. franc. suppl. p. 356.) inerme, fructibus hispidis, rostris uncinatis, *spinis a medio fere arcuatis apice circinato-hamatis.* ☉. In ruderatis ad vias prope Opso Istriae, Tommasini, et circa Vindobonam, Dolliner. Jul.-Oct. X. orientale L. sp. 1400., excl. synonymis et patria. Gärtn. fruct. 2. t. 184. X. italicum Moretti dec. 5. p. 8. Reichenb. ic. fig. 503. Flores virides. G.

3. **X. spinosum** (L. sp. 1400.) *spinis ad basin foliorum trifurcatis,* foliis integris trilobisve, lobo intermedio elongato acuminato ☉. Ad vias, ruderata reg. calid., (um Triest u. Fiume, Wien.) Jul. Aug. Moris. sect. 15. t. 2. f. 3. Flores virides. G.

Ord. LXV. LOBELIACEAE. Juss. ann. mus. 18. p. 1.

Cal. superus, 5 fidus aut integer. Cor. 1 petala, calyci inserta, irregularis, 5 fida, supra profunde longitudinaliter fissa. *Stam.* 5, *ante corollam ovario inserta,* laciniis alterna. Antherae filamentis adnatae. Ovarium 2-4 loculare: loculis multiovulatis; placentis centralibus. Styl. 1. *Stigma urceolo membranaceo vel corona ciliata obvallatum.* Fructus capsularis vel drupaceus. Embryo rectus, albumine tenui inclusus; radicula hilum spectante. Folia alterna.

1. LOBELIA (L. gen. 1006.) Cal. 5 fidus. Cor. hinc fissa; limbo 5 partito, irregulari. Antherae connatae. Caps. 2-3 locularis, apice 2-3 valvis.

1. **L. Dortmanna** (L. sp. 1318.) foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule subnudo. 4. Sub aqua in lacubus et paludibus, florescentiae tempore spicas emergens, (von Westphalen stellenweise bis nach Hannover u. Holstein.) Jul. Aug. Flores cyanei. Fl. dan. t. 39. G.

Ord. LXVI. CAMPANULACEAE. Juss. gen. p. 163.

Cal. superus, 5 fidus. Cor. 1 petala, calyci inserta, regularis, raro irregularis. *Stam.* 5, *ante corollam ovario inserta*, corollae laciniis alterna. Antherae 2 loculares, interdum basi connatae. Ovar. 3-5 loculare: loculis multiovulatis; placentis centralibus. Styl. 1. *Stigma* 2-5 *fidum*, *non obvallatum*. Fructus capsularis. Embryo rectus in centro albuminis, radicula hilum spectante. Folia alterna.

1. JASIONE (L. gen. 1005.) Cor. 5 partita, laciniis linearibus, primum coalitis, denique a basi ad apicem solutis. Filamenta subulata; antherae cohaerentes. Caps. bilocularis, apice foramine dehiscens. — Flores caerulei.

1. **J. montana** (L. sp. pl. 1317.) foliis linearibus, *radice simplici* multicauli. ☉. In arenosis siccis, ericetis, collibus incultis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 148. St. h. 9. Variat hirsuta et glabra et

β. maior; radix crassa, multicaulis, caules 2 pedales, capitula duplo maiora. D. fl. l. c. Hanc in rupium fissuris montium porphyriorum, (bei Kroneburg an der Nahe, Flor. palat., selbst gesammelt, u. am Hohenstein bei Weilmünster im Nassauischen, vom Apoth. Rudio.)

γ. littoralis; radix multicaulis, caules digitales undique prostrati et apice tantum adscendentes; prope littora maris arenosa habitat. J. montana *β.* littoralis Fries. nov. p. 269.

2. **J. perennis** (Lam. dict. 3. p. 216.) foliis linearibus, *radice stolonifera*, caudiculis unicaulibus. ♃. In locis rupestribus graminosis sylvaticis, (im Elsass überall u. durch die ganze Gegend um Bitsch u. bis Kaiserslautern in der Rheinpfalz; bei Rossleben in d. Gegend von Halle; im Gebiete d. Flora v. Spaa.) Jun.-Aug. Varietatem duplo humiliorem et dense caespitosam e Pyrenaeis habemus, quae J. perennis *β.* humilis D. fl. 2. p. 149. J. humilis Pers. syn. 2. 215. G.

2. PHYTEUMA (L. gen. n. 220.) Cor. 5 partita, laciniis linearibus, primum coalitis, denique a basi ad apicem solutis. Filamenta basi dilatata. Antherae liberae. Caps. 2-3 locularis, foraminibus lateralibus dehiscens.

Sect. I. Flores spicati, spica globosa vel cylindrica.

a. Spica semper globosa vel post anthesin ovalis. — Flores omnium violacei, vel raro in variatione albi.

1. **P. pauciflorum** (L. sp. 241.) *capitulo subgloboso quinquefloro*, *foliis obovatis vel obovato-lanceolatis obtusis apice subtricrenatis* in petiolum attenuatis, bracteis subrotundo-ovatis obtusis villoso-ciliatis capitulo brevioribus. ♃. In summis alpium jugis, (Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 181. Reichenb. ic. 4. f. 545. Occurrit floribus albis. Varietas:

β. globulariaefolium, foliis latioribus, fere obovatis, et bracteis obtusis est: P. globulariaefolium Hopp. et Sternb. Denkschr. d. Regensb. Ges. 2. p. 100. D. fl. 2. p. 182. P. pauciflorum et globulariaefolium Reichenb. ic. 4. f. 545. 547-549.

2. **P. hemisphaericum** (L. sp. 241.) *capitulo globoso subduodecimfloro*, *foliis linearibus* vel lanceolato-linearibus *integerrimis* vel apice subcrenatis, bracteis ovatis acuminatis integerrimis villoso-ciliatis capitulo dimidio brevioribus. ♃. In locis graminosis alpium editiorum, (Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.) Jul. Aug. D. fl. 2. 183. Reichenb. ic. 4. f. 544. Occurrit rarissime floribus albis; porro: foliis omnibus anguste lanceolatis, fol. exterioribus lanceolatis, interioribus linearibus, et fol. omnibus angustis linearibus, saepe in uno eodemque caespite; haec ultima forma est: P. graminifolium Sieb. herb. fl. a. n. 71.

3. **P humile** (Schleich. pl. exsicc.) *capitulo globoso sub* 12 *floro*, foliis lanceolato-linearibus linearibusque, *superioribus remote denticulatis*, bra-

cteisque margine ciliato-scabris, pilis brevissimis subreflexis, *bracteis* exterioribus *e basi ovata argute dentata lanceolato-attenuatis* capitulum subaequantibus. 4. In summis jugis alpium graniticarum in rupium fissuris, (Wallis, auf d. Räfel über Zermatten u. auf d. Mori über Macugnaga; südl. Tyrol auf Granitfelsen der Gletscher Venezia im nordwestl. Giudicarie auf mittlerer Höhe der Gletscher, Facchin.); variat *coloratum*, foliis molliusculis calycibus coloratis, (Val de Fain u. Bernina in Graubünden, Lagger.) Jul. Aug. Gaud. helv. 2. p. 172. Hegetschw. Reisen. f. 16. Reichenb. c. 4. f. 546., specimen pusillum. P. Carestiae Bir. in Brignatell. giorn. di fis. 1. p. 37. H.

4. **P. Sieberi** (Spreng. pugill. 1. p. 15. n. 19.) *capitulo globoso sub* 15 *floro, foliis* fasciculorum sterilium longe petiolatis cordatis ovatis vel ovato-lanceolatis *crenatis*, caulinis lanceolatis, *superioribus* sessilibus *e basi rhombeo-ovata attenuatis, bracteis* exterioribus *ovatis acuminatis argute serratis.* 4. In summis alpibus, (Tyrol, Krain, Kärnthen, Steyermark.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 184. P. Charmelii Sieb. nec Vill. Variat caule digitali et semipedali foliisque caulinis integerrimis et dentato-serratis. — Phyteuma cordata Vill. delph. t. 11. et P. lanceolata l. c. t. 12., fortasse ad hanc speciem trahendae sunt, sed absque inspectione speciminum authenticorum nihil certi erui potest. G.

5. **P. orbiculare** (L. sp. 242.) *capitulo multifloro globoso* vel deflorato ovali, *foliis crenato-serratis*, fasciculorum sterilium et saepe caulinis infimis longe petiolatis cordatis ovatis vel ovato-lanceolatis, caulinis *superioribus linearibus, bracteis* exterioribus *e basi ovata lanceolato-attenuatis subserratis.* 4. In pratis pascuisque, praecipue sylvaticis, in alpes adscendens, (stellenweise durch d. ganze Gebiet.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 185. Jacq. a. t. 437. Rapunculus orbicularis Scop. carn. 1. 150. Variat in locis pinguibus.

β. fistulosum, caule fistuloso, praeterea nulla nota diversum. E semine, ab amico Hopp. accepto, specimina caule fistuloso et solido mihi enata sunt. Capitulum defloratum in formam ovalem abiens in varietate vulgari, si loco opimo enascitur, quoque observatur: P. fistulosum Reichenb. fl. exc. p. 297.

6. **P. Scheuchzeri** (All. ped. 1. p. 116. t. 39. f. 2.) *capitulo multifloro globoso*, foliis crenato-serratis, inferioribus longe petiolatis lanceolatis attenuato-acuminatis, fasciculorum sterilium cordatis, superioribus linearibus, *bracteis* exterioribus *linearibus* capitulo plerumque longioribus. 4. In locis rupestribus et rupium fissuris alpium et region. subalpinarum, atque in regionibus humilioribus, (Walliseralpen, Gotthard, Glarneralpen, Gaud.; südl. Tyrol, Fleischer; Krain im Isonzothale, Host.; Steyermark, Maly, u. geht wie mehrere Alpenpflanzen südlich in die niedrigern Gegenden hinab.) Jul. Aug. D. fl. 2. 187. Reichenb. ic. 4. f. 541. P. Charmelii Vill. delph. 2. 516. t. 11., excl. fig. B. et C. varietatem nostram *β.* referentibus. P. corniculatum Clairvill. man. 43. Gaud. helv. 2. p. 177., excl. varietat. P. Scheuchzeri DC. fl. fr. 3. p. 711., planta absque fol. radicalib. et P. Charmelii DC. fl. fr. 3. p. 711., planta cum foliis radicalib. Bracteae plerumque integerrimae, rarius serratae, (Facchini.) Variat:

β. serrata; foliis argute serratis, dentibus prominentibus: P. Charmelii var. Vill. l. c. t. 11. f. B. C.

b. Spica subrotunda vel ovata sub anthesi sensim elongata, denique cylindrica. Flores omnium, excepto Phyteumate spicato, violacei vel in variatione albi.

7. **P. Michelii** (Bertolon. flor. ital. vol. 2. p. 538.) *spica multiflora subrotunda vel ovali denique cylindrica, foliis remote crenato-serrulatis*, radicalibus caulinisque inferioribus cordatis vel ovatis vel lanceolatis sublinearibusve petiolatis, superioribus lanceolato-linearibus linearibusve sessilibus subserratis, *bracteis linearibus longitudine florum brevioribusve.* 4. In pratis alpinis et subalpinis, inque latere alpium meridionali in regiones humiliores descendens. Jul. Aug. Specimen floribus albis misit Dr. Facchini. Var.

α. betonicifolium, folia radicalia et infima caulis cordata vel cordato-oblonga: P. betonicifolium Vill. delph. p. 518. t. 12. P. persicifolia Hoppe

bot. Ztg. 15. 1. p. 206. Reichenb. ic. 3. f. 412., modif. foliis fere omnibus cordato-lanceolatis.

β. scorzonerifolium, folia radicalia lanceolata longe petiolata: P. scorzonerifolium Vill. delph. 2. p. 519. t. 12. Reichenb. ic. 3. f. 411.

γ. angustissimum, folia radicalia lineari-lanceolata breviter petiolata: P. Michelii All. ped. 1. p. 115. t. 7. f. 3.

Omnes hae varietates formis intermediis confluunt sensimque una in alteram abit; non raro in uno eodem prato montano promiscue crescunt.

8. **P. nigrum** (Schmidt. boh. 2. n. 189.) *spica oblonga, foliis simpliciter crenato-serratis*, inferioribus petiolatis *ovatis basi cordatis*, supremis linearibus, bracteis linearibus. 4. In sylvis frondosis, (stellenweise dch. d. ganze Gebiet.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 191. P. ovale Hopp. Taschenb. 1794. p. 84. P. spicatum β. Rapunculus Pers. syn. 1. 194. Flores ante expansionem laciniarum atro-violacei et rugosissimi; in P. Halleri fere laeves.

9. **P. spicatum** (L. sp. 242.) *spica oblonga, foliis duplicato-crenato-serratis*, inferioribus petiolatis *ovatis basi cordatis*, supremis linearibus. 4. In sylvis et pratis montanis, (stellenweise im Gebiete, aber bis jetzt z. B. nicht in d. Rheinpfalz, wo P. nigrum gemein ist.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 190. Schk. t. 39. Rapunculus spicatus Scop. carn. 1. p. 150. — Flores albidi vel ochroleuci apice virentes.

10. **P. Halleri** (All. ped. 1. p. 116.) *spica obovato-oblonga, foliis grosse duplicato-serratis*, inferioribus petiolatis *ovatis*, supremis lanceolatis, bracteis linearibus. 4. In vallibus et pascuis alpinis et subalpinis, (Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Steyermark; sodann auf d. Sudeten,) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 192. P. ovatum Schmidt. boh. 2. n. 190. Willd. sp. 1. 923. Hoffm. D. fl. 1. p. 105. P. urticifolium Clairvill. man. 63. Flores atro-violacei, rarissime albi; specimen huius misit D. Facchinius.

Sect. II. Phyteumata comosa. Flores umbellati, pedicellati. Corolla obverse pyriformis, nunquam, ut videtur, in lacinias liberas fissa.

11. **P. comosum** (L. sp. 42.) *umbella terminali*, floribus breviter pedicellatis, foliis dentatis, radicalibus reniformibus. 4. In rupium fissuris montium et alpium, (in Krain in d. Wochein; zerstreut auf Kalkfelsen im ganzen südl. Tyrol, von d. obersten Baumgrenze bis fast zur Region des Oelbaumes hinab, Facchin.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 193. Jacq. a. app. t. 50. St. h. 22. Corolla azurea, antice atro-purpurea. G.

Sect. III. Flores breviter pedunculati, solitarii, sparsi, racemum vel paniculam formantes.

12. **P. canescens** (Waldst. et Kit. pl. r. hung. 1. p. 12. t. 14.) foliis sessilibus, inferioribus ovatis crenato-serratis basi attenuatis, superioribus lanceolatis subintegerrimis, *floribus* breviter pedunculatis *racemoso-paniculatis*. 4. In locis incultis, inter virgulta, (unter Gebüsch in Gesellschaft von Rhus Cotinus zw. Cilli u. Lichtenwald in Untersteyermark, Maly.) Jul.-autumn. D. fl. 2. p. 193. W. et Kit. pl. r. h. t. 14. Cor. caerulea. G.

3. CAMPÁNULA (L. gen. n. 218.) Cal. tubus turbinatus. Cor. campanulata vel rotata, in segmenta 5 magis minusve divisa, fundo clauso filamentis basi dilatatis, subhemisphaerico-conniventibus et discum epigynum plano-convexum obtegentibus. Antherae liberae. Ovarium turbinatum. Caps. 2-3 locularis, foraminibus lateralibus dehiscens.

Sect. I. Calycis sinus appendice destituti. Flores pedunculati, in caulibus multifloris racemosi vel paniculati. — Flores omnium caerulei vel violacei, raro in varietate albi.

a. Capsula nutans, sub calycis laciniis dehiscens.

1. **C. Zoysii** (Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 122.) *foliis* integerrimis, *infimis ovatis* petiolatis, *petiolo folium aequante*, caulinis mediis spathulatis, supremis lineari-oblongis, caule 1-plurifloro, calycis laciniis subulatis, *corolla* oblongo-campanulata, *laciniis dense barbatis*. 4. In rupestribus alpium, (Wochein in Krain; auf d. Ovir in Kärnthen, auf d. Rechberge am Eingang in d. Vellachthal ebenfalls in Kärnthen, auf der Oistritza im Cilli-

kreise im Sulzbachthale an Felsen der Nadel in Steyerm., Alpe Kren in Görtz.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 150. Jacq. ic. rar. t. 334. St. h. 22. G.

b. Capsula nutans, basi dehiscens.

2. **C. pulla** (L. sp. 231.) *foliis ellipticis* crenatis petiolatis *petiolo triplo longioribus*, inferioribus obtusis, superioribus acutis, *caule 1 floro*, *flore nutante*, *calycis laciniis subulatis*. 4. In pascuis subalpinis et alpinis, (Oestreich, Steyermark, Krain, Salzburg.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 151. Jacq. a. t. 286. St. h. 34. Cor. intense violacea. G.

3. **C. excisa** (Schleicher. plant. exs. Gaud. helv. 2. 147.) foliis linearibus integerrimis sessilibus, inferioribus lineari-cuneatis in petiolum brevem attenuatis subdenticulatis, caule 1-3 floro, *corolla ventricoso-campanulata* ad tertiam partem quinquefida, *laciniis ovatis basi angustioribus sinuque subrotundo separatis*, calycis laciniis subulatis. 4. In rupium fissuris ad moles glaciales in Helv., (in d. südlichen Alpenkette des Wallis, auf d. Simplon an d. Kaltwassergletscher, auf d. Furca u. Moro, im grossen Boden im Münsterthale Zehnden Gombs.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 1. f. 159. 160. Gaud. helv. 2. t. 2., varietas fol. superioribus denticulatis. H.

4. **C. caespitosa** (Scop. carn. 1. p. 143.) *foliis radicalibus caulinisque infimis obovatis in petiolum latiusculum folium vix aequantem decurrentibus* paucicrenatis, caulinis sessilibus lineari-lanceolatis subserratis, superioribus linearibus integerrimis, *caule plurifloro* racemoso vel paniculato, *pedunculis 1-2 floris*, *corolla oblongo-campanulata sub laciniis paulum coarctata*, calycis laciniis subulatis. 4. In fissuris rupium calcarearum alpium et reg. subalpinarum, (Oberöstreich, Steyermark, Krain, südl. Tyrol.) Jul. Aug. Icon Scopolii t. 4., non bona. — Species a C. pusilla evidenter diversa. Cor. dilute violacea in purpurascentem vergens, oblongo-campanulata, medio latior, subventricosa, sub dentibus angustior, praeter nervum validiorem in dentes excurrentem et binos laterales validiores a basi ad dentes usque reti venarum evidente instructa, dentes extrorsum versi staminum basis ovata, longior quam lata. G.

5. **C. pusilla** (Haenk. in Jacq. collect. 2. p. 79.) *foliis fasciculorum sterilium ovatis cordatis reniformibusque serratis petiolatis*, *petiolo folium pluries superante*, *caulinis inferioribus ellipticis* brevius petiolatis, *superioribus linearibus* sessilibus, *caule racemoso 3-6 floro*, *corolla hemisphaerico-campanulata*, calycis laciniis subulatis. 4. In rupestribus et glareosis alpium, in subalpina et cum fluviis in planities, alpibus vicinas, descendens, inque sudetis, (kommt mit dem Isarkiese bis München u. mit dem Rheinkiese bis Strassburg hinab.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 152. C. caespitosa Vill. delph. 2. p. 500., non Scop. C. rotundifolia *β.* L. sp. 232. Variat, sicut omnes affines, magis minusve pilis brevibus adspersa, vel

β. pubescens, tota usque ad lacinias calycis pilis brevibus hirta: C. pubescens Schmidt. boh. n. 167. Willd. sp. 1. 894. B. Schmidt. ex alpibus Salisburgensibus, non vero e Bohemia, habuit, conf. Tausch. bot. Ztg. 11. 2. p. 425. Icon Reichenbachii in ic. 1. f. 161. et 162., ob corollam subturbinatam ad varietatem pubescentem depauperatam C. rotundifoliae pertinere videtur. Corolla in C. pusilla basi rotundata, tubus ad dentes usque parum dilatatus neque ventricosus, praeter nervum medium validiorem et binos laterales debiliores non reticulato-venosus; dentes porrecti parum tantum extrorsum versi. Basis filamentorum breviter ovata latior quam longa. Color florum caeruleus.

6. **C. rotundifolia** (L. sp. 332.) *foliis fasciculorum sterilium ovatis cordatis reniformibusque* petiolatis, *petiolo folium pluries superante*, caulinis infimis lanceolatis, caeteris linearibus integerrimis, *caule paniculato-multifloro*, *corolla ovato-vel subturbinato-campanulata*, calycis laciniis subulatis erectis. 4. In pascuis, pratis siccis, sylvis, ad vias, muros. Jun.-autumn. D. fl. 2. p. 154. Fl. dan. 835. Variat:

β. hirta, inferior pars plantae pilis rigidulis hirta: D. fl. l. c.

γ. velutina, tota pilis brevibus densis cana: C. rotundifolia *β.* velutina DC. fl. fr. 5. p. 432.

δ. lancifolia, folia caulina inferiora bipollicaria, 3-4 lineas lata, superiora sensim breviora et angustiora: C. rotundifolia *δ.* lancifolia D. fl. l. c. C. rotundifolia *β.* reniformis Pers. syn. 1. p. 188. C. Baumgartenii Beck. Fl. v. Frankf. Haec in monte Feldberg prope Francof. ad Moen. provenit. — C. Hostii Baumg. transs. 3. p. 342. ab hac varietate non diversa videtur, vivam tamen observare nondum potui.

C. tenuifolia Hoffm. germ. 1. p. 100. constat e speciminibus inter gramina enatis, quorum folia inferiora putredine destructa fuerunt.

7. **C. Scheuchzeri** (Vill. prospect. d. l'hist. des plant. du Dauph. p. 22. 1779.) *foliis fasciculorum sterilium ovatis cordatisve* petiolatis, *petiolo folium pluries superante*, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis vel inferioribus crenato-serratis, *caule* 1 *floro vel racemoso*-2-6 *floro, calycis laciniis subulatis.* 4. In pascuis et pratis alpium et reg. subalpinarum, (durch d. ganze Alpenk., sodann auf d. Sudeten u. auf d. Belchen in Oberbaden.) Jul. Aug. C. linifolia Lam. dict. 1. p. 579. 1783. D. fl. 2. p. 157. Haenk. ap. Jacq. collect. 2. p. 81. 1788. C. rotundifolia *γ.* L. sp. 232. Var.:

α. glabra: C. linifolia DC. fl. fr. 3. p. 698. C. Scheuchzeri Vill. delph. 2. p. 503. t. 10.

β. hirta: C. valdensis All. ped. 1. p. 109. t. 6. f. 1. C. uniflora Vill. delph. 2. p. 500. t. 10.

8. **C. carnica** (Schiede ap. Mert. et Koch. D. fl. 2. p. 158.) *foliis fasciculorum sterilium ovatis cordatisve* petiolatis, *petiolo folium pluries superante*, caulinis linearibus, superioribus angustissimis, *caule unifloro, calycis laciniis lineari-setaceis* corollam aequantibus reflexis. 4. In rupium fissuris alpium Carnioliae, (zwischen Resiutte u. Ponteba an d. Hauptstrasse; sodann zwischen Veldes u. Wochein, auf dem westl. Abhange der Alpe Kren.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 158. C. linifolia Scop. carn. 1. p. 144. — Nomen Scopolii ob ambiguitatem praeferre nolui. G.

9. **C. rhomboidalis** (L. sp. 233.) *foliis ovatis* lanceolatisve *serratis*, superioribus sessilibus, inferioribus breviter petiolatis, *floribus paniculatis secundis*, calycis laciniis lanceolato-subulatis. 4. In subalpinis, (in d. Schweiz nicht selten, auf d. Jura überall, Gaud.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 163. St. h. 72. Barrel. f. 567. C. rhomboidea Willd. sp. 1. 899. H.

10. **C. bononiensis** (L. sp. 234.) *foliis* crenato-serratis *subtus tomentosocanis, inferioribus cordatis* longe petiolatis, superioribus ovatis acuminatis sessilibus, racemo terminali simplici vel paniculato-composito, calycis laciniis lanceolatis, *caule erecto tereti.* 4. In pratis siccis, collibus apricis, sylvarum oris, (in Mecklenburg, Pommern bei Stettin, Mittelmark, Schlesien, Mähren, Böhmen; am südöstlichen Rande des Harzes, Sachsen; Thüringen, Erfurt, Tanna, Sondershausen; Unteröstreich, Krain u. d. südl. Tyrol; im untern Wallis.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 167. St. h. 72. C. Thaliana Wallr. sched. p. 87. (totam speciem complectitur.) Reichenb. ic. 2. f. 221., (panicula laxiore basi ramosa,) et C. Thaliana Reichenb. l. c. f. 222. (panicula contracta.) C. simplex DC. fl. fr. 3. p. 730. (specim. racemo simplici.) C. ruthenica M. Bieberst. taur. cauc. 1. p. 151. 3. p. 142.

11. **C. rapunculoides** (L. sp. 234.) *foliis* inaequaliter serratis *subhirsutis, inferioribus subcordatis* longe petiolatis, superioribus lanceolatis, *racemo* terminali *secundo*, calycis laciniis lanceolatis caule erecto obtusangulo, *radice repente.* 4. In sylvis, agris, locis cultis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 167. Reichenb. ic. 6. f. 700. C. trachelioides Reichenb. l. c. f. 701., non MB.; C. crenata Link. en. h. berol. 1. p. 214. Reichenb. ic. l. c. f. 702. C. ucranica Spreng. nov. prov. p. 8. — C. trachelioides MBieberst.; in ditione florae nostrae lecta, ulterius observanda est.

12. **C. Trachelium** (L. sp. 235.) *foliis grosse duplicato-serratis hispidis, inferioribus* longe petiolatis *cordatis*, superioribus oblongis sessilibus, pedunculis axillaribus 1-3 floris in racemum dispositis, calycis laciniis ovato-

lanceolatis, *caule erecto argute angulato.* 4. In sylvis et dumetis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 165. Fl. dan. t. 1026. Variat:

β. dasycarpa, calyce hispido: C urticifolia Schmidt. boh. n. 173. Willd. sp. 1. 901.

13. **C. latifolia** (L. sp. 233.) *foliis ovato-lanceolatis acuminatis grosse duplicato-serratis hirtis* breviter petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris in racemum dispositis, laciniis calycis ovato-lanceolatis, *caule erecto-obsolete angulato.* 4. In sylvis et dumetis umbrosis subhumidis, (in Mecklenburg u. durch Pommern nach Preussen, Schlesien, Böhmen u. Mähren; im Erzgebirge; bei Quedlinburg; Blankenburg am Harz; Rhön, Wenderoth; auf d. Feldberge in Oberbaden; d. Vogesen; Steyermark; Schweiz hin u. wieder.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 164. Fl. dan. t. 85. St. h. 72.

14. **C. Erinus** (L. spec. 240.) hirta, caule ramoso superne dichotomo, *foliis* inferioribus *obovato-oblongis in petiolum brevem attenuatis,* floralibus oppositis utrinque uni-bidentatis, floribus subsessilibus. ⊙. In locis siccis petrosis, (Pola in Istrien im Amphitheater; um Fiume; um Mömpelgard im Oberelsass, vergl. Kirschleger prodr. fl. d'als. p. 82.) Jun. Wahlenbergia Erinus Link. Handb. 1. p. 631. Koch. syn. ed. 1. p. 473. Moris. s. 5. t. 3. f. 25. Roncela Erinus Dumort. secund. Reichenb. fl. exc. p. 296.; in Dumortierii scriptis non reperio. G.

c. Capsula erecta, basi dehiscens.

15. **C. Elatines** (L. sp. 240.) *foliis* serratis, fasciculorum sterilium *caulinisque inferioribus cordatis* longe petiolatis, *caulinis superioribus ovato-cordatis* acuminatis brevius petiolatis, *caulibus caespitosis simplicibus procumbentibus,* floribus racemoso-paniculatis, pedunculis axillaribus subtrifloris, calycis laciniis lineari-lanceolatis, *corolla ad tertiam partem quinquefida.* 4. In rupium fissuris reg. austral., (auf d. Insel Cherso, Biasol.) Mai. Jun. All. ped. 1. p. 114. t. 7. Folia Allionius describit acuminata et ita pingenda curavit. Linnaeus suam plantam ab Allionio accepit. Quid igitur sit C. Elatines Morettii apud Host. fl. a. 1. p. 270., foliis obtusis a C. Elatine et C. elatinoide diversa, conjicere nequeo. J.

16. **C. Morettiana** (Reichenb. iconogr. 4. p. 18. f. 499. 500.) *foliis* simpliciter serratis, fasciculorum sterilium *cordatis* longe petiolatis, caulinis ovatis in petiolum brevem protractis, inferioribus superioribusque minoribus, caule *erecto* 1-2 *floro, floribus erectis,* corolla calycis laciniis lanceolatis quadruplo longiore quinqueloba. 4. In rupium fissuris Tyrolis australis, (am Berge Udai im Fassa-Thale im südl. Tyrol, Elsmann; auf d. Berge Castellazzo di Ponereggio in Fiemme u. östl. bis an das Geb. von Agordo u. Feltre, Facchini.) Jul. Aug. C. filiformis Morett. pl. it. dec. 8., non Ruiz. et Pav. C. pulla Pollin. fl. veron. 1. p. 268. G.

17. **C. garganica** (Tenor. syllog. fl. neapol. p. 95.) *foliis* inaequaliter-vel biserratis, fasciculorum sterilium *caulinisque inferioribus cordatis* longe petiolatis, *caulinis mediis ovatis in petiolum protractis,* caulibus caespitosis simplicibus procumbentibus, floribus racemoso-paniculatis, pedunculis axillaribus subtrifloris, calycinis laciniis lanceolatis, *corolla* 5-*partita.* 4. In rupium fissuris reg. austr., (Felsen bei Tianova in Istrien, Felsen des Berges Triskavaz auf Veglia, Tommas.; auf d. Insel Cherso, Biasol.) Mai. Jun. C. garganica Ten. l. c. secund. specim. ab ipso cl. auctore in herb. amic. Martii. C. Elatines Ten. fl. neap. prod. p. 16., secundum citatum ipsius auctoris, non Linn. J.

18. **C. Raineri** (Perpent. in bibliothec. ital. 1817.) *foliis oblongo-obovatis* obtusis *remote crenatis* in petiolum brevem decurrentibus pubescentibus, inferioribus minoribus spathulatis, *caule* adscendente *unifloro,* flore cernuo, *calycis laciniis lato-lanceolatis acuminatis* remote denticulatis, corolla quinqueloba, lobis lato-ovatis. 4. In rupestribus Helvet. australis, (auf d. M. Generoso im Cant. Tessin.) Jul. Aug. H.

19. **C. pyramidalis** (L. sp. 232.) *foliis* serratis *glaberrimis* ovatis, superioribus lanceolatis, *fasciculorum sterilium cordatis* longe petiolatis, *caule*

stricto ramosissimo, ramis erectis cauli approximatis, calycis laciniis lanceolatis. ☉. In collibus saxosis, muris, (in Krain um Idria u. im Littorale bei Triest; Fiume sehr gemein, Noé; Monte Santo bei Goerz, Tommas.) Jul. Aug. D. flor. 2. p. 163. G.

d. Capsula erecta, in medio vel sub apice dehiscens.

20. **C. patula** (L. sp. 232.) *foliis* crenatis, *radicalibus oblongo-obovatis* in petiolum decurrentibus, caulinis lineari-lanceolatis sessilibus, *panicula* patula *subcorymbosa, floribus erectis*, ramis superne divisis, calycis laciniis subulatis. ☉. In pratis, ad sylvarum oras, (zwar durch d. ganze Gebiet, aber oft auf weiten Strecken gar nicht, fehlt z. B. auf d. linken Rheinufer von der Rheinpfalz bis zu d. Niederlanden.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 158. Fl. dan. t. 373. Variat glabra et hirsuta, atque calycis tubo glabro, et

β. dasycarpa, calyce hirsuto: D. fl. l. c.

γ. adenocarpa, calyce glanduloso-punctato: G. patula *β.* punctata Wallr. sched. 85.

δ. flaccida, rami filiformes, flores dimidio minores: C. patula *γ.* flaccida Wallr. sched. 85. C. neglecta R. et S. syst. veg. 5. 104.

21. **C. Rapunculus** (L. sp. 232.) *foliis* crenatis, *radicalibus oblongo-obovatis in petiolum decurrentibus*, caulinis lineari-lanceolatis, *panicula subracemosa, ramulis basi divisis*, laciniis calycinis subulatis. ☉. In pratis siccis, locis sylvaticis, collibus incultis. Mai-Aug. D. fl. 2. p. 160. Schk. t. 39. Variat caule foliisque glabris et hirtis, calycisque laciniis erectis atque reflexis.

22. **C. persicifolia** (L. sp. 232.) foliis remote minute serratis, *radicalibus oblongo-obovatis in petiolum decurrentibus*, caulinis lineari-lanceolatis sessilibus, *racemo pauciflоro, laciniis calycinis lanceolatis.* ♃. In sylvis praecipue montosis, in montosis praeruptis inter virgulta. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 160. Fl. dan. t. 1087. Variat floribus praemagnis C. persicifolia *β.* grandiflora DC. fl. fr. 3. 700.; caule hirto-canescente: C. hispida Lej. spa. 2. 299. et

β. eriocarpa, calyce hispido: D. fl. l. c.

23. **C. cenisia** (L. sp. 1669. in app.) *foliis obovatis* obtusis in petiolum brevem contractis *integerrimis glabris* basi ciliatis, *caulibus* adscendentibus 1 *floris* superne calyceque hispidis, calycis laciniis e basi lata lanceolatis, *corolla subquinquepartita*, laciniis ovato-lanceolatis. ♃. In summis alpium jugis, (d. südlichen Kette im Wallis.) Jul. Aug. All. ped. t. 6. f. 9. H.

Sect. II. Calycis sinus appendice destituti. Flores sessiles, in spicas vel capitula digesti.

24. **C. thyrsoidea** (L. sp. 236.) hispida, foliis lineari-oblongis obsolete crenatis, *floribus sessilibus in spicam ovato-oblongam densam congestis*, laciniis calycis ovato-lanceolatis. ☉. In pratis alpinis, (durch d. ganze Alpenkette.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 172. Jacq. a. t. 411. St. h. 41. Flores ochroleuci.

25. **C. spicata** (L. sp. 234.) hispida, *foliis oblongo-lanceolatis* obsolete crenatis, *inferioribus basin versus attenuatis*, superioribus e basi dilatata amplexicauli lanceolato-acuminatis, *floribus sessilibus in spicam elongatam interruptam dispositis, inferioribus ternis, superioribus solitariis.* ☉. In locis petrosis siccis convallium alpinarum et ad radices alpium reg. australium, (Krain; Tyrol auf d. Seiseralpe, auch tief um Botzen u. daselbst häufig, Hausmann; sparsam im ganzen südl. Tyrol, Facchin.; im C. Wallis u. Tessin.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 173. All. ped. t. 46. f. 2. t. 47. f. 1. St. h. 27. Flores caerulei.

26. **C. cervicaria** (L. sp. 235.) *hispida*, foliis minute crenatis, radicalibus lanceolatis in petiolum attenuatis, caulinis lanceolato-linearibus, superioribus basi amplexicauli sessilibus, *floribus sessilibus in capitula terminalia et lateralia congestis.* ♃. In sylvis et collibus incultis inter virgulta, (stellen-

weise im ganzen Gebiete.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 176. Reichenb. ic. 6. f. 778., 779. C. ligulata Reichenb. ic. 6. f. 781., non Waldst. et Kit., quae ad sectionem sequentem pertinet, et quam Cl. Reichenb. sub nomine C. capitatae ic. 6. f. 782. proposuit. Flores caerulei.

27. **C. glomerata** (L. sp. 235.) hirta vel cano-pubescens vel glabra, *foliis* minute crenatis, *radicalibus ovatis vel ovato-lanceolatis basi rotundatis vel cordatis*, caulinis superioribus basi cordata amplexicauli sessilibus, *floribus sessilibus in capitula terminalia et lateralia congestis.* 4. In pratis, locis incultis herbidis, ad sylvarum oras, (durch d. ganze Gebiet.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 174. Flores caerulei. Reichenb. ic. 6. f. 751-755., forma petiolis angustis; C. congesta R. et S. s. veg. 5. p. 125., forma foliis omnibus petiolatis, supremo sessili. Variat foliis latioribus et angustioribus, floribus maioribus et dimidio minoribus, glabra, hirta, hirsuta et

β. farinosa, caulis et folia subtus cano-tomentosa: C. glomerata *β.* salviaefolia Wallr. sched. p. 90. C. glomerata *β.* farinosa Rochel. pl. exs. C. farinosa Andrz. ap. Bess. en. pl. volh. p. 10. C. petraea Schmidt. boh. 2. p. 78. DC. fl. fr. 3. p. 730., non Linn. C. aggregata *α.* farinosa Reichenb. l. c. f. 757-759. Flores saepe minuti.

γ. aggregata, viridis, petioli foliorum caulinorum latiores, alati, flores maiores: C. aggregata Willd. en. h. berol. suppl. p. 10. Reichenb. ic. 6. f. 760. 761.

δ. speciosa, viridis, folia omnia ovato-cordata, flores magni speciosi: C. speciosa Hornem. hafn. 2. 957. Reichenb. ic. 6. f. 762.

ε. elliptica, foliis omnibus basi rotundatis vel in petiolum protractis, non cordatis: C. elliptica Kit. ap. Schult. Oestr. Flor. 1. p. 410. Eadem varietas, sed bracteis pallidis et reticulatis instructa, quae in aliis huius speciei varietatibus hinc inde quoque observantur: C. elliptica Reichenb. ic. 6. f. 763. 764. — Conf. fl. altaic. 1. p. 241.

Sect. III. Calycis sinus appendice deflexa instructi, quibus calycis tubus plus minusve obtegitur. Flores caerulei vel violacei.

28. **C. alpina** (Jacq. en. stirp. vind. p. 36. et 210.) caule superne *foliis* margine pedunculis calycibusque *lanato-villosis*, foliis *linearibus* vel linearioblongis subintegerrimis, floribus longe pedunculatis subracemosis cernuis, calycis laciniis lanceolato-subulatis, *appendicibus brevissimis*, corolla calyce paulo longiore apice pilis raris adspersa. 4. In locis siccis petrosis alpium, (in Graubünden, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark u. Unteröstreich.) Jun. Jul. L. sp. 2. 1669., ex Jacq. enum. desumpta. St. h. 51. Jacq. a. t. 118. D. fl. 2. p. 171.

29. **C. barbata** (L. sp. 236.) hirsuta, foliis oblongo-lanceolatis subintegerrimis, floribus pedunculatis axillaribus racemosis nutantibus subsecundis, calycis laciniis ovato-lanceolatis, *appendicibus tubum calycis subaequantibus*, *corolla* calyce subtriplo longiore *apice dense barbata.* 4. In locis herbidis alpium et reg. subalpinarum, (Schweiz u. durch d. ganze Alpenkette: in d. Sudeten.) Jul. Aug. Jacq. ob. bot. t. 37. D. fl. 2. p. 171.

30. **C. sibirica** (L. sp. 236.) hirta, foliis lanceolatis undulatis, infimis obtusis in petiolum attenuatis, superioribus acutis semiamplexicaulibus, floribus pedunculatis paniculatis nutantibus, calycis laciniis lanceolato-subulatis, *appendicibus tubum calycis aequantibus*, *corolla apice glabra.* ☉. In collibus herbidis, (Istrien, südl. Tyrol, Unteröstreich, Mähren, Schlesien und bis Frankf. a. d. O. u. Berlin.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 169. Jacq. a. t. 200. G.

Campanula Medium L., in D. fl. 2. p. 170. proposita, loca indicata non inhabitat, et nuspiam in ditione florae nostrae indigena facta est. — C. Allionii Vill. dubia Helvetiae civis est.

4. EDRAIÁNTHUS (Alph. DeCand. in DC. prodr. 7. p. 448.) Capsula apice intra calycem fragmentis vel valvis irregularibus caducis dehiscens denique intra calycem tota aperta, caetera ut Campanulae.

1. **E. tenuifolius** (Alph. DeCand. in DC. prodr. 7. p. 449.) foliis linearibus ciliatis setis rigidis, *bracteis* ovatis longe lineari-acuminatis, *setoso-ciliatis*, caule piloso. 4. In locis lapidosis, (Triest, Fiume; Monte d'Ossero, Tommas.) Jul. Aug. Campanula tenuifolia W. K. pl. rar. hung. 2. p. 168. t. 155. C. graminifolia Host. austr. 1. p. 268. Koch. syn. ed. 1. p. 472. Flores caerulei. G.

2. **E. Kitaibelii** (Alph. DeCand. in DC. prodr. 7. p. 449.) foliis linearibus vel anguste lanceolatis basi attenuatis ciliatis pilis mollibus supra saepe glabris, *bracteis* ovatis utrinque 1-2 dentatis *molliter villoso-ciliatis*, caule pubescente. 4. In pascuis alpinis et locis lapidosis, (Schneeberg im Karstgebirge, Tommasini, Dolliner.) Jul. Flores caerulei. G.

5. ADENÓPHORA (Fischer. in act. mosq. 6. 165.) Discus epigynus circa basin styli in tubuli formam prominens; caetera ut Campanulae.

1. **A. suaveolens** (Meyer. elench. plant. boruss. indig. p. 19.) caule erecto, foliis oblongis, inferioribus subpetiolatis, panicula effusa, calycis laciniis glanduloso-subserratis, stylo exserto. 4. In dumetis et sylvaticis, (bei Rastenburg in Preussen, Meyer!, auf d. Karlstein der Velika Gora in Böhmen sehr selten, Kosteletzky! in Schlesien am Geiersberge u. d. Strehlner Bergen; Gbg. Bondon im südl. Giudicarie bei d. Schlosse Lodron u. bei Trembellano ober Rovoredo.) Jul. Aug. A. lilifolia DC. prodr. 7. 492. A. communis Fisch. l. c. Ledeb. fl. altaic. 1. p. 246. Campanula lilifolia L. sp. p. 233. C. Alpini L. sp. 1669. C. lilifolia D. fl. 2. p. 162. MBieberst. taur. cauc. 3. p. 139. et plurim. auct. C. suaveolens Willd. en. suppl. p. 10. C. intermedia Schult. s. veg. 5. p. 110. C. Fischeri Schult. l. c. p. 116. Conf. de hac specie fl. altaic. l. c. Flores pallide caerulei. G.

6. SPECULARIA (Heister. syst. pl. p. 8. sec. Alph. DC. mon. camp. p. 44.) Cor. rotata, limbo plano. Caps. lineari-oblonga, prismatica. Caetera ut Campanulae.

1. **S. Speculum** (DC. prodr. 7. p. 490.) caule erecto ramoso divaricato, ramis inferioribus elongatis adscendentibus, foliis oblongis, inferioribus obovatis, floribus solitariis, *laciniis calycinis linearibus longitudine corollae brevioribusve.* ☉. Inter segetes, (stellenweise durch das südliche u. mittlere Gebiet.) Jun. Jul. Campanula Speculum L. sp. 1. 238. D. fl. 2. p. 178. Prismatocarpus Speculum L'Herit. ap. DC. fl. fr. 3. p. 709. Koch. syn. ed. 1. p. 473. Flores purpureo-violacei. Occurrit calyce corollam aequante: Campanula cordata Visian. stirp. dalm. specim. p. 5. t. 2.

2. **S. hybrida** (DC. prodr. 7. p. 490.) caule erecto ramoso, ramis inferioribus elongatis adscendentibus, foliis oblongis, inferioribus obovatis, floribus solitariis, *laciniis calycis lanceolatis basi apiceque attenuatis corolla longioribus, ovario sub flore constricto.* ☉. Inter segetes, (bei Basel u. stellenweise durch Elsass bis Mainz, bei Trier, Saarlouis, u. durch Baden bis Frankf. a. M.; in Thüringen bei Arnstadt, Eisenach; im südl. Theil von Hannover u. in Westphalen; Triest; Istrien sehr häufig, ebenso Fiume, südl. Tyrol.) Jun. Jul. Campanula hybrida L. sp. 239. D. fl. 2. 178. Prismatocarpus hybridus L'Herit. ap. DC. fl. fr. 3. p. 708. Koch. syn. ed. 1. p. 473. Flores purpurei. G.

3. **S. falcata** (Alph. DC. monogr. camp. p. 345.) caule erecto ramoso, ramis inferioribus elongatis adscendentibus, foliis oblongis, inferioribus obovatis, floribus solitariis, *laciniis calycis e basi aeque lata lanceolato-linearibus longe attenuatis arcuato-reflexis corolla longioribus, ovario apice aequali.* ☉. Inter segetes et in locis cultis, (um Fiume häufig, Noé.)

7. WAHLENBERGIA (Schrad. cat. sem. hort. gött. 1814.) Capsula semisupera, ab apice in 3-5 valvulas septigeras dehiscens; caetera ut Campanulae.

1. **W. hederacea** (Reichenb. ic. 5. p. 47. t. 380. f. 673.) *foliis cordato-*

subrotundis angulato-quinquelobis petiolatis glabris, caule filiformi ramoso, pedunculis solitariis elongatis. 4. In pratis turfosis et locis uliginosis, ubi inter Sphagna repit, (in d. Rheinpfalz bei Kaiserslautern, zwischen d. Vogelwog u. d. Blechhammer u. an d. östlichen Seite des Pfaffenberges; über dem Dorfe Frauenlautern bei Saarlouis, Buddensieg; Varel, Bökler; im Oldenburgischen im Wäldchen bei Neuendorf sparsam, nicht bei Jever, Meyer chlor. hannov. p. 375.; in der Gegend v. Spa u. Malmedy, Lej.) Jun.-Aug. Campanula hederacea L. sp. 240. D. fl. 2. p. 179. Flores dilute caerulei.
G.

Ord. LXVII. VACCINEAE. DC. theor. elem. p. 216.

Cal. superus, 4-5 dentatus, vel integer. Cor. monopetala, 4-5 loba. *Stam.* cum laciniis corollae alternantia, vel numero dupla, *ante discum epigynum crenatum inserta, corollae haud adnata.* Antherae biloculares, bicornes. Ovarium 4-5 loculare, loculis pluriovulatis, placentis centralibus. Styl. 1; stigma simplex. Fructus baccatus. Embryo in axi albuminis, radicula hilum spectante. — Frutices foliis alternis.

1. VACCINIUM (L. gen. n. 483.) Cal. 4-5 fidus dentatusve, quandoque subinteger. Cor. 4-5 fida vel 4-5 dentata. Bacca globosa.

Sect. I. Myrtillus. Folia decidua. Corolla ovata vel globosa. Antherae bispinosae huic sectioni non propriae sunt, nam in Vaccinio intermedio sectionis sequentis etiam reperiuntur.

1. **V. Myrtillus** (L. sp. 498.) *foliis* deciduis *ovatis* minute serratis glabris, pedunculis unifloris solitariis axillaribus nutantibus, corolla globosa, *ramis argute angulatis.* ħ. In sylvis et ad earum margines; in alpes adscendens. Mai. Jun. Schk. t. 107. Flores dilute virides, carneo colore suffusi. Baccae nigrae. Variat antheris breviter bispinosis.

2. **V. uliginosum** (L. sp. 499.) *foliis* deciduis *obovatis* obtusis integerrimis *subtus glaucis reticulatis,* ramis teretibus, pedunculis aggregatis nutantibus, corolla ovata. ħ. In sylvis acerosis, solo turfoso; in alpes adscendens. Mai. Jun. St. h. 12. Flores albi vel rubelli; baccae nigrae.

Sect. II. Vitis idaea. Folia sempervirentia. Corolla campanulata.

3. **V. Vitis idaea** (L. sp. 500.) *foliis* sempervirentibus *obovatis* obtusis obsolete crenatis margine revolutis *subtus punctatis,* racemis terminalibus nutantibus, corollis campanulatis, antheris muticis, *stylo corollam excedente,* ramis teretibus. ħ. In sylvis et ericetis, solo arenario; in alpes adscendens. Mai.-Jul. Fl. dan. t. 40. Flores albi vel rubelli; baccae rubrae.

4. **V. intermedium** (Ruthe Fl. v. Brandenb. p. 377.) *foliis* sempervirentibus *ovalibus* obtusis *obtuse denticulatis* margine subrevolutis *subtus parce punctatis,* floribus axillaribus solitariis vel terminalibus in racemis paucifloris, corolla campanulata, antheris dorso bispinosis, *stylo incluso,* ramis subangulatis. ħ. In locis sylvaticis humidis, (Jungfernhaide, ein Nadelwald bei Berlin.) Mai. Jun. Flores majores quam in antecedente, rubelli. Baccae rubrae.
G.

Sect. III. Oxycoccos Pers. syn. 1. 419. Folia sempervirentia. Corolla rotata, reflexa.

5. **V. Oxycoccos** (L. sp. 500.) caule repente, ramis filiformibus prostratis, *foliis* sempervirentibus *ovatis acutiusculis subtus cinereis,* floribus longe pedunculatis nutantibus, corolla rotata, laciniis oblongis. ħ. In locis uliginosis turfosis, Sphagno repletis. Jun.-Aug. D. fl. 3. p. 36. Schk. t. 107. Oxycoccos palustris Pers. syn. 1. p. 419. Schollera Oxycoccos Roth. tent. 1. 170. Flores purpurei. Baccae rubrae.

Ord. LXVIII. ERICINEAE. Desv. journ. bot. 1813. p. 28. DC. fl. fr. 3. p. 671. et 675.

Cal. 4-5 fidus vel partitus, persistens. *Cor.* 1 *petala*, 4-5 fida vel partita, hypogyna, aestivatione imbricata. *Stamina* corollae laciniis alterna, aut dupla, *ante corollam disco hypogyno inserta, libera, nec corollae adnata. Ovarium* disco hypogyno insertum, liberum, *multiloculare*, loculis 1-multiovulatis, placentis centralibus. Styl. 1. Stigma 1. Fructus capsularis vel baccatus. *Sem. aptera.* Embryo in axi albuminis, radicula ad hilum versa. Folia exstipulata.

Trib. I. *ARBUTEAE* DeC. prodr. 7. p. 580. Fructus baccatus.

1. ÁRBUTUS (L. gen. n. 552.) Cal. 5 fidus. Cor. subovata, limbo quinquefido. Stam. 10. Antherae apice poris 2 dehiscentes. Bacca 5-locularis, loculis 4-5 spermis.

1. **A. Únedo** (L. sp. 566.) trunco erecto, foliis obovatis vel oblongo-lanceolatis serratis coriaceis glabris, panicula terminali nutante, pedicellis glabris. ♄. In montosis rupestribus, (Krain, Istrien, Fiume.) Octob.-Febr. Noé. D. fl. 3. p. 98. Flores albi, apice virides. G.

2. ARCTOSTÁPHYLOS (Adans.) Drupa pentapyrena, pyrenis monospermis; caetera ut Arbuti.

1. **A. alpina** (Spreng. syst. veg. 2. 287,) trunco prostrato, *foliis* obovatis *inaequaliter minute serratis* glabris basi integerrimis ciliatisque marcescentibus reticulato-venosis, venis subtus prominulis, racemis brevibus terminalibus. ♄. In locis petrosis siccis, (Schweiz u. durch d. Alpenkette.) Mai.-Jul. D. fl. 3. p. 99. Arbutus alpina L. sp. 566. St. h. 51. Fl. dan. t. 73. Flores albi, fauce viridescentes, cum foliis erumpentes.

2. **A. officinalis** (Wimm. et Grab. fl. siles. 1. 391.) trunco prostrato, *foliis* oblongo-obovatis *integerrimis* sempervirentibus glabris reticulato-venosis, venis utrinque impressis subtus obsoletioribus, iunioribus margine pubescentibus, racemis brevibus terminalibus. ♄. In ericetis et pinetis German. borealis, rarius in German. media; in petrosis subalpinis Helvet. et German. austral. Mai. Jun. D. fl. 3. p. 100. A. Uva ursi Spreng. s. veg. 2. 287. Arbutus Uva ursi L. sp. 566. St. h. 6. Flores carnei; baccae rubrae. Foliis subtus reticulato-venosis, non punctatis et margine non revolutis, a Vaccinio Vitis idaea facile dignoscitur, cuius folia in officinis cum foliis A. Uvae ursi commutantur.

Trib. II. *ANDROMEDEAE.* DC. prodr. 7. p. 588. Fructus capsularis loculicido-dehiscens, dissepimenta simplicia in medio valvularum. Corolla decidua.

3. ANDRÓMEDA (L. gen. n. 549.) Capsula 5 locularis, 5 valvis; caetera ut Arbuti.

1. **A. polifolia** (L. sp. 564.) pedunculis terminalibus subumbellatis flore triplo longioribus, *foliis lineari-lanceolatis* margine revolutis supra nitidis *subtus glaucis.* ♄. In paludibus turfosis et ericetis uliginosis planitierum, inque paludibus frigidis montium altiorum, (durch d. ganze Gebiet stellenweise, aber nicht überall.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 96. Schk. t. 118. Rhododendron polifolium Scop. carn. 1. p. 287. Pedunculi et calyces rosei, corollae albae, in colorem dilute roseum vergentes.

2. **A. calyculata** (L. sp. 565.) racemis terminalibus foliatis secundis, *foliis ovali-oblongis* cum mucronulo obtusis obsolete serrulatis *utrinque lepidotis.* ♄. In locis paludosis Borussiae orientalis et Pomeraniae, (bei Spittelhof in d. Gegend v. Königsberg, bei Rehrenhof in d. Gegend v. Greifs-

walde.) April. Mai. D. fl. 3. p. 97. Schk. t. 118. Cassandra calyculata Don. in edinb. phil. journ. Jul. 1834. DC. prodr. 7. p. 610. Lyonia calyculata Reichenb. fl. exc. p. 414. Flores albi.

Trib. III. *ERICEAE.* DC. prodr. 7. p. 612. Fructus capsularis, varie dehiscens. Corolla marcescens.

4. CALLUNA (Salisb. in Linn. transs. 6. p. 317.) Cal. tetraphyllus corolla longior. Cor. quadrifida. Stam. 8. Ovarium 4 loculare, pluriovulatum. Caps. quadrilocularis, quadrivalvis; dissepimenta a valvulis disjuncta, columellae adnata, suturis opposita.

1. **C. vulgaris** (Salisb. l. c. Smith. engl. fl. 2. p. 225.) ♄. In sylvis, pascuis sylvaticis et pratis siccis, solo arenoso. Aug.-autumn. Erica vulgaris L. sp. 501. D. fl. 3. p. 37. St. h. 1. Flores lilacini, rarius albi; variat in locis uliginosis

β. pubescens, foliis pubescentibus: E. ciliaris Huds. angl. 144., non Linn.

5. ERICA (L. gen. n. 484.) Cal. tetraphyllus vel quadripartitus. Corolla limbo quadrifido. Stam. 8. Ovarium 4 loculare, multiovulatum. Caps. quadrilocularis, quadrivalvis, valvulis medio septigeris, septo completo vel incompleto.

Paucarum florae nostrae specierum characteres, quibus inter se differunt, hic solummodo proponere, mihi sufficere videbatur.

1. **E. Tetralix** (L. sp. 502.) antheris aristatis inclusis, stigmate capitato, corolla urceolato-ovata quadridentata, *foliis* ternatis quaternatisve linearibus margine rotundatis *hispido-ciliatis,* floribus terminalibus capitato-umbellatis. ♄. In ericetis turfosis et locis paludosis, (auf d. Fläche des nördl. D. vom Niederrheine u. Westphalen durch Hannover, Holstein bis Preussen u. Schlesien; in d. Wetterau.) Jul.-Sept. D. fl. 3. p. 38. Fl. dan. t. 81. Flores carnei. G.

2. **E. cinerea** (L. sp. 501.) *antheris aristatis inclusis,* stigmate capitato, corolla urceolato-ovata quadridentata, *foliis* ternatis linearibus margine acuto subtus convexis rima exaratis *glabris,* floribus verticillato-racemosis. ♄. In ericetis, (über Dottendorf bei Bonn.) Jun. Jul. Fl. dan. t. 38. D. fl. 3. p. 39. E. humilis Neck. gallob. 182. E. mutabilis Salisb. soc. linn. 6. 369. Flores caerulescenti-purpurei. G.

3. **E. carnea** (L. sp. 504.) *antheris inermibus exsertis apice bifidis basi cum apice filamenti confluentibus,* stigmate minuto, corolla urceolato-tubulosa quadridentata, foliolis calycis lanceolatis corolla dimidia longioribus, foliis quaternis linearibus acutis margine acuto praeditis glabris, floribus racemosis subsecundis. ♄. In ericetis et sylvis acerosis montanis et subalpinis, (v. d. Schweiz durch d. ganze Alpenkette; bei Regensburg; in Oestreich, Mähren, Böhmen u. Schlesien.) April. Mai. D. fl. 3. p. 40. Jacq. a. t. 32. E. herbacea St. h. 26. Flores autumno apparent calyce viridi inclusi; in quo statu planta E. herbaceam L. exhibet. Flores carnei.

4. **E. vagans** (L. mant. p. 230.) *antheris inermibus exsertis bipartitis in apice filamenti lateraliter annexis,* stigmate minuto, corolla campanulata 4 dentata, foliolis calycis ovatis corolla triplo brevioribus, foliis quaternis linearibus margine acuto praeditis obtusiusculis glabris, floribus racemosis. ♄. Inter frutices in Insula Cherso et Osero. April. Flores carnei. Erica multiflora huic maxime affinis differt corollis longioribus, ovato-campanulatis, et antheris bifidis, neque ad basin usque partitis. J.

5. **E. arborea** (L. sp. 502.) antheris appendiculatis inclusis, stylo exserto subdeclinato, *stigmate peltato, corolla campanulata quadrifida,* laciniis ovatis obtusis, foliis ternis linearibus obtusis margine acutis subtus convexis rima exaratis glabris, ramis hirtis, floribus racemoso-paniculatis. ♄. In locis asperis, (Istrien bei Pola u. auf Osero u. Cherso, Südtyrol in Giudicarie häufig; Veltlin.) Mai. Jun. D. fl. 3. p. 41. E. scoparia Wulf. in Röm.

arch. 3. 359. E. lusitanica Roth. en. 2. p. 165. et, ut videtur, Rudolph. in Schrad. Journ. 2. 1. p. 286. Flores albi. G.

Menziesiam caeruleam Sw., quippe civem florae nostrae valde dubiam, omisi.

Trib. IV. *RHODOREAE.* D. Don. in Edinb. phil. journ. 17. p. 152. DC. prodr. 7. p. 712. Fructus capsularis, septicido-dehiscens, dissepimento-duplicato. Corolla decidua.

6. AZÁLEA (L. gen. n. 212.) Cal. 5 partitus. Cor. campanulata, aequalis, quinquefida. Stam. 5. Antherae rimis 2 longitudinalibus dehiscentes. Caps. quadrivalvis, marginibus valvularum inflexis quadrilocularis.

1. **A. procumbens** (L. sp. 215.) ♄. In rupibus alpium altiorum, (durch d. g. Alpenkette.) Jul. Aug. Schk. t. 36. Chamaeledon procumbens Link. en. p. 210. D. fl. 2. p. 139. Loiseleuria procumbens Desvaux. journ. bot. v. 3. p. 34. Flores rosei.

7. RHODODENDRON (L. gen. n. 548.) Cor. infundibuliformis vel rotata. Stam. 10. Antherae apice poris 2 dehiscentes. Caetera ut Azaleae. Flores rosei.

Sect. I. Eurhododendron DeC. prodr. 7. p. 721. Corolla infundibuliformis. Stam. declinata.

1. **R. ferrugineum** (L. sp. 562.) foliis oblongo-lanceolatis ellipticisve integerrimis vel obsolete crenatis margine glabris subtus glanduloso-lepidotis, *squamulis totam superficiem dense tegentibus* denique ferrugineis, racemis subumbellatis, *dentibus calycis breviter ovatis transverse latioribus,* corolla infundibuliformi. ♄. In alpibus praecipue graniticis, (dch. die Alpenkette.) Jul. Aug., tamen serius quam R. hirsutum et intermedium. D. fl. 3. p. 94. Jacq. a. t. 255.

2. **R. intermedium** (Tausch. Regensb. bot. Ztg. v. 19. p. 36.) foliis oblongo-lanceolatis ellipticisve obsolete crenatis integerrimisve remote ciliatis subtus dense glanduloso-punctatis, *punctis sejunctis* denique ferrugineis, racemis subumbellatis, *dentibus calycis oblongo-lanceolatis,* corolla infundibuliformi. ♄. Inter praecedentem et sequentem, cum quo secund. Dom. Finke floret. Num sit hujus varietas, an fortasse hybrida progenies observationibus ulterioribus eruendum est. Jul. Aug.

3. **R. hirsutum** (L. sp. p. 562.) foliis ellipticis vel oblongo-lanceolatis obtuse crenatis remote ciliatis glabris subtus glanduloso-punctatis, *punctis laxe sparsis,* racemis subumbellatis, *dentibus calycis oblongo-lanceolatis,* corolla infundibuliformi. ♄. In alpibus praecipue calcareis. Mai-Jul. D. fl. 3. p. 95. Jacq. a. t. 98. Variat: R. *latifolium* Hoppe bot. Ztg. v. 23. p. 525. folia lato-elliptica vel obovata, flores maiores dilutius colorati; variat porro foliis densius remotiusve ciliatis et fere margine glabris, foliisque etiam in superiore superficie punctatis.

Sect. II. Chamaecistus G. Don. syst. 3. p. 845. DC. prodr. 7. p. 725. Cor. rotata, stamina patentia.

4. **R. Chamaecistus** (L. sp. 562.) foliis elliptico-lanceolatis serrato-ciliatis glabris *eglandulosis,* floribus subgeminis, pedunculis calycibusque glanduloso-pilosis, corolla plana rotata. ♄. In alpium calcarearum rupibus; in subalpina descendens, (Oestreich, Steyerm., Krain, Salzburg, Tyrol.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 95. Jacq. a. t. 217. Rhodothamnus Chamaecistus Reichenb. fl. exc. p. 417. G.

8. LEDUM (L. gen. n. 546.) Cal. minutus, quinquedentatus. Cor. pentapetala. Antherae apice poris 2 dehiscentes. Caps. 5 locularis, a basi ad apicem in valvulas 5 dehiscens; dissepimenta e marginibus valvularum introflexis. Placentae 5, ex apice columellae dependentes.

1. **L. palustre** (L. sp. 561.) foliis linearibus margine revolutis subtus ramulisque ferrugineo-tomentosis, floribus decandris. ♄. In paludosis tur-

fosis, (stellenweise im nördlichen D., von Holstein bis Preussen u. Schlesien; seltner in Böhmen u. Mähren, Sachsen u. Thüringen; vereinzelt bei Regensburg u. auf d. Schwarzwalde.) Jul. Aug. D. fl. 3. p. 92. Schk. t. 177. Flores albi, raro rosei. G.

Ord. LXIX. PYROLACEAE. Lindl. syst. edit. germ. p. 283., excl. Monotropeis Nutt.

Discus hypogynus nullus. Semina minutissima arillo tubuloso reticulato inclusa, globosa, arillo multo minora. Caetera ut Ericinearum.

1. PYROLA (L. gen. n. 340.) Cal. 5 partitus. Pet. 5. Caps. 5 locularis, ramis 5 dehiscens; valvulae basi apiceque columellae adnatae, medio septiferae. — Filamenta apice nutantia. Antherae poris 2 prope insertionem filamenti dehiscentes.

Sect. I. Pyrolae genuinae. Filamenta subulata, a basi adscendentia. Margines rimarum capsulae pilis lanatis conjuncti. Folia reti venarum, in pagina superiore magis quam in inferiore prominulo, instructa.

1. **P. rotundifolia** (L. sp. 567.) staminibus sursum curvatis, *stylo* declinato *apice arcuato*, petalis obovatis, *laciniis calycis lanceolatis acuminatis* apice recurvatis corollam dimidiam aequantibus, racemo aequali. 4. In sylvis umbrosis. Jun. Jul. D. fl. 3. p. 102. Fl. dan. t. 1816. Flores albi; variat:

β. arenaria, minor, foliis dimidio minoribus acutiusculis, pedunculis calycem vix aequantibus, laciniis calycis latioribus oblongis obtusiusculis: haec in insula Norderney.

2. **P. chlorantha** (Swartz. act. holm. 1810. p. 190.) staminibus sursum curvatis, *stylo* declinato *apice arcuato*, petalis obovatis, *laciniis calycis ovatis* breviter acuminatis *aeque latis ac longis* corollae capsulaeque adpressis corolla quadruplo brevioribus, racemo aequali. 4. In sylvis umbrosis, (stellenweise und, wie es scheint, durch das ganze Gebiet.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 104. Sering. mus. helv. 3. icon. P. virens Schweigg. et Kört. fl. erlang. add. p. 154. P. media Hayn. darst. p. 22., non Sw., P. asarifolia Rad. monogr. p. 23., non Mich. P. rotundifolia St. h. 13. Flores virescenti-albidi.

3. **P. media** (Swartz. vet. ac. handl. 1804. p. 257. t. 7.) *staminibus aequaliter conniventibus*, stylo recto subobliquo, *annulo apicis styli stigmate latiore*. 4. In sylvis umbrosis raro, (Schweiz bei Rügisb.; Mecklenb. bei Lipen; Hessen bei Allend.; Gött. am Wiessner; am Huy bei Halberstadt, Sachsen; Thüring.; Böhm.; Schles.; bayer. Geb. bei Kreuth; Elsass zw. Soulzmatt u. Guebw.; Oberbad.; Tyrol; Steyerm.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 105. Rad. monogr. t. 3. f. 1. Flores albi.

4. **P. minor** (L. sp. 567.) *staminibus aequaliter conniventibus*, stylo recto perpendiculari, *stigmate* 5 crenato *latitudinem styli duplo superante*. 4. In sylvis. Jun. Jul. D. fl. 3. p. 106. St. h. 13. P. rosea Engl. bot. t. 2543. est eadem planta, conf. Smith. engl. fl. 2. 257. Flores rosei.

5. **P. secunda** (L. sp. 568.) *racemo secundo*. 4. In sylvis. Jun. Jul. D. fl. 3. p. 107. St. h. 13. Corolla ovali-oblonga, virescenti-alba. Fol. ovata, acuta.

Sect. II. Parnassioides, (Monesis Salisb.) Filamenta subulata, basi extrorsum curvata, trigona, crassa, sed non dilatata, inde adscendentia. Antherae corniculis 2 divergentibus. Margines rimarum capsulae glabri. Folia reti venarum, in pagina superiore prominulo, instructa. — Haec sectio multo magis cum sequente, quam cum antecedente, convenit.

6. **P. uniflora** (L. sp. 568.) *scapo unifloro*. 4. In sylvis umbrosis, rarius. Jun. Jul. D. fl. 3. p. 108. Schk. t. 119. Monesis grandiflora Salisb. in Gray. brit. arrang. 2. p. 403. DC. prodr. 7. p. 775. Flos speciosus, albus.

Sect. III. Chimaphila Pursh. Filamenta basi extrorsum curvata, dilatata, trigona, inde adscendentia, subulata. Antherae corniculis 2 divergentibus. Margines rimarum capsulae glabri. Folia reti venarum supra impresso. Capsula Chimaphilae umbellatae certissime a Pyrolae capsula non differt, nec apice dehiscit, sed latere, ut in caeteris.

7. **P. umbellata** (L. sp. 1. 565.) *floribus umbellatis*, foliis lanceolato-cuneatis. 4. In sylvis, (stellenweise zerstreut durch das Gebiet.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 107. Fl. dan. t. 1336. Chimaphila umbellata Nutt. gen. pl. amer. bor. 1. 274. DC. prodr. 7. p. 775. Flores rosei.

Ord. LXX. MONOTROPEAE. Nutt. gen. amer. 1. 272. Dub. bot. gall. p. 319.

Cal. 5 *sepalus*, persistens. Cor. 5 petala, hypogyna, aestivatione imbricata, persistens. *Stam.* hypogyna, *libera*, numero petalorum dupla, 5 *alterna e sinu glandularum hypogynarum, basin ovarii ambientium, egredientia;* 5 cum glandulis alternantia. *Ovarium* liberum, *semiquinqueloculare*. Caps. 5 valvis, valvulis, medio dissepimentum incompletum, ad basin columellae pentagonae adnatum, gerentibus. *Styl.* 1. Stigma magnum infundibuliforme. Sem. copiosa, arillo tubuloso reticulato inclusa, subglobosa, arillo multo minora. Flores laterales unam fructificationis partem excludunt.

1. MONÓTROPA (L. gen. n. 536.) Cal. 5 sepalus, sepalis planis. Cor. 5 petala; pet. basi gibba, subcalcarata, intus mellifera.

1. **M. Hypopitys** (L. sp. 555.) racemo multifloro, petalis denticulatis. 4. In sylvis umbrosis, intra folia semiputrida et humum laxum radices agens. Jul. Aug. D. fl. 3. p. 91. Tota planta decolor, pallida; stigmate solo mellei coloris. Occurrit

α. glabra, tota glabra, ovario punctis minutis elevatis obsesso: M. Hypophegea Wallr. sched. 191. Reichenb. ic. f. 675. M. Hypoxa Spreng. s. veg. 2. 317. M. hypopitys *α.* Roth. tent. 2. 461. St. h. 13. Hypopitys glabra DC. prodr. 7. p. 780.

β. hirsuta, caule inter flores pubescente, bracteis ciliatis, sepalis interne et margine petalis utrinque staminibus pistilloque hirsutis: M. Hypopitys Wallr. sched. 193. Reichenb. ic. f. 674. M. hypopitys *β.* hirsuta Roth. tent. 2. 462. Hypopitys multiflora Scop. carn. p. 285. Inter varietatem *α.* et *β.* multae reperiuntur formae intermediae, quae promiscue crescunt, tam in sylvis frondosis, quam acerosis.

Subclass. III. COROLLIFLORAE.

Calyx liber, gamosepalus, (monophyllus.) Cor. monopetala, hypogyna. Stamina corollae inserta. Ovarium liberum.

Ord. LXXI. EBENACEAE. Vent. tabl. p. 443.

Cal. 3-6 fidus, persistens. *Cor.* regularis, hypogyna; *limbo* 3-6 *fido*, laciniis aestivatione imbricatis. *Stam. cor. inserta, numero laciniarum duplo, aut indefinita.* Discus o. *Ovarium pluriloculare: loculis* 1-2 *ovulatis, ovulis pendulis.* Styl. 1, saepe divisus. Capsula aut bacca. Embryo rectus in albumine carnoso, radicula ad hilum versa. Flores saepe diclini.

1. DIOSPYROS (L. gen. 1161.) Cal. 4-6 fidus. Cor. imo calyci inserta, urceolata, limbo 4-6 fido. Stam. 8-16, imae corollae inserta, interdum sterilia. Stigmata 4. Bacca 8-12 locularis.

1. **D. Lotus** (L. sp. 1510.) foliis ovato-oblongis, subtus discoloribus. ♄. In collibus et sepibus reg. calidior., (im Canton Tessin, doch wahrscheinlich nur verwildert.) Jul. Aug. Lam. illustr. t. 858. Flores purpurei. H.

Ord. LXXII. AQUIFOLIACEAE. DC. theor. elem. ed. 1. p. 217. Celastrin. trib. prodr. 2. p. 11.

Cal 4-6 dentatus, aestivatione imbricatus. *Cor. regularis,* 4-6 *partita,* hypogyna, laciniis aestivatione imbricatis. *Stamina corollae inserta, laciniis ejusdem alterna.* Discus o. *Ovarium* 2-6 *loculare: loculis uniovulatis, ovulis pendulis;* stigma lobatum fere sessile. Fructus drupaceus, indehiscens. Albumen magnum. Embryo rectus, parvus, radicula ad hilum versa. Flores interdum unisexuales.

1. ILEX (L. gen. n. 172.) Cal. 4-5 dentatus. Cor. rotata, 4-5 partita. Stigmata 4-5, subsessilia. Drupa 4-5 pyrena.

1. **I. Aquifolium** (L. sp. 181.) foliis alternis ovatis acutis glabris lucidis spinoso-dentatis integerrimisve spinaque terminatis, pedunculis axillaribus brevibus multifloris, floribus subumbellatis. ♄. In sylvis et pascuis montosis, (v. Westphalen durch Hannover nach Holstein u. Mecklenburg in Menge; in d. Wäldern der die Alpen begleitenden Berge von Oestreich bis in die Schweiz; Panowitzer Wald bei Görz; im Schwarzwalde u. d. Vogesen und bis zur Mosel stellenweise.) Mai. Jun. D. fl. 1. p. 833. St. h. 7. Flores albi. Baccae rubrae.

Ord. LXXIII. OLEACEAE. Lindl. syst. ed. germ. p. 305. Oleineae Hoffmannsegg. et Link. fl. port. Lilaceae. Vent. tabl. 1. p. 308.

Cal. dentatus vel divisus. *Cor. regularis,* hypogyna, monopetala, limbo 4 fido; vel 4 petala, petalis per paria filamento connexa, aestivatione valvata. *Stamina* 2, tubo inserta vel petalis adnexa. Discus o. Ovarium biloculare, loculis 2 ovulatis, *ovulis pendulis* collateralibus. Fructus capsularis, baccatus vel drupaceus. Sem. albuminosa; embryo rectus, radicula ad hilum versa. Folia alterna.

Trib. I. *OLEINEAE.* Fructus carnosus.

1. ÓLEA (L. gen. n. 20.) Cal. 4 dentatus. Corollae limbus 4 fidus. Drupa 1-2 sperma, putamine osseo.

1. **O. europaea** (L. sp. 11.) foliis oppositis lanceolatis integerrimis discoloribus, racemis axillaribus compositis. ♄. Colitur in regionib. transalpinis calidis ibidemque indigena facta est, (Littorale; südl. Tyrol; Cant. Tessin.) Mai. Jun. D. fl. 1. 298. Tabernaem. Krtrb. 1450. Flores albi.

2. PHILLYRÉA (L. gen. n. 19.) Cal. 4 dentatus. Corollae limbus 4 fidus. Drupa 1-sperma, putamine fragili.

1. **P. media** (L. sp. 10.) fol. ovato-lanceolatis oblongisve minute serratis integerrimisque, drupa apiculata. ♄. In sylvis et dumetis, (um Fiume, in Istrien, Felsen bei Duino, See v. Toblin nördl. vom Gardasee im südlichen Tyrol.) Mart. Apr. D. fl. 1. 299. Ph. III. Clus. 1. 52. ic. Flores albi. — P. angustifolia L. foliis lanceolato-linearibus, duplo triplove angustioribus, integerrimis, raro denticulo uno alterove instructis, Cl. Bertolon. varietas Ph. mediae videtur. — Ph. latifolia L. secundum cl. Bertolon. differt foliis plantarum juniorum argute serratis et praecipue drupa obtusa umbilicata. G.

3. LIGUSTRUM (L. gen. n. 18.) Cal. 4 dentatus. Cor. limbus quadrifidus. Baccae loculi membrana tenuissima vestiti.

1. **L. vulgare** (L. sp. 10.) foliis oblongo-lanceolatis glabris, panicula terminali coarctata. ♄. In sylvis, collibus dumetosis, ad vias. Jun. Jul. D. fl. 1. 300. St. h. 14. Flores albi. Baccae nigrae.

Trib. II. *LILACEAE* Vent. Fructus siccus.

4. SYRINGA (L. gen. n. 22.) Cal. 4 dentatus. Cor. limbus quadrifidus. Caps. 1-2 sperma, bilocularis, bivalvis, valvulis navicularibus dimidium dissepimenti, maturitate fissi, gerentibus.

1. **S. vulgaris** (L. sp. 11.) foliis cordatis acuminatis. ♄. In sepibus hinc inde, quasi spontanea. Apr. Mai. D. fl. 1. 301. St. h. 2. Flores violacei, variant purpurei et albi.

5. FRAXINUS (L. gen. n. 1160.) Cal. 3-4 partitus vel nullus. Cor. 3-4 partita vel nulla. Ovarium biloculare, dissepimento valvulis contrario, loculis 1 ovulatis. Nux plano-compressa. Flores polygamo-dioici.

1. **F. excelsior** (L. sp. 1509.) foliis 3-6 jugis, foliolis sessilibus lanceolato-oblongis acuminatis serratis, floribus nudis, nucibus apice oblique emarginatis. ♄. In sylvis; alpes adscendens ad 3500 ped. Apr. Mai. D. fl. 1. p. 297. St. h. 44. Flores brunnei. Variat ramis vitellinis: F. aurea Willd. en. 1059.; foliis crispis: F. atrovirens Desf. arb. 1. p. 104.; foliis simplicibus: F. simplicifolia Willd. sp. 4. 1098. F. heterophylla Vahl. en. p. 53. — F. oxyphylla MBieb. differt stigmate simplici subemarginato et nucibus apice rotundato-obtusis integerrimis.

2. **F. Ornus** (L. sp. 1510.) foliis subtrijugis, foliolis petiolulatis lanceolatis ellipticisve acuminatis serratis, floribus completis. ♄. In montosis reg. calid., (Krain, südl. Kärnthen, südl. Tyrol, Cant. Tessin.) Apr. Mai. F. florifera Scop. carn. 2. 282. Ornus europaea Pers. syn. 1. 9. D. fl. 1. 306. Flores albi.

Ord. LXXIV. JASMINEAE. Rob. Brown. prodr. fl. nov. holl. p. 520. Vent. tabl. 1. p. 311.

Cal. dentatus vel divisus. *Cor. regularis*, hypogyna, *limbo* 5-8 *fido*, laciniis aestivatione spiraliter convolutis. *Stam.* 2, corollae inserta. Discus o. Ovarium 2 loculare, loculis 1 ovulatis, *ovulis erectis*. Styl. 1. Stigm. 1. Fructus capsularis vel baccatus. Embryo rectus, radicula ad hilum versa, albumen subnullum. Folia opposita.

1. JASMINUM (Linn. gen. n. 17.) Cal. 5-8 dentatus. Cor. limbus 5-8 fidus. Bacca solida, 1-2 sperma.

1. **J. officinale** (L. sp. 9.) foliis oppositis pinnatis, foliolis acuminatis, dentibus calycis filiformibus tubum corollae dimidium superantibus. ♄. In vineis, locis apricis, muris Helvet. et Tyrol. austr. et in littor., quasi spontanea, nec vero mere sylvestris. Jul. Aug. D. fl. 1. 302. Schk. t. 2. Flores albi.

Locus natalis Jasmini fruticantis prope Aquilejam valde dubius est, sec. cl. Tommasin. in litt.

Ord. LXXV. ASCLEPIADEAE. R. Brown. in Wern. soc. 1. p. 12. Apocynear. gen. Juss. gen. p. 143.

Cal. 5 partitus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, regularis*, 5 fida, aestivatione imbricata, raro valvata, decidua. Stam. 5, basi corollae inserta; filamenta saepe connata. *Pollen in massas coalescens, glandulis stigmatis*

affixas. Ovaria 2, styli 2, stigma ambobus stylis commune, dilatatum, pentagonum, angulis glanduliferis. Folliculi 2, placenta suturae applicata, serius libera. Sem. imbricata, pendula. Albumen tenue. Embryo rectus, radicula ad hilum versa.

1. CYNANCHUM (R. Br. l. c.) Cor. subrotata, profunde quinquefida. Corona staminea monophylla, simplex 5 loba, lobis antheris oppositis, vel duplex, appendiculis 5 interioribus. Massae pollinis ventricosae pendulae. Folliculi 2.

Sect. I. Scammonea. Corona latere interiore appendiculis 5, laciniis coronae exterioris oppositis, praedita, ideoque duplex.

1. **C. acutum** (L. sp. 310.) *caule volubili*, foliis profunde cordatis acuminatis, corollis glabris, *corona exteriori decemloba, lobis quinque lanceolatis acutis quinque interjectos emarginatos excedentibus*, interiori quinqueloba, lobis acutis. ♃. Ad littora maris, (auf dem Scoglio di S. Marina im Golfo di Medolino an dem Südende von Istrien, Tommasini.) Jul. Flores dilute rosei. J.

Sect. II. Vincetoxicum. Corona simplex appendiculis in latere interiori destituta.

2. **C. Vincetoxicum** (R. Br. l. c. p. 47.) caule erecto, foliis acuminatis in margine venisque pubescentibus, *intermediis ovato-cordatis, corollae* glabrae *laciniis ovatis*, corona quinqueloba, *lobis* ovatis rotundato-obtusis *disjunctis sed membrana interjecta pellucida connexis.* ♃. In montosis rupestribus, (stw. durch d. Geb.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 290. Asclepias Vincetoxicum L. sp. 314. St. h. 9. Flores intus albi corona ochroleuca, extus ochroleuci basi virente.

3. **C. laxum** (Bartling. in Koch. Taschenb. p. 350.) caule erecto, foliis acuminatis in margine venisque pubescentibus, *intermediis e cordata basi oblongo-lanceolatis longe attenuatis, corollae* glabrae laciniis *oblongis margine reflexis*, corona quinqueloba, *lobis* ovatis rotundato-obtusis *disjunctis sed membrana interjecta pellucida connexis.* ♃. In montosis et subalpinis, (Görz, Krain.) Mai-Jul. C. medium Koch. syn. ed. 1. p. 483., excl. syn. C. nigrum Host. fl. a. 1. p. 317., excl. omnibus synonymis et descriptione, a Jacquino, qui genuinam plantam descripsit, mutuata. Corolla utrinque alba basi virente. G.

4. **C. contiguum** (Koch. suppl. der D. fl. ined.) caule erecto, foliis acuminatis in margine venisque pubescentibus, *intermediis cordato-ovatis*, corollis glabris, corona ad medium quinqueloba, *lobis erectis dense contiguis genitalia arcte cingentibus liberis membrana connectente deficiente.* ♃. In pratis, (um Triest u. in Istrien, Tommas.) Mai-Jul. Color florum ut C. Vincetoxici. — Tres species, hic enumeratae, valde affines sunt, tamen me judicante diversae atque vivae non difficile distinguendae. Dignoscitur Cynanchum laxum a Cynancho Vincetoxico habitu graciliore, foliis caulinis intermediis dimidio angustioribus, inflorescentia laxiore et laciniis corollae oblongis latere valde reflexis; C. contiguum a binis memoratis facile distinguitur lobis coronae arcte contiguis et genitalia cingentibus. — Ab his differt C. fuscatum Link. colore florum fusco et lobis coronae rhombeis magis disjunctis et membrana latiore separatis; C. nigrum habet corollas intus pubescentes.

Locus natalis Cynanchi nigri, in D. fl. 2. p. 291., ex Schultesii oestr. fl. 1. p. 438., desumptus, valde dubius videtur.

Ord. LXXVI. APOCYNEAE. R. Brown. prodr. 465. Apocynearum gen. Juss. gen. p. 143.

Cal. 5 partitus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, regularis,* 5 fida, *aestivatione oblique contorta, decidua. Stam.* 5, corollae inserta, laciniis

alterna; filamenta libera. *Antherae stigmati incumbentes; pollen granulosus.* Ovaria multiovulata, 2 unilocularia, vel 1 biloculare. Styl. 2 vel 1. Stigma 1. Pericarpium folliculare, capsulare, drupaceum vel baccatum. Sem. albuminosa, embryo rectus, radicula ad hilum versa.

1. APÓCYNUM (L. gen. n. 305.) Cor. campanulata. Denticuli tubi 5, acuti laciniis corollae oppositi. Antherae medio stigmati cohaerentes. Ovaria 2. Styli subnulli. Stigma dilatatum. Folliculi 2.

1. **A. venetum** (L. sp. 311.) foliis oblongo-lanceolatis glabris mucronatis margine denticulato-scabris, umbellis paniculatis, pedicellis floribusque pulverulento-pubescentibus. ♃. In locis palustribus ad litus maris adriatici, (bei Triest, alla riva longa, Biasol.; zw. Monfalcone u. Aquileja, Sieb.) Jul. Aug. Flores rosei. G.

2. VINCA (L. gen. n. 295.) Cal. 5 partitus, cor. hypocrateriformis, fauce pentagona nuda, limbus 5 partitus, laciniis apice oblique truncatis. Antherae supra pistillum conniventes, denique contortae. Styl. 1, apicem versus stigmate succoso annulatus et apice ipso corona pilosa terminatus. Folliculi 2. Sem. nuda. — Flores caerulei, rarius in varietate albi.

1. **V. maior** (L. sp. 304.) *foliis* ovatis antice attenuatis *postice rotundatis subcordatisque*, calycis laciniis ciliatis, *caule* prostrato *repente*, ramis floriferis erectis. ♃. In sepibus, bei Görz, Scop., Tommasin.; Istrien, Biasol.; Wallis.) April. Mai. Pervinca maior Scop. carn. 1. p. 170. Folia margine plerumque ciliata.

2. **V. minor** (L. sp. 304.) foliis ovatis basi obtusis vel lanceolato-ellipticis vel lanceolatis, *basi apiceque acutis*, calycis laciniis glabris, *caule* prostrato *repente*, ramis floriferis erectis. ♃. In nemoribus et ad sepes umbrosas. Apr. Mai. Schk. t. 51. Pervinca minor Scop. carn. 2. p. 170. Folia margine glabra. Varietas foliis lanceolatis basi apiceque obtusis: V. intermedia Tausch. pl. sel. — Varietatem laciniis corollae oblique attenuatis, sub nomine Vincae acutiflorae Bert. misit cl. Facchin. sed Bertolonii planta (conf. flor. ital. 2. p. 751.) videtur varietas conformis Vincae majoris.

3. **V. herbacea** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 1. p. 8. t. 9.) foliis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, calycis laciniis ciliatis, *caulibus procumbentibus non radicantibus, radice multicaule.* ♃. In montibus et collibus apricis, (bisher bloss a. d. Biesamberge in d. Gegend von Wien, Osswald! Pittoni u. Host.) April. Mai. Folia, saltem iuniora, margine scabra. G.

3. NERIUM (L. gen. 295.) Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformis, fauce corona laciniata instructa, limbus 5 partitus, laciniis apice oblique truncatis. Antherae in appendicem filiformem pilosam desinentes. Styl. 1. Stigma truncatum, basi annulo cinctum. Folliculi 2. Sem. comosa.

1. **N. Oleander** (L. sp. 305.) foliis lanceolatis ternis subtus parallele venosis, calycis laciniis patentibus, dentibus coronae trifidis. ♄. In rupestribus regionum australium, (an der westlichen Seite des Gardasees auf tyrolischem Gebiete, Facchini.) Jul. Aug. Flores rosei. G.

Ord. LXXVII. GENTIANEAE. Juss. gen. p. 141.

Cal. monosepalus, divisus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna,* 4-8 *fida, marcescens. Stam. corollae inserta, tot quot laciniae corollae et iis alterna.* Ovar. 1. Styli 2, ex parte vel omnino connati. *Caps. polysperma, bivalvis, valvularum marginibus seminiferis; vel bilocularis, valvulis margine introflexis, dissepimentum constituentibus, placentis centralibus;* vel bacca polysperma. Embryo rectus, in axe albuminis carnosi, radicula ad hilum versa.

Trib. I. *MENYANTHEAE.* Ovarium disco hypogyno impositum vel glandulis stipatum. Folia alterna.

1. MENYÁNTHES (L. gen. 164., excl. spec.) Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformis, limbo quinquepartito, intus barbato. Ovarium annulo ciliato impositum. Stigma emarginatum. Caps. 1 locularis, bivalvis, polysperma, valvulis medio longitudinaliter placentiferis.

1. **M. trifoliata** (L. sp. 208.) foliis ternatis. 4. In locis paludosis, pratis turfosis, fossis. April. Mai. St. h. 8. Flores dilute rosei, barba alba.

2. LIMNANTHEMUM (Gmel. act. petrop. 1769. Griesebach. gen. et spec. gentian. p. 341.) Cal. 5 partitus. Cor. rotata, limbo 5 partito, marginibus laciniarum aestivatione inflexis, fauce barbata. Glandulae 5, cum staminibus alternantes, ad basin ovarii. Stigma bifidum. Caps. 1 locularis, bivalvis, polysperma, valvulis margine placentiferis.

1. **L. Nymphoides** (Link. fl. portug. 1. p. 344.) foliis natantibus cordato-orbiculatis, umbellis axillaribus sessilibus, corolla ciliata. 4. In aquis stagnantibus et lente fluentibus natans. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 126. Menyanthes Nymphoides L. sp. 207. St. h. 13. Waldschmidia Nymph. Wigg. prim. 20. Schweyckerta Nymph. Gmel. bad. 1. 447. Limnanthemum peltatum Gmel. act. petrop. 1769. 527. Villarsia Nymphoides Vent. chois. n. 9. p. 2. Koch. syn. ed. 1. p. 485. Flores flavi.

Trib. II. *GENTIANEAE VERAE.* Discus hypogynus nullus. Folia opposita.

3. CHLORA (L. gen. 1258. mant. p. 10.) Cal. 8 partitus. Cor. hypocrateriformis, limbo octopartito. Stam. 8, fauci inserta. Stigmata 2, leviter emarginata. Caps. unilocularis; placentae marginibus valvularum introflexis adnatae. — Flores lutei.

1. **C. perfoliata** (L. syst. nat. 2. 267.) *foliis caulinis triangulari-ovatis tota sua latitudine connatis*, calyce ad basin octofido, laciniis subulatis uninerviis corolla brevioribus, corollae laciniis oblongis obtusis. ⊙. In pratis pascuisque turfosis, humidis, (stw. a. d. Flächen d. Schweiz, von Basel bis nach Mainz; v. d. Littorale nach Oestreich u. Böhmen.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 3. f. 349.; sed stylus bifidus, ut in sequente, nec integer. Gentiana perfoliata L. sp. 335.

2. **C. serotina** (Koch. ap. Reichenb. ic. 3. p. 6. f. 351.) *foliis caulinis ovatis vel ovato-lanceolatis basi rotundata connatis,* calyce profunde octofido, laciniis lanceolato-subulatis siccitate subtrinerviis corollam subaequantibus, laciniis corollae acutiusculis vel acuminatis. ⊙. In pratis et pascuis turfosis, (auf d. Rheinfläche v. der Schweiz dch. Elsass bis Worms u. v. Oberbad. bis Mannheim.) Aug.-Oct. Specimina laciniis corollae acuminatis: C. acuminata K. et Ziz. cat. pl. palat. p. 20. Reichenb. ic. 3. f. 350.

4. SWERTIA (L. gen. n. 321.) Cal. 5 partitus. Cor. rotata, limbo plano 5 partito, laciniis basi foveis 2 nectariferis ambitu fimbriatis. Caps. unilocularis placentae marginibus valvularum adnatae.

1. **S. perennis** (L. sp. 328.) corolla 5 partita, pedunculis subulato-tetragonis, caule simplici, foliis radicalibus ellipticis. 4. In pratis turfosis alpium, et reg. subalpinarum, et in paludosis Germaniae borealis, (Schweiz, an d. Rigi, bei Einsiedeln, a. d. Voges., dch. d. ganze Alpenk.; a. d. Sudeten nur an einer Stelle oberhalb des Kessels, u. Erzgebirge; a. d. Mooren v. Holst., Mecklenb. u. Pomm.; Oberbad. u. Oberbayern.) Jul. Aug. Jacq. a. t. 243. Flores triste violacei.

5. LOMATOGÓNIUM (Alex. Braun. bot. Ztg. 13. 1. p. 221.) Cal. 5 partitus. Cor. rotata, limbo plano, 5 partito; laciniarum basis foveis nectariferis destituta. Styl. o. Stigma breve, integrum, linea papillosa, per margines valvularum ad basin ovarii utrinque decurrente. Caps. unilocularis, placentis margini valvularum adnatis.

1. **L. carinthiacum** (Alex. Braun. l. c.) corolla fauce barbata, laciniis calycis lanceolatis, foliis ovatis acutis, radicalibus obovatis obtusis, caule basi ramoso et foliato, pedunculis elongatis nudis. ☉. In alpium locis apricis lapidosis et glarea torrentium, (a. d. Nassfelde in Salzb., a. d. Pasterze u. Fleiss b. Heiligenblut, über Sagriz u. Döllach u. a. d. höchsten Möllthaler Alpen in Kärnthen; Hochebene des Schlehern westl. von der Kapelle aus; im Saasthale in d. Schw.) Aug.-Octob. Swertia carinthiaca Wulf. ic. Jacq. misc. 2. 53. t. 6. St. h. 22. Gentiana carinth. Froel. gent. p. 103. Pleurogyne carinthiaca Grieseb. gen. et spec. gent. p. 310. Flores dilute azurei.

6. GENTIÁNA (L. gen. 322.) Cal. 4-9 fidus vel partitus, vel dimidiato-spathaceus. Cor. tubus cylindricus vel campanulatus; limbus 5-9 fidus. Stam. 5-9 tubo corollae inserta. Styli 2, vel 1 stigmatibus 2. Discus hypogynus nullus. Caps. unilocularis, placentae marginibus valvularum introflexis adnatae. — Antherae quandoque connatae.

Sect. I. Coelanthe Froel. Faux corollae nuda. Cor. rotata, tubo brevi, vel subcampanulata, tubo clavato; tubus inter lacinias plica truncata, vel in appendicem integram bifidamve protracta, instructus. — Caulis omnium simplicissimus.

a. Flores verticillati vel capitati. Cal. dimidiatus spathaceus vel campanulatus et irregulariter 2-3 dentatus.

1. **G. lutea** (L. sp. 329.) floribus verticillatis, inferioribus pedunculatis, corollis fauce nudis rotatis 5 partitis, *laciniis lanceolatis attenuato-acutis tubo triplo longioribus, antheris liberis, calyce dimidiato* spathaceo, foliis ellipticis nervosis. ♃. In pascuis alpium et reg. subalpinarum, (Schweiz, Vorarlberg, südl. Tyrol, Krain; a. d. höhern Weiden d. Schwäb. Alp., d. Schwarzwaldes u. d. Vogesen; selten in Thüring., a. d. Gleichen bei Arnstadt.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 334. Tabern. Krtrb. 1102. Flores lutei, laciniae saepe tribus seriebus punctorum fuscorum notatae.

Gentianae tres sequentes ad formas hybridas referuntur.

2. **G. Thomasii** (Gillabog. ap. Villars. in Roem. coll. 1. p. 189., secund. Griesebach. gen. et sp. Gent. p. 212. G. purpureae-lutea Griesebach. l. c.) floribus verticillatis, inferioribus pedunculatis, corollis fauce nudis rotatis profunde 5 fidis, *laciniis oblongo-lanceolatis breviter acutis tubo dimidio triplove longioribus, antheris liberis, calyce dimidiato* spathaceo, foliis ellipticis nervosis. ♃. In pascuis alpinis Helv., rarissima, (Alpen über Bex in der Schweiz u. am Rhonegletscher.) Jul. Aug. G. Thomasii Hall. fil. ined. G. rubra Clairv. man. 73. G. hybrida Schleich. DC. fl. fr. 3. p. 651. Flores purpurei, in varietate punctis violaceis notati; his notis et laciniis corollae oblongis, obtusiusculis, vel apice breviter acutis ab antecedente differt, cuius fortasse varietas. H.

3. **G. Charpentieri** (Thomas. pl. exsicc. G. punctatae-lutea Griesebach. gen. et sp. gentian. p. 213.) floribus verticillatis, inferioribus petiolatis, corollis fauce nudis profunde 5 fidis, laciniis oblongo-lanceolatis tubo dimidio brevioribus, *antheris liberis, calyce campanulato truncato breviter bidentato,* dentibus lanceolato-subulatis acuminatis. ♃. In convallibus alpinis, (Thal v. Bevers in dem Engadin der Schweiz, Charpentier.) Jul. Aug. Calyx quandoque, praeter dentes majores, minoribus 1-3 instructus est. Flores lutei. H.

4. **G. Gaudiniana** (Thomas. pl. exsicc., G. punctatae-purpureae Grieseb. gen. et sp. Gent. p. 301.) floribus in apice caulis capitatis vel verticillatis, corollis 6 fidis fauce nudis, tubo campanulato, laciniis ovatis tubo quadruplo brevioribus, *calyce campanulato membranaceo truncato altero latere* 2-3 *dentato* altero edentato ibidemque ad medium usque fisso, *antheris connatis,* foliis nervosis, inferioribus ellipticis. ♃. In alpibus helveticis, (über Bex.) Jul. Aug. G. pannonica Gaud. helv. 2. p. 272. Flores purpureo-violacei. H.

5. **G. purpurea** (L. sp. 329.) floribus capitatis verticillatisque sessilibus, corollis fauce nudis campanulatis, limbo plerumque sexfido, *laciniis ovatis*

tubo triplo brevioribus, antheris coalitis, calyce dimidiato spathaceo, foliis nervosis, inferioribus ellipticis. 4. In alp. Helv. australioribus, (auf d. Aelener, Berner u. Walliser Alpen; a. d. Gotthard, Pilatus u. a.; nach v. Welden in Maly flora auch in Steyerm., von welchem Standorte ich noch kein Exemplar gesehen habe.) Jul. Aug. Fl. dan. t. 50. Cor. extus saturate vel etiam dilute purpurea, intus lutescens, tubus luteus. H.

b. Flores verticillati vel capitati. Cal. campanulatus, subaequaliter dentatus; rarius calyces dimidiati regularibus intermixti sunt.

6. **G. pannonica** (Scop. carn. 1. p. 182.) *floribus verticillatis,* corollis 6-7 fidis fauce nudis, tubo corollae campanulato, laciniis limbi tubo triplo brevioribus obtusiusculis, *calyce campanulato, dentibus* lanceolatis *recurvatis,* foliis sessilibus nervosis, inferioribus petiolatis ellipticis. 4. In locis graminosis alpium et reg. subalp., (nördl. Tyrol u. v. da d. d. g. Alpenk. bis Oestr.; im Böhmerwalde.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 335. Jacq. a. t. 156. St. h. 54. G. purpurea Schrank. bayer. fl. 509. Cor. saturate purpurea, punctis atropurpureis variegata, tubo pallide flavo. G.

7. **G. punctata** (L. sp. 329.) *floribus verticillatis,* corollis 6 fidis fauce nudis, tubo corollae campanulato, laciniis limbi tubo quadruplo brevioribus, *calyce campanulato, dentibus* lanceolatis *erectis,* foliis sessilibus nervosis, inferioribus petiolatis ellipticis. 4. In locis graminosis apricis alpium et reg. subalp., (d. d. g. Alpenk.; im Gesenke d. Sudeten; Böhmer Wald.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 336. Jacq. a. app. t. 28. St. h. 54. Flores pallide flavi, punctis atropurpureis picti. Variat:

β. concolor, floribus impunctatis: G. campanulata Jacq. a. app. t. 29.

8. **G. cruciata** (L. sp. 334.) *floribus verticillatis, corollis quadrifidis* fauce nudis, tubo corollae subclavato, *foliis* lanceolatis trinerviis basi *vaginantibus, vaginis inferioribus elongatis* superne dilatatis. 4. In pratis siccis, locis apricis incultis, (stellenweise d. d. g. G.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 337. Jacq. a. t. 372. Flores intense violacei, limbo supra azureo. Flos infimus solitarius plerumque 5 fidus, Buchinger.

c. Flores solitarii axillares, vel ad apicem caulis solitarii vel gemini.

9. **G. asclepiadea** (L. sp. 329.) *floribus oppositis* axillaribus terminalibusque, corollis quinquefidis fauce nudis, *tubo corollae clavato-campanulato, foliis* sessilibus *e basi ovata* rotundata *lanceolato-acuminatis* quinquenerviis margine scabris. 4. In locis graminosis et dumetis convall. alp., reg. subalp. et mont. alpes comitantium, (auf d. Vog., d. Alp. d. Schweiz bis Oestr., u. a. d. Sudeten.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 338. Jacq. a. t. 328. St. h. 54. Corolla intus pulchre azurea, punctis obscurioribus, raro alba.

10. **G. Pneumonanthe** (L. sp. 330.) caule 1-multifloro, *floribus solitariis* alternis oppositisve, corollis quinquefidis fauce nudis, *tubo corollae clavato-campanulato, foliis* brevissime vaginantibus lanceolato-*linearibus* obtusis, *infimis* minutis *squamaeformibus,* antheris coalitis, stigmatibus linearibus elongatis. 4. In pratis humidis turfosis, (stellenweise d. d. Geb.) Jul.-autumn. D. fl. 2. p. 339. St. h. 30. Flores intus intense azurei, striis 5 viridi-punctatis.

11. **G. Froelichii** (Hladnik. secund. D. Graf. in litt.) *caule unifloro, corolla* fauce nuda, *tubo clavato-campanulato,* foliis lanceolato-linearibus, radicalibus caulinisque inferioribus aggregatis vaginantibus, *vaginis membranaceis superne dilatatis,* antheris coalitis, stylo elongato dimidium ovarium subaequante, *stigmatibus oblongis.* 4. In summis alpium carniolicarum jugis, (zuerst v. D. Hladnik a. d. höchsten Kuppe d. Steineralpen Velka planava aufgefunden.) Aug. Sept. G. Hladnikiana Host. suppl. fl. a. ined. G. angustifolia Reichenb. fl. exc. p. 427. St. h. 54. G. Froelichii Jan. Reichenb. fl. exc. add. p. 865. G. carnica Welw. sec. Reichenb. l. c. Flores dilute caerulei, impunctati. G.

12. **G. frigida** (Haenke in Jacq. collect. 2. p. 13.) *caule* 1-2 *floro,* co-

rolla fauce nuda, *tubo clavato-campanulato*, foliis lanceolato-linearibus, radicalibus caulinisque inferioribus aggregatis vaginantibus, vaginis membranaceis superne dilatatis, *antheris liberis*, stylo brevi ovario multo breviore, stigmatibus oblongis. 4. In summis alp. granitic. jugis Styr., (a. d. Seckauer Alp., Haenke, Wulf.; a. d. Grieskogel daselbst, Angelis; hohe Zinken, Zechent u. andern A. nach Maly.) Jul. Aug. D. fl. 2. 339. St. h. 54. Cor. albida, punctis sparsis et intus striis 5 caerulescentibus, his in fauce confluentibus. G.

13. **G. acaulis** (L. sp. 330.) *caule unifloro*, corolla fauce nuda, *tubo clavato-campanulato, dentibus* calycis e basi latiore *attenuato-lanceolatis* tubo corollae *adpressis, foliis radicalibus rosulatis* lanceolatis ellipticisve, antheris coalitis, stigmatibus semiorbiculatis denticulatis. 4. In pratis et pascuis alp. et subalp., in planities descendens, (a. d. Vog. u. d. d. g. Alpenk.; in Oberschwaben u. durch Oberbayern bis Regensburg hinab; bei Halle selten.) In planitiebus Mai. Jun., in alpibus serius Jul. Aug. D. fl. 2. p. 540. Jacq. a. t. 136. St. h. 4. G. acaulis *β.* L. l. c. G. angustifolia Vill. delph. 2. 526. Nomen pessimum, quum in hoc genere certo angustifolia non sit. Linnaeus hanc a subsequente non nisi ut varietatem separavit; nomen Linnaeanum autem speciei notissimae, ab omnibus auctoribus ad novissima tempora usque nomine Gentianae acaulis salutatae, conservandum esse existimo. — Corollae limbus supra azureus.

14. **G. excisa** (Presl. bot. Ztg. 11. 1. p. 268.) *caule unifloro*, corolla fauce nuda, *tubo clavato-campanulato, dentibus* calycis e *basi paulo angustiore* ovato-lanceolatis *patentibus, foliis radicalibus rosulatis* ovalibus ellipticisve, antheris coalitis, stigmatibus semiorbiculatis denticulatis. 4. In summarum alp. pratis, tam graniticarum quam calcariarum; in Tyroli australi in convalles ad regiones Vitis et Oleae descendens, Dr. Facchini, (d. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. G. acaulis *α.* L. sp. 330., ex citato Casp. Bauhini, qui primus huius plantae mentionem fecit, quam ex alpibus helveticis habuit; sed Cl. Preslius primus ex omnibus eam clare descripsit. G. acaulis Vill. delph. 2. p. 525. Variat foliis obtusis et acutis atque

β. minor, flore foliisque dimidio minoribus: G. alpina Vill. delph. 2. 526. t. 10.

Sect. II. Calathia Froel. Tubus corollae cylindricus vel subventricosus; caetera ut sectionis antecedentis. — Antherae omnium liberae.

a. Radix multicaulis, caespitosa, caules florigeros simplicissimos, unifloros fasciculosque foliorum steriles, (capita radicalia in sequentibus annis in caules florigeros propullulantia,) agens. Flores intense azurei, rarius in varietate albi.

15. **G. bavarica** (L. sp. 331.) *caulibus caespitosis unifloris*, corollis fauce nudis, tubo cylindrico, *foliis obovatis rotundato-obtusissimis*, in petiolum brevem contractis, inferioribus vel omnibus confertis, *stylo profunde bifido*, stigmatibus semiorbiculatis. 4. In locis subirrigatis alp. edit., (Schweiz u. d. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 343. St. h. 41. G. prostrata Wahlenb. helv. p. 48., non L. Folia non rosulata, variat autem:

β. rotundifolia, foliis omnibus in caule brevi imbricatis: G. imbricata Schleich. exs., non Froel., G. rotundifolia Hopp.

16. **G. brachyphylla** (Vill. delph. 2. 258.) *caulibus caespitosis unifloris*, corolla fauce nuda, tubo cylindrico, *foliis subrotundo-ovatis breviter acuminatis* in petiolum brevem contractis, *radicalibus rosulatis*, stylo indiviso, stigmatibus semiorbiculatis. 4. In summis alp. granit., (südl. Schweiz, Tyr., Kärnth. u. Steyerm. u. wahrscheinlich d. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. St. h. 54. Praeter folia brevia a G. verna, cui valde similis, differt foliis crassiusculis subcarnosis mollibus.

17. **G. verna** (L. sp. 331.) *caulibus caespitosis unifloris*, corolla fauce nuda, tubo cylindrico, *calycis angulis anguste alatis, alis aequalibus, foliis* ellipticis lanceolatisve acutis basin versus angustioribus, *radicalibus rosulatis*, stylo indiviso, stigmatibus semiorbiculatis. 4. In pratis alp., ad nives perennes usque; descendens in subalpina et planities alpes comitantes,

(d. d. g. Alpenk. u. a. d. niedrigern Bergen u. d. Flächen von Oberbad., Würtemb. u. Bayern bis n. Oestreich; in Franken, bei Berlin, selten auf d. Sudeten u. d. Böhm. Gebirgen.) Mai-Jul. in alp. serius. D. fl. 2. p. 341. St. h. 40. Reichenb. ic. 9. f. 1116. Flores azurei.

18. **G. aestiva** (Roem. et Schult. syst. veg. 6. 156.) *caulibus caespitosis unifloris*, corolla fauce nuda, tubo cylindrico, *calycis angulis alatis, alis medio latioribus, foliis* ellipticis lanceolatisve acutis basin versus angustioribus, *radicalibus rosulatis*, stylo indiviso stigmatibus semiorbiculatis. 4. In pratis montanis et alp.; in planities, ad latera meridionalia sitas, descendens, Kärnthen, Krain bis an die Berge des Karschtes, Voralp. in Südtyrol, Sulzbacher Gebirge in Steyerm.) Mai. Jun. St. h. 54. G. angulosa MBieberst. taur. cauc. 1. 197. 3. 190. Reichenb. ic. 2. f. 246. 247. et 9. f. 1116-1118. G. verna β. angulosa Wahlenb. carp. 74. D. fl. 2. p. 342. G. utriculosa Wahlenb. helv. 273. Hippion aestivum Schmidt. boh. n. 119. Roem. arch. t. 3. f. 8. — Flores plerumque duplo maiores, quam in antecedente. Hanc seorsim proposui, quum a multis et strenuis viris ab antecedente separetur, sed vereor, ne in hanc transeat; meliores saltem characteres in viva planta eruendi sunt. — Secundum observationes cl. Facchinii, de novo institutas, formis intermediis in G. vernam transit; sed sec. cl. Hoppeum G. aestiva est planta saxatilis: G. verna crescit in humidis et uliginosis.

19. **G. imbricata** (Froelich. gent. p. 74.) *caulibus caespitosis unifloris*, corolla fauce nuda, tubo cylindrico, *foliis lanceolato-ellipticis acutis* basi attenuatis margine scabris, *omnibus imbricatis*, stylo indiviso, stigmatibus semiorbiculatis. 4. In summis alp. jugis, Tyrol. et Carniol., (auf d. Kirschbaumer Alpe in Tyr. u. auf vielen Alpen in Südtyrol, auf d. Kren u. Manhart in d. Jul. Alpen; Krainer Alpen, Müller!) Jul. Aug. St. h. 41. G. verna γ. imbricata D. fl. 2. 342. G. tergloviensis Hacq. pl. alp. p. 15. t. 2. f. 3. secund. cl. Tommasin. G.

20. **G. pumila** (Jacq. en. stirp. vind. p. 41. et 215.) *caulibus caespitosis unifloris*, corollae fauce nuda, tubo cylindrico, *foliis linearibus basi vix angustioribus*, inferioribus confertis, stylo indiviso, stigmatibus semiorbiculatis. 4. In summis alp. jugis, (Krain, Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. Jacq. a. t. 302. D. fl. 2. p. 344. G.

b. Radix simplex, caulis ramosus; fasciculi foliorum steriles nulli.

21. **G. prostrata** (Haenk. in Jacq. collect. 2. p. 66. t. 17. f. 2.) *caule basi ramoso*, radice simplici, fauce corollae nuda, tubo cylindrico, *appendicibus dimidias limbi lacinias superantibus*, foliis obovatis obtusis, stigmatibus obtusis, stylo bipartito revoluto. ⊙. In summis alpibus ad moles glaciales, (a. d. Alp. Kartal u. Frosnitz in Salzb.; a. d. Heiligenbluter Tauern u. d. Pasterze in Kärnthen; auf d. todten Gebirge bei Aussee in Steyerm.; Tyrol auf der Hochebene des Schlehern westlich v. der Kapelle aus.) Jul. Aug. Flores dilute caerulei in caulibus 1-2 pollicaribus. Calyx et corolla saepe quadrifida. G.

22. **G. utriculosa** (L. sp. 332.) *caule a basi ramoso*, radice simplici, fauce corollae nuda, foliis ovatis oblongisve obtusis, radicalibus rosulatis, *calycibus inflatis alato-angulatis oblongo-ovalibus*, stylo elongato bifido, stigmatibus semiorbiculatis. ⊙. In pasc. humidis alp. et reg. subalpin.; in planities descendens, (auf Flächen im Oberelsass, Oberbaden, Oberbayern, auch a. d. Rheinfläche zwischen Dürkheim u. Mannheim.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 345. St. h. 30. Flores splendidissime caerulei.

23. **G. nivalis** (L. sp. 332.) *caule a basi ramoso*, radice simplici, fauce corollae nuda, foliis ovatis oblongisve, radicalibus rosulatis, *calycibus cylindricis carinato-angulatis*, stylo breviusculo bifido, stigmatibus semiorbicularibus. ⊙. In summis alpibus, (d. d. g. Alpenk. im südlichen Tyrol hinabsteigend bis in die Region des Ackerbaues.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 345. St. h. 22. Flores pulcherrime caerulei. In summis alpibus ad nives aeternas saepe pusilla et uniflora.

Sect. III. Endotricha Froel. gent. 86. Faux corollae intus barbata; ad singularum laciniarum basin scillicet squama bifida et simul capillaceo-multifida sita est.

a. Calyx tubulosus, 4-5 dentatus. Caulis erectus, racemosus vel paniculatus.

24.. **G. campestris** (L. sp. 334.) *corollis* quadrifidis *fauce barbatis, dentibus calycinis* inaequalibus, *exterioribus duobus lato-ellipticis*, foliis ovato-lanceolatis acutis, radicalibus obovatis petiolatis, capsula subsessili. ⊙. In locis apricis alp. et subalp. atque in montosis et planitiebus reg. septentrionalium, (d. d. g. Alpenk.; in Mähr., Schles., Böhm. u. d. d. g. nördl. D. vom Harze an.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 347. Fl. dan. t. 387. Flores saturate violacei. Capsula brevissime stipitata stipite vix sextam longitudinis partem capsulae attingens. Variat foliis latioribus, inferioribus obtusioribus: G. chloraefolia N. v. Esenb.

25. **G. germanica** (Willd. sp. 1. 1346.) *corollis* quinquefidis *fauce barbatis, calyce* 5 *dentato*, dentibus lineari-lanceolatis subaequalibus, *foliis* sessilibus *ovatis* e basi latiore attenuatis *acutis*, radicalibus obovatis petiolatis; capsula subsessili. ⊙. In pratis et locis sylvaticis humidis. Aug. Sept. D. fl. 2. p. 347. St. h. 23. G. Amarella Pollich. pal. 1. 255. et plurim. auct. germ. — Specim. humillima uniflora sunt: G. uniflora Willd. sp. 1346. Hippion Gentianella Schmidt. Roem. arch. 1. p. 13. t. 3. f. 4. — Capsula, ut antecedentis, brevissime stipitata.

26. **G. Amarella** (L. sp. 334.) *corollis* 5 fidis *fauce barbatis, calyce* 5 *dentato*, dentibus lineari-lanceolatis subaequalibus, *foliis* sessilibus *e basi latiore lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis*, radicalibus obovatis petiolatis, capsula longe stipitata, stipite tertiam capsulae partem attingens. ☉. In pratis et pascuis humidis, (im nördl. D. gemein, sodann in Sachsen, Böhmen u. Schlesien.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 548. Simillima antecedenti, sed flores dimidio minores et folia dimidio angustiora. Specimina subracemosa pedunculis brevibus, floribus internodia non aequantibus: G. Amarella Willd. sp. 1. 1347., G. axillaris Reichenb. ic. 2. f. 250., Hippion axillare Schmidt.; specimina pedunculis gracilioribus, floribus internodia caulis superantibus: G. uliginosa Willd. sp. 1. 1347., Reichenb. ic. 1. f. 118. 119.; specimen humile ramosissimum: G. obtusifolia Reichenb. ic. 2. f. 248. — Stipes capsulae et receptaculo usque ad semina tertiam partem capsulae habet.

27. **G. obtusifolia** (Willd. sp. 1. 1347.) *corollis* 5 fidis *fauce barbatis, calyce* 5 *dentato*, dentibus lineari-lanceolatis subaequalibus, *foliis* sessilibus *oblongis obtusis*, radicalibus obovatis, supremis ovato-lanceolatis acutis. ⊙ In pascuis alp. et subalp., montiumque altiorum. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 349. St. h. 54. G. pyramidalis Nees v. Esenb. St. h. 54. (specimen a basi pyramidato-ramosum.) G. spathulata Bartl. ap. Reichenb. ic. 1. f. 195-197. G. montana N. v. Esenb. Hippion obtusifolium Schmidt. boh. n. 126. Capsula brevissime stipitata. Variat:

β. calycina, calycis laciniis latissime ovatis, in acumen lanceolatum terminatis. Haec in Tyroli australi, D. Facchini.

b. Calyx 4-5 partitus, corollae non accumbens. Caulis basi tantum ramosus et foliatus; rami in pedunculos nudos et plerumque elongatos abeuntes.

28. **G. tenella** (Rottbel. act. hafn. 10. p. 436. t. 2. f. 6.) *corollis* quadrifidis tubuloso-campanulatis *fauce barbatis, calyce quadripartito*, laciniis ovato-lanceolatis subaequalibus, *foliis elliptico-oblongis acutiusculis*, caule basi ramoso et foliato, pedunculis elongatis nudis. ⊙. In alpibus editissimis, saepe in vicinia molium glacialium, (auf d. südl. Alpenk. d. Schweiz; Tyrol, Salzb., Kärnth.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 350. St. h. 54. G. glacialis Abr. Thomas. ap. Vill. delph. 2. p. 532. Koch. syn. ed. 1. p. 491. G. tetragona Roth. tent. 2. 290. G. Koenigii Gunn. norw. p. 102. Hippion longepedunculatum Schm. Röm. arch. 1. 21. t. 3. f. 5. bona.

29. **G. nana** (Wulf. in Jacq. misc. 1. 161. t. 18. f. 3.) *corollis* 4-5 fidis tubuloso-campanulatis *fauce barbatis, calyce* 4-5 *partito*, laciniis ovatis subaequalibus, *foliis obovatis rotundato-obtusis*, caule ramoso, ramis adscendenti-

bus. ⊙. In alp. altiss. Salisburg. et Carinth. ad nives perennes, (a. d. Heiligenbluter u. Nassfelder Tauern u. d. Gamsgrube bei Hblut.; südl. Abhang d. Glockners, höchste Möllthaler Alpen.) Aug. Sept. D. fl. 2. 351. St. h. 22., haud bona. Hippion nanum Schm. Roem. arch. 1. 20. t. 4. f. 10. opt. G.

Sect. IV. Grossopetalum Froel. Corollae laciniae fimbriatae; faux nuda.

30. **G. ciliata** (L. sp. 334.) floribus terminalibus, *corolla* quadrifida fauce nuda, *laciniis* serratis medio *inciso-fimbriatis*, foliis lineari-lanceolatis, caule flexuoso anguloso. ⊙. In montosis asperis, locis subhumidis. Aug. Sept. D. fl. 2. p. 346. St. h. 23. Flores caerulei.

7. CICENDIA (Adanson.) Cal. tubulosus, 4 dentatus, vel 4 partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 4 partito. Stam. 4. Styl. 1. Stigma capitatum. Discus hypogynus o. Caps. 1 locularis vel semibilocularis.

1. **C. filiformis** (Reichenb. fl. exc. p. 431.) *caule a basi ramoso*, pedunculis elongatis nudis, radice simplici, fauce corollae nuda, foliis lanceolatis, *calycibus breviter campanulatis quadridentatis*, *stylo indiviso*, stigmate capitato bilobo. ⊙. In pascuis arenosis humidis, (bei Birkenfeld an der Nahe u. vom Niederrheine durch Westph., Hannov., Holst. nach Mecklenb.; um Henau in d. Wetterau; Istrien auf d. südl. Vorgebirge.) Jul. Aug. in Istrien Mai. Gentiana filiformis L. sp. 335. Koch. syn. ed. 1. p. 490. Exacum filiforme Willd. sp. 1. 638. D. fl. 1. p. 799. Vaill. bot. par. t. 6. f. 3. Flores flavi, appendices inter corollae lacinias nullae. G.

8. ERYTHRÆA (Ren. Richard. ap. Pers. syn. 1. 283.) Cal. 5 fidus. Cor. infundibuliformis, limbo 5 fido. Antherae defloratae spiraliter contortae. Caps., marginibus valvularum inflexis bilocularis.

1. **E. Centaurium** (Pers. syn. 1. 283.) caule simplici quadrangulari, *foliis ovali-oblongis* subquinquenerviis, *corymbo* terminali fasciculato deflorato laxiusculo *semper fastigiato*, corollae laciniis ovalibus, stigmatibus subrotundis stylo apice bifido triplo quadruplove brevioribus. ⊙. In pascuis et locis sylvarum denutatis subhumidis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 232. Gentiana Centaurium L. sp. 232. Chironia Centaurium Schmidt. boh. 1. n. 130. St. h. 12. Flores pulchre carnei. Variat:

β. capitata, corymbo etiam post anthesin compacto, nec elongato: E. capitata R. et S. syst. veg. 4. 163. D. fl. 2. p. 132. In Westph. u. Brandenb.

E. grandifloram, reiterato examine, saltem quod specimina, a Cl. Preslio in Sicilia lecta, attinet, ab E. Centaurio nunc quidem nulla nota diversam puto.

2. **E. linariaefolia** (Gentiana Lam. dict. 5. p. 641. Erythraea linearifolia Pers. syn. 1. p. 283.) caule quadrangulari, *foliis linearibus* vel linearioblongis subtrinerviis, *corymbo* primum fastigiato, serius in ramos erectos *paniculato-elongatos remote florigeros soluto*, laciniis corollae ovalibus, stigmatibus subrotundis stylo apice bifido quadruplo brevioribus. ⊙. In arenosis et pascuis salsis, (an d. Küste der Nord- u. Ostsee; in d. Mark Brandenbg., in Thüringen a. salzhaltigen Orten.) Jul. Aug. D. fl. 2. 235. (excl. syn. Eryth. confertae.) Reichenb. ic. f. 185-189. E. littoralis Fries. nov. ed. 2. p. 74. E. compressa Hayn. ap. Kunth. fl. berol. p. 65. E. angustifolia Wallr. sched. 504. Gentiana linariaefolia Lam. dict. 2. 641., quo ex libro Persoonius speciem desumpsit, nomine in E. linarifoliam mutato, ut videtur, per errorem scriptorium. Chironia uliginosa W. K. pl. r. h. 5. p. 287. t. 259. Flores carnei. G.

3. **E. pulchella** (Fries. nov. ed. 2. p. 74.) *caule* acute quadrangulari ramosissimo inque *ramos patentes soluto*, foliis ovatis quinquenerviis, *floribus* alaribus *pedicellatis*, corollae laciniis lanceolatis, stigmatibus subrotundis stylo apice bifido quadruplo brevioribus. ⊙. In pascuis et pratis sterilibus subhumidis. Jul. Aug. D. fl. 2. 235. E. inaperta Schlechtend. fl. ber. 1.

131. E. ramosissima Pers. syn. 1. 283., excl. var. β. Chironia Gerardi Schmidt. boh. 1. n. 131. Gentiana Centaurium β. L. sp. 333. Specimina depauperata caule uni- vel paucifloro simplici: Chironia Vaillantii Schm. boh. n. 132. C. inaperta Willd. sp. 1. 1069., excl. syn. Vaill. Gentiana pulchella Swartz. act. holm. 1783. t. 3. f. 8. 9. Flores carnei.

4. **E. maritima** (Pers. syn. 1. p. 283.) caule quadrangulari superne ramoso, foliis ovatis, floribus alaribus pedicellatis sessilibusve, corollae laciniis ovatis acutiusculis, *stigmatibus oblongis stylo longioribus.* ⊙. In pratis, (Istrien in der Valle Bendon zwischen Fasana u. Pola; Insel Lossino.) Jun. Gentiana maritima L. mant. p. 55. Chironia lutea Bert. amoen. it. p. 76. Ch. maritima Bert. fl. it. v. 2. p. 646. J.

5. **E. spicata** (Pers. syn. 1. 283.) caule quadrangulari, *ramis* simplicibus floribus lateralibus *elongato-spicatis,* foliis oblongis subquinquenerviis, laciniis corollae lanceolatis, *stigmatibus subrotundis stylo apice bifido quadruplo brevioribus.* ⊙. In uliginosis et paludosis ad mare adriaticum, (bei Triest u. Aquileja.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 237. Gentiana spicata L. sp. 1. 333. Flores rosei. G.

Ord. LXXVIII. POLEMONIACEAE. Lindl. syn. 168. Polemonideae Dub. bot. gall. p. 329.

Cal. monosepalus, divisus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna,* regularis vel paulo inaequalis, 5 fida, aestivatione imbricata. *Stam.* 5, *tubo corollae inserta,* eiusdem laciniis alterna. *Ovarium* liberum, *triloculare, pauci-multiovulatum,* placentis centralibus; ovulis adscendentibus vel peltatis. Styl. 1. Stigm. trifidum. Caps. 3 valvis: valvis medio septiferis, vel costa prominente instructis; axis centralis trigonus, angulis suis valvularum septis costisve applicitus. Embryo rectus in albumine corneo, radicula ad hilum versa.

1. POLEMONIUM (L. gen. n. 217.) Cal. 5 fidus. Cor. rotata, limbo quinquelobo; faux clausa staminibus basi dilatatis. Antherae incumbentes.

1. **P. caeruleum** (L. sp. 162.) glabrum vel sparsim pilosum superne glanduloso-pubescens, caule folioso, foliis pinnatis, pinnis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, panicula glanduloso-pilosa, calycis quinquefidi laciniis ovato-lanceolatis acuminatis, floribus erectis. 4. In pratis paludosis et sylvarum locis herbidis humidis, in subalpinis, (Steyermark, in d. Krainer A., d. Schweiz hin u. wieder, Tyrol, Würtemberg, Oberbayern, Unterharz, Preussen.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 145. St. h. 27. Flores caerulei, rarius albi.

Ord. LXXIX. CONVOLVULACEAE. Juss. gen. p. 132.

Cal. 5 fidus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, regularis,* decidua; limbo 5 lobo, plerumque longitudinaliter plicato. *Stamina* 5, *fundo corollae inserta,* lobis alterna. *Ovarium* liberum, disco hypogyno insertum, 2-4 *loculare,* raro subuniloculare; *ovulis definitis erectis.* Styl. 1, interdum partitus. Caps. 2, 3, 4 valvis: valvulis a margine dissepimentorum solutis dehiscens, vel transverse vel non dehiscens. Semina in basi angulorum centralium affixa, dissepimentis incompletis fundum ovarii tantum occupantibus, albumine parco mucilaginoso. Embryo curvatus, cotyledonibus corrugatis,

radicula ad hilum versa, vel o. Plantae saepe volubiles et lactescentes, folia alterna exstipulata, in Cuscutinis nulla.

Tribus I. *GENUINAE* Link. Handb. 1. 589. Foliis et cotyledonibus praeditae.

1. CONVOLVULUS (L. gen. n. 215.) Cor. infundibuliformi-campanulata, angulato-5 loba, 5 plicata. Stylus indivisus; stigmata 2. Caps. 2-4 locularis, loculis 2 spermis.

§. 1. Flores basi bracteis 2 dilatatis cincti. Calystegia R. Brown.

1. **C. sepium** (L. sp. 218.) *foliis sagittatis*, auriculis truncatis saepe dentatis, *calyce bracteis cordatis incluso*, pedunculis quadrangularibus unifloris petiolo longioribus. 4. In sepibus et dumetis. Jul.-autumn. D. fl. 2. p. 142. St. h. 1. Flores albi. — C. sylvestris Willd. en. h. berol. 1. p. 202. 1809., C. sylvaticus W. Kit. pl. rar. hung. 3. p. 290. t. 261. 1812., circa Tergestum non raro proveniens, mihi hucusque dubia species est, nam praeter partium magnitudinem paulo majorem, notam constantem, saltem ex speciminibus siccis, eruere nondum potui.

2. **C. Soldanella** (L. sp. 226.) *foliis reniformibus*, *calyce bracteis ovatis obtusis fulto*, pedunculis alato-angulatis unifloris. 4. In arenosis maritimis, (bei Aquileja, Biasol.! Ins. St. Andria bei Istrien; „auf d. Oldenb. Insel Wangeroog früherhin vom verstorb. Möhring gesammelt, dessen Exemplare ich besitze, im J. 1821.“ v. H. D. Kellner“ Mey. chlor. Hannov. p. 263.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 143. Engl. bot. t. 314. Flores albi. G.

§. 2. Bracteae a flore remotae; caulis volubilis.

3. **C. arvensis** (L. sp. 218.) *foliis sagittatis*, auriculis acutis, pedunculis subunifloris, *bracteis a flore remotis*. 4. In locis cultis, aggeribus, fluviorum glareis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 141. Fl. dan. t. 459. Flores rosei vel albi, extus striis 5 rubris. Variat:

β. hirtus: C. villosus Lej. fl. spad. 2. p. 298. Variat insuper foliis ovatis, oblongis et linearibus, auriculis acutis et obtusis.

4. **C. tenuissimus** (Sibth. et Sm. fl. graec. prodr. 1. p. 134.) *foliis* cordatis cauleque *argenteo-sericeis*, inferioribus integris, superioribus pedatopartitis, laciniis linearibus integerrimis, pedunculis 1-2 floris. 4. In locis sterilibus, (Istrien, Cherso.) Jun. Jul. Clus. hist. 2. p. 49. fig. inf. C. argyreus DC. fl. fr. 5. p. 423. C. althaeoides M. et K. D. fl. 2. p. 143. K. syn. ed. 1. p. 494. C. althaeoides L. sp. var. *β.* p. 222. Flores rosei. J.

§. 3. Bracteae a flore remotae; caulis non volubilis.

5. **C. Cantabrica** (L. sp. 225.) *foliis lineari-lanceolatis* acutis, caulibus ramosis prostratis, calyce piloso, pedunculis subunifloris. 4. In incultis asperis apricis, (im südwestl. Tyrol bei Arco sparsam, Facch.; Unteröstreich, Host; bei Triest, Biasol.! Inseln v. Istrien.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 144. Jacq. a. t. 296. Flores rosei. G.

Trib. II. *CUSCUTINAE* Link. Handb. 1. p. 594. Folia nulla. Embryo spiralis, acotyledoneus.

2. CUSCUTA (L. gen. n. 170.) Cal. 4-5 fidus. Cor. campanulata vel urceolata, 4-5 fida. Styli 2 vel 1. Caps. circumscissa. — Omnes species florae nostrae in tubo corollae squamis, infra stamina collocatis, instructae sunt. Herbae filiformes, aphyllae, post germinationem parasiticae.

1. **C. europaea** (L. sp. 180., excl. var. *β.*) caule ramoso, *tubo* corollae cylindrico *limbum aequante*, *squamis erectis tubo adpressis*, stigmatibus filiformibus. ☉. In Urtica dioica, Humulo, Cannabi, Salicibus parasitica. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 330. St. h. 10. C. maior DeC. fl. fr. 2. p. 644. C. vulgaris Pers. syn. 1. p. 289. C. tubulosa Presl.! delic. p. 215. Flores dilute purpurascentes.

2. **C. Epithymum** (L. syst. veg. ed. Murr. p. 140.) caule ramoso, tubo

1. **O. verna** (Moench. meth. 420.) *foliis* petiolatis subglabris, radicalibus *cordato-ovatis*, caulinis superioribus ovato-lanceolatis, racemis geminatis pauciflоris. 4. In sylvis umbrosis, (in Krain, Untersteyermark; bei Salzburg.) April. Mai. D. fl. 2. p. 69. O. repens Schrank. Denks. d. Münch. Ac. 1811. p. 221. Cynoglossum Omphalodes L. sp. 192. St. h. 21. Picotia verna R. et S. s. veg. 4. p. 85. Flores azurei. G.

2. **O. scorpioides** (Lehm. neu. Schrift. d. ges. nat. berl. 7. p. 100.) caule prostrato, superne dichotomo, *foliis* scabris, radicalibus spathulatis, caulinis *lanceolatis* sessilibus, inferioribus oppositis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus. ☉. In nemoribus, dumetis umbrosis humidis, (Schlesien, Mähren, Böhmen bis Dresden; Blankenburg am Harz; in Franken bei Schweinfurt; Steyerm.) Apr. Mai. D. fl. 2. p. 70. Cynoglossum scorpioides Haenk. in Jacq. coll. 2. p. 3. St. h. 21. Flores caerulei. G.

Trib. III. *ANCHUSEAE.* Nuces 4, disco hypogyno insertae, basi annulo tumido striato instructae et intra annulum excavatae. Stylus liber.

6. BORÁGO (L. gen. n. 188.) Nuces 4, liberae, basi excavatae ibidemque margine tumido plicato-striato praeditae. Cor. rotata. Fornices breves, obtusi, emarginati. Filamenta bifida, crure interiore antherifero.

1. **B. officinalis** (L. sp. 197.) foliis inferioribus ellipticis obtusis basi attenuatis, laciniis limbi ovatis acuminatis planis. ☉. In hortis colitur, ibique et in ruderatis atque hortorum rejectamentis quasi sponte provenit. Jun. Jul. St. h. 8. Flores caerulei.

7. ANCHUSA (L. gen. 182.) Nuces 4, liberae, basi excavatae ibidemque margine tumido plicato-striato praeditae. Cor. infundibuliformis, tubo recto; fauce clausa fornicibus obtusis.

1. **A. officinalis** (L. sp. 191.) foliis lanceolatis hispidis, bracteis ovato-lanceolatis, calyce quinquefido, laciniis acutiusculis, *pilis ramorum paniculae et calycis patulis, fornicibus ovatis velutinis.* ☉ quandoque 4. In locis incultis lapidosis, ad vias, muros. Mai-autumn. D. fl. 2. p. 59. St. h. 18. A. angustifolia DC. fl. fr. 2. p. 632. 5. p. 421. A. officinalis Reichenb. ic. 3. f. 479., forma spicis densioribus et dentibus calycis post anthesin conniventibus. A. arvalis Reichenb. ic. 3. f. 470., forma spicis laxioribus et dentibus calycis post anthesin erectis. A. officinalis et angustifolia Pollich. palat. 1. p. 182. 183. Gmel. bad. 1. p. 417. et 419., omniumque flor. germ. A. officinalis et A. arvensis Tausch. bot. Ztg. 7. 233. Variat hispiditate maiore vel minore, foliis latioribus vel angustioribus, spicis densioribus vel laxioribus, calycibus vix ad medium usque divisis vel, praecipue in specim. fructiferis, fere 5 partitis, dentibus calycis peracta anthesi erectis vel conniventibus, colore floris perfecte explicati violaceo, violaceo cum stria azurea, vel toto azureo, rarius etiam carneo et albo, sed inter omnes has variationes nullibi limites invenias.

2. **A. leptophylla** (R. et S. syst. veg. 4. p. 90.) foliis lanceolatis hispidis, bracteis ovato-lanceolatis, calyce quinquefido, laciniis obtusissimis, *pilis ramorum paniculae et calycis accumbentibus, fornicibus ovatis velutinis.* ☉. In locis incultis Tyrolis et Helv. australis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 61. A. angustifolia Lehmann. asperif. 1. p. 244. — A. officinali omnino valde similis est, sed bona species videtur. Folia ratione latitudinis longiora, a medio apicem versus attenuata et longe acutata: panicula in planta sicca cana et subsericea ob pilos accumbentes. Vivam nondum vidi. — Nomen Anchusae angustifoliae, quippe vere ambiguum factum, in Anchusae leptophyllae mutavi. Linnaei A. angustifolia hucusque extricari nondum potuit. Descriptio brevis vix characterem in difficili hoc genere exhibet, quo species distinguatur, et synonyma, ex mea sententia, ad varietatem Anchusae officinalis, floribus roseis ornatam, (A. incarnatam Schrad.,) pertinent. Zanonii pulchra icon certe nil aliud refert. Sibthorpii plantam, collata tabula 164 florae graecae, ab A. leptophylla longe diversam inveni, calyce tubo corollae duplo

breviore aliisque notis. A. angustifolia Reichenb. ic. 8. f. 967., excl. synonym., ad A. italicam, A. angustifolia DC. fl. fr. 3. p. 632. et suppl. 421. ad A. officinalem pertinent, cui Aiton. perperam calycem quinquepartitum tribuit. Herbarium Willdenowii sub n. 3307. fol. I. nomine: A. angustifoliae exhibet A. leptophyllam; specimina caetera ad A. officinalem pertinent.

3. **A. italica** (Retzius obs. bot. fasc. 1. p. 12.) caule ramoso erecto, *foliis* lanceolatis undulatis hispidis *nitidis*, racemis geminatis bracteatis, bracteis lineari-lanceolatis, laciniis calycis subulatis tubo corollae subaequalis longioribus, *fornicibus oblongis penicillato-pilosis*. ☉. In vineis, ad vias, (um Triest; C. Wallis u. Tess.; Oberbaden am Kaiserstuhl.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 63. A. paniculata Ait. kew. ed. 1. p. 777. Flores speciosi, pulchre azurei, fornicibus albis. Variat autem, ut omnes, floribus maioribus et minoribus, stylo breviore et longiore, staminibus altius et profundius insertis. A. angustifolia Rchb. fl. exc. p. 343. ic. 8. f. 967., A. paniculata Rchb. fl. exc. p. 343., A. azurea Rchb. fl. exc. p. 344. icon. 10. f. 1229. et A. italica Rchb. fl. exc. p. 344.; Buglossum angustifolium Tausch., B. paniculatum T., B. vulgare T. et B. italicum T. bot. Ztg. 7. p. 227-30., sunt modificationes Anchusae italicae.

8. LYCOPSIS (L. gen. n. 190.) Cor. tubus infracto-flexus et sursum curvatus, vel arcuatus et limbum irregularem obliquum gerens; caetera ut Anchusae. Flores in nostris caerulei.

1. **L. arvensis** (L. sp. 199.) caule erecto ramoso, *foliis lanceolatis repando-dentatis* hispidis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus semi-amplexicaulibus, racemis foliatis, tubo corollae in medio curvato. ☉. In arvis et locis cultis. Jun.-autumn. Schk. t. 31. Anchusa arvensis M. Bieb. taur. cauc. 1. 123. D. fl. 2. p. 63. Flores caerulei.

2. **L. variegata** (L. sp. 198.) caulibus adscendentibus, *foliis oblongo-lanceolatis repando-dentatis* hispidis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus semiamplexicaulibus, racemis superne nudis subsolitariis, *tubo corollae rectiusculo, limbo irregulari* obliquo. ☉. In locis cultis, ad vias, (Istrien, Osero.) Mai. Jun. L. bullata Cyr. pl. rar. fasc. 1. p. 34. t. 11. f. 3. Barrel. f. 403. Anchusa variegata Lehm. monogr. p. 223. A. perlata Lam. ill. gen. n. 1820. Cor. limbus azureus, lineis 5 albis, fornicibus niveis. J.

3. **L. orientalis** (L. sp. 199.) caule erecto dichotome ramoso, *foliis ovato-oblongis integerrimis* vel remote obsolete repando-denticulatis hispidis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi inaequalibus semiamplexicaulibus, racemis foliatis, *tubo corollae infra medium curvato*. ☉. Inter segetes, (bei Verviers, Lej., ohne Zweifel mit Baumwolle eingeführt.) Flores caerulei. G.

9. NONNÉA (Medic. phil. bot. 1. p. 31.) Corollae faux aperta, barbata, vel fornicibus minutis pilosis obsita, sed his vix coarctata. Caetera ut Anchusae.

1. **N. pulla** (DC. fl. fr. 3. p. 626.) caule erecto subsimplici, foliis lanceolatis integerrimis adpresse pilosis, floralibus ovato-lanceolatis, limbo corollae aequalis tubum aequante. ☉. In agris et ad vias, (im östlich. D.; Oestreich u. v. da dch. Mähren, Böhmen, Schlesien nach Sachsen u. Thüringen u. d. Harz u. bis Berlin.) Mai. Jun. Lycopsis pulla L. sp. 198. D. fl. 2. p. 64. Anchusa pulla MBieb. taur. cauc. 1. 125. Limbus corollae intense purpureo-fuscus, e longinquo niger. G.

10. SÝMPHYTUM (L. gen. n. 158.) Cor. cylindrico-campanulata; fornices 5, subulati, in conum collocati, margine glanduloso-dentati. Nuces 4, liberae, basi excavatae, et basi margine tumido plicato-striato praeditae.

1. **S. officinale** (L. sp. 195.) radice fusiformi ramosa, *caule ramoso, foliis decurrentibus*, inferioribus radicalibusque ovato-lanceolatis in petiolum

contractis, superioribus floralibusque lanceolatis, corollae limbo quinquedentato, dentibus recurvatis, antheris filamento duplo longioribus. 4. In pratis udis, ad fluviorum ripas, fossas et dumeta pratorum. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 76. St. h. 17. Variat corollis albis, roseis et violaceis, calyce erecto, apice recurvo vel a basi patente, stylo corolla longiore et breviore. Forma corollis violaceis et calyce patente est: S. patens Sibth. oxon. p. 70., conf. Babington man. p. 206.; forma corollis albis et stylo exserto: S. bohemicum Schm. boh. n. 212.

2. **S. bulbosum** (Schimp. bot. Ztg. 8. 1. p. 17.) rhizomate stolonibusque subterraneis teretibus gracilibus elongatis tubera subrotunda sparsa gerentibus, caule folioso subramoso apice bifido, foliis ovato-oblongis semidecurrentibus, inferioribus in petiolum contractis, superioribus sessilibus basi rotundatis, corollis subcylindricis, limbo semiquinquefido, laciniis erectis, antheris longitudine filamentorum, *fornicibus exsertis.* 4. In vineis, (bei Heidelberg hinter der Krappfabrik, Schimper; im Cant. Tessin, in monte Generoso, Thomas.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 78. Schimp. Beschr. d. symph. Zeyher. p. 8. S. filipendulum Bischoff. bot. Ztg. 9. p. 561. S. Clusii Gmel. bad. 4. p. 144. S. punctatum Gaud. helv. 2. p. 41. Cor. tubus albidus, limbus dilute flavescens. In specimine helvetico, quod possideo, fornices et stylus parum tantum ultra corollam eminent, caeterum absque dubio huic speciei adnumerandum est. Specimen gallicum vero, ab amico b. Zizio prope Telonem lectum, ad aliam, et quidem, quantum scio, indescriptam speciem pertinet, quam in D. fl. l. c. cum S. bulboso confudi; S. mediterraneum rhizomate . . . ., caule folioso apice bifido, foliis ovatis, inferioribus in petiolum basi subdilatata amplexicaulem contractis, supremis elliptico-lanceolatis subdecurrentibus, corollis subinfundibuliformi-cylindricis, limbo quinquedentato, dentibus erectis limbo quadruplo brevioribus, antheris filamento duplo longioribus, fornicibus inclusis. Antherae basi cordatae ut in omnibus, sed auriculae in hac specie mucronulatae. Differt a S. tuberoso, foliis caulinis inferioribus caeteris maioribus petiolo basi dilatato amplexicaulibus et summis tantum subdecurrentibus, corollis dimidio minoribus, dentibus ipsarum erectis, et antheris basi utrinque apiculatis. Radicem et fructum nondum vidi.

3. **S. tuberosum** (L. sp. 195.) rhizomate obliquo tereti carnoso nodoso postice praemorso et breviter ramoso antice fibris descendentibus validis aucto, caule simplicissimo vel apice bifido, *foliis* semidecurrentibus, inferioribus ovatis in petiolum contractis, superioribus ellipticis, *infimis minoribus sub anthesi emarcidis*, corollis infundibuliformi-tubulosis 5 dentatis, dentibus recurvatis, antheris filamento duplo longioribus. 4. In sylvis umbrosis, praecipue montanis, (Oberbay., Salzb. Krain, Triest, Oestr., Mähr., Böhm., Schles. u. d. Erzgeb., Lugano in d. südl. Schwz.) April. Mai. Jacq. a. t. 3. t. 225. Flores ochroleuci.

Trib. IV. *LITHOSPERMEAE.* Nuces 4, vel 2 disco hypogyno insertae, basi non excavatae, sed area plana vel convexiuscula affixae. Stylus liber.

11. ONOSMA (L. gen. n. 159.) Nuces 4, liberae, area basilari subtriangulari plana affixae. Cor. cylindrico-campanulata, fauce fornicibus destituta. Antherae sagittatae, basi cohaerentes. — Flores primum albi, deinde ochroleuci.

1. **O. echioides** (L. sp. pl. 196. var. *β.*) caule ramosissimo, foliis linearilanceolatis hispidis *setis tuberculo glabro insidentibus*, floralibus ovato-lanceolatis, filamentis *antherа glabra* dimidio brevioribus. Biennis, saltem in horto nostro, rarius in tertium et quartum annum perdurans. In collibus asperis apricis, (in Mähr., Oestr. u. Krain, bei Fiume, südl. Tyr., im Wallis nach Gaud.) Jun. Jul. Jacq. a. t. 295. D. fl. 3. p. 83. Cerinthe echioides Scop. carn. 1. p. 129. Caulis purpureus. Flores ochroleuci, ut sequentium.

2. **O. arenarium** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 3. p. 308. t. 279.) caule

ramoso, foliis lineari-lanceolatis hispidis *setis tuberculo glabro insidentibus*, floralibus ovato-lanceolatis, filamentis *anthera margine denticulato-scabra* brevioribus. ☉. In sylvaticis siccis arenosis, (auf Sandplätzen im Föhrenwalde bei Mainz hinter der Hartmühle.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 84. G.

3. **O. stellulatum** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 189. t. 279. 805.) *caulibus simplicissimis,* foliis lineari-lanceolatis hispidis *setis tuberculo stellato-piloso insidentibus*, floralibus e basi ovata lanceolatis, filamentis anthera longioribus. ♃. In locis asperis apricis, (bei Fiume, Triest, im südl. Tyrol, in d. südl. Schweiz im Cant. Waadt u. Wallis.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 85. O. montanum Sibth. et Sm. fl. graec. prodr. 1. p. 121. 1806. Bertol. fl. ital. v. 2. p. 326. O. echioides *α.* L. sp. 196. Variat:

β. angustifolium, foliis angustioribus, densius pilosis, pilis quandoque tenuioribus: O. stellulata *β.* M. Bieb. taur. cauc. 1. p. 138. O. montana *β.* Bert. fl. ital. 2. p. 327. O. angustifolium Lehm. asperif. p. 361.

12. CERINTHE (L. gen. n. 186.) Nuces 2, liberae, biloculares, affixae area basilari semicirculari plana. Cor. cylindraceo-campanulata, fauce fornicibus destituta. Antherae sagittatae, basi cohaerentes.

1. **C. major** (L. sp. 195.) *corollis* 5 *dentatis*, dentibus breviter ovatis reflexis, *filamentis longitudine antherarum.* ☉. In sylvis alpinis, (auf d. Berner Alpen; ich besitze sie vom Stockhorn.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 80. St. h. 12. Variat in hortis corolla ochroleuca, ochroleuca tubo violaceo, et tota luride violacea. Characteres vero, quibus cl. Reichenb. Cerinthen maiorem, asperam et strigosam distinguit, aut reperire nequeo, aut e speciebus tribus hic memoratis duas nondum vidi. H.

2. **C. minor** (L. sp. 196.) *corollis* ultra tertiam partem *quinquefidis*, dentibus subulatis erecto-conniventibus, filamentis anthera quadruplo brevioribus. ☉. In campis, ad agrorum margines, vias, (d. g. Oberbayern bis Regensburg, südl. Tyrol, in Oestr. u. v. da durch Mähr. u. Schles., Böhm. bis Sachs.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 81. St. h. 68. C. glabra Scop. carn. 1. p. 128. Corolla flava. Variat foliis emarginatis: C. minor *β.* L. sp. pl. 196.; atque corolla maculis 5 fuscis notata: C. maculata M. Bieberst. taur. cauc. 1. 134. et si simul folia immaculata sunt: C. maculata Reichenb. ic. 4. f. 482. G.

3. **C. alpina** (Kit. ap. Schult. oestr. Fl. 1. p. 353.) *corollis quinquedentatis,* dentibus ovatis apice recurvatis, *filamentis anthera quadruplo brevioribus.* ♃. In alpibus et cum fluviis in planities descendens, (Schweiz nicht selten; Allgäu u. Tyrol u. a. d. Iller u. d. Lech bis gegen die Donau; im südl. Tyrol in Fiemme, Fassa u. der benachbarten Gegend; Sulzbacher Alpen in Steyermark.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 83. St. h. 68. C. quinquemaculata Wahlenb. carp. p. 50. C. suevica Mart. Reis. nach Vened. 1. 44. C. glabra Gaud. helv. p. 29. Reichenb. ic. 5. f. 658. (non Mill., cuius planta annua est neque a C. maiore differt nisi foliis glabris.)

13. ÉCHIUM (L. gen. n. 191.) Nuces 4, liberae, affixae area basilari triangulari plana. Cor. campanulata, vel a basi sensim ampliata; faux fornicibus destituta. Antherae ovales, liberae.

1. **E. vulgare** (L. sp. 200) setoso-hispidum, caule herbaceo, foliis lanceolatis, spicis indivisis, *tubo corollae calyce breviore*, stylo apice bifido, *staminibus* declinatis divaricatis corollae *limbo accumbentibus.* ☉. In locis rupestribus, arvis, ad vias, muros. Jun.-Sept. D. fl. p. 2. p. 88. St. h. 18. Flores caerulei, rarius rosei vel albi. Variat corollis maioribus et dimidio minoribus, staminibus corolla brevioribus et longe exsertis. — E. Wierzbickii Haberl. Reichenb. fl. excurs. p. 336., in Germania sponte proveniens, nil est nisi varietas E. vulgaris, staminibus corolla brevioribus; quod vero in hortis botanicis sub hoc nomine colitur, id nondum satis examinavi.

2. **E. pustulatum** (Sibth. et Sm. prodr. fl. graec. 1. p. 125.) setoso-hispidum, caule herbaceo, foliis lanceolatis, spicis indivisis, *tubo corollae calyce longiore*, stylo apice bifido, *staminibus* declinatis parallelis a *limbo co-*

rollae remotis. ☉. In locis incultis, (Istrien, Veglia.) Mai-Jul. Fl. graec. t. 180. Flores caerulei. — Simile E. vulgari, sed dignoscitur ab hoc, etiam planta exsiccata, setis crassioribus et rigidioribus, tuberculo duplo latiori insidentibus, tubo corollae duplo longiore; in viva planta praeterea observes calycem, apice non arcte corollae accumbentem, corollam caeruleam striis 5 violaceis dilutius marginatis, stamina ob tubum longiorem altius inserta, declinata quidem, sed parallela et nullibi corollae accumbentia. J.

3. **E. rubrum** (Jacq. fl. austr. app. p. 27. t. 3.) setoso-hispidum, caule herbaceo stricto, foliis lineari-lanceolatis, spicis indivisis, tubo corollae calyce duplo longiore, *stylo apice indiviso,* staminibus corolla longioribus. ☉, rarius per plures annos durat. In pratis et locis sylvaticis, (Unteröstreich u. Mähren.) Jun. D. fl. 2. p. 89. Flores rubri. G.

4. **E. italicum** (L. sp. 201.) setoso-hispidissimum, caule herbaceo stricto, foliis lanceolatis, *spicis bifidis* densis, stylo apice bifido, staminibus corolla duplo longioribus. ☉. In collibus incultis, (Istr., Litt., südl. Tyrol, Wallis.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 90. E. altissimum Jacq. a. app. t. 16. E. asperrimum MBieb. taur. cauc. 1. 135. Flores albi.

5. **E. violaceum** (L. mant. 42.) caule herbaceo ramoso, *foliis* hispidis, inferioribus oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis, *superioribus e basi cordata amplexicauli attenuatis,* spicis indivisis elongatis, staminibus corollam aequantibus. ☉. In campis, ad vias, (Istrien; auf d. Insel Osero.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 91. Flores caeruleo-violacei, spectabiles. J.

14. PULMONARIA (L. gen. n. 184.) Nuces 4, liberae, basi planae. Cor. infundibuliformis, fauce pilosa, fornicibus destituta. Cal. 5 fidus.

Species huius generis, quod florum formationem attinet, sexum polygamico-dioicum indicant: sicut Primulae, Menthae et multae aliae Boraginearum et Labiatarum species. In uno sexu stamina fauci ampliatae inserta sunt, et stylus brevis in tubo absconditur, in altero sexu stamina in medio tubi affixa sunt, et stylus haec longe superat, faucem attingit, vel longius breviusve extra tubum emergit. Flores, in forma longistyla plerumque conspicue maiores, limbum saepe duplo latiorem gerunt.

1. **P. officinalis** (L. sp. 194.) *foliis capitum radicalium sterilium exterioribus cordatis petiolatis, petiolo anguste alato,* pilis caulis setosis intermixtis paucis articulatis glanduliferis. ♃. In sylvis frondosis umbrosis, (stellenweise dch. d. ganze Gebiet.) Mart. April. D. fl. 2. p. 71. Reichenb. ic. 6. f. 699. St. h. 17. Flores primum rubri, deinde violacei. Folia quandoque maculis dilute viridibus adspersa.

2. **P. saccharata** (Mill. Gärtn. Lex. ed. germ. 3. p. 702.) *foliis capitum radicalium sterilium exterioribus ovatis in petiolum anguste alatum subito contractis,* interioribus oblongis in petiolum decurrentibus, *pilis caulis setosis* intermixtis paucis articulatis glanduliferis. ♃. In sylvis umbrosis subhumidis, (im Gebiete d. Fl. von Spaa u. in Pommern, nämlich bei Stettin im Schrei von Garz häufig; Lukau in der untern Lausitz; Piperalpen in Stmk., an der Sane bei Cilli in Stmk.) Mart. Apr. D. fl. 2. p. 72. Reichenb. ic. 6. f. 698. P. grandiflora DC. cat. hort. monsp. p. 135., (forma longistyla.) Rostkov. et Schm. fl. sedin. p. 103. Folia maculis albidis confluentibus, et saepe fere tota albida, maculis viridibus adspersa. Flores lilacini vel albi. G.

3. **P. mollis** (Wolff. in litt. ad amic. conf. Heller. suppl. fl. wirceb. p. 13.) foliis capitum radicalium sterilium elliptico-lanceolatis lanceolatisque in petiolum lato-alatum decurrentibus, *pilis caulis mollibus articulatis viscoso-glandulosis.* ♃. In locis petrosis subumbrosis, (in d. bayer. A. u. Vorberg.; in Oestr.; um Schweinfurt u. Würzb., u. vermuthlich noch an andern Orten d. südl. D., wahrscheinlich auch in d. Schweiz.) April. Mai. D. fl. 2. p. 75. Reichenb. ic. 6. f. 696. P. media Host. fl. austr. 1. p. 235., hanc vivam ex semine, a cl. Jacquin. mecum communicato, in horto possideo. Folia molliter pubescentia. Flores primum rubri, deinde violacei.

4. **P. angustifolia** (L. sp. 194.) *foliis* capitum radicalium sterilium *ellipticolanceolatis lanceolatisque* in petiolum alatum decurrentibus, *pilis caulis setosis*

intermixtis paucis glanduliferis, *fauce intus infra circulum barbatum pilosa.* 4. In nemoribus, (stellenweise dch. d. ganze Gebiet.) April. Mai. D. fl. 2. p. 73. P. tuberosa Schrank. in act. nat. cur. 9. p. 37. P. montana Lej. spa conf. rev. de la fl. d. spa. p. 43. Reichenb. ic. 6. f. 695. Flores primum rubri, dein violacei. Variat foliis lanceolatis et

β. oblongata, ovato-lanceolatis: P. media Reichenb. ic. 6. f. 697., non Host. P. oblongata Schrad. ap. R. et S. syst. veg. 5. 744. Reichenb. fl. exc. p. 838.

5. **P. azurea** (Besser. prim. fl. galic. 1. 150.) *foliis* capitum radicalium sterilium *lanceolatis* basi in petiolum alatum attenuatis, *pilis caulis setosis, fauce intus infra circulum barbatum glabra.* 4. In nemorosis, (Oberbayern, Oestr., Böhm., Schles., Sachs.; am Harze.) April. Mai. D. fl. 2. p. 75. Reichenb. ic. 6. f. 694. P. angustifolia Schrank. l. c. P. Clusii Baumg. transs. 1. 123. Bessera azurea Scult. obs. p. 28. 29. Flores azurei. Fauce infra circulum barbatum tuboque intus glabris florumque colore laetius azureo ab antecedente tute distinguitur; tubus glaber constans est. G.

15. LITHOSPERMUM (L. gen. n. 181.) Cal. 5 partitus, caetera ut Pulmonariae. — Faux corollae aperta quidem, sed tamen plicis 5 pilosis vel fornicibus pubescentibus paulo coarctata.

1. **L. officinale** (L. sp. 189.) *caulibus* herbaceis erectis *ramosissimis,* foliis lanceolatis acutis venosis scaberrimis, pilis basi tuberculatis adpressis, *nucibus laevibus.* 4. In locis montanis asperis inter dumeta. Mai-Jul. D. fl. 2. p. 55. St. h. 5. Flores virenti-albi.

2. **L. purpureo-caeruleum** (L. sp. 190.) *caulibus* herbaceis, *florigeris erectis apice bi-trifidis, sterilibus repentibus,* foliis lanceolatis acutis basi attenuatis hirto-scabris pilis adpressis, *nucibus laevibus.* 4. In sylvis montanis, (im südl. u. mittlern Gebiete stellenweise bis Westphalen u. Hildesheim.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 56. Jacq. a. t. 14. Flores primum rubri, deinde azurei.

3. **L. arvense** (L. sp. 190.) caule herbaceo erecto apice ramoso, simplici vel basi caulibus secundariis aucto, foliis lanceolatis acutiusculis hirtis pilis adpressis, inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum attenuatis, *calycibus fructiferis remotis, nucibus rugoso-scabris.* ⊙. In agris et campis. April-Jun. D. fl. 2. p. 57. Fl. dan. t. 456. Flores albi; variant raro caerulei.

4. **L. apulum** (Vahl. symb. bot. 2. p. 33.) hispidum setis patulis, caule herbaceo erecto apice ramoso simplici vel basi caulibus secundariis aucto, foliis linearibus, infimis in petiolum attenuatis subspathulato-lanceolatis, *calycibus fructiferis dense approximatis, nucibus tuberculato-scabris.* ⊙. In arvis, (Istrien, Biasoletto; Ins. Lossino, Dr. Sendtner.) April. Mai Myosotis apula L. sp. 189. Column. ecphr. 185. fig. sinistra. Flores lutei. J.

Lithospermum maritimum Lehm., Pulmonaria maritima L., in D. fl. 2. p. 58. memorata, loca ibidem indicata non inhabitat et e flora nostra delendum est.

16. MYÓSOTIS (L. gen. n. 180.) Nuces 4, liberae, antice convexae, postice obtuse carinatae et area minuta, punctiformi, versus basin nucis sita, affixae. Cor. infundibuliformis vel hypocrateriformis, fauce fornicibus glabris coarctata. Cal. 5 fidus.

§. 1. Calyces adpresse pilosi.

1. **M. palustris** (Withering. arrang. of. brit. pl. 2. 225.) *calyce* 5 dentato *adpresse piloso*, fructifero aperto, *stylo calycem subaequante*, foliis caulinis oblongo-lanceolatis acutiusculis, caule angulato, rhizomate obliquo repente. 4. In pratis et ericetis humidis, ad fossas, ripas, paludes. Mai-Jul. D. fl. 2. p. 40. M. scorpioides Willd. sp. 1. 746. M. scorpioides *β.* palustris L. sp. 188. M. scorpioides palustris Ehrh. decad. M. perennis Moench. hass. n. 154. M. palustris Reichenb. ap. St. h. 42., forma pilis caulinis patentibus; M. repens l. c. calycibus paulo profundius divisis; M. strigulosa l. c., pilis caulis adpressis. Flores pulcherrime caerulei, rarius carnei

vel albi. In fossis et stagnorum marginibus magnos caespites efficit, racemi et pedicelli longiores et laxiores fiunt:

β. laxiflora: M. laxiflora Reichenb. ap. St. h. 42.

2. **M. caespitosa** (Schultz. fl. starg. suppl. 11.) nucibus glabris, *calyce* quinquefido *adpresse piloso*, fructifero aperto, *stylo brevissimo*, foliis caulinis lineari-oblongis obtusis, caule (in viva planta) tereti, radice descendente undique fibrosa. ☉. In fossis et paludibus, praecedente multo rarior. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 42. St. h. 42. M. lingulata R. et S. syst. veg. 4. p. 780., in annot. M. uliginosa Schrad. — Caulis in viva planta, praecipue inferne, crassior, quam in antecedente, et linea a margine foliorum decurrente impressa notatus; quae linea in M. palustri prominet et angulum argutum efficit. Flores semper minores, laciniis angustioribus et plerumque integris instructi.

§. 2. Calyces pilosi, pili patuli et in basi patentissimi atque in uncum recurvati.

3. **M. sylvatica** (Hoffm. D. fl. ed. 2. p. 85.) *calycibus* profunde 5 fidis patulo-pilosis, *pilis* baseos divaricatis *uncinatis*, laciniis calycis fructiferi erecto-conniventibus, pedicellis fructiferis calycem aequantibus longioribusque, *corollae limbo plano.* ☉. (In horto semper biennis.) In sylvis montanis; alpes adscendit ibidemque in var. *β.* abit. Mai.-Jul. D. fl. 2. p. 43. St. h. 42. M. arvensis *β.* sylvatica Pers. syn. 1. 156. M. scropioides sylvatica Ehrh. decad. 31. M. decumbens Host. fl. austr. 1. p. 128., (nulla nota diversam invenio.) Flores odorati, intensius caerulei, quam in M. palustri. Variat:

β. alpestris, humilior, racemis brevioribus, densius incumbenti-pilosis, pedicellis crassioribus, calycibus maioribus: M. alpestris Schm. boh. p. 26. D. fl. 2. p. 45. St. h. 42. M. suaveolens Kit. ap. R. et S. syst. veg. p. 102. St. h. 42. M. odorata Poir. dict. suppl. 4. 1. p. 44. M. rupicola Engl. bot. t. 2559. Forma altior huius varietatis est: M. montana M. Bieberst. taur. cauc. 3. p. 116. M. lithospermifolia Hornem. hafn. 173. St. h. 42.

γ. lactea, Bönningh. prodr. fl. monast. 56., statura et indumento varietatis *β*, sed floribus magnis lacteis notabilis. E seminibus constanter redit, sed semina in cultis speciminibus non maiora sunt, quam in M. sylvaticae var. *α*, quae cl. auctor duplo maiora in loco natali vidit. (In Westphalen u. auch bei Bitsch an der Deutschen Grenze unter der Abart *α*.)

4. **M. variabilis** (Moritz Angelis.) calyce profundo 5 fido patulo-piloso pilis baseos divaricatis uncinatis, fructifero clauso, racemis pedunculatis, pedicellis fructiferis calycem aequantibus, *tubo corollae denique calyce duplo longiore, antheris exsertis, fornices superantibus*, foliis caulinis lato-lanceolatis. ☉. In locis sylvaticis inferalpinis, (in der Waldregion am Rottenmanner Tauern in Steyermark.) Jun.? Flores post explicationem flavi, deinde rubri, denique caerulei. G.

5. **M. intermedia** (Link. en. h. berol. 1. 164.) *calycibus* profunde quinquefidis *fructiferis clausis* patulo-pilosis, *pilis* divaricatis *uncinatis, pedicellis fructiferis patentibus calyce duplo longioribus*, corollae limbo concavo. ☉. In agris. Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 46. St. h. 42. M. scorpioides *α.* arvensis L. sp. 188., testantibus speciminibus, ab Ehrharto Linnaei tempore Upsaliae lectis, (Meyer. chlor. hannov. p. 270.) sed Linnaeus ipse, ut e flora suecica patet, etiam sequentes sub hac varietate comprehendit. M. arvensis Lehm. asp. 1. p. 92. — Nomen M. arvensis, toties et ab Ehrharto ipso ab una ad alteram speciem translatum, confusionem iam ortam semper augebit.

6. **M. hispida** (Schlechtend. Mag. d. Naturf. z. Berl. 8. 229.) *calycibus* quinquefidis *fructiferis apertis* patulo-pilosis, *pilis* baseos divaricatis *uncinatis*, racemis pedunculatis, *pedicellis fructiferis horizontaliter patentibus calycem aequantibus*, tubo corollae incluso. ⊙. In collibus, agrorum versuris, locis cultis. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 47. M. collina Reichenb. ap. St. h. 42. M. arvensis Link. en. hort. berol. 1. 164. Flores minuti, intensius caerulei, quam in M. stricta. Herba non magis hispida, quam congenerum.

7. **M. versicolor** (Persoon. syn. 1. p. 156. M. arvensis *γ.* versicolor.)

JAN MUSZYŃSKI

calycibus profunde quinquefidis *fructiferis clausis* pilosis, *pilis* baseos divaricatis *uncinatis*, racemis pedunculatis, pedicellis calyce brevioribus, *tubo corollae denique calyce duplo longiore, antheris basin fornicum attingentibus*, foliis caulinis lineari-lanceolatis. ☉. In locis cultis subhumidis, in nemorosis, fluviorum glareis, ad ripas. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 48. St. h. 42. M. scorpioides collina Ehrh. herb. n. 51. Ehrharti M. scorpioides collina ad hanc, non vero ad M. hispidam, pertinet. „M. versicolorem neque Ehrhartus neque Rothius habent" Mey. chlor. hannov. p. 271. Flores primum sulphurei, deinde caerulescentes, denique violacei.

8. **M. stricta** (Link. en. h. berol. 1. 164. 1819.) *calycibus* profunde quinquefidis *fructiferis clausis* pilosis, *pilis* baseos divaricatis *uncinatis, racemis basi foliatis*, pedicellis fructiferis calyce brevioribus, tubo corollae incluso. ☉. In locis arenosis, incultis et cultis. April-Mai. D. fl. 2. p. 49. M. arenaria Schrad. ap. Schultz. fl. starg. suppl. p. 12. M. arvensis Reichenb. ap. St. h. 42. Flores minuti, caerulei.

9. **M. sparsiflora** (Mikan, Pohl. in Hopp. Taschenb. 1807. p. 71. 123.) *calycibus* profunde quinquefidis pilosis, *pilis* baseos divaricatis *uncinatis*, racemis paucifloris basi foliatis, *pedicellis fructiferis inferioribus calyce multoties longioribus refractis.* ☉. In sylvis et dumetis humidis, (Steyerm., Oestr., Mähr., Böhm., Schles., Sachs., Harz, Preussen, Pomm., Hamburg.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 51. St. h. 42. Flores caerulei. G.

17. ERITRICHIUM (Schrad. de asperifol. gött. 1820.) Nuces 4, liberae, triquetrae, antice planae et margine prominente cinctae, angulo postico obtusiore, areola dorsali minuta punctiformi receptaculo, (nec stylo,) affixae. Caetera ut Myosotidis.

1. **E. nanum** (Schrad. l. c. Gaud. helv. 2. p. 57.) foliis oblongo-lanceolatis villosis, racemis 3-6 floris inferne foliatis. ♃. In summarum alp. jugis petrosis, (Wallis, Graubünden, südl. Tyrol, Kärnthen, Steyerm., Krain.) Jul. Aug. Myosotis nana Vill. delph. 2. 459. t. 13. (rudis) „seminum marginibus serratis" Vill. l. c., Reichenb. ap. St. h. 42. (nuces non bonae.) M. et K. D. fl. 2. p. 52. Planta 1-2 pollicaris, dense caespitosa. Flores pulchre caerulei, magni ratione plantulae. Variat

α. odontospermum. Nuces margine aculeato-fimbriato cinctae.

β. lejospermum. Nuces margine glabrae vel dentibus 1-2 utrinque praeditae: E. Hacquetii Koch. synops. ed. 1. p. 507. Myosotis terglouensis Hacquet. pl. alp. p. 21. t. 2. f. 6. M. nana Wulf. in Jacq. collect. 1. p. 261. Varietates *α.* et *β.* formis intermediis confluunt.

Ord. LXXXI. SOLANEAE. Juss. gen. p. 124.

Cal. 5 fidus, aut 5 partitus, persistens aut deciduus, basi circumscissa persistente. *Cor. monopetala, hypogyna, regularis vel subinaequalis, caduca*, aestivatione plicata vel imbricata. *Stam.* 5, *basi corollae inserta, ejusdem laciniis alterna. Antherae in apice filamenti acuti sitae*, biloculares. Ovarium liberum, *biloculare, multiovulatum*, placentis crassis, in medio dissepimenti adnatis. Styl. 1. Stigma simplex. Fructus capsularis vel baccatus. Albumen carnosum. Embryo annularis vel spiralis. Folia alterna, superiora saepe gemina, altero minore. Inflorescentia saepe extraaxillaris.

1. LYCIUM (L. gen. n. 262.) Cor. infundibuliformis. Stam. in medio vel in basi tubi inserta. Cal. fructiferus parvus, ad basin baccae adpressus.

1. **L. europaeum** (L. mant. 1. p. 47.) foliis lanceolatis basi attenuatis vel obovato-lanceolatis, *tubo corollae limbum bis excedente.* ♄. Inter frutices, (bei Besca nuova auf Veglia.) Mai. Jun. Flores albi vel dilute purpurei. J.

2. **L. barbarum** (L. sp. 277.) foliis subrhombeo-ovatis lanceolatisve basi

attenuatis, *tubo corollae limbum aequante.* ♄. In sepibus culta, nunc passim spontanea facta. Jun. Jul. Flores purpurei.

2. SOLÁNUM (L. gen. 251.) Cor. rotata. Antherae conniventes, apice poro dehiscentes. Bacca.

1. **S. villosum** (Lam. dict. 4. p. 289.) annuum, angulis ramorum subobsoletis subtuberculatis, *foliis* ovatis sinuato-dentatis cauleque *subtomentoso-villosis,* racemis simplicibus, pedicellis fructiferis apice incrassatis deflexis. ☉. In ruderatis, ad vias hinc inde. Jul.-autumn. Bernhard. über d. Begriff d. Pflanzenart. p. 56. et 65. S. nigrum *γ.* villosum L. sp. 266. S. luteum Mill. dict. n. 3. Dill. elth. t. 274. f. 353. *Baccae luteae.* Flores albi vel subviolacei ut in seq. tribus. „Pubescentia densa, asperitates caulis occultante, et fructibus luteis, denique fuscescentibus, facile a S. miniato dignoscitur" Bernh. l. c. Diagnosin huius speciei et trium subsequentium ex opere citato cl. Bernhardii mutuatus sum.

2. **S. miniatum** (Bernh. ap. Willd. en. h. berol. 1. 236.) annuum, angulis ramorum prominulis tuberculatis, *foliis* ovatis subdeltoideis sinuato-dentatis cauleque *patenti-villosis,* racemis simplicibus, pedicellis fructiferis apice incrassatis deflexis. ☉. In ruderatis et ad vias. Jul.-autumn. Bernhard. l. c. p. 55. et 65. S. villosum Mill. dict. n. 2. Hayn. Abbild. 2. 41. S. alatum Moench. meth. 474. S. puniceum Gmel. fl. bad. 4. 176. S. nigrum *γ.* D. fl. 2. p. 231. *Baccae rubrae.*

3. **S. humile** (Bernh. ap. Willd. en. h. berol. 1. 236.) annuum, angulis ramorum subobsoletis subtuberculatis, *foliis* ovatis subrhombeis *repando-dentatis cauleque subglabris,* racemis simplicibus, pedicellis fructiferis apice incrassatis deflexis. ☉. In cultis, ad vias. Jul.-autumn. Bernhard. l. c. p. 55. et 65. S. luteo-virescens Gmel. bad. 4. 177. S. nigrum *δ.* D. fl. 2. p. 230. *Baccae ceraceo-flavae.* Statura humiliore, a sequente S. nigro, caule foliisque glabrioribus et marginibus foliorum decurrentibus minus prominulis diversum.

4. **S. nigrum** (L. sp. 266., excl. variet.) annuum, angulis ramorum prominulis tuberculatis, *foliis* ovatis subdeltoideis *sinuato-dentatis cauleque pubescentibus, pilis incurvo-erectis,* racemis simplicibus, pedicellis fructiferis apice incrassatis deflexis. ☉. In cultis, ruderatis, ad vias. Jul.-autumn. Bernhard. l. c. p. 52. et 64. St. h. 1. D. fl. 2. p. 230., excl. varietatibus. S. melanocerasum Willd. en. 1. 237. S. atriplicifolium Desp. S. nigrum Reichenb. ic. f. 1284. S. pterocaulon Reichenb. ic. 1284., non Dunal., forma angulis ramorum magis muriculatis. *Baccae atrae.* Variat:

β. stenopetalum, folia angustiora, corolla profunde partita, laciniis angustissimis: S. nigrum stenopetalum Alex. Braun.

γ. chlorocarpum, baccae perfecte maturae virides: S. nigrum chlorocarpum Spenn. fl. frib. p. 1074.

5. **S. Dulcamara** (L. sp. 266.) caule fruticoso flexuoso, *foliis* ovato-cordatis, *superioribus hastatis,* corymbis suboppositifoliis. ♄. In dumetis et locis sylvaticis humidis, ad ripas. Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 230. St. h. 18. Flores violacei, maculis 2 viridibus albo-marginatis ad basin laciniarum, raro albi. Baccae rubrae. Variat:

β. tomentosum, caule foliisque tomentosis: S. littorale Raab. Ad muros campestres vetustos, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, Swinemünde in Pommern.)

6. **S. tuberosum** (L. sp. 265.) caule herbaceo, *foliis pinnatis,* foliolis inaequalibus, alternis minutissimis, pedicellis articulatis, corolla quinquangulata. Ramis subterraneis tuberiferis propagatur, ♃ quidem sed tubera quotannis, nova prole producta, pereunt. Colit.

3. PHÝSALIS (L. gen. n. 250.) Antherae longitudinaliter dehiscentes; bacca calyci inflato et aucto inclusa; caetera ut Solani.

1. **P. Alkekengi** (L. sp. 262.) foliis geminatis integris acutis, caule herbaceo, a basi ramoso. ♃. In collibus siccis inter virgulta, in vineis, ad

vias, (stellenweise dch. d. g. Gebiet.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 229. Schk. t. 45. Flores albi. Bacca coccinea, calyci inflato miniato inclusa.

4. ÁTROPA (L. gen. n. 249.) Cor. e tubo brevi campanulata. Stam. basi faucem claudentia, superne distantia, cum stylo declinata. Bacca bilocularis.

1. **A. Belladonna** (L. sp. 260.) caule herbaceo, foliis ovatis integerrimis. 4. In sylvis, praecipue frondosis et caeduis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 227. Jacq. a. t. 309. St. h. 3. Flores sordide violaceo-fusci, basi luridi, venis brunneis.

Atropa Mandragora L., Mandragora officinalis Mill., in Tyroli australi et Helvet. transalpina olim, ut dicunt, lecta, nuper non reperta est.

5. SCOPOLINA (Schultes. Oestr. Fl. 1. 844.) Cor. tubuloso-campanulata, 5 loba. Caps. subrotunda, basi circumscissa.

1. **S. atropoides** (Schult. l. c.) corolla tubuloso-campanulata. 4. In sylvis umbrosis, (Krain, im Cillier-Kreise in Steyerm.) Apr. Mai. D. fl. 2. p. 226. Hyoscyamus Scopolia L. mant. 46. St. h. 21. Cor. externe nitidae, fuscae, interne opacae et olivaceae. G.

2. **S. Hladnikiana** (Freyer. in litt.) corolla obovato-campanulata. 4. In sylvis montosis, (Berg Schelmlje in Krain.) Apr. Mai. S. viridiflora Freyer. ap. Reichenb. fl. germ. exsicc. Corolla viridis, concolor. G.

6. HYOSCÝAMUS (L. gen. n. 247.) Cor. infundibuliformis, limbo 5 lobo. Caps. basi ventricosa, superne in collum contracta, apice circumscissa.

1. **H. niger** (L. sp. 457.) *foliis* ovato-oblongis pinnatifido-sinuatis, infimis petiolatis, *caulinis semiamplexicaulibus*, floralibus utrinque uni-bidentatis, floribus subsessilibus. ☉ et ⊙. In ruderatis, ad vias, fimeta, in agris et cultis sparsim. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 224. St. h. 3. Cor. sulphurea, venis nigris, in fauce atropurpureis et latioribus. In agris et locis cultis annuus est, foliis minus profunde sinuatis: H. *agrestis* Kit. ap. Schult. Oestr. Fl. 1. 383. D. fl. 2. p. 225. H. verviensis fl. de spa. 1. 116. H. bohemicus Schmidt. Varietas, perinde annua, occurrit, sed raro:

β. pallidus, floribus unicoloribus pallidis: H. pallidus Kit. ap. Willd. en. h. berol. 1. 228.

2. **H. albus** (L. sp. 257.) *foliis omnibus petiolatis* subrotundo-ovatis sinuatis obtuse lobatis, superioribus repando-dentatis, floribus subsessilibus. ☉. In cultis, ad vias, muros, (um Fiume, in Istrien u. a. d. Inseln) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 257. Lam. illustr. t. 117. f. 1. Flores pallide flavi fauce violacea. J.

7. NICOTIANA (L. gen. n. 248.) Cor. infundibuliformis, limbo plicato, 5 lobo. Cal. persistens. Stigma capitatum. Caps. apice quadrivalvis, 2-4 locularis, polysperma.

1. **N. Tabacum** (L. sp. 258.) *foliis* oblongo-*lanceolatis* acuminatis, *inferioribus attenuato-decurrentibus*, fauce corollae inflato-ventricoso, corollae limbo 5 partito, lobis acuminatis. ⊙. Colitur. Jul. Aug. D. fl. 2. 223. Schk. t. 44. Flores rosei. Colit.

2. **N. latissima** (Mill. dict. n. 1.) *foliis ovato-lanceolatis e basi auriculata decurrentibus*, fauce corollae inflato-ventricosa, corollae limbo 5 fido, lobis breviter acuminatis. ⊙. Colitur cum priore. Jul. Aug. N. macrophylla Spreng. index hort. hal. 1807. D. fl. 2. p. 223. Flores rosei. Colit.

3. **N. rustica** (L. sp. 258.) caule tereti, foliis petiolatis ovatis integerrimis, tubo corollae cylindrico calycem superante, *limbi laciniis subrotundis obtusis*. ⊙. Colitur. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 224. Flores flavescentivirides. Colit.

8. DATURA (L. gen. n. 246.) Cor. infundibuliformis, limbo plicato,

5 lobo. Cal. deciduus, basi orbiculari persistente. Stigma bilamellatum. Caps. 4 valvis, 4 locularis, loculis bipartitis, polyspermis.

1. **D. Stramonium** (L. sp. 255.) foliis ovatis glabris inaequaliter sinuato-dentatis, capsulis erectis spinosis. ⊙. In locis cultis, ruderatis, ad vias. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 222. Jacq. a. t. 43. Stramonium foetidum Scop. carn. 1. p. 157. S. vulgatum Gärtn. fruct. 2. 243. Corolla alba. Variat foliis simpliciter et duplicato sinuato-dentatis et

β. chalybea, caule, petiolis, nervis foliorum saturate violaceis, calyce violaceo colore suffuso, corollis dilute violaceis: D. Tatula L. sp. 1. 256. Ad Rhenum inferiorem legit v. Bönningh.

Ord. LXXXII. VERBASCEAE. Bartling. ord. nat. p. 170., sectio Scrophularinearum.

Corolla inaequalis vel irregularis. Antherae apice dilatato filamentorum transverse vel oblique adnatae, uniloculares. Caetera ut Solanearum.

1. VERBASCUM (L. gen. n. 245.) Cor. rotata, limbo 5 lobo, inaequali. Stam. 5, inaequalia. Caps. apice bivalvis.

Sect. I. Folia penitus a folio ad folium decurrentia. (Flores flavi, lana filamentorum alba.)

1. **V. Schraderi** (Mey. chlor. hannov. p. 326.) **V. Thapsus** (L. suec. p. 69. secund. Fries.) *foliis* crenulatis tomentosis, tomento lutescente, omnibus *a folio ad folium decurrentibus*, racemo subsolitario, pedicellis florigeris calyce brevioribus, corollis infundibuliformibus, filamentis albo-lanatis, 2 *longioribus glabris vel superne parce pilosis anthera sua hinc breviter decurrente quadruplo longioribus.* ⊙. In collibus incultis, lapidosis, campis arenosis. Jul. Aug. V. Thapsus Schrad. monog. p. 17. D. fl. 2. p. 204. V. Thapsus *α.* Wahlenb. fl. suec. p. 139. Occurrit, sed rarius, floribus pallidis: V. pallidum Nees v. Esenb. bot. Ztg. 2. p. 295., vel albis: V. elongatum Willd. en. h. berol. 1. p. 223.

2. **V. thapsiforme** (Schrad. monogr. 1. p. 21.) *foliis* crenatis tomentosis, tomento lutescente, omnibus *a folio ad folium decurrentibus*, racemo subsolitario, pedicellis florigeris calyce brevioribus, corollis rotatis, filamentis albo-lanatis, 2 *longioribus glabris vel superne parce pilosis anthera sua hinc longe decurrente sesqui- vel duplo-longioribus.* ⊙. In iisdem cum priore locis. Jul. Aug. V. Thapsus Mey. chlor. hannov. p. 325. Koch. syn. ed. 1. p. 510. V. thapsiforme D. fl. 2. p. 206. Floribus multo maioribus et explanatis ab antecedente statim dignoscitur. Occurrit floribus albis et spica, in speciminibus macris, pineta arenosa inhabitantibus, tomento tenuiore indutis, interrupta: V. cuspidatum Schrad. l. c. p. 23. t. 1. f. 1.

Sect. II. Folia breviter vel semidecurrentia.

a. Flores flavi, lana filamentorum alba.

3. **V. phlomoides** (L. sp. 253.) *foliis* crenatis tomentosis, tomento-lutescente, superioribus *breviter vel semidecurrentibus*, racemo subsolitario, pedicellis florigeris calyce brevioribus, corollis rotatis, *filamentis albo-lanatis*, 2 *longioribus glabris vel superne parce pilosis anthera sua hinc longe decurrente sesqui- vel duplo longioribus.* ⊙. In iisdem locis cum antecedentibus. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 206. V. rugulosum Willd. en. 1. p. 224. Occurrit, sed raro, floribus albis. Porro: 1. fol. ellipticis breviter decurrentibus, racemo laxiore: V. phlomoides Schrad. monogr. p. 29.; 2. foliis ellipticis semidecurrentibus: V. australe Schrad. l. c. p. 28. t. 2.; 3. foliis oblongo-lanceolatis breviter decurrentibus: V. nemorosum Schrad. l. c. p. 32.; 4. foliis ellipticis breviter decurrentibus, racemo denso: V. condensatum Schrad. l. c. p. 31. — Caeterum haec species antecedenti simillima est, neque differt, nisi foliis breviter vel semidecurrentibus.

4. **V. montanum** (Schrad. hort. gött. fasc. 2. p. 18. t. 2.) *foliis* crenatis

tomentosis, tomento lutescente, superioribus *semidecurrentibus*, racemo subsolitario, floribus solitariis fasciculatisque, fasciculis 3-4 floris, *pedicellis florigeris calyce brevioribus*, corollis rotatis, *filamentis omnibus albo-lanatis*, 2 longioribus apice glabris *anthera* sua hinc *breviter decurrente* quadruplo brevioribus. ☉. In collibus sylvaticis regionum calidiorum, (bei Grade an der Küste von Görz, Tommasini; im untern Wallis; der Standort in d. Thälern d. Vogesen scheint mir zweifelhaft.) Jul. Aug. V. montanum Schrad. monogr. p. 33. D. fl. 2. p. 209. V. crassifolium Schleich. cat. 1815. Gaud. helv. 1. p. 119., non DC., (quod filamentis glabris praeditum est; conf. diagn. n. Dub. bot. gall. p. 340. Simile V. phlomoidi, sed differt foliis inferioribus ovatis, subito in petiolum contractis, et fabrica staminum.

b. Flores flavi, lana filamentorum dilutius vel saturatius violacea.

5. **V. sinuatum** (L. sp. 154.) *foliis* tomentosis, radicalibus caulinisque *inferioribus sinuatis*, superioribus crenatis breviter decurrentibus, racemis paniculatis, *filamentis* omnibus *purpureo-lanatis*, antheris aequalibus. ☉. In aridis asperis, (Istrien, Biasol.; Osero, Noé.) Jul. Aug. J.

Sect. III. Folia non decurrentia. Flores fasciculati.

a. Flores flavi, (in varietate albi,) lana filamentorum alba.

6. **V. speciosum** (Schrad. hort. gött. fasc. 2. p. 22. t. 16.) *foliis integerrimis undulatis* tomentosis, *tomento persistente*, inferioribus oblongis acutis in petiolum attenuatis, *caulinis auriculato-cordatis sessilibus*, ramis angulatis, racemis paniculatis, filamentis albo-lanatis, antheris aequalibus. ☉. In collibus herbidis, ad sylvarum oras, (in Unteröstreich, Dolliner, Host.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 214. — V. longifolium DC. fl. fr. suppl. 414. secund. Schrad. ad hoc referendum est. G.

7. **V. floccosum** (Wald. et Kit. pl. rar. hung. 1. p. 81. t. 71.) *foliis* dense tomentosis, *tomento albo floccoso deciduo*, radicalibus oblongo-ellipticis in petiolum attenuatis, caeteris *sessilibus* obsolete crenatis, *superioribus longe acuminatis* semiamplexicaulibus, *caule ramisque terctibus*, racemis paniculatis patentibus, *filamentis albo-lanatis*. ☉. In collibus apricis, ad vias, (Schweiz an mehreren Orten; auf d. Rheinfläche von Basel bis Coblenz hin u. wieder; bei Trier nicht selten; sodann im südl. Tyrol, Steyerm., im Littorale, um Triest überall, Kütz.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 215. V. pulverulentum Smith. brit. 251. et plurim. auct. — Pedicelli et calyces ante anthesin in tomentum niveum floccosum absconditi.

8. **V. Lychnitis** (L. sp. 235.) *foliis* crenatis *supra glabriusculis subtus pulverulento-tomentosis* canescentibus, inferioribus elliptico-oblongis in petiolum attenuatis, caeteris inferioribus brevius petiolatis, *superioribus sessilibus* ovatis acuminatis, *ramis erecto-patulis pyramidato-paniculatis argute angulatis, filamentis albo-lanatis*. ☉. In collibus incultis, locis sylvaticis lapidosis, ad ripas. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 216. Variat:

β. album, floribus albis: V. Lychnitis *β.* Schrad. monogr. 2. p. 18. V. album Mill. dict. n. 3. Moench. meth. p. 447. Forma tomento tenuiori est: V. incanum Gaud.

b. Flores flavi, filamentorum purpurea.

9. **V. nigrum** (L. sp. 253.) *foliis* crenatis supra glabriusculis subtus tenuiter tomentosis, caulinis *inferioribus* oblongo-ovatis basi *cordatis* longe petiolatis, superioribus ovato-oblongis subsessilibus, *caule superne acute angulato*, *racemo elongato*, pedicellis calyce duplo longioribus, *filamentis purpureo-lanatis*. ☉. In montosis sylvaticis, ad vias. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 219. Variat:

β. thyrsoideum, foliis densius tomentosis: V. Alopecuros Thuill. par. p. 110. V. thyrsoideum Host. fl. a. p. 289. V. parisiense Thuill. l. c.; hoc floribus duplo minoribus praeditum.

10. **V. lanatum** (Schrad. monogr. 2. p. 28.) *foliis* subtus lanato-tomentosis, inferioribus mediisque oblongis petiolatis *subsinuato-duplicato-crenatis*, superioribus oblongo-ovatis sessilibus acute crenatis, *caule superne angulato*,

racemo simplici, pedicellis calyce duplo longioribus, *filamentis purpureo-lanatis*. ☉. In montosis, (Krain, Steyerm., Kärnthen, Hamburg am hohen Elbufer.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 220. V. thyrsoideum Host. a. 1. p. 289. Varietas Verbasci nigri sec. cl. Facchinium et Sonderum. G.

11. **V. orientale** (MBieb. fl. taur. cauc. 1. 160. 3. 154.) *foliis* crenatis supra subglabris subtus tenuiter tomentosis, inferioribus ovato-oblongis *in petiolum contractis vel leviter cordatis*, intermediis ovatis breviter petiolatis, superioribus sessilibus subcordatis, *ramis paniculatis cauleque subangulatis*, pedicellis calyce sesquilongioribus, *filamentis purpureo-lanatis*. ☉. In collibus incultis lapidosis, ad vias, (Böhmen, Mähren, Oestreich, südl. Tyrol, Steyerm., wärmere Schweiz.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 218. Folia basi profundius crenata. Variat foliis subtus minus tomentosis: V. austriacum Schrad. monogr. p. 22. V. virens Host. a. 1. p. 291.

β. Chaixi, foliis basi sublyrato-incisis: V. Chaixi Vill. delph. 2. p. 491. t. 13., mala. V. gallicum Willd. sp. 1. p. 1005.

Sect. IV. Folia non decurrentia. Flores solitarii vel gemini.

12. **V. phoeniceum** (L. sp. 254.) *foliis* subtus pubescentibus, *radicalibus petiolatis ovatis oblongisve crenatis*, caulinis mediis et superioribus multo minoribus minute crenatis sessilibus, *racemo glanduloso-piloso*, *pedicellis solitariis* bractea multo longioribus, antheris omnibus aequalibus non decurrentibus. ☉. In collibus incultis apricis, (von dem Littorale nach Krain, Oestr., Mähr., Schles. u. Böhm., Sachs. u. Thüring bis Magdeburg; Oberbayern; Tyrol.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 220. Jacq. a. t. 125. Flores speciosi, intense violacei, tubo flavescente. G.

13. **V. Blattaria** (L. sp. 254.) *foliis* glabris, inferioribus *obovato-oblongis basi attenuatis sinuatis*, caulinis oblongis acutis crenatis sessilibus, superioribus subcordatis acuminatis semiamplexicaulibus, *racemo glanduloso-piloso*, *pedicellis solitariis* bractea sesqui- vel duplo-longioribus. ☉. In glareosis humidis, ad vias. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 221. Flores flavi, basi intus violaceo-barbati. Filamenta violaceo-lanata. Variat floribus albis, quae varietas passim copiosior occurrit.

Species sequentes proles hybridae sunt vel saltem pro hybridis habentur.

a. Folia semidecurrentia. Flores flavi, lana filamentorum alba.

14. **V. Thapso-Lychnitis** (M. et K. D. fl. 2. p. 212.) **V. spurium** (Koch. syn. ed. 1. p. 511.) *foliis* crenatis *semidecurrentibus* tomentosis, tomento adpresso cano, *caule superne acute angulato*, pedicellis calycem aequantibus, *filamentis omnibus albo-lanatis*, *antheris* aequalibus filamentorum longiorum *non decurrentibus*. ☉. In collibus incultis, (einmal in der Rheinpfalz gesammelt; bei Offenbach, Fl. der Wett., Lehmann; Schwarzb. Rudolst., Apoth. Hoë.) Jul. Aug. V. Thapso-Lychnitis M. et K. D. fl. 2. p. 212., excl. syn. fl. lusitan. — Refert V. Lychnitidem, sed ab hoc differt foliis decurrentibus, tomento crassiore, floribus brevius pedicellatis, calycibus maioribus. Videtur proles hybrida ex V. Lychnitide et V. Schraderi.

15. **V. thapsiformi-Lychnitis** (Schiede de plant. hybrid. p. 38.) **V. ramigerum** (Schrad. monogr. p. 34. t. 4.) *foliis* crenatis breviter vel *semidecurrentibus* tomentosis, tomento adpresso canescente, *caule superne acute angulato*, racemorum fasciculis multifloris, *pedicellis florigeris calyce longioribus*, *filamentis omnibus albo-lanatis*, *antheris filamentorum longiorum hinc breviter decurrentibus*, ☉. In locis incultis, pascuis, (hin u. wieder im Gebiete.) Jul. Aug. V. thapsiformi-Lychnitis D. fl. 2. p. 213. Valde simile antecedenti, sed floribus triplo maioribus, fere magnitudine florum V. thapsiformis, et antheris in altero latere filamenti conspicue decurrentibus differt. Videtur hybridum ex V. Lychnitide et V. thapsiformi.

b. Folia breviter vel semidecurrentia. Flores flavi, lana filamentorum dilutius vel saturatius violacea.

16. **V. thapsiformi-floccosum? V. nothum** (Koch. suppl. z. D. fl. ined.) foliis crenatis breviter vel semidecurrentibus tomentosis, tomento luteo-cine-

rascente, superioribus longe cuspidatis, *caule tereti*, racemorum *fasciculis multifloris*, pedicellis florigeris calycem aequantibus, *filamentis lana alba vel longioribus lana purpurascente praeditis*, *antheris filamentorum longiorum subdecurrentibus*. ☉. In collibus incultis, ad vias, (bei Mainz in Gesellschaft von V. floccosum u. anderen Arten.) Jul. Aug. Intermedium quasi inter V. floccosum et thapsiforme. Flores eius duplo maiores quam in V. floccoso, caeterum huic simile, si folia decurrentia et lanam filamentorum majorum, quae ultima nunc alba, nunc dilute nunc saturatius purpurea est, excipias. Amicus b. Ziz. suspicabatur, hybridum esse ex V. thapsiformi et floccoso, sed huic opinioni obstat lana filamentorum violacea. An h. l. V. nigro-pulverulentum Sm. brit. 251.? at flores magni et panicula dense floccoso-pulverulenta nec cum V. nigro, nec cum pulverulento conveniunt.

17. **V. thapso-nigrum** (Schied. d. plant. hybr. p. 32.) **V. collinum** (Schrad. monogr. verb. p. 35.) foliis crenatis semidecurrentibus tomentosis, tomento lutescente, superioribus oblongis acutis, *caule superne acute angulato*, racemi fasciculis subquinquefloris, pedicellis florigeris calycem aequantibus, *filamentis omnibus purpureo-lanatis*, *antheris* aequalibus *nullis decurrentibus*. ☉. In nemorosis lapidosis, (im nördlichen Deutschland, in Hessen, bei Hessellohe oberhalb München, bei Altötting; Grätz in Steyerm.) Jul. Aug. V. Thapso-nigrum D. fl. 2. p. 211. V. ambiguum Lej. rev. de la fl. d. spa. p. 229., ob flores multo minores, quam in V. nemoroso. — V. seminigrum Fries. hoc tempore comparare nequeo.

18. **V. thapsiformi-nigrum** (Schied. d. plant. hybr. p. 36.) **V. adulterinum** (Koch. suppl. z. D. fl. ined.) foliis crenatis breviter vel semidecurrentibus tomentosis, tomento subcanescente, superioribus cuspidatis, *caule superne acute angulato*, racemorum fasciculis 5-7 floris, pedicellis florigeris calycem aequantibus, *filamentis omnibus purpureo-lanatis*, *antheris filamentorum longiorum oblongis decurrentibus*. ☉. In fluviorum glareis, pascuis, hinc inde. Jul. Aug. V. thapsiformi-nigrum D. fl. 2. p. 211. Flores speciosi, magnitudine florum V. phlomoidis. Videtur hybridum ex V. thapsiformi et V. nigro.

c. Folia breviter decurrentia. Flores rubro-ferruginei, lana filamentorum violacea.

19. **V. thapso-phoeniceum? V. versiflorum** (Schrad. monogr. verb. p. 36.) foliis crenatis breviter decurrentibus tomentosis, tomento canescente, *caule tereti*, racemis paniculatis, *fasciculis primariis* 3-5 *floris*, *pedicellis floriferis calyce sesqui-fructiferis subtriplo-longioribus*, *filamentis violaceo-lanatis*, antheris filamentorum longiorum subdecurrentibus. ☉. In locis incultis, (bisher bloss bei Prag in Böhmen.) Jul. Aug. *Flores rubro-ferruginei.* Planta mihi e descriptione cl. Schraderi tantum nota. G.

d. Folia non decurrentia. Flores fasciculati, flavi, lana filamentorum alba.

20. **V. Lychnitidi-floccosum** (Ziz. in litt.) **V. pulverulentum** (Vill. delph. 2. p. 490., secundum Schrad. in monogr. verb. 2. p. 17.) *foliis* crenatis *supra tenue subtus densius tomentosis*, tomento canescente, inferioribus oblongo-ellipticis in petiolum decurrentibus, caeteris *sessilibus*, superioribus acuminatis, caule superne *ramisque obtuse angulatis*, *racemis* paniculatis *patentibus*, *filamentis albo-lanatis*. ☉. In collibus et ad vias, (bisher bloss im Elsass u. in d. Gegend v. Mainz.) Jul. Aug. Amicus Ziz., hoc hybridum esse, censebat, ex V. floccoso et Lychnitide ortum.

e. Folia non decurrentia. Flores fasciculati, flavi, lana filamentorum purpurea.

21. **V. nigro-floccosum, V. Schottianum** (Schrad. monogr. verb. p. 13. t. 3. f. 2.) *foliis crenatis utrinque* supra tenuius subtus densius *tomentosis*, *radicalibus ovali-oblongis* acutiusculis *petiolatis*, *caulinis* intermediis oblongis acutis *sessilibus*, superioribus ovatis acuminatis subcordatis semiamplexicaulibus, caule superne angulato *ramis paniculatis*, pedicellis calyce duplo longioribus, *filamentis purpureo-lanatis*. ☉. In collibus incultis, ad vias rarius, (Oestreich, Schott; Guebwiller im Elsass, Mühlenb.; Coblenz, Wirt-

gen; Rheinufer unterhalb Niederbreisig u. oberhalb Höningen unweit Linz, Bogenhard; Vevey Cant. Waadt.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 217. V. mixtum Ramond. ap. DC. fl. fr. 3. p. 603. V. mixtum Thomas. pl. exsicc. Plantam hanc hybridam esse prolem ex Verbasco floccoso, cui magis accedit et a quo non differt nisi tomento vix in floccis secedente et colore violaceo indumenti staminum; specimina rhenana Verbasco nigro paulo magis accedunt.

22. **V. nigro-Lychnitis** (Schied. pl. hybr. p. 40.) **V. Schiedeanum** (Koch.) foliis crenatis supra subglabris, subtus tenuiter tomentosis, caulinis *inferioribus* oblongo-ovatis *basi obtusis in petiolum contractis* longe petiolatis, superioribus ovato-oblongis subsessilibus, *caule superne acute angulato, racemis elongato*, pedicellis calyce duplo longioribus, filamentis purpureo-lanatis. ☉. In locis incultis, (sehr zerstreut dch. das Geb.) Jul. Aug. V. nigrum *γ.* ovatum Loch. syn. ed. 1. p. 514.

f. Folia non decurrentia. Flores ferruginei.

23. **V. nigro-phoeniceum** (F. W. Schultz.) **V. rubiginosum** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 216. t. 197.) foliis crenatis subtus pubescentibus, inferioribus oblongis obtusis petiolatis, caulinis oblongo-ovatis acutiusculis sessilibus, superioribus ovatis acutis subcordatis semiamplexicaulibus, *racemis paniculatis, pedicellis calyce multoties longioribus*, filamentis purpureolanatis. ☉. In campis, (von Herrn Dr. F. W. Schultz bei Berg, eine Stunde von München auf dem rechten Isarufer, in wenigen Exemplaren gefunden; bei Brünn in Mähren, Reisseck; auch über Montreux am Genfersee, nach Gaud.) Jun. Jul. Flores extus rubro-ferruginei, intus flavo-ferruginei, versus tubum violaceo-maculati.

g. Folia non decurrentia. Flores solitarii vel gemini, flavi, lana filamentorum violacea.

24. **V. Lychnitidi-Blattaria** (Koch.) **V. Pseudo-Blattaria** (Schleicher. pl. exsicc.) foliis supra parce subtus densius *pubescentibus*, radicalibus oblongo-lanceolatis acutis basi sensim in petiolum latum attenuatis duplicato-crenatis vel subsinuatis, intermediis oblongis, superioribus ovato-cordatis acuminatis crenatis crenis breviter mucronatis, caule superne ramoso, *ramis virgatis cum pedicellis calycibusque hirtis pilis brevibus setulosis, floribus solitariis geminisve*, pedicellis calycem aequantibus fructiferis paulo longioribus. ☉. In locis incultis ad vias, (Wallis.) Jun. Jul. V. blattarioides Gaud. fl. helv. 2. p. 127., non Lamarck; (hoc differt pedunculis brevissimis calyce duplo triplove brevioribus et calycibus duplo maioribus.) Flores flavi, lana filamentorum violacea. „Capsulae vix unquam ad maturitatem perveniunt, ut probabile sit, hanc stirpem V. Blattariae et V. Lychnitidis, in quorum consortio provenit, hybridam esse progeniem.“ Gaud. l. c.

2. SCROPHULARIA (L. gen. n. 756.) Cor. subglobosa, limbo minuto, 5 lobo, lobo inferiore reflexo. Stam. 4, didynama, saepe cum rudimento filamenti quinti, staminodii, cuius stipes corollae adnatus est.

Sect. I. Paniculatae. Flores in panicula terminali oblonga, e ramis dichotomis composita.

a. Sub labio superiore appendicula subrotunda, vel reniformis, vel transverse oblonga, e rudimento filamenti quinti sterilis orta, (staminodium).

1. **S. nodosa** (L. sp. 863.) *foliis* ovato-oblongis ovatis subcordatisve *glabris duplicato-serratis, serraturis inferioribus longioribus acutioribusque*, caule argute quadrangulari, *petiolis exalatis*, panicula terminali, laciniis calycis ovatis obtusis angustissime membranaceo-marginatis, appendice staminodii breviter obovata vel transverse oblonga obsolete emarginata. ♃. In sylvis humidis, ad fossas, ripas, pratorum dumeta. Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 404. St. h. 23. Flores triste olivacei, dorso brunnei, raro ubique virentes.

2. **S. Ehrharti** (C. A. Steven., conf. Babington manual of brit. bot. p. 218.) *foliis* ovato-oblongis ovatis subcordatisve *glabris acute serratis, serraturis inferioribus minoribus, caule petiolisque lato-alatis*, panicula terminali, laciniis calycis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, *ap-*

pendice staminodii obcordato-biloba, lobis divaricatis. 4. Ad fluvios, rivos, piscinas fossasque, et in aqua ipsa. Jul.-Sept. S. aquatica Koch. syn. ed. 1. p. 515. et omnium auctorum ad nostra tempora. D. fl. 4. p. 405. St. h. 23. Flores dorso purpureo-fusci minus triste colorati quam antecedentis. Rami paniculae angula semirecto patentes.

3. **S. Neesii** (Wirtgen. Verhandl. des naturhist. Vereines 1. p. 29.) *foliis* ovato-oblongis ovatisve *glabris inferioribus* obtusiusculis *crenatis, mediis superioribusque acutis serratis, serraturis inferioribus minoribus, caule petiolisque lato-alatis*, panicula terminali, laciniis calycis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, *appendice staminodii transverse oblonga longitudine sua triplo latiore postice truncata* antice leviter et plerumque cum denticulo emarginata. 4. Ad rivos et fluvios, (an der Nette bei Neuwied, im Siechhausthal bei Coblenz; bei Düsseldorf, Wirtgen.) Jul.-Sept. „Omnibus partibus tenerior, rami caulis et paniculae fere rectangule patentes; corolla laetius rubra quam antecedentis et, basi excepta, nunquam colore rubro viridi mixto tincta." Wirtgen l. c. Staminodii appendix latere anteriore saepe leviter emarginata cum denticulo interjecto. G.

4. **S. Balbisii** (Hornem. hort. hafn. 2. p. 577.) *foliis* cordato-oblongis rotundato-obtusis *glabris obtuse crenatis* ad basin saepe foliolo minuto binisve auriculatis, *caule petiolisque lato-alatis*, panicula terminali, calycis laciniis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, *appendice staminodii subrotunda vel subrotundo-reniformi vix emarginata*. 4. In paludosis, locis humidis, ad fossas, (bei Aachen häufig, Hornung; am Ufer der Mosel v. Moselweiss bis Coblenz, 1-3 Stunden v. Coblenz entfernt, Wirtgen; Carlsruh, Alex. Braun; im Elsass, Kirschleger.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 406. S. aquatica L. secund. Steven., conf. Babingt. man. p. 219. Flores maiores, quam Scrophulariae Ehrharti, toti purpureo-fusci, basi tantum virides. G.

5. **S. Scopolii** (Hopp. cent., Pers. syn. 2. p. 160.) *foliis* ovato-oblongis ovatisve subcordatis *utrinque pubescentibus* duplicato-crenatis, caule petiolisque villosis, *panicula terminali*, calycis laciniis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis. ☉. In sylvis montanis, (Schles., Mähr., Steyermark, Kärnth., Krain.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 406. S. glandulosa W. et Kit. pl. r. h. t. 214. S. auriculata Scop. carn. 1. p. 446. t. 31., non Linn. S. Scorodonia Host. fl. a. 2. p. 204., non Linn. S. granidentata Tenor. fl. neap. prodr. 2. p. 69. sec. specimen ab auctore in herbario cl. Martii. Flores ut S. nodosae. G.

6. **S. laciniata** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 185. t. 170.) *foliis* glabris lobato-incisis *basi pinnatifidis pinnatisve*, lobis pinnisque inaequaliter dentatis, panicula terminali glandulosa, glandulis breviter stipitatis, calycis laciniis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, appendice staminodii *subrotundo-reniformi*. 4. In rupibus et ad muros, (bei Fiume in Menge.) April. Mai. D. fl. 4. p. 407. S. lucida MBieb. taur. cauc. 2. p. 77., non L. — Specimen Kitaibelianum, in collect. Willd. sub n. 11367. asservatum, comparavi. Flores virides dorso labii superioris purpureo-fusco. J.

b. Appendicula (staminodium,) sub labio superiore angusta, lineari aut lanceolata, acuta, aut nulla.

7. **S. canina** (Linn. sp. 2. 865.) *foliis glabris pinnatis*, pinnis inaequaliter et inciso-dentatis, panicula terminali glandulosa, glandulis subsessilibus, calycis laciniis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, *rudimento* filamenti quinti *lanceolato acuto nullove, tubo corollae labium superius ter superante*. 4. In locis montosis et in arenosis ad lacuum ripas, inque fluviorum glareis, (in d. Schweiz an vielen Orten, längs dem Rheine auf Kies, von d. Schweiz bis Rastatt; im südl. Tyr., Krain u. d. Litt.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 408. Reichenb. ic. f. 970. S. canina Wydl. ess. monogr. p. 44., excl. var. γ. et δ. S. atro-purpurea Morett. in bibl. ital. sec. Wydl. S. chrysanthemifolia M. Bieberst. taur. cauc. 2. p. 78., (secund. specimina authentica in collect. Willd. nulla nota ab hac differt.) Cor. minuta viola-

ceo-rubra, laciniis lateralibus albidis, infima albido-marginata. Variat laciniis superioribus albido-marginatis et lateralibus totis albis. — Flores non omnino sessiles, quales a Linnaeo dicuntur, multo tamen brevius pedicellati, quam in sequente. Alioquin hanc „floribus sessilibus" definire non potuisset.

8. **S. Hoppii** (Koch. in Deutschl. fl. 4. p. 410.) *foliis glabris pinnatis* bipinnatisque, laciniis incisis dentatisque, panicula terminali glanduloso-pilosa, pilis diametrum transversalem pedicellorum subaequantibus, laciniis calycis subrotundis obtusissimis lato-membranaceo-marginatis, *rudimento* filamenti quinti *lanceolato acuto nullove, labio corollae superiore tubum dimidium superante.* ☉. In vallibus alpinis; in montes humiliores australes descendens, (a. d. Nanas in Krain; im Bodenthale u. auf d. Loibl in Kärnthen; Steyermark; auf d. Schlehern im südl. Tyrol, auf d. Jura in d. Schweiz.) Jul. Aug. S. canina Hopp. cent. 4. S. canina Sieb. herb. fl. a. n. 195. S. canina var. *β.* et *γ.* DC. fl. fr. 2. p. 582. Wydl. p. 45. var. *γ.* et *δ.* Flores violacei antecedentis, sed calyx duplo fere maior, quam antecedentis. Pedicellus capsulam plerumque aequat.

Sect. II. Flores axillares; pedunculi pluriflori, corymbosi, vel 1-2 flori.

9. **S. vernalis** (L. sp. 864.) foliis cordatis duplicato crenatis pubescentibus, *caule petiolisque villosis,* pedunculis axillaribus 3-7 floris, floribus corymboso-congestis, *laciniis calycis oblongis* acutiusculis *immarginatis* apice recurvis. ☉. In locis humidis inter dumeta, ad sepes et vias, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 4. p. 411. St. h. 23. S. vernalis et latifolia Host. fl. a. 2. p. 205. 206. Flores flavi in colorem virescentem vergentes.

10. **S. peregrina** (L. sp. 866.) *foliis* cordatis grosse subduplicato-crenato-serratis *glabris* nitidis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus paucifloris, *laciniis calycis ovato-lanceolatis acuminatis immarginatis.* ♃. In locis cultis et ruderatis, (Istrien u. auf d. Inseln.) April. Mai. D. fl. 4. p. 412. Flores obscure sanguinei. J.

Ord. LXXXIII. ANTIRRHINEAE. Juss. gen. p. 118. Dub. bot. gall. p. 342. Personatae DC. fl. fr. 3. p. 573. Scrophularinearum gen. R. Brown.

Cal. divisus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, irregularis vel inaequalis, decidua,* aestivatione imbricata. *Stam.* 4, *didynama vel* 2, *corollae inserta; antherae basi exappendiculatae.* Ovarium liberum, biloculare, multiovulatum, placentis in medio dissepimenti adnatis. Styl. 1. Stigma integrum vel bilobum Fructus capsularis vel baccatus. *Embryo albumini* carnoso *inclusus, rectus* radicula hilum spectante. Folia, saltem inferiora, opposita.

1. GRATÍOLA (L. gen. n. 29.) Cal. 5 partitus. Cor. labium superius bifidum, inferius trifidum. Stam. 4, 5, tubo inserta, quorum 2 fertilia. Antherae pendulae, birimosae. Stigma bilamellatum.

1. **G. officinalis** (L. sp. 24.) foliis sessilibus lanceolatis trinerviis serrulatis basi integerrimis, pedunculis axillaribus 1 floris. ♃. In pratis humidis, ad ripas, (stellenweise durch d. ganze Gebiet.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 340. Schk. t. 2. Flores albi vel dilutissime rosei tubo flavescente.

2. DIGITÁLIS (L. gen. n. 758.) Cal. 5 partitus. Cor. campanulata, limbo obliquo, 4 fido, lacinia superiore emarginata. Stam. 4, didynama, in fundo corollae inserta; antherarum sacculi divaricati, hinc anthera transverse dehiscens. Caps. marginibus valvularum inflexis bilocularis, placenta superne libera.

1. **D. purpurea** (L. sp. 866.) *foliis* ovato-lanceolatis crenatis *subtus caule pedunculisque tomentosis*, inferioribus in petiolum angustatis, laciniis calycis ovato-lanceolatis breviter acuminatis trinerviis pubescentibus, *corolla ampliato-campanulata extus glaberrima*, labio superiore obtusissimo retuso vel leviter emarginato, laciniis labii inferioris breviter ovatis rotundatis. ☉. In montosis asperis sylvaticis, (von d. nördlichen Grenze d. Schweiz durch d. Vogesen u. d. Gebirge auf d. linken Rheinufer bis nach d. Eifel, auf d. rechten durch d. Schwarz- u. Odenwald, Hessen bis Westphalen u. bis zum Harze u. durch d. ganzen Thüringer Wald.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 414. St. h. 11. Flores purpurei, raro carnei vel albi, intus punctis intense purpureis albo-marginatis adspersi.

2. **D. purpurascens** (Roth. cat. bot. 2. p. 62.) foliis oblongo-lanceolatis serratis glabris subtus in nervis pubescentibus, inferioribus in petiolum angustatis, superioribus basi ovata sessilibus, *laciniis calycis* oblongo-lanceolatis acuminatis *trinerviis* margine pedunculis cauleque superne glanduloso-pubescentibus, *corolla tubuloso-campanulata extus glaberrima*, labio superiore obtuso emarginato, laciniis labii inferioris ovatis, lateralibus acutiusculis, *intermedia obtusissima corolla multo breviore*. ☉. In montibus porphyriis Palat. ad Rhenum, (in der Gegend von Kusel im bayerischen Rheinkreise u. auf den einige Stunden davon entfernten Gebirgen der Nahe; nach Lejeune auch bei Lüttich u. Malmedy.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 415. Reichenb. ic. 2. f. 284. D. longiflora Lej. rev. d. la fl. d. spa. p. 126. D. purpureo-lutea Mey. chlor. Hannov. p. 324. D. lutea *γ.* hybrida Lindl. monogr. dig. 24. — Digitalis purpurascens Lej. est varietas parviflora D. purpureae. — Fortasse hybrida e D. purpurea et D. lutea, sed in locis memoratis saepe solitarie crescit, neque inter affines, seminibusque propagatur. Corolla flava, colore dilute purpureo fucata, rarius tota purpurea; intus pallida, ventre punctis purpureis plus minusve adspersa. G.

3. **D. grandiflora** (Lam. fl. fr. 2. p. 332.) *foliis* oblongo-lanceolatis serratis ciliatis *pubescentibus*, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi ovata semiamplexicaulibus, laciniis calycis lanceolatis acutis, pedunculis cauleque superne glanduloso-pilosis, *corolla ampliato-campanulata glanduloso-pubescente*, labio superiore obtusissimo emarginato vel subdenticulato, laciniis labii inferioris triangularibus, *intermedia duplo latiore acuta obtusave corolla multo breviore*. ♃. In rupestribus et lapidosis montium; in subalpina adscendens. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 416. D. ambigua Murr. prod. fl. goett. 62. D. ochroleuca Jacq. a. t. 75. D. lutea Pollich. pal. 2. p. 199. Corolla luteo-sulphurea, interne lineis fuscis reticulato-nebulosa. Variat:

α. acutiflora, laciniis labii inferioris acutis: D. ambigua St. h. 11. D. ochroleuca Lindl. monogr. t. 8. D. grandiflora Reichenb. ic. 2. t. 189.

β. obtusiflora, laciniis labii inferioris obtusis: D. ambigua Lindl. l. c. t. 7. D. ochroleuca Reichenb. ic. 2. t. 290.

4. **D. media** (Roth. catal. bot. 2. p. 60.) *foliis* oblongo-lanceolatis serratis *glabris ciliatis*, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi ovata sessilibus, calycis laciniis lanceolatis uninerviis acutis margine pedunculis cauleque superne glanduloso-pubescentibus, *corolla tubuloso-campanulata extus glanduloso-pubescente*, labio superiore obtuso emarginato, lobulis acutis, laciniis lateralibus labii inferioris triangularibus acutis, *intermedia ovata obtusa corolla multo breviore*. ☉. In montosis sylvaticis, (auf d. Porphyrgebirgen d. Rheimpfalz, bei Kusel u. Niederalben selten, bei Wieselbach in der Gegend v. Oberstein an der Nahe in Gesellschaft von D. lutea u. D. grandiflora in Menge, Bogenhard; in d. Thälern d. Jura, aber selten.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 417. Reichenb. ic. 2. f. 281. D. intermedia Pers. syn. 2. 167. D. ambiguo-lutea Mey. chlor. Hannov. p. 325. Differt a sequente D. lutea corollis maioribus latioribus intus in ventre obsolete brunneo-reticulatis et ad insertionem staminum utrinque fascia lata ferruginea pictis. Hybrida censetur e Digitali grandiflora et D. lutea.

5. **D. lutea** (L. sp. 867.) foliis oblongo-lanceolatis serratis glabris vel basi subciliatis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi ovata

sessilibus, *caule pedunculisque glabris*, laciniis calycis lanceolatis uninerviis acutis margine glanduloso-pubescentibus, *corolla tubulosa extus glabra*, labio superiore acute emarginato, lobulis acutis, laciniis labii inferioris ovatis, lateralibus acutis, *intermedia* acutiuscula vel obtusa, *corolla multo breviore*. ☉. In collibus et montosis asperis, (Schweiz; südl. Tyrol, Oberschwaben, Schwarzw., Odenw. u. vom Elsass durch d. Geb. d. Rheinpfalz bis nach Luxemb. u. Lüttich.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 418. Reichenb. ic. 2. f. 280.

6. **D. fuscescens** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. p. 304. t. 274.) foliis oblongo-lanceolatis remote denticulatis glabris ciliatis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi ovata amplexicaulibus, laciniis calycis oblongo-lanceolatis acutis *pedunculis cauleque superne lanato-villosis*, corolla campanulata glanduloso-pubescente, labio superiore obtuso emarginato, laciniis lateralibus labii inferioris triangularibus, *intermedia* ovata breviter acuminata *tertiam corollae partem aequante*. ☉. In montosis reg. calid., (bei Fiume, Bartling.) Jul. D. fl. 4. p. 419. Rchb. ic. 2. f. 288. D. lanato-(laevigato-) ambigua Mey. chlor. Hannov. Corolla ochracea intus reti rubro-fusco extus transparente picta. — Cl. Mey. hanc plantam hybridam e D lanata vel D. laevigata, quam posteriorem tanquam speciem a priori non separat, et e D. grandiflora ortam esse, existimat. J.

7. **D. laevigata** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 171. t. 158.) foliis lanceolatis remote denticulatis integerrimisve cauleque glabris; laciniis *calycis lanceolatis acuminatis* margine corollaque glanduloso-pubescentibus, corolla breviter campanulata pone labium inferius gibba, *lacinia intermedia labii inferioris corollam fere aequante ovata acuminata*. ☉. In collibus lapidosis reg. calid., (Innerkrain u. bei Fiume.) Jul. D. fl. 4. p. 420. Corolla ochracea, venis fuscis striata et reticulata, labio inferiore albo, venis aquose virescentibus notato. G.

8. **D. ferruginea** (L. sp. 2. 867.) foliis lanceolatis remote denticulatis subciliatis, *calycis laciniis* oblongo-ovatis *rotundato-obtusis margine lato-membranaceo cinctis*, corolla breviter campanulata pone labium inferius gibba, *lacinia media labii inferioris corollam subaequante ovata rotundato-obtusa*. ☉. In locis saxosis, (im wärmern Krain u. im Littorale, Host.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 422. Reichenb. ic. 2. f. 286. Corolla ochracea, intus ferrugineo-, in labio inferiore fusco-purpureo-reticulata.

D. lutescens Lindl. monogr. t. 21., secundum cl. Mey., chlor. Hannov. p. 324., eadem planta est, ac D. fucata Ehrh. Beitr. 7. 151. et hybrida e D. purpurea et D. grandiflora. Hanc nondum vidi. G.

3. ANTIRRHINUM (L. gen. n. 750., excl. specieb.) Cal. 5 partitus. Cor. basi gibba, bilabiata, labio inferiore trifido, in medio inflato-prominente et faucem claudente; superiore bifido vel bipartito. Stam. 4, didynama. Capsula apice foraminibus 3 dehiscens.

1. **A. maius** (L. sp. 859., excl. var. *α*.) foliis oppositis alternisve lanceolatis glabris, floribus racemosis, *foliolis calycinis* ovatis obtusis, *corolla multo breviorибus*, labio corollae superiore bipartito. ♃. In muris vetustis, declivibus montium petrosorum et fluviorum glareis, (Südtyrol bei La Sega unweit Rovoredo an sehr warmen Abhängen, Facchini; Istrien, Oestreich, Böhmen u. Schlesien, in d. westlichen Schw., u. v. da auf allen alten Mauern u. Kirchen von Basel bis an die Niederlande, aber nur längs dem Rheine hin.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 384. Corolla sesquipollicaris, purpurea vel alba, maculis 2 flavis in palato, (in prominentia, labii inferioris, quae palatum dicitur.) — A. maius *α*. L. sp. 859., A. latifolium Mill. dict. 4., in Littorali austriaco fortasse quaerendum, differt: tota planta a basi dense pilis glanduliferis tecta; folia, etiam superiora, lata, ovalia vel ovali-lanceolata; flores flavi, palato saturatiore, quandoque purpureo-striati; labium superius brevius, neque ad medium usque bifidum.

2. **A. Orontium** (L. sp. 860.) foliis oppositis alternisve lanceolatis, floribus remotis, *laciniis calycis* lanceolatis *corolla longioribus*. ☉. In cultis et

ruderatis. Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 385. St. h. 27. Flores purpurei, raro albi.

4. LINARIA (Tournef. Mill. dict.) Cal. 5 partitus. Cor. basi calcarata, bilabiata; labio inferiore trifido, in medio inflato-prominente, faucem plus minusve claudente; superiore bifido vel bi-partito. Stam. 4, didynama. Caps. apice in valvulas 2 dehiscens, remanente arcu stylifero, dissepimentum tegente; valvulae integrae vel trifidae.

Sect. I. Cymbalaria. Caules a basi divisi in ramos flagelliformes filiformes prostratos. Folia lata, subrotunda, ovata vel hastata, omnia, etiam suprema, conspicue petiolata. Pedunculi tenues, elongati, solitarii in axillis foliorum a basi caulis ad apicem usque. Faux palato non penitus clausa.

1. **L. Cymbalaria** (Mill. dict. n. 17.) *foliis* cordato-subrotundis *quinquelobis* glabris. 4. In muris vetustis, praecipue vinearum; hinc inde, sed rarius, in rupium fissuris, (südl. D. u. Schw., seltner im nördl. D.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 386. St. h. 70. Antirrhinum Cymbalaria L. sp. 851. Cymbalaria muralis Fl. wett. 2. 397. Cor. dilute violacea, palato albo, gibbis 2 vitellinis; variationem floribus minoribus albidis misit G. W. Bischoff.

2. **L. Elatine** (Mill. l. e. n. 16.) *foliis* sparsis *ovato-hastatis*, inferioribus ovatis, caulibus prostratis, *calcare recto*, pedunculis glabris. ⊙. In agris solo argillaceo et calcareo. Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 387. St. h. 70. Antirrhinum Elatine L. sp. 821. Cor. albida, labio superiore superficie interiore violaceo, inferiore sulphureo.

3. **L. commutata** (Bernhard. ap. Reichenb. fl. exc. p. 373.) *foliis* sparsis *hastatis*, infimis obovatis, caulibus prostratis, *calcare subuncinato*, pedunculis glabris. ⊙. In agris Istriae, in Insula Brioni. Aug. Sept. D. fl. 4. p. 388. Corolla duplo maior, quam in antecedente. J.

4. **L. spuria** (Mill. dict. n. 15.) *foliis* sparsis *subrotundo-ovatis integerrimis*, caulibus prostratis, calcare arcuato, pedunculis villosis. ⊙. In agris solo calcareo et lutoso. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 389. St. h. 70. Antirrhinum spurium L. sp. 851. Flores albidi labio superiore superficie interiore atro-violaceo, inferiore flavo.

Sect. II. Chaenorrhinum DC. fl. fr. 5. p. 140. Flores solitarii in foliorum axillis, racemos foliatos valde laxos formantes; folia lanceolata vel elliptica, inferiora plus minusve conspicue petiolata, superiora sessilia. Faux plerumque palato non penitus clausa.

5. **L. minor** (Desfont. atl. 2. 46.) *tota glanduloso-pilosa*, foliis lanceolatis obtusis in petiolum attenuatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis linearibus, floribus solitariis axillaribus subracemosis, *pedunculis calyce triplo longioribus, laciniis labii superioris divaricatis*, seminibus oblongis sulcatis. ⊙. In agris et locis cultis. Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 389. St. h. 70. L. viscida Moench. meth. 524. Antirrhinum minus L. sp. 852. Cor. dilute violacea, labiis ochroleucis.

6. **L. littoralis** (Bernhard. ap. Spreng. syst. veg. 2. 793.) *toto glanduloso-pilosa*, foliis lanceolatis obtusis in petiolum attenuatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis angustioribus, floribus solitariis axillaribus subracemosis, *pedunculis calycem aequantibus, laciniis labii superioris sinu clauso parallelis*, seminibus oblongis sulcatis. ⊙. In littore maris Istriae. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 390. St. h. 70. Flores antecedente paulo maiores, laetius violacei. J.

Sect. III. Linariastrum DC. Caulis ramique racemo vel spica terminati. Folia sessilia vel infima tantum in petiolum brevem attenuata. Faux arcte clausa. — Praeter caules primarios florigeros non raro occurrunt alii tenues, debiles, filiformes, steriles, foliis, brevioribus et latioribus, quam caetera, densius obsiti, quod non solum in speciebus perennibus, sed in annuis etiam observatur.

a. Folia infima opposita vel verticillata.

7. **L. triphylla** (Mill. dict. n. 2.) *glabra*, *foliis ternatis* sessilibus *ovali-oblongis* nervosis, *floribus dense spicatis*, calycis laciniis oblongis acutiusculis obsolete trinerviis inaequalibus capsula subrotunda emarginata longioribus, *seminibus* oblique ovatis *trigonis* foveolato-rugosis. ⊙. In locis cultis Istriae,

Host. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 391. Antirrhinum triphyllum L. sp. 852. Bocc. sic. t. 22. Flores ochroleuci, palato vitellino, calcare violaceo. J.

8. **L. alpina** (Mill. dict. n. 5.) glaberrima, *foliis quaternis*, lineari-oblongis basi attenuatis, racemis ovatis brevibus, *calycis laciniis* lanceolatis acutis *capsula* obovata apice integra *brevioribus*, *seminibus* planis *ala* orbiculari *cinctis* laevibus. ⊙. In locis lapidosis et glareis alpium, cum fluviis in convalles et planities, alpes comitantes, descendens. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 392. St. h. 51. Antirrhinum alpinum L. sp. 856. Corolla caerulea, gibbis palati croceis.

9. **L. pelisseriana** (Mill. dict. n. 11.) *tota glabra*, *foliis linearibus* basi apiceque attenuatis, *inferioribus quaternis*, caulium sterilium ellipticis, *racemis* pedunculatis *capitatis* serius elongatis, *calycis laciniis* e basi latiore attenuatis acutissimis *capsula duplo longioribus*, *seminibus* plano compressis *pectinato-ciliatis*. ⊙. In locis lapidosis incultis Istriae et insulis adjacentibus. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 395. Antirrhinum pelisserianum L. sp. 2. 855. Cor. dilute caerulea venis saturatioribus, palato albo, striis caerulescentibus; calcar corolla dimidio brevius. Variat floribus paulo maioribus et calcare longitudine corollae: Antirrhinum gracile Pers. syn. 2. 156., secund. Salzmann. J.

10. **L. arvensis** (Desfontain. atl. 2. 45.) glabra, *calycibus pedicellisque glanduloso-pilosis*, *foliis* linearibus basi apiceque attenuatis, *inferioribus quaternis*, *racemis pedunculatis capitatis* serius elongatis, laciniis calycis linearibus obtusiusculis, inferioribus capsula obovata integra brevioribus, *labio corollae superiore erecto plano*, laciniis oblongis obtusis, *seminibus* planis ala lata orbiculari cinctis. ⊙. In agris et campis arenosis, (Rheingegenden bis nach d. Niederlanden, sodann im mittlern u. nördlichen D., Böhm.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 393. St. h. 70. L. arvensis *α*. Desf. atl. 2. 45. Antirrhinum arvense *α*. L. sp. 2. 855. A. arvense Willd. sp. 3. 244. Cor. parva, dilute caerulea, striis saturatioribus, palatum albidum rete subtili violaceo. G.

11. **L. simplex** (DeCand. fl. fr. 3. p. 588.) glabra calycibus pedicellisque glanduloso-pilosis, *foliis* linearibus basi apiceque attenuatis, *infimis quaternis*, *racemis pedunculatis capitatis* serius elongatis, calycis laciniis obtusiusculis, inferioribus capsula obovata integra brevioribus, *labio corollae superiore lateribus reflexo*, laciniis ovatis acutis, seminibus planis ala lata orbiculari cinctis. ⊙. In agris, (bei Lüttich, Lej.; auf einem Acker bei Pfungen eine Stunde von Winterthur C. Zürich, Dom. Fuckel pharm.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 394. St. h. 70. Antirrhinum simplex Willd. sp. pl. 3. 243. A. parviflorum Jacq. ic. rar. 499. A. arvense *β*. L. sp. 555. Cor. dilute flava, striis tenuibus violaceis, labium inferius et palatum vitellina, concolora. Variat seminibus medio laevibus, hanc misit ex Helvetia Dom. Fuckel.

12. **L. striata** (DeCand. fl. fr. 3. p. 586.) *tota glabra*, *fol. anguste lanceolatis linearibusque* uninerviis vel obsolete trinerviis acutis, *inferioribus verticillatis*, superioribus sparsis, racemis laxis, *calycis laciniis* lanceolatis acutis *capsula brevioribus*, *seminibus* ovatis *trigonis* apteris rugis anastomosantibus impresso-punctatis, angulis acutis impunctatis. ♃. In locis incultis, (im Lüttichischen bei Mastricht, Lej.; im Oberelsass bei Siegolsheim, im St. Amarinthale bei Wesserling, Wildenstein, Geishausen; im Cant. Waadt; Westerplatte bei Danzig.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 401. Reichenb. ic. f. 610. L. decumbens Moench. meth. 523. Antirrhinum striatum et A. galioides Lam. dict. 2. p. 351. A. repens Sm. brit. p. 658. A. monspessulanum et A. repens L. sp. 854. Cor. cinerascenti-alba vel caerulescens, violaceo-striata in palato reticulata; color in planta culta variat.

13. **L. chalepensis** (Mill. dict. n. 12.) *glaberrima*, *foliis* lineari-lanceolatis acutis obsolete trinerviis, *infimis verticillatis*, racemis elongatis laxis flexuosis, *laciniis calycis* linearibus acutis patentibus *capsula* subrotunda compressa emarginata *duplo longioribus*, *seminibus* ovatis *trigonis* transverse

foveolato-rugosis. ⊙. In locis lapidosis reg. calid., (Fiume, Insel Veglia u. Cherso.) Mai. Jun. D. fl. 4. p. 395. L. alba Moench. meth. 524. Antirrhinum chalepense L. sp. 859. Cor. alba, quandoque obsolete caeruleo-striata, labiis ochroleucis. J.

b. Folia alterna vel absque ordine sparsa.

14. **L. Loeselii** (Schweigger. im königsb. Arch. 1. p. 228.) *glaberrima, foliis alternis remotis* lineari-lanceolatis longe attenuatis obsolete trinerviis, racemis laxis, calycis laciniis oblongo-lanceolatis breviter acuminatis obsolete nervosis capsula brevioribus, *seminibus* planis *ala reniformi cinctis laevibus*. 4. In arenosis maritimis, (Kurische Nehrung in Preussen, Dünen bei Danzig, in Pommern.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 396. L. maritima Rechb. fl. exc. p. 375. L. juncea Rchb. ic. 5. f. 612. 613. Antirrhinum odoratum MBieb. taur. cauc. 2. p. 76. A. odoratissimum Güldenst. it. 1. 111.; atque verosimile: A. linifolium L. sp. 858. Flores sulphurei, calcare leviter purpurascente. G.

15. **L. genistifolia** (Mill. dict. n. 14.) *tota glabra, foliis alternis* sparsisve, lanceolatis vel lineari-lanceolatis trinerviis *acuminatis* racemis laxis, laciniis calycis e latiore basi attenuato-acutis capsula longioribus, *seminibus ovatis trigonis* apteris rugulis tenuibus anastomosantibus impresso-punctatis, angulis acutis impunctatis. 4. In collibus apricis, (Oestreich, Mähren, Böhmen, Erzgeb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 399., non DC. Reichenb. ic. 5. f. 626. Antirrhinum genistifolium L. sp. 858. Cor. citrina. Variat foliis latioribus, ovato-lanceolatis: Jacq. a. t. 244.; atque foliis latioribus floribusque maioribus: L. chloraefolia Reichenb. ic. 6. f. 627. G

16. **L. italica** (Trev. act. acad. leopold. car. 13. p. 188.) *tota glabra, foliis* alternis sparsisve lineari-lanceolatis acutis *planis trinerviis*, nervis (in viva planta) obsoletis, *medio supra non impresso*, floribus racemosis, laciniis calycis oblongo-lanceolatis breviter acuminatis enerviis capsula brevioribus, *seminibus* planis *ala* orbiculari *cinctis*. 4. In locis incultis asperis, (im Wallis; südl. Tyrol, u. bei Marburg in Steyermark.) Jul.-Sept. D. fl. 4. p. 397. Reichenb. ic. 5. f. 608. L. genistifolia DC. fl. fr. 3. p. 591. L. angustifolia Reichenb. fl. exc. p. 375. L. paniculata Peyer. et Vest. bot. Ztg. 12. 1. Beil. p. 30. L. linifolia Roch. bann. p. 60. f. 47. Antirrhinum genistifolium Vill. delph. 2. 439. A. Bauhini Gaud. helv. 4. p. 154. Cor. citrina. Semina medio tuberculato scabra, rarius quoque tota laevia.

17. **L. vulgaris** (Mill. dict. n. 1.) glabra, *rachi pedicellisque glanduloso-pubescentibus, foliis sparsis dense congestis lanceolato-linearibus* acutis margine reflexiusculis *trinerviis, nervo medio supra sulco exarato* subtus valide prominente, *racemo saepe imbricato*, laciniis calycis oblongo-lanceolatis trinerviis acutis capsula brevioribus, seminibus planis ala orbiculari cinctis medio tuberculato-scabris. 4. In campis, aggeribus, ad vias. Jul.-Sept. D. fl. 4. p. 400. Antirrhinum Linaria L. sp. 858. St. h. 18. Cor. sulphurea, labio inferiore vitellino, palato croceo. — Cl. Facchinius specimina misit, inter L. vulgarem et italicam intermedia, quae facile originis hybridae. — Peloriam Linariae vulgaris misit Dom. Rudio cum schedula: (auf magerm Thonschieferboden bei Weilmünster häufig.)

5. ANARRHINUM (Desfont. fl. atl. 2. p. 51.) Tubus corollae subcylindricus, limbus planus, obliquus; faux aperta, palato deficiente. Corolla calcarata vel ecalcarata. Caetera ut Linariae.

1. **A. bellidifolium** (Desf. l. c.) foliis radicalibus oblongo-obovatis obtusis inaequaliter serratis, caulinis 5-7 partitis, laciniis linearibus integerrimis. 4. In declivibus apricis, (an Gebirgsabhängen längs d. Mosel zwischen Trier u. Bernkassel; im Cant. Genf.) Jul. Aug. Cor. parva violacea, calcare gracili adscendente.

6. ÉRINUS (L. gen. n. 771.) Cal. 5 partitus. Cor. hypocrateriformis; tubo gracili, tereti; limbo plano, subinaequali, 5 fido, laciniis emarginatis

subaequalibus. Stam. 4, didynama, tubo inclusa; antherae reniformes. Caps. apice bivalvis, valvulis dissepimento longioribus.

1. **E. alpinus** (L. sp. 878.) corymbo simplici serius racemoso, foliis spathulatis antice crenatis. 4. In locis petrosis graminosis alpium et montium altiorum, (in der Schweiz nicht selten, auch auf d. z. Elsass gehörigen Jura; nach Host auch im südl. Tyrol.) Mai.-Jul. D. fl. 4. p. 423. Schk. t. 176. Flores violacei.

7. VERÓNICA (L. gen. n. 25.) Cal. 4-5 partitus. Corollae limbus quadrifidus, lacinia superiore latiore. Stam. 2; antherae rimis 2 longitudinalibus dehiscentes. Stigma integrum. Caps. emarginata.

Sect. I. Chamaedrys. Racemi axillares. (Radix perennis.)

a. Calyces quadripartiti.

1. **V. scutellata** (L. sp. 16.) *fol.* sessilibus *lanceolato-linearibus acutis remote retrorsum denticulatis*, racemis axillaribus, pedicellis fructiferis patentissimis, capsula compressa emarginato-biloba transverse latiori. 4. In uliginosis, ad fossas, etiam in cultis humidis. Jun.-Sept. D. fl. 1. 315. St. h. 58. Flores albidi roseo- vel caeruleo-striati.

β. pubescens, caule, pedunculis vel calyce quoque margineque capsularum villosis: V. parmularia Poit et Turp. fl. par. 19. t. 14.

2. **V. Anagallis** (L. sp. 16.) *fol. sessilibus* lanceolatis ovatisque *acutis serratis, racemis axillaribus*, pedicellis fructiferis patentissimis, *capsula orbiculari leviter emarginata*. 4. In aquis stagnantibus et rivis. Mai.-Aug. D. fl. 1. 316. Fl. dan. t. 903. Flor. pallide caerulei venis saturatioribus. Variat fol. subintegerrimis: V. tenella Schmidt boh. cent. 1. 14.; flor. roseis: V. aquatica Bernhardii über Pflanzenart. p. 66. — V. anagalloides Guss. fl. sic. prodr. 1. p. 10. Differt fol. lanceolato-linearibus, capsulis ellipticis, minute emarginatis.

3. **V. Beccabunga** (L. sp. 16.) *fol. petiolatis* ellipticis oblongisve *obtusis crenato-serratis, racemis axillaribus*, pedicellis fructiferis patentibus, *capsula subrotunda* turgida *leviter emarginata*. 4. In aquis stagnantibus, fontibus, rivis. Mai-Aug. D. fl. 1. 317. St. h. 12. Flores caerulei venis saturatioribus. Var. maior et minor; fol. subintegerrimis; flor. roseis et bracteis pedicello longioribus: V. limosa Lej. rev. p. 3.

4. **V. urticifolia** (L. fil. suppl. 83.) *fol. sessilibus ovatis argute serratis, superioribus longe acuminatis, racemis axillaribus*, pedicellis fructiferis patentissimis, capsula suborbiculari transverse latiore emarginata, *caule sparsim piloso*. 4. In nemorosis subalpinis, cum fluviis in planities descendens, (von d. Schweiz d. d. g. Alpenk.) Mai-Jul. D. fl. 1. 321. St. h. 58. Jacq. a. t. 59. V. latifolia Scop. carn. 1. 13. — Flor. dilute caerulei vel rosei, striis saturatioribus.

5. **V. Chamaedrys** (L. sp. 17.) fol. subsessilibus ovatis inciso-crenato-serratis, racemis axillaribus, pedicellis fructiferis adscendentibus, capsula triangulari-obcordata ciliata longioribus, *caulibus* adscendentibus *bifariam pilosis*. 4. In pratis siccioribus, ad sylvarum oras, sepes, vias, etiam in alpinis. April. Mai. D. fl. 1. 319. St. h. 58. Flores pulchri, dilute caerulei, venis saturatioribus. — Var. caule undique piloso, pilis vero in lineis 2 oppositis densioribus: V. pilosa Schm. cent. 1. 17. Willd. sp. pl. 1. 66. V. plicata Pohl. boh. 15.

6. **V. montana** (L. sp. 17.) *fol. longe petiolatis* ovatis inciso-crenato-serratis, racemis axillaribus, pedicellis fructiferis patulis, *capsula transverse latiore basi apiceque emarginata complanata glabra margine crenulata ciliata*, caulibus basi repentibus sparsim pilosis. 4. In nemoribus frondosis umbrosis, (d. d. g. Geb., aber nicht überall, in d. Schweiz sehr selten.) Mai. Jun. D. fl. 1. 319. St. h. 58. Jacq. a. t. 109. Cor. albida, striis purpureo-caeruleis, racemi laxi, pauciflori. Caps. magnae, subbiscutatae.

7. **V. officinalis** (L. sp. 14.) fol. breviter petiolatis obovato-ellipticis oblongisve serratis, *racemis axillaribus multifloris densis, pedicellis fructiferis*

erectis capsula triangulari-obcordata obtuse emarginata brevioribus, caulibus hirsutis basi repentibus apice adscendentibus. 4. In pascuis, ericetis sylvaticis, (in den Alpen bis 5500 F.) Jun. Jul. D. fl. 1. 318. St. h. 58. Cor. dilute caerulea, venis saturatioribus, rarius tota alba, vel alba venis roseis. — Specim. pusilla fol. subrotundo-obovatis: V. Tournefortii Schm. boh. cent. 1. 12. Reichenb. ic. fig. 1054. 1055. Specimen luxurians, racemis paniculatis: V. spadana Lej. fl. d. spa. 1. 22. — Distinguitur V. pyrenaica All., V. Allionii Vill., hucusque nec in G. nec in Helv. lecta: fol. glabris serrulatis, cor. laciniis oblongis linearibusve et praecipue caps. oblongo-obcordata acute emarginata, lobis rotundatis. V. Allionii a cl. Sternberg. in alpe Spinale Tyrolis lecta in Hostii fl. austriacam non recepta est; secund. cl. Facchinium nihil est nisi modificatio Veronicae serpyllifoliae.

8. **V. aphylla** (L. sp. 14.) fol. breviter petiolatis obovato-ellipticis crenato-serratis integerrimisve, *racemo axillari subsolitario subquadrifloro*, pedicellis fructiferis erectis capsula obcordata longioribus. 4. In alpibus, rarius cum fluviis in humiliora loca descendens, in cacumine Babiae Gorae Sudetorum. Jun.-Aug. D. fl. 1. 314. St. h. 56. V. depauperata WK. t. 245.

b. Calyx quinquepartitus, lacinia quinta minuta.

9. **V. prostrata** (L. sp. 22.) fol. breviter petiolatis lineari-lanceolatis crenato-serratis basi subincisis subintegerrimisve, racemis axillaribus, pedicellis capsulam obovatam leviter emarginatam subaequantibus, *calycibus quinquefidis, caulibus sterilibus prostratis*, floriferis adscendentibus. 4. In ericetis siccis, collibus apricis, (zerstreut d. d. g. Geb. an manchen Orten häufig, aber nicht allgemein verbreitet.) Mai. Jun. D. fl. 1. p. 323. St. h. 58.? fig. pessima. Viva non difficile distinguitur a duabus sequentibus: tempore florendi praecociori, caulibus multo gracilioribus, basi duris lignosis, iunioribus et sterilibus in orbem prostratis, floribusque pallidioribus; ludit quoque floribus albis et carneis, quod in sequentibus non occurrit.

10. **V. austriaca** (L. sp. 17.) *foliis subpetiolatis* crenato- vel pinnatifido-serratis lanceolatis vel multifidis et ambitu ovatis, racemis axillaribus, pedicellis superioribus capsulam obovatam acute emarginatam aequantibus, *calycibus quinquefidis, caulibus omnibus erectis vel e basi arcuata adscendentibus.* 4. In collibus siccis apricis Germ. orientalis et australis et in Helv. australi, (*α.* bei Troppau in Schlesien; bei Karlstein in Böhmen; Oestr.; Steyerm.; Frankenhausen im Schwarzb.; bei München; Genf; *β.* et *γ.* Oestr. u. Krain.) Jun. Jul. Flores pulchre caerulei. Tres varietates insignes sunt:

α. dentata, folia lanceolata vel lanceolato-linearia, plerumque remote crenato-serrata, quandoque integerrima: V. dentata Schmidt. boh. cent. 1. 20. St. h. 58. V. Schmidtii R. et S. 1. 115.

β. pinnatifida, folia lanceolata vel lanceolato-linearia pinnatifido-dentata: V. austriaca L. 1. c. M. et K. D. fl. 1. 326. Jacq. austr. t. 329., cum varietate sequ. V. polymorpha Willd. en. suppl. p. 2., sec. Link. Jahrb. 1. 3. 43. V. Jacquini Schott. R. et S. 1. 108. Forma laciniis foliorum linearifiliformibus: V. tenuifolia MB. t. c. 1. 13., sec. ipsum auctorem in suppl.

γ. bipinnatifida, folia bipinnatifida ambitu ovato: V. multifida L. sp. 1. 17. D. fl. 1. 327. — Si caps. pilosae sunt: V. pilocarpa Link. en. 1. 25. V. trichocarpa R. et S. mant. 1. 106.

Omnes hae varietates formis intermediis confluunt, et e semine unius plantae enascuntur. Var. *β.* et *γ.* non raro in una radice reperiuntur. Florent antecedente serius et sequente praecocius. Planta viva habitu proprio sese prodit.

11. **V. latifolia** (L. sp. 18.) *foliis sessilibus* e basi subcordata ovatis oblongisque inciso-serratis pinnatifidisque, racemis axillaribus, pedicellis erectis capsulam obovatam acute emarginatam subaequantibus, *calycibus quinquefidis, caulibus omnibus erectis vel e basi arcuata adscendentibus.* 4.

In graminosis siccioribus, praecipue montanis, (dch. d. g. Geb., doch nicht aller Orten.) Jun. Jul. D. fl. 1. 322. St. h. 58. V. Pseudochamaedrys Jacq. a. t. 60. Flores pulcherrimi, caerulei venis saturatioribus. Variat:

α. maior, fol. basi cordata amplexicaulibus: V. latifolia maior Schrad. g. 1. 35.

β. minor, fol. basi ovatis et plerumque oblongis: V. latifolia minor Schrad. l. c. V. Teucrium Vahl. en. 1. 76., secundum descriptionem. Num V. Teucrium L. sp. 16. ad hanc varietatem, an ad varietates V. austriacae pertineat, nondum satis constat.

Sect. II. Pseudo-Lysimachium. Racemus terminalis, et saepe plures secundarii laterales. Cor. tubus cylindricus, diametro suo transversali longior; limbus subbilabiatus. (Radix perennis.)

12. **V. spuria** (L. sp. 13.) foliis oppositis ternis quaternisque oblongo-lanceolatis lanceolatisve acutis simpliciter vel subduplicato-serratis, *racemis terminalibus* subpaniculatis elongatis *laxiusculis*, *bracteis* lineari-lanceolatis *pedicellum aequantibus brevioribusque,* capsula subrotunda emarginata turgida. 4. In nemorosis, (bisher bloss um Halle in Thüring. u. zw. Verviers u. Limburg im Geb. d. Fl. v. Spaa.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 303. Flores caerulei. Variat pedicellis bracteam aequantibus et duplo triplove longioribus, foliis lanceolatis et fere ellipticis, longius et brevius acuminatis, serraturis simplicibus et duplicatis. Foliorum apex plus minusve integerrimus est, et bracteae saepe pedicellos, nunquam autem calyces aequant. Variat porro:

α. Schraderi, folia lanceolata brevius acuminata, serraturae remotae, sed non semper aequales, pedicelli plerumque longi: V. spuria Schrad. comment. p. 36. t. 2. f. 4. V. amethystina Willd. en. 1. 17. herbar. 171. fol. 1. (fol. 2. specimina Pallasiana medium tenent inter hanc varietatem et var. nostram ∂.) V. paniculata L. sp. 18.

β. laxiflora, folia lanceolata longe acuminata, serraturis approximatis: V. spuria Spreng. hal. t. 1. f. 1., serraturis simplicibus. Veronicam laxifloram Lej. rev. p. 4., examinato unico specimine haud completo, hic citaveram, sed nunc, eam varietatibus Veronicae longifoliae adnumerandam esse, censeo.

γ. foliosa, fol. elliptico-lanceolata plerumque inaequaliter serrata: V. foliosa WK. t. 102. Spr. hal. t. 1. f. 2. V. nitida Ehrh. pl. sel. n. 4. V. brevifolia MB. (specim. superne pubescentia.)

Veronica arguta Schrad., ex horto Goettingensi accepta, omnibus partibus V. longifoliae simillima est, nec differt, nisi apice foliorum ad unguicularem longitudinem circiter integerrimo. Ab hac V. alternifoliam Lej. plane diversam, eamque progeniem V. spicatae esse, mihi persuasum habeo: qua de causa illam inter varietates huius cum V. paludosa Lej. refero, quae posterior cum V. crenulata Hoffm., saltem cum V. villosa Schraderi, eadem esse nequit, quamvis etiam haec ultima e V. spicata vel e quadam eiusdem varietate ortum duxerit. Nota, a petalis crenulatis et integerrimis petita, fallacissima est. G.

13. **V. longifolia** (L. sp. 13.) *foliis* oppositis ternis quaternisve ex ovata vel cordata basi lanceolatis acuminatis *ad apicem usque argute duplicato-serratis*, *racemis terminalibus* elongatis spiciformibus *densissimis,* bracteis lineari-subulatis calycem subaequantibus, capsula subrotunda turgida emarginata. 4. In pratis humidis, ad fossas, ripas. Jul. Aug. D. fl. 1. 505. Schrad. comment. t. 2. f. 1. Mire variat haec species innumeris foliorum formis. Folia in variis speciminibus ex ovata profunde cordata figura per formas intermedias sensim abeunt in lineari-lanceolatam basi attenuatam; occurrit praetera foliis brevioribus et elongatis, atque, basi praecipue, inciso-serratis. Varietates sequentes ut species peculiares proponuntur:

α. vulgaris, folia basi profunde cordata: V. longifolia Schrad. comment. p. 26. t. 2. f. 1.

β. maritima, folia basi rotundata vel subcuneata: V. maritima Schrad. l. c. p. 29. t. 1. f. 1., si folia simul angusta sunt.

γ. media, folia basi cuneata: V. media Schrad. l. c. p. 23. t. 1. f. 2.

δ. glabra, folia tota glabra: V. glabra Schrad. l. c. p. 25. t. 1. f. 4., si folia simul subsimpliciter serrata sunt. — V. elata, V. elatior et V. Hostii Host. fl. austr., V. complicata Hoffm., V. grossa, V. acuta, V. ambigua Mart., V. persicifolia Schott. sunt modificationes ulteriores.

14. **V. spicata** (L. sp. 14.) *foliis* oppositis ovatis lanceolatisve *crenato-serratis apice integerrimis, inferioribus obtusis, racemo terminali* subsolitario elongato spiciformi densissimo, bracteis lanceolato-subulatis pedicellum superantibus, capsula subrotunda emarginata turgida, pilis calycis crebre articulatis. ♃. In apricis siccis planitierum et montium, (dch. d. g. Geb., doch nicht überall.) Jul. Aug. D. fl. 1. 307. Vaill. par. t. 33. f. 4. Flor. caerulei, raro carnei vel albi. Variat: 1. pubescentia brevissima glandulosa, 2. brevissima crispula, 3. longiore subsetulosa, pilis rectis, 4. calycibus glabris, glabris et ciliatis pilosisve, atque 5. caule foliisque glabris: Porro:

α. vulgaris, crispulo- vel glanduloso-pubescens, fol. infer. oblonga basi cuneata: V. spicata Auct.; V. Clusii Schott. R. et S. 1. 94., si pili glandulosi sunt; eadem calyce glabro ciliato: V. squamosa Presl. cech. p. 2. Haec varietas, solo sylvestri pinguissimo vel cultura multum aucta, refert: V. argutam Morett. V. spicatam var. *γ.* Bertol. fl. ital. 1. 63.

β. latifolia, crispulo- vel glanduloso-pubescens, foliis inferioribus ovatis vel etiam subcordatis argutius serratis: V. hybrida L. sp. 14. V. australis Schrad. comm. p. 24. t. 2. f. 3. V. paludosa Lej. fl. spa. 1. p. 22. Reichenb. fl. g. exsicc. n. 621. (si flores purpurei sunt.) (Diese am Unterharze u. im Gebiete der Flora v. Spaa.)

γ. lancifolia, crispulo-pubescens, foliis lanceolatis argutius serratis: V. alternifolia Lej. fl. de spa. 2. 386. V. media Lej. rev. p. 4.

δ. nitens, tota glabra, fol. calycibusque ciliatis: V. nitens Host. fl. a. 1. 7. V. Sternbergiana Bernhard. herbar. Willd. n. 161. Haec in Carniolia et Tyroli australi.

ε. setulosa, setuloso-pubescens, pilis rectis eglandulosis, calycibus glabris ciliatis: V. Barrelieri Schott. R. et S. 1. 94. Plerumque elatior est, quam antecedens, et folia elliptico-oblonga habet; sed foliis ellipticis quoque lanceolatisque occurrit.

ζ. cristata, pubescens vel inferne glabriuscula, laciniis corollae angustioribus attenuatis saepe contortis: V. cristata Bernhardi. V. orchidea Crantz. austr. 4. 333. V. hybrida MB. t. c. 1. 8.; conf. flor. altaic. 1. 31. V. crassifolia Kit. R. et S. 1. 96., sec. Cl. Sadler. (Diese in Unteröstreich u. auf der Gans bei Kreuznach, Rheinpreuss., Wirtgen!)

Ab omnibus hisce varietatibus differunt Veronica incana L., V. neglecta Vahl., (V. canescens Schrad.) et V. pallens Host. fl. a., quas pro varietatibus unius speciei habeo, pilis calycis lanuginosis, flexuosis, tenuioribus, sub microscopio remotissime vel non articulatis; in varietatibus V. spicatae crebre articulati et crassiores sunt.

Sect. III. **Veronicastrum.** Racemi in caule ramisque terminales. Cor. tubus brevissimus. Folia caulina in plerisque sensim in bracteas transeunt.

* Semina plana, peltiformia.

15. **V. bellidioides** (L. sp. 15.) *foliis* obovatis obtusis subcrenatis, *inferioribus maioribus congestis* subrosulatis, caulinis oppositis remotis, racemo terminali brevi paucifloro pilis articulatis villoso, capsula obovata leviter emarginata. ♃. In graminosis alpium et reg. subalpinarum, (dch. d. ganze Alpenkette u. in d. Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 314. St. h. 58. Cor. luride caerulea.

16. **V. fruticulosa** (L. sp. 15.) foliis oblongis obtusis subcrenatis, infimis minoribus, *racemo terminali pauciflоro glanduloso-pubescente,* capsula ovali leviter emarginata. ♃. In locis rupestribus et graminosis reg. subalpinarum, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 311. St. h. 56. V. frutescens Scop. carn. 1. 19. Cor. carnea, venis roseis. Paria foliorum caulinorum

approximata. Ovarium sub anthesi subrotundum, obtusissimum, glandulosopilosum.

17. **V. saxatilis** (Jacq. obs. 1. 200. L. fil. suppl. 83.) foliis oblongis ellipticisve subcrenatis, infimis minoribus, *racemo terminali pauciflore pilis* crispulis *eglandulosis* pubescente, *capsula* ovata *superne attenuata* vix emarginata. 4. In locis graminosis et rupestribus alpium et reg. subalp., (durch d. g. Alpenk. u. a. d. Voges.) Jul. Aug. D. fl. 1. 312. St. h. 56. Cor. speciosa, caerulea, fauce annulo purpureo picta. Paria fol. caulinorum remota. Ovarium sub anthesi ovatum, acutum, cano-pilosum, pilis eglandulosis.

18. **V. alpina** (L. sp. 15.) foliis ellipticis crenatis integerrimisque, infimis minoribus subrotundis, *racemo terminali pauciflore hirsuto, pilis patentibus articulatis eglandulosis*, capsula oblongo-obovata emarginata. 4. In graminosis alpium et reg. subalp., (dch. d. g. Alpenk. u. in d. Sudet.) Jul. Aug. D. fl. 1. 312. St. h. 56. Flor. parvi, caerulei. Folia obtusa vel acutiuscula. Occurrit foliis integerrimis: V. integrifolia Schranck. salisb. n. 10. V. Gebhardiana Vest. R. et S. mant. 1. 104.; foliis crenatis: V. rotundifolia Schranck. salisb. n. 13.; fol. crenatis acutioribus: V. pumila All. ped. 1. 75. t. 22. f. 6., sed hae formae vix varietates dicendae sunt.

19. **V. serpyllifolia** (L. sp. 15.) foliis ovatis oblongisve subcrenatis, infimis minoribus subrotundis, floralibus superioribus lanceolatis integerrimis, *caule ramisque multifloris laxe racemosis*, pedicellis erectis calycem subaequantibus, *capsula* compressa subrotundo-obcordata *transverse latiore obtuse emarginata*, stylo porrecto. 4. In locis humidis, cultis et incultis. Apr.-autumn. D. fl. 1. 319. St. h. 58. Fl. albi, venis caeruleis. Forma maior fol. ovatis: V. neglecta Schmidt.; forma minor, fol. subrotundis: V. tenella All. ped. 1. 75. t. 22. f. 1.

20. **V. acinifolia** (L. sp. 19.) foliis ovatis subcrenatis, floralibus lanceolatis integerrimis, *caule ramisque multifloris laxe racemosis*, pedicellis patentibus calyce duplo longioribus, *capsula* compressa planiuscula *transverse latiori semibifida, lobis orbiculatis*, stylo fissuram aequante. ☉. Inter segetes, (a. d. Rheinfläche bei Basel, Strasburg, Mühlheim, Carlsruh und im Oberelsass; Creuznach an der Nahe, Giesen; Zürich; Untersteyerm.; im Thale der Rhone; in Istrien.) Apr. Mai. D. fl. 1. 328. Vaill. par. t. 33. f. 3. opt. St. h. 58. pessima. Flores caerulei.

21. **V. arvensis** (L. sp. 18.) *foliis cordato-ovatis crenatis*, floralibus superioribus lanceolatis integerrimis, *caule ramisque multifloris laxe racemoso-spicatis, pedicellis erectis calyce brevioribus, capsula* compressa *obcordato-biloba*, stylo fissuram paulo superante. ☉. In cultis et campis sterilibus. Mart. et per tot. aest. D. fl. 1. 330. St. h. 58. Flores caerulei. Specim. maxima: V. polyanthos Thuill.; spec. parvula simplicia: V. nana Lam. V. Bellardi All. ped. t. 85. f. 1., sec. specim. a Balbisio ad Bertolon. missa; conf. fl. it. 1. 93. V. romana Schmidt. boh.

22. **V. peregrina** (L. sp. p. 20.) foliis inferioribus obovato-oblongis obsolete parce crenatis, floralibus lineari-oblongis integerrimis *omnibus in petiolum cuneato-attenuatis, caule ramisque multifloris racemoso-spicatis, pedicellis erectis calyce brevioribus, capsula* compressa *obcordata*, stylo brevissimo fissuram aequante. ☉. In locis cultis prope Hamburg, (in der Nähe des Elbufers am Wege nach Flottbeck nicht selten, Sonder; bei der hohen Luft, Sickmann.) April. Mai. V. romana L. mant. alt. p. 317. Flores albi vel caerulescentes, capsula glaberrima. G.

23. **V. verna** (L. sp. 19.) *foliis pinnatipartitis*, imis ovatis integris, floralibus lanceolatis, *caule ramisque* multifloris *racemoso-spicatis, pedicellis erectis calyce brevioribus*, capsula compressa obcordata, stylo fissuram aequante. ☉. In apricis sterilibus, campis et sylvis arenosis. Apr. Mai. D. fl. 1. 336. St. h. 13. V. Dillenii Crantz. a. 352. V. pinnatifida Lam. n. 194. V. succulenta All. ped. 1. 78. t. 22. f. 4. (ic. mala) Schm. boh. c. 1. n. 43. Fl. caerulescentes, venis saturatioribus. Specim. minuta, fol.

integris: V. Bellardi Wulf. Röm. arch. 3. 312. et V. Bellardi All. sec. herbar. Balbisii; conf. fl. it. 1. 96. V. polygonoides Lam. illustr. 195.

** Semina concava pelviformia.

24. **V. triphyllos** (L. sp. 19.) *foliis digitato-partitis*, imis ovatis integris, floralibus lanceolatis, *caule ramisque* multifloris *laxe racemosis*, *pedicellis calyce longioribus patentibus* adscendentibus, capsula subrotundo-obcordata turgida. ⊙. In agris et cultis. Mart.-Mai. D. fl. 1. 335. St. h. 8. Flor. saturate caerulei. Specim. parvula: V. romana All. ped. 1. 79. t. 83. f. 2., nec Linn. et quidem sec. Bertolon.

25. **V. praecox** (Allionii auct. 5. t. 1. f. 1.) foliis inferioribus cordato-ovatis crenatis obtusis, floralibus lanceolatis, *caule ramisque multifloris laxe racemosis*, pedicellis calycem subaequantibus longioribusque adscendentibus, *capsula* ovali-obcordata *turgida*. ⊙. In agris et cultis, (zerstreut durch d. Geb.) Mart.-Mai. D. fl. 1. 329. St. h. 58. V. romana Scop. carn. 1. p. 18. V. ocymifolia Thuill. par. 1. 10., pedicellis longitudine fol. floralium. Fl. caerulei, venis saturatioribus.

Sect. IV. Alsinoides. Bractearum loco folia floralia inferioribus conformia. Pedunculi axillares, solitarii, fructiferi reflexi.

26. **V. agrestis** (L. sp. 18.) *pedunc. axillaribus solitariis* folium subaequantibus, fructiferis reflexis, foliis ovatis subcordatis serrato-crenatis, *capsula* sparse *glanduloso-pilosa* subrotunda acute emarginata, lobis turgidis ad suturam subcompressis, *staminibus margini inferiori tubi insertis*. ⊙. In agris et cultis. Mart.-autumn. D. fl. 1. 331. St. h. 58. Reichenb. ic. 3. f. 440. V. pulchella Bast. fl. maine et loire 414. V. pulchella Guss. sic. 1. 12. V. didyma Ten. fl. neap. prodr. p. 6. sec. specimina authentica. Cor. lactea, subtiliter caeruleo-striata, lobo superiore dilute caeruleo vel carneo. Folia luteo- vel olivaceo-viridia, magis oblongo-ovata quam subsequentium. Capsula loculis 4-5 spermis.

27. **V. polita** (Fries. novit. ed. 2. p. 1.) *pedunc. axillaribus solitariis* folium subaequantibus, fructiferis reflexis, foliis subrotundo-ovatis subcordatis profunde serrato-crenatis, *capsula pilis patentibus dense pubescente* acute emarginata, *lobis globoso-convexis, staminibus margini inferiori tubi insertis*. ⊙. In agris et cultis. Mart. in autumn. D. fl. 1. 331. annot. 1. St. h. 58. V. polita Reichenb. ic. 3. f. 304. 305. V. didyma K. syn. ed. 1. p. 531., sic denominata secund. specimina italica V. politae. Cor. lacte caerulea. Fol. intense viridia, subrotunda, cordata. Calycis laciniae ovatae, etiam sub anthesi basi se invicem tegentes. Caps. loculis sub 10 spermis.

28. **V. opaca** (Fries. nov. ed. 2. p. 3.) *pedunculis axillaribus solitariis* folium subaequantibus, fructiferis reflexis, foliis subrotundo-ovatis subcordatis serrato-crenatis, *capsula crispulo-pubescente* transverse latiore acute emarginata, *lobis* turgidis ad marginem *compresso-carinatis, staminibus fauci insertis*. ⊙. In agris et cultis hinc inde. Mart.-Mai. St. h. 58. Reichenb. ic. 3. f. 441. Cor. caerulea. Capsula latitudine sua dimidio brevior, fere obreniformis, pilis eglandulosis crispulis tecta, turgida quidem, sed ad marginem evidenter compressa; his notis et insertione staminum differt ab antecedentibus duabus. Loculi 3-5 spermi.

29. **V. Buxbaumii** (Tenor. fl. neap. 1. p. 7.) *pedunculis axillaribus solitariis*, fructiferis reflexis, superioribus folia superantibus, foliis ovatis subcordatis profunde crenato-serratis, *capsula* transverse latiori *venis elevatis reticulata* obtuse emarginata, *lobis* ad suturam compressis *divaricatis*. ⊙. In cultis et agris, (dch. d. g. G. stw.) April. Mai. St. h. 56. Reichenb. ic. 3. f. 430. 431. V. hospita D. fl. 1. 332. V. persica Poir. enc. 8. 542. V. Tournefortii Gmel. bad. 1. 39. V. cymbalariaefolia Schmidt. sec. R. et S. V. filiformis DeC. fl. fr. 5. 388. Flores caerulei. Variat caule tenuissimo, filiformi, foliis et calycibus dimidio minoribus, illis haud profunde crenatis: V. hospita β. D. fl. 1. 332., exclus. synonym. Huic varietati simillima est V. filiformis Sm. act. soc. linn. 1. 195., differt vero: crenis fol. obtusioribus,

capsula aeque longa ac lata, acute emarginata, lobis obtusioribus, stylo capsula fere duplo longiore, qui in V. Buxbaumii longitudinem dissepimenti capsulae aequat, pedunculisque longioribus.

30. **V. hederifolia** (L. sp. 19.) *pedunc. axillaribus solitariis* folium subaequantibus, fructiferis reflexis, foliis cordato-rotundatis crenato-subquinquelobis, *capsula globoso-quadriloba, calycis laciniis cordatis,* fructiferi erectis. ☉. In agris et cultis inque campis sterilibus. Mart.-Mai. D. fl. 1. 334. St. h. 56. V. hederif. Schrank. baier. fl. 1. 217., modificatio fol. lobis rotundatis; V. Lappago Schrank. l. c. 218. fol. lobis acutiusculis. Flores dilute caerulei.

31. **V. Cymbalaria** (Bodard. diss. 1798.) *pedunculis axillaribus solitariis,* fructiferis reflexis, superioribus folio longioribus, foliis subcordato-semiorbiculatis lobato-crenatis, *capsula globoso-quadriloba, calycis laciniis ellipticis* fructiferi patentissimis. ☉. Ad muros campestres vetustos et in cultis, (Triest.) Mart. Apr. D. fl. 1. 334. V. cymbalariaefolia Vahl. en. 1. 81. V. hederaefolia β. L. sp. 19. V. panormitana. Guss. suppl. 1. 4., specim. macra sec. Bertolon. Flores dilute caerulei. G.

8. PAEDERÓTA (L. gen. n. 26.) Cal. 5 partitus. Cor. limbus quadrifidus, lacinia superiore latiore, integra vel bifida. Stamina 2, in imo tubo, annulo pilorum ibidem clauso inserta. Antherae rimis 2 longitudinalibus dehiscentes. Stigma integrum. Caps. bilocularis, rostrato-acuminata.

1. **P. Bonarota** (L. sp. 20.) fol. serratis, superioribus ovatis acutis, corollae labio superiore integro, *staminibus corolla longioribus.* ☉. In rupium fissuris alpium, (Sulzbacher Alpen in Untersteyerm.; südl. Kärnth., südl. Tyrol, Schlehern, Kirschbaumeralpe.) Jun. Jul. D. fl. 1. 339. St. h. 24. Brignol. fasc. pl. foroj. p. 6. P. caerulea L. fil. suppl. 84. P. chamaedryfolia Suffr. forojul. p. 108. Wulfenia Bonarota Sm. trans. 6. 69. W. chamaedryfolia Host. a. 1. 19. St. h. 24. Flores caerulei, rarius rosei. Variat minor, racemo compacto: P. Bonarota β. Bertol. fl. ital. 1. p. 108. P. chamaedryfolia Brignol. fasc. pl. foroj. p. 7. R. et Sch. s. veg. 1. 178. P. Bonarota Suffr. forojul. 108. Michelii gen. t. 15. f. 2. G.

2. **P. Ageria** (L. mant. 171.) foliis serratis, superioribus ovato-lanceolatis longe acuminatis, corollae labio superiori bifido, *staminibus corolla brevioribus.* ♃. In rupium fissuris montium et alpium, (Sulzbacher Alpen in Untersteyerm.; in Krain auf d. Steiner- u. Wocheiner Alpen und auch tiefer bei Canziano unweit Triest.) Jun. Jul. D. fl. 1. 338. St. h. 24. P. lutea L. fil. suppl. 84. P. urticifolia Brign. fasc. 8. P. Bonarota Jacq. hort. vind. 2. t. 121. Bonarota chamaedryfolia Scop. carn. 1. 22. Wulfenia Ageria Sm. trans. 6. W. lutea Host. fl. a. 1. 19. Variat minor, foliis brevioribus, minus acuminatis, racemo compacto. P. Ageria β. Bertol. fl. ital. 1. p. 110. — Cl. Brignolius, (regensb. bot. Ztg. 23. 1. p. 98.) contendit, Paederotam chamaedryfoliam et P. Zanichellii bonas esse species; dijudicent, qui eas in locis natalibus observare possint. P. Zanichelli Brign. fasc. p. 9. G.

9. WULFÉNIA (Jacq. collect. 2. p. 66.) Cal. 5 partitus. Cor. labium superius bifidum, inferius trifidum. Stam. 2, in apice faucis ad basin sinuum, labia seiungentium, inserta; antherae reniformes, in patellulam bilobam dehiscentes. Stigma capitatum, umbilicatum.

1. **W. carinthiaca** (Jacq. l. c.) ♃. In solo pingui alpium calcarearum, (bisher bloss auf der im Gailthale bei der Kapelle Hermagor in Oberkärnthen gelegenen Küweger Alpe.) Jul. Jacq. ic. rar. t. 2. St. h. 59. D. fl. 1. 339. Flores caerulei. G.

10. LINDÉRNIA (L. gen. n. 1315.) Cal. 5 partitus. Cor. labium superius emarginatum, inferius trifidum, lacinia media maiore. Stam. 4, didynama, fauci inserta; antherarum sacculi non coaliti. Stigma capitatum. Placenta centralis, cylindrica, libera.

1. **L. pyxidaria** (Allion. misc. taurin. 3. 178.) foliis oblongo-ovatis inte-

gerrimis trinerviis sessilibus, pedunculis unifloris, caulibus procumbentibus. ☉. In locis humidis hyeme inundatis, ad ripas lacuum et fluviorum, (bei Genf, im Oberelsass u. gegenüber im Badischen; bei Regensburg; Wittenberg; in Schles.; Böhm.; bei Klagenfurth; Steyerm.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 424. St. h. 30. Capraria gratioloides L. sp. 876. Anagalloides procumbens Krock. fl. sil. 2. 398. Cor. albida, limbo dilute carneo.

11. LIMOSÉLLA (L. gen. n. 776.) Cal. 5 dentatus. Corollae limbus quinquefidus, aequalis. Stam. 4, didynama, fauci inserta. Antherae sacculis in unum coalitis, transverse dehiscentes. Stigma capitatum. Placenta centralis, cylindrica, libera et basi tantum dissepimento brevissimo adnata.

1. **L. aquatica** (L. sp. 881.) ☉. Ad margines piscinarum et paludum, inque locis humidis hyeme inundatis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 425. St. h. 30. Cor. tubus viridis, limbus carneus. Caulis praeter stolones nullus. Variat autem:

β. caulescens, caule 1-2 pollicari. D. fl. l. c.

Ord. LXXXIV. OROBANCHEAE. Juss. annal. mus. 12. p. 445.

Ovarium 1 loculare, placentis parietalibus. Caetera ut Antirrhinearum. — Folia ad squamas reducta, nunquam viridia.

1. OROBÁNCHE (Linn. gen. 779.) Cal. quadrifidus vel disepalus, sepalis saepius bifidis. Cor. ringens, inferne glanduloso-carnosa, denique, basi circumscissa remanente, secedens. Caps. 1-locularis, placentis parietalibus oppositis.

Sect. I. Osproleon Wallr. diasc. p. 21. Cal. disepalus, sepalis quandoque antice coalitis, bractea unica fultus. Foliolum calycis *plurinervium* voco, quod, si luci admoveas, praeter nervum solitarium geminumve nonnullos alios teneriores ostendit.

1. **O. cruenta** (Bert. rar. it. pl. dec. 3. p. 56.) *sepalis plurinervis* subaequaliter bifidis tubum corollae superantibus, *corolla campanulata antice basi strumoso-ventricosa* dorso arcuata, *labiis* inaequaliter denticulatis *glanduloso-fimbriatis*, superiori galeato integro vel subemarginato, lobis patentibus, laciniis labii inferioris subaequalibus, *staminibus in basi corollae insertis dense pilosis* superne styloque glanduloso-pubescentibus, disco stigmatis holosericeo elevato-marginato. ♃. In locis graminosis, pratis ad radices Loti corniculati et Hippocrepidis comosae, (von Regensburg durch Bayern bis in die Voralpen von Bayern u. Salzburg, Steyerm., südl. Tyrol, in der Schweiz gemein.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 430. Reichenb. ic. 7. f. 896. O. gracilis Sm. linn. trans. 4. 172. Reichenb. ic. 7. f. 898. 899. O. vulgaris Gaud. helv. 4. 176. O. carpophyllacea Schultz. Beitr. 8. Cor. campanulata, ampla, basi antice strumoso-gibba, intus sanguinea, staminibus in ima basi corollae insertis, *stigmate luteo, margine fusco-purpureo cincto,* et tota corolla pilis copiosis brevibus glanduliferis tecta, atque odore suaveolente dignoscitur.

2. **O. Rapum** (Thuill. par. ed. 2. 317.) *sepalis plurinerviis* subaequaliter bifidis integrisve tubum corollae subaequantibus, *cor. campanulata antice basi strumoso-ventricosa* dorso arcuata, *labiis* undulatis *obsolete denticulatis, (haud fimbriatis,)* superiori galeato emarginato, lobis patentibus, lacinia intermedia labii inferioris lateralibus duplo maiori, *staminibus in basi corollae insertis inferne glaberrimis* apice styloque glanduloso pubescentibus, disco stigmatis holosericeo immarginato. ♃. In locis sterilibus ad radices Sarothamni scoparii, (auf dem Kniebis; auf dem Siebengeb., Unterrhein, Westphalen, Wien; als Bürger der Schweiz zweifelhaft, Gaud. 4. 175.) Mai. Jun. D. fl. 4. p. 435. O. maior DeC. fl. fr. 3. 488. Reichenb. ic. 7. f. 900. (O. maior.) f. 923. (O. Rapum.) Corolla ampla, campanulata O. cruentae, dilute rubello-fuscescente vel carnea, sicca luteo-fusca, antheris defloratis albis, staminibus inferne glaberrimis et labiis non fimbriatis dignoscitur. Haec secund. Babingt. manual. p. 213., est Orobanche major Smith. et

Linn., quam cl. Friesius, nov. fl. suec. mant. 3. p. 57., in Orobanche elatiori Sutt. recognoscit; equidem specimina et anglica et suecica specierum memoratarum nondum vidi. G.

3. **O. procera** (Koch. in D. fl. 4. p. 438.) *sepalis plurinerviis lato-ovatis* subaequaliter bifidis integrisque tubo corollae brevioribus, *corolla campanulata antice basi strumoso-ventricosa* dorso curvata, *labiis* inaequaliter *denticulatis* margine subglandulosis, superiore emarginato lobis porrectis, lacinia intermedia labii inferioris paulo maiore, *staminibus in basi corollae insertis glabris ima basi parce pilosis* apice styloque subglandulosis. 4. In agris, parasitica in radice Cirsii arvensis, (bisher bloss um Mannheim in d. Rheinpfalz.) Jun. G.

4. **O. pruinosa** (Lapeyrous. suppl. p. 87.) *sepalis quinquenerviis* bifidis, laciniis subaequalibus angustis subulatis tubum corollae aequantibus, *corolla campanulata dorso subcurvata, labiis expansis undulato-plicatis crispis obtuse denticulatis non ciliatis colorato-venosis*, superiore bilobo, laciniis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo maiori, staminibus supra basin corollae insertis *inferne villosis* apice styloque subglandulosis. ⊙. In radice Viciae Fabae parasitica, (bei Fiume, Noé; Gypsgruben bei Dirschel in Schlesien, Wimm. Fl. v. Schles. p. 443.) Jun.? D. fl. 4. 439. Reichenb. ic. f. 911. Cor. magna praecedentium, sed tenuis substantiae, exsiccata papyracea, labiis magnis plicato-crispis instructa venisque caeruleis pulchre picta. Secundum Vauch. stigma violaceum.

5. **O. Scabiosae** (Koch. in Deutschl. Fl. 4. p. 440.) *sepalis plurinerviis ovatis* in apicem subulatum attenuatis corollae tubum subaequantibus rarius superantibus, vel bifidis, laciniis parallelis, *corolla campanulata* dorso arcuata *extus labioque superiore intus piloso-scabris, pilis* sparsis brevibus glandulifĕris *tuberculo violaceo nigrove insidentibus*, labiis inaequalibus acute dentatis margine crispis, superiore paulo sursum curvato bilobo, lobis patentibus, laciniis labii inferioris aequalibus, *staminibus prope basin* corollae *insertis* inferne *sparsim pilosis* apice styloque subglabris. 4. In pascuis alpium, in radice Scabiosae columbariae et Cardui deflorati parasitica, (bei Berchtesgaden, Berger; bei Lofer, v. Spitzel; Steyerm., Angelis; Oberöstr., Sauter.) Jun. D. fl. 4. p. 440. Corolla dilute ochracea, margine rubiginosa, dorso violacea. Stigma saturate purpureum vel nigrum. Similis O. Epithymo, differt autem caule crassiore, altiore, tuberculis nigris piligeris corollae, lobis labii inf. aequalibus et filamentis apice glabris conniventibus, nec arcuato-descendentibus. G.

6. **O. pallidiflora** (Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 233.) *sepalis plurinerviis lato-ovatis* subito in acumen subulatum contractis tubum corollae aequantibus, *corolla campanulata in medio dorsi rectiuscula* superne antrorsum curvata *extus labioque superiore intus glanduloso-pilosis, pilis tuberculo ochraceo insidentibus,* labiis inaequalibus acute denticulatis margine crispatis, superiore apice paulo sursum curvato bilobo, lobis patentibus, *laciniis* labii inferioris *subaequalibus, staminibus prope basin corollae insertis* inferne *sparsim pilosis* superne glabris, stylo superne glanduloso-piloso. 4. In radice Cirsii arvensis parasitica, (in Schlesien u. bei Frankfurt a. d. O.) Jun. D. fl. 4. p. 441. O. speciosa Dietrich. preuss. flor. p. 149.; an etiam DeCandollii? Corolla ochroleuca nervis rubellis. Stigma castaneo-rubrum. Simillima antecedenti, differt praecipue sepalis et colore florum, tuberculisque piligeris minoribus et ochraceis. G.

7. **O. Epithymum** (DC. fl. fr. 3. p. 490.) *sepalis plurinerviis lanceolatis* subulato-acuminatis tubo corollae longioribus indivisis vel dente divaricato bifidis, *corolla campanulata dorso leviter arcuata extus labioque superiore intus glanduloso-pilosis*, pilis tuberculo minutissimo insidentibus, labiis inaequalibus acute dentatis margine crispatis, superiore apice paulo sursum curvato bilobo, lobis patentibus, *lacinia intermedia* labii inferioris lateralibus *duplo longiore, staminibus prope basin corollae insertis* inferne *sparsim pilosis* apice styloque glanduloso-pilosis, disco stigmatis velutino margine elevato

destituto. 4. In ericetis et campis incultis in radice Thymi Serpylli parasitica, (im südl. Geb.: Schweiz, Rheinfläche, Würtemberg, Bayern.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 443. Reichenb. ic. 7. f. 887-889. O. rubra Smith. engl. flor. 3. p. 148. Engl. bot. t. 1786., figura pessima. Reichenb. ic. 7. f. 885. O. sparsiflora Wallr. sched. p. 309. Humilior antecedentibus, plerumque 5-6 pollicaris, viva sordide lutescens, saepe colore purpureo suffusa, tota pilis ferrugineis viscidis tecta, suaveolens. Stigma obscure purpureum; qua nota viva planta ab O. Rapo et O. cruenta facile dignoscitur; exsiccata ab illa differt praeter alias notas antheris fuscis, nec albis, ab hac filamentis basi parce pilosis.

8. **O. Galii** (Duby. bot. gall. 1. 349.) *sepalis plurinerviis* subaequaliter bifidis tubum corollae dimidium aequantibus antice contiguis connatisve, *corolla e basi sensim ampliata campanulata dorso curvata, labiis* inaequaliter denticulatis, superiori galeato lateribus *porrectis* (non patentibus), labii inferioris laciniis ovatis subaequalibus porrectis tubo dimidio brevioribus, *staminibus* supra basin corollae insertis *dense pilosis* superne styloque glanduloso-pilosis, disco stigmatis velutino margine elevato destituto. 4. In collibus incultis, campis, sylvarum oris, in Galii veri et G. Molluginis aliarumque plantarum radice parasitica, (am weitesten d. d. Geb. verbreitet.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 447. O. caryophyllacea Sm. in act. soc. linn. 4. p. 169. O. vulgaris DC. fl. fr. 3. 489. O. bipontina Schultz. Beitr. p. 7. O. caryophyllacea Reichenb. ic. 7. f. 890. 891. O. Galii f. 892-895. O. strobiligena f. 905. 906. O. laxiflora Reichenb. fl. exc. p. 355. O. vulgaris ic. f. 808-810. O. maior Pollich. pal. 2. p. 200. Corolla alba colore dilute rubello vel violaceo leviter suffusa. Stigma obscure purpureum. Staminibus dense pilosis a praecedentibus praeter alias notas differt, excepta O. cruenta, quae autem corollam ampliorem antice basi gibbam aliterque coloratam, lobos labii superioris patentes et stigma luteum habet.

9. **O. rubens** (Wallroth. diasc. orob. gen. 46.) *sepalis plurinerviis* latoovatis subulato-acuminatis postice anticeque dente instructis vel inaequaliter bifidis tubum corollae dimidium subaequantibus antice contiguis vel coalitis, *corolla e basi curvata tubuloso-campanulata dorso recta apice galeata declivi*, labiis inaequaliter denticulatis, superiore bilobo, *lobis patentibus*, labii inferioris ovatis subaequalibus, lateralibus patentibus, *staminibus* in curvatura corollae insertis a basi ad medium *dense pilosis*, stigmatis disco velutino margine elevato destituto. 4. In agris et pascuis, in radice Medicaginis falcatae et sativae parasitica. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 449. O. elatior Koch. et Ziz. cat. pl. pal. p. 12. Reichenb. ic. 7. f. 901. 902. O. Medicaginis Schultz. in annal. d. Regensb. bot. Ges. 5. 505. O. Buekii Dietrich. preuss. flor. t. 145. Cor. lutescens vel dilute fusca et rubella, 9-10‴ longa, tubulosa, tubo supra basin conspicue curvato, dorso recto vel subimpresso, labio superiore insigniter galeato et curvato, apiceque paulo sursum curvato haec species dignoscitur. *Stigma cerino-flavum.*

10. **O. Teucrii** (F. W. Schultz.) *sepalis plurinerviis* subaequaliter bifidis, laciniis lanceolatis tubum corollae dimidium subaequantibus antice contiguis vel connatis, *corolla campanulato-tubulosa dorso recta apice galeata declivi*, labiis inaequaliter denticulatis, superiore integra margine patente, inferiore triloba deorsum versa, laciniis rotundato-obtusis, *staminibus supra basin corollae insertis, a basi ad medium pilosis*, stylo apice glanduloso-piloso, stigmate (sec. cl. Schultz.) holosericeo-verruculoso, margine elevato destituto. 4. In locis siccis apricis in radice Teucrii Chamaedryos, T. montani et Thymi Serpylli parasitica, (Salzburg, Zweibrücken, Dorlisheim im Elsass.) Jun.? Corolla (sec. Schultz.) fusco-rubra, plus minusve in violaceum vel aurantiacum vergens, basi flavida. Stylus albus, denique violaceus, stigma fuscescenti-sanguineum. G.

11. **O. stigmatotes** (Wimmer. Fl. v. Schles. p. 280.) *sepalis plurinerviis* ovatis subaequaliter bifidis, laciniis lanceolatis tubo corollae paulo brevioribus, *corolla campanulato-tubulosa dorso arcuata*, labiis eroso-denticulatis, superiore obsolete bilobo, *lobis porrectis*, inferiore subpatente triloba, lobis

oblongo-rotundatis subaequalibus, *staminibus infra medium tubi insertis a basi ad medium villosis* supra sparsim styloque apice glanduloso-pilosis. ♃. In agris et locis incultis, (bei den Gypsgruben unweit Dirschel in Oberschlesien auf Centaurea Scabiosa, Wimmer; am Schlossberge bei Grätz, auf mehreren Pflanzen, auch auf Anthericum ramosum, Maly.) Jul. Aug., postquam O. rubens et O. Galii jamdudum defloruerunt, Maly. Corolla basi flavida, antice flavo-fusca; paulum in rubicundum vergens, stigma violaceum. G.

12. **O. loricata** (Reichenb. fl. exc. p. 355., excl. synonymo O. flavae et locis natal. germanicis.) *sepalis* 3-5 *nerviis bipartitis* tubum corollae aequantibus, *corolla tubuloso-campanulata dorso recta* apice antrorsum curvata, labiis obtuse denticulatis, superiore bilobo, lobis patentibus, *staminibus sub medio tubi insertis* glabris basi *parce pilosis*, stigmatibus disco . . . ♃. In montanis incultis, in radice Artemisiae campestris parasitica, (auf d. Westerbergen bei Aschersleben u. bei Frankenhausen in Thüringen; selten auch im Wallis.) Jun. D. fl. 4. p. 451. O. Artemisiae campestris Gaud. helv. 4. p. 479. O. elatior Schleich. exs. secund. specimina a me examinata. Sepalis angustis, 3-5 nerviis, profunde divisis, corollae tubum aequantibus longioribusque, corolla 7-8 lineas longa, a basi ad labium inferius usque recta, in dorso labii superioris tantum paulo curvata, labio bilobo patente, staminibus parce pilosis, alte supra finem tertiae partis tubi insertis, haec dignoscitur. Stigma secund. Vauch. dilute purpureum.

13. **O. Picridis** (F. W. Schultz. ap. Koch. D. fl. 4. p. 453.) sepalis unibinerviis integris vel antice dente auctis tubum corollae superantibus, corolla tubuloso-campanulata dorso recta apice antrorsum curvata, *labiis* obtuse denticulatis, *superiori integro* margine laterali patulo, *staminibus* fere in medio tubi insertis a basi ultra medium *dense pilosis* superne verruculoso-scabriusculis, stigmatis disco *sublaevi, granulis minutissimis obtusissimis dense obtecto*. ☉. In locis montanis, in radice Picridis hieracioidis parasitica, (Zweibrücken in der Rheinpfalz, Rohitsch in Steyerm., Karschtgeb.) Jun. *Stigma violaceum in amaranthinum et lilacinum varians.* Simillima O. loricatae, sed caulis superne et bracteae multo magis villosae, sepala 1 nervia rarius dente aucta, et tunc trinervia, corolla superne paulo magis antrorsum curvata, labium superius integrum, stamina a basi supra medium dense pilosa et superne verruculis obsita. Ab O. flava differt: pilosior est, sepala corollae tubum superant, corolla dorso multo minus curvata est et labium superius integrum, lateribus vix patulis, nullo modo refractis, filamenta longiora, apice multo minus curvata sunt, stigma ultra curvaturam filamentorum eminet, sordide violaceum nec cerino-flavum, latius, et in disco subtiliter granulatum, non cicatricosum est. Ab O. lucorum differt: corolla recta, antice tantum paulo curvata, labiis obtuse crenulatis, labio superiore integro, insertione staminum altiore et stigmate subtiliter granulato. G.

14. **O. flava** (Martius in Schultz. Beitr. p. 9.) sepalis uninerviis vel obsolete trinerviis integris vel antice dente auctis tubum dimidium aequantibus, corolla tubuloso-campanulata dorso curvata, labiis denticulatis, superiori bilobo, *lobis reflexis retrorsum accumbentibus*, *staminibus* fere in medio tubi insertis a basi ultra medium *dense pilosis*, stylo glabro, *stigmatis disco verrucoso-cicatricoso*. ♃. In pascuis subhumidis, in radice Tussilaginis niveae aliarumque plantarum, (auf den Isarauen bei München, Martius; Oberöstreich, Sauter; auf dem Blabusch bei Grätz u. daselbst auf Peucedanum Cervaria u. vielen andern Pflanzen, Maly.) Jul. Species lobis labii superioris refractis et postice sibi contiguis, ut Antirrhinorum, valde insignis. Tota cerino-vel dilute flava; corolla 7‴ longa, stamina longiora apice manubrii instar fortiter arcuata et descendentia, *stigma cerino-flavum* verrucoso-cicatricosum. G.

15. **O. lucorum** (Alex. Braun. ap. Schultz. in Annal. d. Gewk. d. Regensb. bot. Ges. 5. p. 504.) *sepalis binerviis* inaequaliter bifidis tubum corollae aequantibus, corolla tubuloso-campanulata dorso curvata, labiis subtiliter glanduloso-ciliatis obsolete denticulatis superiore bilobo, *lobis patentibus,*

staminibus supra basin corollae insertis a basi supra medium *dense pilosis*, stylo glabro, stigmatis disco laevi velutino. 4. In radice Berberidis vulgaris et Ruborum parasitica, (im Englischen Garten zu München u. in den bayer. Alpen bei Partenkirchen; südl. Tyrol.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 457. O. loricata Reichenb. ic. f. 918., staminum insertio in icone nimium alta. Stigma dilute luteum saturatiusque ad fusco-rubrum usque. Colore flavo-rubente, corolla ampliore, rictu multo maiore, lobis patentibus non refractis, filamentis longioribus apice multo minus curvatis, stylo ultra staminum curvaturam emerso et *stigmate* maiore *fusco-rubro* profundius bilobo, velutino neque verrucoso-cicatricoso ab O. flava insigniter differt. Variat:

β. Rubi, floribus paulo maioribus et amplioribus, in radice Rubi caesii habitans. Br. ap. Koch. d. fl. 4. p. 458., non Vauch. G.

16. **O. Salviae** (F. W. Schultz. in Ann. d. Gewk. d. Reg. Ges. 5. p. 505.) *sepalis uninerviis* inaequaliter bifidis tubum corollae superantibus, corolla tubuloso-campanulata dorso curvata, labiis denticulatis subciliatis, superiori bilobo, *lobis porrectis*, *staminibus* supra basin corollae insertis a basi ultra medium *dense pilosis* superne pilis glanduliferis parce adspersis, stigmatis disco velutino. 4. In subalpinis, in radice Salviae glutinosae parasitica, (in den Salzb. Alp., der Ramsau bei Berchtesgaden, u. in den bayer. Alp. zwischen Lengries u. d. Glashütte; Steyerm., Wien; Schwz.) Jun. Jul. *Stigma intense cerino-luteum*. Simillima O. lucorum, a qua differt sepalis semper uninerviis, labiis copiose denticulatis, lobis labii superioris semper porrectis, nunquam patentibus *stigmateque cerino flavo*. Ab O. flava, quacum colore convenit, sepalis longioribus, lobis labii superioris porrectis, filamentis non in manubrii formam curvatis et disco stigmatis velutino; ab O. Picridis labio superiore bilobo, stigmate cerino et velutino; ab O. loricata sepalis uninerviis, corolla dorso curvata, filamentis dense pilosis et stigmate cerino; ab O. minore sepalis uninerviis, filamentis dense pilosis et stigmate cerino differt.

17. **O. minor** (Sutton. act. soc. linn. 4. p. 178.) *sepalis plurinerviis* e basi ovata subito anguste subulatis tubum corollae aequantibus longioribusque bifidisve, laciniis subulatis, *corolla tubulosa arcuata*, *labiis obtuse denticulatis* venosis undulatis, superiore bilobo porrecto, lobis labii inferioris subrotundis subaequalibus, *staminibus sub medio tubi insertis* glabris inferne *pilis sparsis* obsitis. ☉. In radicibus Trifolii pratensis parasitica, (Rochusberg bei Bingen; bei Bonn; im Cant. Waadt u. Wallis, bei Fiume; Wien; südl. Tyrol.) Jun. Jul. sec. Gaud. D. fl. 4. p. 459. *Stigma purpureum vel lilacinum*. Similis proxime subsequenti, differt bracteis e basi ovata lanceolatis, tubum, vel etiam corollam, aequantibus, corolla, aequelata quidem, sed brevior, tubulosa, sensim curvata, nec subito in genu flexa, labiis rotundatis, obtuse denticulatis, staminibusque minus alte insertis. — Orobanche Hederae Dub. bot. gallic. p. 350., Orobanchi minori simillima, species est mihi nondum satis clara, cum qua vero perperam conjungitur O. barbata Poiret, quae longe recedit. Specimen hujus in Africa boreali lectum in collectione mea asservo.

18. **O. amethystea** (Thullier. fl. par. 2. 1. p. 317.) *sepalis* 3—6 *nerviis* e basi ovata subito anguste subulato-attenuatis corollam aequantibus bifidisve, laciniis angustis subulatis, *corolla tubulosa basi subito in genu flexa* et antrorsum curvata deinde rectiuscula, *labiis* inaequaliter *acute denticulatis undulato-crispis* ramoso-venosis, superiore galeato porrecto emarginato vel subquadrilobo, lobis lateralibus labii inferioris subbifidis, intermedio duplo maiore bi-trilobo, *staminibus curvaturae corollae insertis* glabris inferne *sparse pilosis*. 4. In ramis radicis Eryngii campestris, sub terra horizontaliter repentibus, parasitica, (bei Bonn, Nees ab E.; Oberkassel bei Bonn, Fl. bonnens.; Rochusberg bei Bingen, Bogenhard; Bugen, Sternberg u. Liebenfels im Nassauischen, Wirtgen.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 462. O. Eryngii Dub. bot. gall. 1. p. 350. O. elatior *β.* microglossa Wallr. diasc. p. 51. Caulis violaceus vel purpureus, flores albidi, vel dorso leviter lilacini vel toti lilacini, venisque purpureis picti. *Stigma fuscum vel rubro-fuscum*. G.

19. **O. Buekiana** (Koch.) *sepalis plurinerviis* ovatis bifidis, laciniis lanceolatis tubum corollae dimidium aequantibus, *corolla campanulato-tubulosa supra basin subito antrorsum curvata dorso arcuata,* labiis inaequaliter denticulatis, *superiore rotundata integra vel leviter emarginata porrecta subgaleata* margine paulum recurvata, *inferiore deflexa lobis subrotundis integris intermedio paulo majore,* staminibus infra medium tubi insertis, basi parce pilis adspersis, stylo glabro apice subglanduloso. 4. In locis incultis in Medicagine sativa parasitica, (in der Neumark bei Frankfurt a. d. O., auf dem Berge Lussow, Apoth. Buek.) Jun. O. elatior Dietrich. preuss. Flor. t. 148., excluso synon. O. rubentis Wallr., et O. elatioris Sutton.; haec ultima serotina est, Julio et Augusto flores suos explicat. Flores pallide flavi in rubentem vergentes. Stylus apice purpureus, stigma flavum. In Flora borussica O. rubens Wallroth., in provinciis ad Rhenum vulgatissima planta, sub nomine novo Orobanches Buekii proposita est. G.

20. **O. fragrans** (Koch. Deutschl. Fl. 4. 463.) sepalis integris vel inaequaliter bifidis, *corolla basi tubulosa superne sensim ampliata* dorso curvata, *staminibus in medio tubi insertis* e basi arcuato-patente adscendentibus inferne pilosis superne glabris, sacculis antherarum breviter et tenuissime mucronatis. 4? In Austria inferiore a Doct. Schiedeo lecta. Jun.? Planta, etiam exsiccata, fragrans. G.

21. **O. caerulescens** (Stephan. ap. Willd. sp. 3. p. 349.) sepalis indivisis bifidisque tubo corollae longioribus, corolla tubulosa, *tubo curvato inferne ovato supra ovarium coarctato,* laciniis labii inferioris concavis, staminibus supra medium tubi insertis, basi parce pilosis. ⊙. In glareosis ad ripas, in Artemisia campestri parasitica, (bei Regensburg, Danzig.) Mai. Jun. Flores e minoribus, caerulei. Spica lanato-villosa, in speciminibus exsiccatis quasi mucore obducta. G.

Sect. II. Trionychon Wallr. l. c. Cal. monosepalus, circum circa clausus, bracteis 3 fultus.

22. **O. caerulea** (Vill. delph. 2. 406.) *calyce monosepalo* 5 dentato, dentibus lanceolatis acutis, corolla tubulosa antrorsum curvata, tubo medio angustato, *laciniis* labiorum *acutis* planis, *antheris glabris* vel basi paulo pubescentibus, *caule simplici.* 4. In radice Achilleae Millefolii parasitica, (in den meisten Provinzen.) Jun. Jul. D. fl. 4. 466. O. purpurea Jacq. a. t. 276. Flores e maioribus, amethystini.

23. **O. arenaria** (Borkhausen. in Röm. n. Mag. p. 6. 1794.) *cal. monosepalo* 5 dentato, dentibus subulatis, corolla tubulosa subrecta, tubo medio angustato, fauce subinflata, *laciniis* labiorum *obtusis* margine reflexis, *antherarum sutura-pilosa,* caule simplici. 4. In radice Artemisiae campestris parasitica tam in solo arenario quam argillaceo, (in mehreren Prov. D.) Jul. Aug. D. fl. 4. 467. Reichenb. ic. f. 929-931. Flores amethystini, aeque longi, atque antecedentis speciei. G.

24. **O. ramosa** (L. sp. 882.) cal. *mono-sepalo* 4 dentato, dentibus ovato-triangularibus subulato-acuminatis, antheris glabris, *caule ramoso.* ⊙. In radice Cannabis, Tabaci, Solani nigri et Maydis parasitica, (zerstreut durch das Geb.) Jun.-Aug. D. fl. 4. 468. Reichenb. ic. f. 933. 934. Flores dimidio triplove minores, quam in antecedentibus duabus, albi vel dilute amethystini.

2. LATHRAEA (L. gen. n. 743.) Cor. cum basi integra decidens. Ovar. antice glandula libera fultum; caetera ut Orobanches.

1. **L. Squamaria** (L. sp. 848.) caule simplici, floribus pendulis secundis, labio inferiore corollae trifido. 4. In sylvis frondosis, umbrosis, non ubique. Mart. April. D. fl. 4. 361. Schk. t. 170. Tota planta alba vel in diluteroseum vergens.

Ord. LXXXV. RHINANTHACEAE. DC. fl. fr. 3. p. 454. (excl. gen.) Pediculares Juss. gen. 99. (excl. gen.)

Antherae basi mucronatae vel spinulosae, caetera ut Antirrhinearum.

1. TOZZIA (L. gen. n. 745.) Cal. 5 dentatus. Corollae tubus cylindricus, superne sensim ampliatus; limbus bilabiatus, labio superiore 2-inferiore 3 fido, lobis subaequalibus. Ovar. biloculare, loculis biovulatis. Caps. 1 sperma.

1. **T. alpina** (L. sp. 844.) 4. Ad rupes umbrosas madentes Alpium et reg. subalpinarum, (d. d. g. Alpenk. u. auf d. Sudet.) Jul. Aug. D. fl. 4. 363. St. h. 30. Cor. flava, labio inferiore sanguineo-punctato.

2. MELAMPYRUM (L. gen. 742.) Cal. tubulosus, 4 dentatus. Ovarii loculi 1-2 spermi. Sem. laevia. — Corollae labium superius margine replicatum, inferius 3 sulcatum.

1. **M. cristatum** (L. sp. 2. 842.) *spicis quadrangularibus dense imbricatis,* bracteis cordatis sursum complicatis recurvatis pectinato-dentatis. ⊙. In sylvis et pratis siccis. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 356. Fl. dan. t. 1104. Flores albidi, antice pallide flavi, labio inferiore vitellino; vel purpurei, labio inferiore intus flavo.

2. **M. arvense** (L. sp. 842.) spicis laxis aequalibus, *bracteis* ovatis lanceolato-acuminatis subulato-dentatis *subtus bifariam punctatis*, calycibus pubescenti-scabris tubum corollae subaequantibus, dentibus e basi ovata elongatis setaceo-acuminatis. ⊙. In agris, solo calcareo et argillaceo. Jun. Jul. D. fl. 4. 357. Fl. dan. t. 911. Cor. purpurea, medio annulo albo, et macula flava ad basin labii inferioris; bracteae purpureae.

3. **M. barbatum** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. p. 89. t. 86.) spicis laxis aequalibus, *bracteis ovatis lanceolato-acuminatis subulato-dentatis infra impunctatis,* calycibus hirsutis tubo corollae triplo brevioribus, dentibus ovatis acuminatis. ⊙. Inter segetes, (im Litt., in Oestr. u. Mähr.) Mai. Jun. D. fl. 4. p. 358. Bracteae luteo-virides, raro purpureae. Corollae flavae. G.

4. **M. nemorosum** (L. sp. 843.) spicis laxis secundis, bracteis superioribus profunde *cordatis dentatis, calycibus hirsutis corollam dimidiam subaequantibus,* dentibus lanceolato-subulatis patentibus. ⊙. In sylvis et nemoribus, non ubique, (fehlt in d. ganzen Rheingegend.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 358. St. h. 29. Bracteae azureae. Cor. aureae, tubo ferrugineo.

5. **M. pratense** (L. sp. 843.) spicis laxis secundis, *bracteis lanceolatis,* superioribus basi utrinque 1-2 *dentatis, calycibus glabris corolla triplo brevioribus,* floribus horizontaliter patentibus. ⊙. In sylvis, ericetis, pratis turfosis et sylvaticis. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 360. M. vulgatum Pers. syn. 2. 151. M. commutatum Tausch. pl. select. Flores flavi, vel albi et superne flavi.

6. **M. sylvaticum** (L. sp. 843.) spicis laxis secundis, *bracteis lanceolatis plerumque integerrimis, calycibus glabris corollam aequantibus,* floribus erectis. ⊙. In sylvis et pratis subalpinis, (d. d. g. Alpenk.; Vog.; Schwarzw.; Sud.; Thüring. W.; Harz; Böhm.) Jul. Aug. St. h. 9. M. pratense Tausch. pl. select. Flores dimidio, quam antecedentis, minores, aurei, erecti; fructus autem nutantes. Specimina bracteis utrinque 1-3 dentatis misit D. Facchin.

3. PEDICULARIS (L. gen. n. 746.) Cal. tubulosus vel inflatus, 5 dentatus. Ovarii loculi multiovulati. Sem. reticulato-scrobiculata.

Sect. I. Labium corollae superius in rostrum, apice truncatum, ibidemque saepe crenulatum, contractum; anguli inferiores apicis rostri in dentem conspicue non protracti. Capsula compressa, oblique ovata.

1. **P. Jacquinii** (Koch. D. fl. 4. p. 363.) corollae labio superiore subito in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis

longioribus apice sparsim pilosis, *calyce oblongo-campanulato glabro vel nervis margineque pubescente*, *laciniis* superne foliaceis inaequaliter crenatis *apice recurvatis* calycis tubo triplo brevioribus, foliis profunde bipinnatifidis, pinnulis dentatis, caulibus adscendentibus. 4. In locis madidis alp. altiorum, (v. den bayer. Alp. u. v. Tyr. bis Oestr.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 363. P. rostrata Jacq. a. t. 205. St. h. 20. Flores rosei. Caulis linea decurrente, e pube brevissima formata notatus. G.

2. **P. rostrata** (L. sp. 845.) corollae labio superiore subito in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis supra medium barbatis, *calyce tubuloso* basin versus attenuato *ubique breviter villoso*, *laciniis* superne foliaceis inaequaliter crenatis *apice uncinatis* tubo calycis triplo brevioribus, foliis profunde pinnatifidis, pinnulis duplicato-dentatis, caulibus prostratis adscendentibus. 4. In locis humidis alp. altior., (Schweiz, Grimsel, Alpe Tolud in Tessin; Tyr. a. d. Zielalpe u. d. Alp. im Suldenthale; südöstl. Tyrol, Alpe la Colem zw. Val de Sole u. Ulten.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 367. Gay. ann. d. scienc. nat. mart. 1832. Flores rosei. Caulis linea decurrente villoso-pubescente.

3. **P. asplenifolia** (Floerk. ap. Willd. sp. 208.) corollae labio superiore subito in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis glabris, *calyce oblongo-campanulato lanato-villoso*, *laciniis* superne foliaceis crenatis *apice uncinatis* tubo calycis triplo brevioribus, foliis profunde pinnatifidis, foliolis duplicato-dentatis, caule erecto. 4. In locis madidis alp., (Tyr.; Salzb.; Kärnth.; Steyerm.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 367. St. h. 20. Flores rosei. G.

4. **P. Portenschlagii** (Sauter. ap. Reichenb. ic. 5. f. 587.) corollae *labio superiore in rostrum breve conicum apice truncatum sensim abeunte*, filamentis longioribus supra medium barbatis, *calyce* tubuloso-campanulato glabro nervis margineque pubescente, *laciniis* superne inaequaliter crenatis *apice recurvatis* tubo calycis brevioribus, foliis pinnatifidis, pinnis duplicato-dentatis, caule erecto dense foliato. 4. In locis humidis alp. altiss. granitic. Styr. sup., Angelis, Austr., Dollin. Jun. Jul. D. fl. 4. 369. Flores rosei. G.

5. **P. fasciculata** (Bellard. app. alterna ad fl. ped. ined. secund. Willd. sp. 3. 218.) corollae labio superiore *in rostrum breve conicum apice truncatum sensim abeunte*, filamentis longioribus supra medium barbata-villosis, *calyce* campanulato ultra medium quinquefido dense pubescente, *laciniis foliaceis pinnatifidis dentatisque rectis*, bracteis superioribus trifidis, segmentis pinnatifidis, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, lobulis dentatis. 4. In alp. et subalp., (a. d. Monte Generoso, Tamor, Calbege, Dr. Lagger; im Cant. Tessin; Berg Fedai in Primiero u. über dem Wirthshause Bracon in Tesino, südl. Tyrol, Facchini.) Jul. Aug. P. gyroflexa Gaud. fl. helv. 4. p. 131., non Vill., neque DC. Flores purpurei, variant albi in dilute roseum vergentes.

6. **P. tuberosa** (L. sp. 847.) corollae labio superiore subito in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis longioribus superne barbato-villosis, *calyce campanulato ad medium quinquefido*, *laciniis foliaceis inciso-dentatis rectis*, bracteis superioribus trifidis, laciniis inciso-dentatis, foliis profunde bipinnatifidis, pinnulis dentatis. 4. In locis humidis alp. altior., (Schw.; Tyr.; Salzb.; Kärnth.; Krain.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 369. St. h. 30. P. gyroflexa b. Vill. delph. 2. 427. P. adscendens Hopp. et Sternb. Denkschr. 1. 2. 122. Flores flavi. Variat rarius tubo calycis villoso.

7. **P. Barelierii** (Reichenb. fl. exc. p. 362.) corollae labio superiore subito in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis longioribus superne barbato-villosis, *calyce* anguste campanulato ad medium quinquefido *glabro*, *laciniis* margine puberulis lanceolatis acuminatis *integerrimis* rectis, bracteis superioribus pinnato-3-5 fidis, laciniis lateralibus integerrimis, foliis profunde bipinnatifidis, pinnulis dentatis. 4. In

alp. calcareis, (a. d. Joche d. Alp. zw. d. Cant. Bern u. Wallis.) Jul. Aug. P. adscendens Gaud. helv. 4. p. 145.; non Schleich. Spica multo longior et inferne laxior, quam in antecedente. Flores flavi. H.

8. **P. incarnata** (Jacq. fl. a. 2. p. 24. t. 140.) corollae labio superiore in *rostrum elongatum lineare* truncatum emarginatum angustato, filamentis glabris, *calyce* tubuloso-campanulato *lanato* quinquefido, *laciniis* lanceolato-subulatis acutis *integerrimis rectis*, longioribus tubum suum subaequantibus, bracteis superioribus trifidis integerrimis, foliis bipinnatifidis serrulatisque. ♃. In locis subhumidis alp., (Oestr., Steyerm., Kärnth., Salzb., Wallis, Graubünden.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 371. St. h. 30. Flores rosei, labio superiore saturatiore. Spica valde laxa.

9. **P. atrorubens** (Schleich. pl. exs. et ap. Gaud. helv. 4. p. 139.) corollae labio superiore *breviter rostrato, rostro truncato subtridentato,* filamentis longioribus superne pilosis, calyce campanulato lanuginoso, laciniis lato-lanceolatis acuminatis serrulatis, *bracteis superioribus lanceolato-linearibus indivisis* apice serrulatis, foliis profunde pinnatifidis, pinnis inciso-serratis serrulatisque. ♃. In locis herbidis alp. altiss., (a. d. grossen Bernhard, nicht weit von d. Kloster Albula in Graubünden.) Jul. Aug. Planta habitu P. sudeticae et P. recutitae. Spica densa; flores saturate purpurei. H.

Sect. II. Labium superius corollae breviter rostratum, rostro truncato et utrinque ad angulum in dentem acutum vel subulatum protracto. Caps. compressa, oblique ovata.

10. **P. sylvatica** (L. sp. 845.) corollae labio superiore subfalcato brevissime rostrato truncato, angulis in dentem triangulari-subulatum protractis, calyce 5 dentato, dentibus superne foliaceis dentatisque, foliis pinnatis, pinnis ovalibus subpinnatifido-lobulatis, lobulis 2-3 dentatis, *caule primario erecto a basi florigero, secundariis prostratis.* ♃ vel ☉. In pratis vilioribus, ericetis sylvisque humidis. Mai-Jul. D. fl. 4. p. 372. St. h. 13. Flores rosei.

11. **P. palustris** (L. sp. 845.) corollae labio superiore subfalcato brevissime rostrato truncato, angulis in denticulum subulatum protractis, calyce bilobo, lobis inciso-dentatis crispis, foliis pinnatis, pinnis oblongis subpinnatifidis lobulatis, lobulis crenatis, *caule erecto a basi ramoso.* ♃ vel ☉. In paludibus et pratis humidis spongiosis. Mai-Jul. D. fl. 4. p. 374. Schk. t. 171. Flores carnei. Praeter denticulum in apice labii superioris, alius minutus in medio marginis ipsius.

12. **P. sudetica** (Willd. sp. 3. 209.) corollae labio superiore *falcato* brevissime rostrato truncato, *angulis in dentem* triangulari-subulatum *protractis, calyce quinquefido* angulis villoso, *dentibus lanceolatis* indivisis serrulatis, foliis pinnatifidis rachi dilatata, pinnis lanceolatis acutis lobulato-dentatis serrulatis, caule simplici. ♃. In locis irroratis et ad fontes in Sudetis. Jun. Jul. D. fl. 4. p. 374. Reichenb. ic. f. 574. Flores carnei. G.

13. **P. Friederici Augusti** (Tommasini in Linnaea v. 13. p. 69. et 74. t. 2.) *corollae labio superiore falcato* brevissime rostrato truncato, *angulis in dentem* triangulari-subulatum *protractis,* calyce ovato quinquedentato lanato pilis elongatis, *dentibus lanceolatis acutis latitudine sua duplo triplove longioribus,* foliis pinnatis, pinnis oblongis pinnatifidis, laciniis mucronato-serratis. ♃. In pratis montanis et declivibus graminosis Littoralis, (auf d. Slavnik, auf der Grenze zw. Krain u. Istrien.) Mai. Flores ochroleuci, deflorati fulvi. G.

14. **P. comosa** (L. sp. 847.) labio corollae superiore *falcato* breviter rostrato truncato, *angulis in dentem* triangulari-subulatum *protractis, calyce 5 dentato* angulis puberulo, *dentibus brevissimis ovatis* obtusis *latitudine sua brevioribus,* foliis pinnatis, pinnis oblongis acuminatis pinnatifidis, laciniis mucronato-serratis. ♃. In montosis, südl. Tyrol, Pollin.) Jun.-Aug. Cor. ochroleuca vel citrina. In ipsa terra Tyrolensi non reperit, sed in finitimis terris Veronensibus cl. Facchinius; in Tyroli itaque ulterius quaerenda est. G.

Sect. III. Corollae labium superius rectum vel falcatum, apice plerumque non latiore, galeato-obtusum, nec vero rostratum neque dentibus instructum. Capsula compressa, oblique ovata.

15. **P. foliosa** (L. mant. p. 86.) corollae *labio superiore subrecto obtuso edentulo hirsuto, calyce* campanulato *integro* angulis villoso 5 dentato, *dentibus tubo multo brevioribus* e basi triangulari acuminatis, posteriore longiore, filamentis omnibus apice dense barbatis, foliis bracteisque inferioribus pinnatis, pinnis profunde pinnatifidis, pinnulis lineari-lanceolatis inciso-mucronato-serratis, bracteis superioribus lanceolatis pinnatifido-serratis. 4. In locis glareosis subalpinis, (d. d. g. Alpenk.; a. d. Hohneck d. Vog.) Jul. Aug. St. h. 20. Planta 6-12 pollicaris. Corolla sulphurea.

16. **P. Hacquetii** (Graf. in bot. Ztg. 17. 1. 42.) corollae *labio superiore subrecto obtuso edentulo glabriusculo, calyce* campanulato *semibifido subspathaceo* antice villoso 3-5 dentato, *dentibus brevissimis triangularibus*, posteriore paulo maiore, filamentis longioribus apice dense barbatis, foliis bracteisque inferioribus pinnatis, pinnis profunde pinnatifidis, pinnulis lineari-lanceolatis inaequaliter mucronato-serratis, bracteis superioribus lanceolatis pinnatifido-serratis. 4. In alpibus vochinensibus Carniol., (auf d. Javernik von Hacquet u. a. d. Zherna perst von Graf gefunden, Slavnik u. M. Maggiore im Küstenlande, Tommas.) Mai. Planta 2-4 pedalis; flores sulphurei. G.

17. **P. recutita** (L. sp. 648.) corollae *labio superiore subrecto obtuso edentulo glabro, calyce* campanulato *glabro subsemiquinquefido, dentibus* inaequalibus *lanceolatis* acutis, bracteis lanceolatis indivisis trifidisque flore brevioribus, inferioribus pinnatifidis elongatis, foliis profunde pinnatifidis, *pinnis* lanceolatis pinnatifido-dentatis denticulatisque, *superioribus* basi *latoconfluentibus*. 4. In pratis humidis et ad fontes alp. altiorum, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 377. Jacq. austr. t. 258. St. h. 30. Flores ferrugineo-purpurei.

18. **P. rosea** (Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 57.) corollae labio superiore *recto subfalcato edentulo obtuso glabro, calyce* tubuloso-campanulato *lanato subsemiquinquefido, dentibus* aequalibus *lanceolato-subulatis* acutis, bracteis pinnatifido-dentatis calyce paulo longioribus, superioribus subintegerrimis, foliis pinnatis, pinnis anguste lanceolatis acute serratis. 4. In alp. calcareis, (Tyr., Steyerm. u. Kärnth.) Jul. Aug. D. fl. 4. 378. Jacq. ic. rar. t. 115. St. h. 20. Cor. rosea, labio superiore saturatiore. G.

19. **P. versicolor** (Wahlenb. fl. helv. p. 118., non fl. succ.) corollae labio superiore *recto subfalcato apice edentulo obtuso glabro,* calyce tubuloso-campanulato cum bracteis villoso 5 dentato, dentibus inaequalibus lanceolatis apice recurvatis subcrenatis, bracteis oblongis pinnatifido-crenatis, superioribus subintegerrimis calyce paulo longioribus, foliis pinnatis, *pinnis ovalibus* duplicato-crenatis, *superioribus deorsum imbricatis*. 4. In rupium fissuris et glareis humidis alp., (Schw., Bayern, Tyrol, Steyerm.) Jun. D. fl. 4. p. 380. P. flammea Wulf. in Jacq. coll. 1. 70. (non L.) P. Oederi Vahl. sec. Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 146. Cor. citrina, macula punicea vel atropurpurea sub apice labii superioris. Differt a Pediculari flammea L., Lapponiam inhabitante, floribus duplo fere majoribus, calyce in nervis et margine vel saltem in margine villoso, labio superiore apice multo minus rotundato, filamentis 2 longioribus apice barbatis et stylo plerumque emerso. P. flammea habet calycem et filamenta omnia glaberrima, labium superius apice saccato-rotundatum, stylum inclusum et labium superius sec. Wahlenberg fere totum atro-purpureum.

20. **P. acaulis** (Scop. fl. carn. ed. 2. p. 439.) corollae *labio* superiore falcato rotundato-obtuso edentulo *margine villoso*, calyce semiquinquefido, dentibus superne foliaceis inciso-dentatis, *pedunculis radicalibus solitariis*, folio multo brevioribus, foliis pinnatis, pinnis ovatis pinnatifido-incisis mucronato-dentatis. 4. In declivibus humidis inter fruticeta, (in Krain auf niedrigern Bergen u. bis in d. Alpen hinauf; in Tyrol unweit Fione in

Giudicarie, Facchin.) Apr. Mai., in alp. serius. D. fl. 4. p. 381. Jacq. coll. 1. t. 11. Cor. alba, in color. carneum vergens. G.

21. **P. verticillata** (L. sp. 846.) corollae labio superiore subrecto obtuso edentulo glabro, *calyce inflato hirsuto apice fisso*, dentibus brevissimis, foliis profunde pinnatifidis, pinnis ovato-oblongis obtusis inaequaliter dentatis, *foliis caulinis bracteis floribusque verticillatis*. 4. In locis graminosis humidis, (d. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 382. Jacq. a. t. 206. St. h. 20. Cor. purpurea.

Sect. IV. Cor. tubus superne in faucem campanulatam, labiis conniventibus clausam dilatatus. Capsula globosa.

22. **P. Sceptrum Carolinum** (L. sp. 845.) *corollae tubo superne campanulato, fauce labiis conniventibus clausa*, labio superiore falcato obtuso edentulo, calyce glabro 5 dentato, dentibus oblongis obtusis acute inaequaliter crenatis, bracteis ovatis indivisis, foliis pinnatifidis, *pinnis ovato-oblongis obtusis duplicato-crenatis*. 4. In pratis turfosis paludosis, (Oberbayern bei Münch., Salzb., Steyerm., Mähr., Mecklenb., Ostpreussen.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 383. St. h. 30. Cor. speciosa, sulphurea, margine labii inf. sanguineo. G.

4. RHINANTHUS (L. gen. n. 740.) Cal. inflatus, 4 dentatus. Ovarii loculi multiovulati. Sem. ala orbiculari cincta. — Flores omnium flavi, tubo albido; saepe macula violacea una alterave notati.

1. **R. minor** (Ehrh. Beitr. 6. 144.) *bracteis concoloribus*, superioribus inciso-serratis, dentibus acuminatis, labiis corollae porrectis, tubo recto, dente in utroque latere labii superioris breviter ovato aeque longo ac lato, foliis oblongo-lanceolatis. ⊙. In pratis. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 343. R. Crista galli Pollich. pal. 2. p. 175. R. Crista galli *α*. L. sp. 840. Alectorolophus parviflorus Wallr. sched. 348. Reichenb. ic. 8. f. 974. Dens labii superioris nunc albidus nunc violaceus. Flores dimidio minores, quam in subsequente; bracteae saepe brunneo colore suffusae. Variat:

β. fallax, altior, caule lineolis nigris adsperso: Alect. minor *β.* fallax Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 213.

γ. angustifolius, foliis dimidio angustioribus: Alect. minor *β.* Reichenb. ic. 8. f. 973. Rhin. minor *β.* alpinus Gaud. helv. 4. p. 197.? In alpibus altioribus. In loco natali ulterius observanda varietas.

2. **R. maior** (Ehrh. Beitr. 6. 144.) *bracteis decoloribus* pallidis, superioribus inciso-serratis, dentibus subulatis cuspidatis, *labiis* corollae *porrectis*, tubo subcurvato, dente in utroque latere labii superioris ovato, *calyce glabro*, vel subpubescente, seminum alis dimidio semine latioribus, *foliis oblongo-lanceolatis*. ⊙. In pratis. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 341., exclus. var. *β.* R. Crista galli *γ.* L. sp. 840. Alectorolophus grandiflorus Wallr. sched. 316. A. maior Reichenb. ic. 8. f. 975. Dens labii corollae violaceus. Variat:

β. angustifolius, foliis dimidio angustioribus lanceolato-linearibus: R. maior var. angustifolia Fries. herbar. norm. fasc. 7. n. 11.

3. **R. Alectorolophus** (Pollich. palat. 2. 177.) bracteis decoloribus pallidis, superioribus inciso-serratis, dentibus subulatis cuspidatis, labiis corollae porrectis, tubo subcurvato, dente in utroque latere labii superioris ovato, *calyce villoso*, seminum alis dimidio semine angustioribus, foliis oblongo-lanceolatis. ⊙. In agris inter segetes, (im mittlern u. südl. Gebiete sehr gemein, im nördl. fast ganz fehlend.) Mai. Jun. R. Crista galli *γ.* L. sp. 2. 480. R. villosus Pers. syn. 2. 151. R. hirsutus Lam. fl. fr. 2. 353. Mimulus Alectorolophus Scop. carn. 1. p. 435. Alectorolophus grandiflorus *β.* pubens Wallr. sched. 316. A. hirsutus All. ped. 1. 58. Planta sesquipedalis et bipedalis. Suadente cl. Meyer. in chlor. Hannov. p. 314., et seminibus denuo inter se comparatis, hunc separavi; tamen suspicor, eum nil nisi varietatem antecedentis speciei exhibere, latitudo alarum seminum variare videtur.

Alectorolophus Reichenbachii Drejer. flor. excurs. hafniens. p. 210., Rhinanthus major Smith. sec. Babingt. man. p. 221., sicut Rhinanthus buccalis Wallroth., regensb. bot. Ztg. v. 25. p. 504., sunt species mihi non satis notae.

4. **R. alpinus** (Baumgart. en. stirp. transs. 2. p. 194.) *bracteis decoloribus pallidis saepe nigro-striolatis punctatisque*, superioribus inciso-serratis, dentibus subulatis longe aristatis, *labio* superiore corollae adscendente, *inferiore patente*, dente in utroque latere labii superioris oblongo, foliis oblongo-lanceolatis vel e basi lanceolata longe attenuatis. ⊙. In alpinis et subalpinis, (durch die Alpenkette u. auf d. Mähr. Carpaten, den Sudeten, die Varietät β. auch auf Kalkbergen am Unterharz u. in Oberbaden.) Jul. Aug. Dens labii superioris caeruleus et saepe macula caerulea pluresve ad labium inferius. Variat rarius labio inferiore adpresso (Facchini,) et insuper saepissime:

β. *angustifolius*, folia dimidio angustiora: R. Crista galli β. L. sp. 840. γ. angustifolius Gaud. helv. 4. p. 108.

5. BARTSIA (L. gen. n. 739.) Cal. campanulatus, quadrifidus. Ovarii loculi multiovulati. Sem. ad hilum compressa, superficie costata, costis dorsalibus alato-dilatatis.

1. **B. alpina** (L. sp. 839.) foliis oppositis ovatis subamplexicaulibus obtuse serratis. 4. In pratis et glareosis humidis alp. et reg. subalp.; cum fluviis in planities descendens, (d. d. g. Alpenk.; a. d. Sudeten; d. Feldb. d. Schwarzw.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 340. St. h. 17. Flores violaceo-rubri.

6. TRIXÁGO (Link. en. h. berol. 2. p. 134.) Caps. in rostrum attenuata; caetera ut Euphrasiae.

1. **T. latifolia** (Reichenb. fl. germ. excurs. p. 360.) foliis palmato-dentatis, floribus subcapitato-aggregatis. ⊙. In collibus incultis, (Istrien.) April. Mai. D. fl. 2. p. 346. Bartsia latifolia Sm. fl. graec. t. 386. Euphrasia latifolia L. sp. 841. Cor. purpurea. J.

7. EUPHRASIA (L. gen. n. 741.) Cal tubulosus vel campanulatus, 4 dentatus vel 4 fidus. Ovarii loculi multiovulati. Sem. aequaliter striata, striis apteris. Caps. obtusissima vel emarginata.

Sect. I. Euphrasium. Antherarum sacculus inferior staminum breviorum spinula longiore armatus, caeteri sacculi tenuissime et breviter mucronati.

1. **E. officinalis** (L. sp. 841.) *foliis ovatis utrinque subquinquedentatis*, dentibus inferioribus approximatis, foliorum superiorum acuminatis brevius longiusque mucronatis, *labio corollae superiore* bilobo, *lobis patentibus* 2-3 dentatis, *inferiore* trifido, *laciniis profunde emarginatis*. ⊙. In pratis, sylvarum locis denudatis, ericetis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 347. Variat:

α. *pratensis*, glanduloso-pilosa, pilis patentibus, dentes foliorum superiorum mucronati. Flores plerumque maiores, albi, macula citrina ad basin labii inferioris, lineis 6 violaceis in labio superiore et 9 in lab. inferiore notati: E. off. var. A. pratensis Fries. nov. 2. p. 196. E. pratensis Reichenb. fl. exc. p. 359. E. Rostkoviana Hayn. Arzngew. 9. t. 7. E. off. St. h. 3. In pratis frequens.

β. *neglecta*, pilosa, pilis patentibus eglandulosis, folia superiora, sicut in varietate subsequente, profundius serrata, dentibus cuspidatis: E. off. β. neglecta Wimm. et Grab. fl. siles. 2. p. 218. Specimina valde pilosa: E. nemorosa β. pectinata Reichenb. fl. exc. p. 359. In subalpinis provenit.

γ. *nemorosa*, pilis crispulis adpressis pubescens, folia superiora profunde serrata, dentibus cuspidatis, labium superius plerumque caeruleum et quandoque totus flos caeruleus: E. off. β. nemorosa Pers. syn. 2. 149. E. off. Hayn. Arzngew. 9. t. 8. Reichenb. fl. exc. p. 358. E. stricta Host. a. 2. p. 185. In locis siccioribus frequens.

δ. alpestris, forma foliorum ut in var. *α.*, pubescentia ut in var. *γ.* Haec varietas occurrit: 1. floribus maioribus eiusdem coloris ac varietatis *α*: E. off. alpestris Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 218.; 2 floribus maioribus caeruleis: E. caerulea Tausch. pl. sel.; 3. floribus minoribus varietatis nemorosae: E. nemorosa Reichenb. fl. exc. p. 358. var. *α.*; 4. dentibus foliorum obtusioribus, floribus minutis: E. micrantha Reichenb. fl. exc. p. 358. In subalpinis et montibus altioribus crescit.

Varietates et formae maxime polymorphae hujus speciei, inclusa subsequente E. minima, in alpibus et montibus altioribus denuo observandae sunt, ut eruatur, num plures species bonae separandae sint, an omnes in unam eandemque combinandae.

2. **E. minima** (Schleich. ap. DC. fl. fr. 3. p. 473.) *foliis ovatis utrinque subquinquedentatis*, dentibus superiorum breviter mucronatis, *labio* corollae *superiore* bilobo, *lobulis conniventibus* bidentatis, *inferiore* trifido, *laciniis profunde emarginatis.* ⊙. In alpium pratis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 350. E. pratensis *α.* Reichenb. fl. exc. p. 359. Humilis, ramosissima, foliis et pubescentia similis E. officinalis varietati nemorosae. Flores minuti, labium superius caeruleum, inferius totum flavum; praeterea autem utrumque lineis pictum ut in antecedente. Occurrit corollis totis caeruleis. — Euphrasiam minimam nunquam vivam examinare potui, qua de causa seorsim proposui, ut ab autoptis ulterius observetur.

3. **E. salisburgensis** (Funk. in Hopp. Taschenb. 1794. p. 190.) *foliis* lanceolatis oblongisve basi cuneatis *utrinque bi-tridentatis, dentibus aequidistantibus foliorum superiorum* calycisque *cuspidato-aristatis*, *labio* corollae superiore bilobo, lobis 2-3 dentatis, *inferiore* trifido, *laciniis profunde emarginatis.* ⊙. In alpibus et subalpinis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 351. E. alpina DC. fl. fr. 3. p. 473. Lamarckii planta eiusdem nominis humillima est et flores magnos caeruleos fert; tamen huius varietas videtur.

4. **E. tricuspidata** (L. sp. 841.) *foliis linearibus apice utrinque unidentatis*, *dentibus* foliorum etiam superiorum calycisque *acutis muticis*, *labio* corollae superiore bilobo, lobis 2-3 dentatis, *inferiore* trifido, *laciniis profunde emarginatis.* ⊙. In montosis Tyr., (im südlichsten Tyrol u. nördl. bis zu dem Eingange in das Gebiet v. Val di Non, Facchini.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 351. Folia angusta, linearia, lin. 6 longa, $^1/_2$ lata, a basi usque ad tres longitudinis partes edentula, deinde dentibus 2 brevibus, non mucronatis, instructa. Flores ut in E. officinali. Foliis angustissimis et dentibus ipsorum muticis longe recedit ab E. salisburgensi. G.

Sect II. Odontites Dub. bot. gall. p. 354. Antherarum sacculi aequaliter mucronati.

5. **E. Odontites** (L. sp. 841.) *foliis e basi latiore attenuatis* lanceolato-linearibus remote serratis, bracteis oblongo-lanceolatis flore longioribus, *corollis* superficie margineque *dense pubescentibus*, labio superiore compresso truncato-obtuso, laciniis inferioris oblongis obtusis, *antheris apice villo connexis.* ⊙. In agris subhumidis et locis hyeme inundatis. Jun.-autumn. D. fl. 4. p. 352. E. verna Bellard. app. ad fl. ped. in mem. d. l'ac. d. scienc. tur. t. 5. Bartsia Odontites Sm. brit. 2. p. 648. Odontites verna Reichenb. fl. exc. p. 359. Cor. dilute purpurea.

6. **E. serotina** (Lam. fl. fr. ed. 2. v. 3. p. 350.) *foliis lanceolatis acuminatis* basin versus subattenuatis remotiuscule serratis, bracteis oblongo-lanceolatis flore brevioribus, *corollis* superficie margineque *dense pubescentibus*, labio superiore compresso truncato-obtuso, inferioris laciniis oblongis obtusis, *antheris apice villo connexis.* ⊙. In montosis siccis, (in d. südlichen Schweiz; um Triest u. wahrscheinlich an mehreren Orten im südl. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 353. E. Odontites *β.* L. sp. 842. Bartsia serotina Bert. amoen. ital. p. 33. Odontites serotina Reichenb. fl. exc. p. 359. Cor. dilute purpurea.

7. **E. lutea** (L. sp. 842.) foliis lanceolato-linearibus obsolete remote serratis, superioribus linearibus integerrimis, omnibus cauleque superne calycibusque pubescentibus, pilis adpressis crispulis eglandulosis, *corolla barbato-*

ciliata, labio superiore compresso truncato-obtuso, *staminibus corollam superantibus, antheris glabris liberis.* ⊙. In montibus humilioribus collibusque incultis, solo calcareo, (im mittl. u. südl. Geb.; u. in Pommern.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 355. Jacq. a. t. 398. Odontites lutea Reichenb. fl. exc. p. 359. var. *β.* Flores vitellini. — E. linifolia L. sp. 842. var. *α.*, differt calycibus glabris et capsulis calyce longioribus; in ditione florae nostrae nondum lecta est. Ab hac autem bonis notis recedit Eufragia linifolia Column. ecphr. 2. p. 68. t. 69., quae in spec. plant. ad Euphrasiam linifoliam trahitur, calyce scilicet tubuloso, angustiore et duplo fere longiore, bracteis erectis, staminibus corolla brevioribus et praecipue antheris circum circa barbato-ciliatis. Haec ad E. tenuifoliam Pers., E. linifoliam Brot., pertinet.

8. **E. viscosa** (L. mant. 86.) foliis lanceolato-linearibus obsolete remote serratis, superioribus linearibus integerrimis, *his caulequc* superne calycibusque pubescentibus, pilis glanduliferis patentibus, *corolla margine glabra, labio superiore compresso truncato-obtuso*, staminibus corolla brevioribus, antheris apice villo connexis. ⊙. In Vallesia media. Jul. Aug. E. linifolia *β.* L. sp. 842. Flores pallide flavi. Cor. glabra statim ab affinibus distinguitur. Folia latiora, quam in antecedente. H.

Euphrasia lanceolata Gaud. helv. 4. p. 116., quae autem in Helvetia nondum reperta est, flores luteos, stamina corollam superantia, antheras glabras liberasque E. luteae, et folia E. Odontitis habet; sed ab illa abunde differt foliis omnibus, etiam rameis lanceolatis, et omnibus, ut bracteae, serratis, corollae labiis subaequalis longitudinis, superiore profunde emarginato subbifido et inferiore, si reflectitur, longitudinem tubi attingente; ab E. Odontite colore floris, staminibus corolla longioribus et antheris glabris liberisque.

Ord. LXXXVI. LABIATAE. Juss. gen. p. 110.

Cal. tubulosus, persistens. *Cor.* monopetala, hypogyna, *irregularis*, saepe bilabiata. Stam. corollae inserta, 4, didynama, vel 2. *Ovaria* 4 *libera, disco hypogyno inserta*, 1 locularia, 1 ovulata, ovulo erecto. *Styl.* 1, *in medio ovariorum.* Nuces 4, calyci inclusae. Embryo rectus, radicula infera, ad hilum versa. Albumen nullum. Folia opposita, exstipulata *).

Trib. I. *OCYMOIDEAE.* Benth. lab. p. 1. Cor. bilabiata. Stam. declinata. Antherae reniformes, uniloculares, rima semicirculari dehiscentes, polline emisso patellulam orbicularem planam exhibentes.

1. ÓCYMUM (L. gen. n. 732.) Stam. labio corollae inferiori incumbentia. Antherae reniformes, uniloculares, in patellulam orbicularem planam

---

*) Labiatarum tribus sequentibus notis dignoscuntur:
Stamina declinata, I. Ocymoideae.
Stamina distantia et vel superne divergentia, vel sub labio superiore conniventia.
Corolla infundibuliformis vel subcampanulata, II. Menthoideae.
Corolla bilabiata.
Antherarum sacculi apice coniuncti, V. Melissineae.
Antherarum sacculi connectivo dilatato utrinque oblique adnati, apice seiuncti, IV. Satureineae.
Stamina sub labio superiore parallela.
Corolla unilabiata, X. Ajugoideae.
Corolla bilabiata, stamina duo, III. Monardeae.
Corolla bilabiata, stamina quatuor, fructus drupacei, IX. Prasieae.
Corolla bilabiata, stamina quatuor, fructus exsucci.
Calyx fructifer apice compresso-clausus, VIII. Scutellarineae.
Calyx fructifer apice non compressus.
Stamina superiora longiora, VI. Nepeteae.
Stamina inferiora longiora, VII. Stachydeae.

dehiscentes. Labium corollae superius quadrifidum, inferius integrum. Calycis labium superius integrum, inferius quadridentatum.

1. **O. Basilicum** (L. sp. 833.) foliis petiolatis ovatis oblongisve remote obsolete serratis glabris, calycibus ciliatis, caule pubescente. ☉. Ex India orientali allatum, nunc ob gratum odorem et hinc inde quoque in usum culinarium plures varietates coluntur. Jul. Aug. D. fl. 4. 330. Corolla alba. Colit.

2. LAVÁNDULA (L. gen. n. 711.) Stamina cum stylo in tubo corollae abscondita. Antherae reniformes uniloculares, in patellulam orbicularem planam dehiscentes. Labium corollae superius bifidum, inferius trifidum. Cal. inaequaliter dentatus, fructifer dentibus conniventibus clausus.

1. **L. vera** (DC. fl. fr. 5. 398.) foliis oblongo-linearibus lanceolatisve integerrimis, iunioribus canis margine revolutis, spicis interruptis, bracteis rhombeo-ovatis acuminatis, omnibus fertilibus, supremis calyce brevioribus. ♃. In montosis siccis incultis, (bei Trient im südl. Tyrol, daselbst aber angepflanzt, Facchin.; a. d. Lavendelberge bei Kreuznach in d. Rheinpfalz; in Schwaben an einigen Orten; häufig über Vully zwischen Murten u. dem Neuenberger See, Shuttleworth, Lagger.) Jul. Aug. L. Spica D. fl. 4. p. 239. L. Spica *α*. L. sp. 800. L. officinalis Chaix ap. Vill. delph. 1. 355. 2. 363. Corolla caerulea.

Trib. II. *MENTHOIDEAE*. Benth. lab. p. 152. Cor. subcampanulata vel infundibuliformis, limbo 4-5 fido, lobis subaequalibus. Stam. distantia, recta. Antherarum sacculi paralleli vel divaricati, rima dehiscentes.

3. ELSHOLTIA (Willd. in Ust. mag. 11. p. 5. sp. pl. 3. 59.) Stamina distantia, recta, superne divergentia. Antherarum sacculi divergentes. Cor. subaequaliter 4 fida, lobo superiore suberecto, subconcavo, emarginato, inferioribus patulis. Cal. 5 dentatus.

1. **E. cristata** (Willd. l. c.) herbacea, glabriuscula, foliis petiolatis ovatis oblongisve utrinque angustatis, bracteis lato-ovatis acutis ciliatis secundis, verticillis approximatis secundis, spicis paniculatis. ☉. In cultis, (in d. Gegend v. Hamburg, vor Ritscher, bei Nienstädten, Sickmann; Aecker bei Jever, C. Koch; auf d. Felde von Hohenzaden u. Völschendorf in der Umgegend v. Stettin, Rostkov.) Jul. Aug. Hyssopus ocymifolius Lam. dict. 3. 187. Mentha Patrini Lepech. nov. act. petrop. 1. 336. t. 8. M. ovata Cav. ic. rar. 4. 36. t. 360. f. 1. Cor. pallide purpurea. G.

4. MENTHA (L. gen. n. 713.) Stamina distantia, recta, superne divergentia. Antherarum sacculi paralleli, rimis longitudinalibus parallelis dehiscentes. Cor. infundibuliformis; tubus sensim in faucem ampliatus, limbus 4 fidus, subaequalis, lacinia superiore emarginata; annulus in tubo nullus. Cal. 5 dentatus, faux aperta, (pilis non clausa.) — Flores omnium dilute violacei vel lilacini.

Menthae variant caule foliisque hirsutis et glabris, vel tomentosis et glabris, et insuper foliis crispis; occurrunt itaque varietates hirsutae, tomentosae, glabrae, et crispae. Folia crispa plerumque latiora fiunt, et petioli, si planta iisdem instructa est, latiores et simul breviores redduntur. Varietates staminibus exsertis floribusque maioribus, atque staminibus inclusis floribusque minoribus, sexus diversitatem et sexum polygamo-dioicum indicant.

1. **M. rotundifolia** (L. sp. 805.) *spicis lineari-cylindricis, bracteis lanceolatis, calycibus* obsolete striatis, *fructiferis subgloboso-ventricosis*, dentibus lanceolato-subulatis denique conniventibus, *foliis sessilibus* subovatis crenato-serratis. ♃. Ad fossas et dumeta in locis humidis, (in d. westl. Schweiz u. dch. d. Rheinthal bis nach Spaa; im Mainthale; um Halle.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 244. M. macrostachya Ten. syllog. p. 282., staminibus exsert. M. rugosa Lam. fl. fr. 2. 420. Roth. cat. 1. 65. M. fragrans Presl. delic. prag. 78. M. suaveolens Ehrh. Beitr. 7. 149.

2. **M. sylvestris** (L. sp. 804.) *spicis lineari-cylindricis, bracteis linearis-*

subulatis, calycibus leviter striatis, *fructiferis ventricosis superne coarctatis,* dentibus lineari-subulatis denique paulo conniventibus, *foliis subsessilibus* ovatis lanceolatisve dentato-serratis. 4. Ad ripas, fossas, dumeta in humidis. Jul. Aug. Variat:

α. vulgaris, folia tomentosa, plana, vel parum tantum undulata; atque haec occurrit

A. tomento in caule foliisque laxo, crassiore: M. sylvestris Willd. sp. 3. 74. M. hybrida Schleich.! exs. M. canescens Roth. cat. 3. 46. M. nemorosa Beck. Fl. v. Frankf. M. sylv. nemorosa Reichenb. ic. f. 1315. M. niliaca Jacq. h. vind. 3. t. 87. — M. velutina Lej. rev. p. 115., M. gratissima Lej. fl. d. spa. 2. p. 15., est forma memorabilis foliis subrotundo-ovatis, profunde dentatis.

B. tomentum caulis et paginae inferioris foliorum adpressum, albidum: M. nemorosa Willd. sp. 3. 75. M. serotina Tenor. syllog. p. 281. M. candicans Opitz.! M. sylvestris Beck. Fl. v. Frankf. — Sexus alter staminibus inclusis: M. reflexifolia Opitz.! M. Halleri Gmel. bad. 2. 594.

C. folia supra tenuiter, subtus dense caulisque tomento crassiusculo tecta: M. sylvestris *α.* molliss. Benth. lab. p. 171. M. mollissima Borkh. in flor. wett. 2. p. 348. M. chalepensis Mill. dict. n. 10.; si folia tomento brevissimo cana sunt: M. candicans Crantz. a. 330. Huius modificatio fol. angustis elongato-lanceolatis: L. niliaca Willd. sp. 2. p. 76. Vahl. symb. 3. 75.

β. undulata, folia plerumque breviora, margine undulata et inciso-dentata, dentibus lanceolatis inaequalibus acuminatis: M. sylvestris *η.* crispa Benth. lab. p. 172. M. undulata Willd. en. h. ber. 6. p. 608. Reichenb. ic. f. 1311. M. crispa Ten. fl. neap. 2. 19. (M. tomentosa Durv. secund. cl. Benth. speciem propriam constituit.) Ex semine huius varietatis varietatem vulgarem eduxi.

γ. pubescens, folia primo adspectu supra glabra, subtus pubescentia, sub lente vero supra pilis brevissimis rare adspersa, subtus in rete venarum pilis brevibus obsita; caulis pube adspersa tectus vel subglaber: M. balsamea W. en. h. berol. 2. 608., sec. specim. in coll. reg. berol. M. pyramidalis Ten. sec. specim. ex h. Götting. Ad litt. mar. prope Servola leg. Biasol.; aliam formam misit D. Lang.

δ. glabra, folia glabra vel subtus in venis sparsim pilosa, caulis glaber vel subpubescens: M. viridis Auct. germanicorum. — M. laevigata Willd. en. h. berol. 2. 609., est modificatio foliis latioribus ovato-oblongis. — Mentha viridis Fries. nov. p. 176., habet folia anguste lanceolata, serraturis paucis valde remotis instructa. Herbar. normale in fasc. 7. sub n. 9. continet duo specimina hujus plantae, unum glabrum et alterum canescens, caule foliisque subtus tomentoso-canescentibus; similem in Germania inventam nondum vidi. Mentha viridis nostra foliis lanceolatis sparsim quoque occurrit, sed serraturas ita remotas non habet.

ε. crispata, folia glabra, bullato-rugosa, inciso-dentata: M. crispata Schrad. cat. sem. h. Gött. Willd. en. 2. p. 608. M. hercynica Röhl. D. fl. p. 328.

3. **M. nepetoides** (Lej. rev. de la flore de spa. p. 116.) *spicis oblongo-cylindricis*, bracteis superioribus lineari-subulatis, *dentibus calycis* linearisetaceis, *fructiferi porrectis* striatis, *foliis petiolatis ovatis* serratis. 4. Ad fossas et ripas. Jul. Aug. D. fl. 4. 248. M. aquatica-sylvestris Mey. chlor. bor. p. 289. Folia M. aquaticae, spicae M. sylvestris, sed crassiores, fortasse hybrida ex ambabus. Folia hirsuta. Variat autem foliis subtus laxius hirsutis et praecipue in venis tantum pilosis: M. hirta Willd.! en. h. berol. 2. 608.; atque foliis subtus densius pilosis, pilis crispulis: M. pubescens Willd.! l. c.; vidi specimina authentica collectionis regiae berolinensis. G.

4. **M. piperita** (L. sp. 805.) *spicis oblongo-cylindricis*, bracteis superioribus lanceolatis, *dentibus calycis* lanceolato-subulatis, *fructiferi porrectis*, tubo sulcato, *foliis petiolatis oblongis* vel ovato-oblongis serratis. 4. Ad

ripas, (in Oberbaden am Klemmbach bei Mühlheim beide Abarten, die Var. *α.* auch in Tyrol bei Kufstein; im Laberthale bei Aichhofen unweit Regensburg in Menge, sie bekleidet alle Wassergräben auf eine Strecke von mehreren Stunden, Fürnrohr.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 250. Variat:

α. Langii, simillima varietati sequenti, copiose in hortis pharmacopolarum cultae, a qua praeter pubescentiam nulla alia nota differt. Caulis enim, petioli, folia subtus, pedicelli et calyces hirsuta, foliaque supra sparsim pilosa sunt: M. Langii Steudel. in litt. M. pyramidalis Tenore fl. neap. 2. p. 33. t. 35. sec. Benth. lab. p. 175. M. suavis Guss. pl. rar. p. 387. t. 66.

β. officinalis, glabra, caulis foliaque subtus pilis brevibus adpressis raro adspersa: M. glabrata Vahl. symb. 2. 75., secund. Benth.

γ. crispa, structura et glabrities caulis, ramorum, spicarum, pedicellorum, calycum florumque exacte ut varietatis antecedentis, M. piperitae officinarum, sed folia ovata, bullato-rugosa, margine crispa et inciso-dentata, dentibus lanceolatis acuminatis: M. crispa L. sp. 805. M. aquatica *γ.* crispa Benth. lab. 177. Spicae maximam similitudinem cum spicis M. piperitae habent, saltem in speciminibus vivis, quae in horto colo; qua de causa eam M. piperitae ut varietatem subiunxi. Hanc cultam tantum vidi. G.

5. **M. aquatica** (L. sp. 805.) *floribus* verticillato-*capitatis*, dentibus calycis e basi triangulari subulatis, fructiferi porrectis, tubo sulcato, foliis petiolatis ovatis serratis. 4. Ad ripas, fossas ubique. Jul. Aug. D. fl. 4. 251. M. palustris Mill. dict. 11. M. intermedia et purpurea Host. fl. a. 2. 141. (specim. paulo villosiora.)

β. hirsuta, pilosior, foliis saepe brevius petiolatis: M. hirsuta L. mant. 81. M. dubia Vill. delph. 2. 358.

γ. glabrata, glabra calycibus tantum ciliatis: M. citrata Ehrh. Beitr. 7. p. 172. M. odorata Sol. menth. 21. t. 9. M. adspersa Moench. meth. 379. M. aquaticam cl. Meyer. in chlor. Hannov. p. 291., cum M. sativa coniungit. Occurrunt formae omnino intermediae, quae vero pro hybridis haberi possunt.

6. **M. sativa** (L. sp. 805.) floribus verticillatis, *verticillis omnibus remotis globosis, calycibus* tubuloso-infundibuliformibus, *dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis*, calycis fructiferi porrectis, *foliis petiolatis* ovatis ellipticisve serratis, *serraturis patentibus*. 4. Ad aquas ubique. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 253. Smith. trans. soc. linn. v. 5. p. 199. M. palustris Moench. meth. p. 380. M. verticillata Roth. tent. fl. germ. 2. 2. p. 11. Variat:

α. vulgaris, pilis caulis deflexis vel deorsum adpressis; haec abit in

β. glabram, pilis plerisque evanescentibus: M. rubra Smith. engl. fl. 3. p. 82. M. arvensis *δ.* rubra Benth. lab. p. 179. M. sativa (Agardhiana) Fries. nov. ed. 2. p. 184. — Altera extremitate seriei formarum varietas *α.* abit in

γ. hirsutam, pilis, etiam calycis et pedicellorum horizontaliter patentibus. Occurrit rarius:

δ. crispa et pilosa, foliis lato-ovatis, bullato-rugosis, irregulariter inciso-dentatis: M. dentata Roth. manual. 2. 815. M. sativa Tausch. bot. Ztg. 11. p. 238. et L. sp. 805. secundum synonyma.

ε. crispa et glabra, eadem foliis glabris: M. dentata Moench. meth. 380.

ζ. parviflora, corolla calyce paulo tantum longiore: M. parviflora Schultz. fl. starg. suppl. 34. M. austriaca Jacq. a. 5. p. 14. t. 30. Omnes generis species occurrunt floribus dimidio minoribus, sed in hac varietate, si caeteras species comparaveris, conspicue minores sunt.

Ad hanc speciem, sec. Benth., pertinent: M. origanifolia, tortuosa, maculata, serotina, nemorosa, longifolia, alata, carniolica, viridula, nitida, montana et sylvatica Host. fl. austr.

7. **M. gentilis** (L. sp. 805. sec. Fries. novit. ed. 2. p. 187.) **M. pratensis** (Sol. menth. brit. t. 17. sec. Benth. lab. 174.) floribus verticillatis, *verticillis omnibus remotis globosis, calycibus tubuloso-campanulatis dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis*, calycis fructiferi porrectis, *foliis* brevius lon-

giusve petiolatis ellipticis lanceolatisve basi apiceque acutis serratis *serraturis acuminatis antrorsum versis.* 4. Ad ripas in locis humidis, (sehr zerstreut dch. das Geb.) Jul. Aug. Mentha gentilis Meyer. chlor. Hannov. p. 292. Sole menth. t. 15. Smith. engl. bot. 7. p. 449. sec. cl. Benth. M. pratensis Sole menth. brit. t. 17. Benth. labiat. p. 174. Koch. syn. ed. 1. p. 551. M. gracilis *γ.* Smith. trans. soc. linn. lond. 5. p. 210. M. rubra Huds. angl. ed. 2. p. 252. sec. cl. Fries. Ad sexum grandiflorum pertinet M. Agardhiana Fries. nov. ed. 2. p. 184. mant. 3. p. 57., quem sexum in Styria legit cl. Maly. Haec species auctoritate cl. Friesii est vera Mentha gentilis Linnaei, sed in herbario Linnaeano, asserente cl. Benth., sub hoc nomine modificatio Menthae arvensis asservatur, ad cujus modificationes, comparato herbario Smithiano, M. rubra Smith. et M. gracilis *α.* ejusdem auctoris a cl. Benth. quoque referuntur. — Plus minusve quandoque fere tota glabra est et latitudo foliorum et longitudo petiolorum valde variabilis. Sexui grandifloro, excepto indumento, simillima est varietas:

β. acutifolia, tota hirsutie patentissima densa obducta: M. acutifolia Rabenhorst. fl. lusat. p. 160., et probabile Smith. brit. p. 619. M. hortensis Tausch. pl. boh. selectae.

γ. gracilis, fere tota glabra, folia lanceolata: M. gracilis Smith. l. c.

δ. crispa, folia crispa: M. pratensis *β.* crispa Benth. labiat. p. 174.; hanc nondum vidi.

8. **M. arvensis** (L. sp. 806.) floribus verticillatis, *verticillis omnibus remotis globosis, calycibus* campanulatis, *dentibus* triangulari-ovatis *aeque latis ac longis,* calycis fructiferi porrectis, foliis petiolatis ovatis ellipticisve serratis. 4. Ad ripas et in cultis subhumidis ubique. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 256. M. arvensis Benth. var. *ζ-θ.* Calycis structura, praecipue, fructiferi, ab antecedente speciei haec recedit. Variat:

α. vulgaris, caule foliisque villosis pedicellis villosis vel glabris: M. arvensis *ζ.* vulgaris Benth. l. c. M. arvensis Sol. menth. brit. t. 12. M. agrestis Sol. l. c. t. 14. (fol. basi subcordatis.)

β. glabriuscula, pedicellis glabris, foliis cauleque glabriusculis: M. arvensis *η.* Benth. l. c. M. gentilis Sm. brit. 621. M. gracilis *α.* Sm. trans. soc. linn. 5. 210.

γ. glaberrima, calyces, pedicelli, caulis foliaque glaberrima: M. praecox Sol. menth. brit. t. 13. sec. cl. Benth. M. rubra Herbar. Smith. sec. Benth.

Sec. cl. Benth. ad hanc speciem referendae sunt: M. suaveolens, stachyoides, multiflora, tenuifolia, carinthiaca, divaricata, varians, prostrata, laxa, parviflora, polymorpha, pulchella, austriaca, grata, atrovirens, rubra et gentilis Host. fl. austr.

5. PULEGIUM (Miller. dict.) Stam. distantia, recta, superne divergentia; antherarum sacculi paralleli, rimis longitudinalibus 2 parallelis dehiscentes. Cor. infundibuliformis, quadrifida, subaequalis; lacinia superiore integra; tubo subito in faucem ventricosam antice carinato-compressam ampliato. Annulus in tubo nullus. Calyx bilabiatus, labio superiore trifido, dentibus triangulari-lanceolatis, inferiore bifido, dentibus subulatis, fructifer pilis clausus.

1. **P. vulgare** (Mill. dict. n. 1.) floribus verticillatis, verticillis globosis omnibus remotis, *calycibus* tubulosis, *fructiferis annulo pilorum clausis,* dentibus calycis superioribus recurvatis, foliis petiolatis ellipticis obtusis obsolete dentatis. 4. Ad ripas et in locis paludosis, non ubique. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 257. Mentha Pulegium L. sp. 807. Koch. syn. ed. 1. p. 553. Pulegium vulgare Reichenb. fl. exc. p. 312. Flores dilute purpurei vel lilacini.

6. LYCOPUS (L. gen. n. 33.) Stam. distantia, recta, divergentia; 2 perfecta, antherarum sacculis parallelis, rimis 2 longitudinalibus dehiscentibus; 2 sterilia, e filamentis brevibus capitellatis confecta, vel plane caren-

tia. Cor. infundibuliformis, 4 fida, subaequalis, lacinia superiore emarginata; annulus in tubo nullus. Cal. 5 dentatus.

1. **L. europaeus** (L. sp. 30.) *foliis* petiolatis *ovato-oblongis* grosse incisodentatis *basi pinnatifidis*, calycis dentibus acuminatis, lacinia labii corollae inferioris intermedia porrecta subquadrata truncata lateralibus duplo latiore. ♃. In humidis, ad ripas. Jul. Aug. D. fl. 1. 346. Schk. t. 4. Flores albi, intus punctis purpureis, ut sequentis.

2. **L. exaltatus** (L. fil. suppl. 87.) *foliis* petiolatis, *inferioribus ambitu lato-ovatis superioribus lanceolatis, omnibus ad nervum medium usque pinnatifidis*, laciniis inferioribus subdentatis, superioribus confluentibus, calycis dentibus acuminatis, laciniis labii corollae inferioris ovatis subaequalibus apice recurvis. ♃. In humidis, (in der Ecke des Rheines u. Maines an der Vereinigung dieser Flüsse bei Bischoffsheim, Fresenius, Lehmann; am grossen Teiche bei Capricia auf d. Insel Veglia, Noé.) Jul. Aug. D. fl. 1. 346. G.

Trib. III. *MONARDEAE.* Benth. lab. p. 190. Cor. bilabiata. Stam. 2 fertilia, sub labio corollae superiore parallela.

7. ROSMARÍNUS (L. gen. 38.) Cor. ringens, labio superiore bipartito. Stam. exserta, curvata, basi dente reverso instructa. Antherae uniloculares. Cal. bilabiatus.

1. **R. officinalis** (L. sp. 33.) foliis sessilibus. ♄. In collibus incultis asperis, (Littorale u. südl. Schweiz.) April. Mai. D. fl. 1. 347. Flores pallide caerulei.

8. SÁLVIA (L. gen. n. 39.) Cor. ringens. Connectivum antherarum filamentiforme, adscendens, apice sacculum 1 locularem gerens. Cal. bilabiatus.

Sect. I. Eusphace Benth. lab. p. 207. Tubus corollae intus annulo piloso instructus. Connectiva, postice subcapitato-dilatata, sacculum lateraliter adnatum gerentia.

1. **S. officinalis** (L. sp. 34.) *caule* suffruticoso, ramis *foliisque iunioribus incano-tomentosis*, fol. ovato-lanceolatis lanceolatisque dense crenulatis rugosis, verticillis 6-12 floris denudatis, *bracteis caducis*, *dentibus calycis porrectis spinuloso-aristatis*, corollae tubo intus piloso-annulato. ♄. Inter saxa in montosis, (im Litt.; im Cant. Tessin.) Jun. Jul. D. fl. 1. 348. St. h. 9. Cor. violacea raro alba.

Sect. II. Drymosphace Benth. lab. 218. Cor. tubus exannulatus. Calycis labium superius brevissime tridentatum. Connectiva antherarum postice capitata ibidemque sacculum cassum ferentia, libera.

2. **S. glutinosa** (L. sp. 37.) caule herbaceo superne bracteis calycibusque glanduloso-villosis viscidis, *foliis cordato-hastatis* grosse serratis pubescentibus, superioribus *longe acuminatis*, verticillis disiunctis 6 floris, calycis labio superiori ovato minutissime tridentato, inferiore bidentato, dentibus ovatis acutis inermibus. ♃. In sylvis, locis umbrosis inque dumetis, subalpina adscendens, (längs der ganzen Alpenkette; in Oberbaden auf dem Kaiserstuhle u. in Schlesien u. Böhmen.) Jun. Jul. D. fl. 1. 356. St. h. 17. Fl. sulphurei fusco-punctati.

Sect. III. Aethíopis Benth. lab. 222. Cor. tubus exannulatus. Calycis labium superius tridentatum, dentibus rectis. Connectiva antherarum postice altero latere in alam dilatata, sacculum cassum ferentia.

3. **S. Aethiopis** (L. sp. 39.) *caule* herbaceo, *foliis calycibusque albolanatis*, foliis ovatis subcordatis eroso-crenatis sinuatis lobatisve rugosissimis calycibusque albo-lanatis, bracteis subrotundo-ovatis cuspidatis concavis, verticillis disiunctis 6-10 floris, *dentibus calycis ovatis acutis spinoso-aristatis*. ☉. In locis incultis, ad viarum margines, (Oestreich, am Schlosse Bielstein im Höllenthal am Fusse des Meisners in Hessen.) Jun. Jul. D. fl.

1. 354. Jacq. austr. t. 211. Cor. alba, labium sup. interdum col. violaceo-tinctum. G.

4. **S. Sclarea** (L. sp. 38.) *caule* herbaceo villoso *superne glanduloso-piloso*, foliis ovatis duplicato-crenatis subtomentosis, inferioribus cordatis rugosis, *bracteis* lato-ovatis cuspidatis membranaceis *coloratis* calyces superantibus, verticillis sexfloris disiunctis, *dentibus calycis ovatis acutis longe spinuloso-aristatis.* ☉. In collibus graminosis, ad vias, (im Gebiete der Fl. v. Spaa bei Verviers; in Istrien; Insel Lesina; im Rhonethale d. Wallis.) Jun. Jul. D. fl. 1. 353. St. h. 9. S. Simsiana R. et S. mant. 1. 210. Cor. dilute caerulescens; bracteae roseae.

Sect. IV. Plethiosphace Benth. Cor. tubus exannulatus. Calycis labium superius concavum, bisulcatum, dentibus 3 minutis conniventibus. Connectiva antherarum postice altero latere in alam dilatata.

5. **S. austriaca** (Jacq. austr. t. 112.) caule herbaceo superne bracteis calycibusque glanduloso-pilosis villosisque, foliis ovatis duplicato-crenatis lobatis subpinnatifidisque pubescentibus, radicalibus petiolatis, caulinis paucis (2-4) sessilibus multo minoribus, bracteis ovatis acutis calyces aequantibus herbaceis, labio calycis superiore breviter tridentato, inferiore bifido, dentibus ovatis mucronulatis, *staminibus corolla duplo longioribus.* ♃. In collibus herbidis Austr. Mai. Jun. D. fl. 1. 353. Cor. albidae vel dilute ochroleucae. G.

6. **S. pratensis** (L. sp. 35.) *caule* herbaceo *superne bracteis calycibus corollisque viscoso-pilosis, foliis* ovatis oblongisve duplicato-crenatis *integris vel trilobis* rugosis subtus pubescentibus, *radicalibus basi cordatis* petiolatis, caulinis paucis, superioribus multo minoribus amplexicaulibus, bracteis ovatis acuminatis calyce brevioribus herbaceis, verticillis subsexfloris disiunctis, *labio calycis superiore breviter tridentato*, inferiore bifido, dentibus ovatis mucronatis, cor. labio superiore inferius superante, staminibus corolla brevioribus. ♃. In pratis siccis aggeribusque. Mai.-Jul. D. fl. 1. 350. Occurrit floribus magnis et duplo minoribus. Cor. saturate caerulea, dilutius caerulea, rosea et alba, atque caerulea cum lacinia intermedia labii inferioris alba, haec est: S. variegata Kit. in Willd. en. 1. 36.

7. **S. sylvestris** (L. sp. 34.) *caule* herbaceo multifolio, foliisque subtus *calycibusque cano-pubescentibus*, foliis inferioribus petiolatis duplicato-crenatis basi cordatis, superioribus decrescentibus brevius petiolatis sessilibus subsimpliciter crenatis basi ovatis cordatisve, *bracteis* ovatis acuminatis *coloratis* flore brevioribus, verticillis subsexfloris disiunctis, *labio calycis superiore breviter tridentato*, inferiore bifido, dentibus ovatis acuminato-mucronatis, staminibus corolla brevioribus. ♃. In collibus herbidis ad vias, (in Krain u. dch. Oestreich nach Böhm., Schles., Sachs. u. d. Elbe nach bis Thüringen; Offenbach Fl. d. Wett., C. B. Lehmann; im Rheinthale zw. Cöln u. Limburg.) Jul. Aug. D. fl. 1. 352. S. sylvestris Spreng. fl. hal. 11. Reichenb. ic. 6. 723. Flores cum bracteis violacei vel rosei. — S. nemorosa L. sp. 35. Spreng. hal. 12. Reichenb. ic. 722., est var. pilis caulis longioribus patulis, et S. deserta Schangin. Reichenb. f. 724., var. fol. latioribus. — S. elata Host. fl. a. 1. 21. S. valentina Vahl. en. 1. 268., sec. Cl. Benth. sunt quoque varietates. G.

8. **S. clandestina** (L. sp. 36., non herb. ipsius.) *caule* herbaceo *pubescente vel villoso* paucifolio, *foliis oblongis lobato-dentatis pinnatifidisve* inaequaliter crenatis rugosis glabris vel subtus puberulis, inferioribus petiolatis basi subcordatis supremis sessilibus, bracteis subrotundo-ovatis acuminatis herbaceis margine calycibusque hirsutis denique deflexis, verticillis subsexfloris inferioribus remotis, *calycis lab. superiori rotundato minute tridentato,* inferiore bifido, dentibus ovatis mucronatis. ♃. In collibus herbidis, (Istrien, Biasol.!) Mai-Aug. S. verbenaca D. fl. 1. 355. S. praecox Savi pis. 1. 22. Lois. not. 6. S. verbenaca Vahl. en. 1. 255. Reichenb. ic. f. 718., non Linn., S. polymorpha Hoffm. et Lk. fl. port. 1. 149. t. 19. Reichenb. f. 719. S. oblongata Reichenb. f. 717., non Vahl. S. multifida Sibth. et Sm. fl. gr. 1.

17. t. 23. Reichenb. ic. f. 720. S. clandestina Vahl. en. 1. 256. Reichenb. ic. f. 721. Conf. Benth. lab. g. et sp. 241. — Flor. pallide caerulei. J.

Sect. V. Hemisphace Benth. lab. 310. Cor. tubus annulo piloso instructus. Connectiva antherarum postice remota, brevia, deflexa, acuta, dentiformia; filamenta erecta cum connectivo subcontinua.

9. **S. verticillata** (L. sp. 37.) fol. subtriangulari-cordatis inaequaliter dentato-crenatis, petiolis inferiorum auriculatis, *verticillis subglobosis* multifloris disiunctis, pedicellis calycem subaequantibus, *stylo labio inferiori incumbente*. 4. In collibus sterilibus, ad vias, (im Oberbadischen bei Engen u. Stockach, v. da durch Würtemb. bis Mergentheim, d. Oberbayern u. Krain, Steyerm. u. Oestr. u. n. Böhm., Sachs. u. Schles.) Jul. Aug. D. fl. 1. 349. Clus. hist. 2. 29. f. 3. Flor. caeruleo-violacei.

Trib. IV. *SATUREINEAE.* Benth. lab. p. 324. Corolla bilabiata. Stam. 4, distantia atque vel superne divergentia, vel sub labio corollae superiore conniventia. *Antherarum sacculi invicem seiuncti, connectivo transverse dilatato utrinque oblique adnati.*

9. ORÍGANUM (L. gen. n. 726.) Stamina distantia, superne patula; sacculi antherarum seiuncti, connectivo dilatato subtriangulari utrinque oblique adnati. Cor. labium superius rectum, emarginatum, inferius trifidum; annulus in tubo nullus. Cal. 5 dentatus, vel oblique fissus et apice tridentatus aut integer.

Sect. I. Genuina. Calyx aequaliter 5 dentatus vel bilabiatus, labio superiore tri-inferiore breviore bidentato. Faux pilis obsita.

1. **O. vulgare** (L. sp. 2. 824.) calyce 5 dentato, dentibus aequalibus, *bracteis latere interiore eglandulosis*, foliis ovatis acutis. 4. In locis incultis apricis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 304. St. h. 3. Fl. dan. t. 1581. Flores purpurei, rarius albi. Planta polygamo-dioica; sexus femineus stamina habet tubo breviora et corollas dimidio-minores. Sexus uterque variat bracteis calyce duplo longioribus vel eum vix superantibus, cum calyce hirtis vel glaberrimis, pubescentia caulis et paniculae crispa vel patente, spicis brevibus, oblongis, coloratis et viridibus; ad hoc ultimum pertinet Origanum virens Hoffmsgg. et Link. flor. portug. t. 9. sec. cl. Vogel. in Linnaea 15. p. 78. et

β. megastachyum, spicis, fere pollicem longis, prismaticis et quidem coloratis: O. vulgare *β.* prismaticum Gaud. fl. helv. 3. 78. O. creticum DC. fl. fr. 3. p. 558. O. creticum herbarii Linnaeani et O. creticum *β.* Linn. sp. 832. O. monspeliense Tabern. Krtb. 726. f. 5.; vel spicis viridibus, floribus albidis: O. creticum Hayn. Arzngw. v. 8. t. 7. O. megastachyum Link. et O. macrostachyum Link. sec. Vogel. l. c.

2. **O. hirtum** (Link.! en. h. berol. 2. p. 114.) calyce 5 dentato, dentibus aequalibus, *bracteis latere exteriore et interiore glanduloso-punctatis,* foliis lato-ovatis breviter acuminatis. 4. In siccis incultis asperis, (Istrien, Biasol.; Lessin piccolo auf Osero, Noé.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 305. O. creticum Sieb. fl. cret. Flores purpurei vel albi. Antecedenti simillimum, sed caulis gracilior, folia duplo minora et ratione longitudinis latiora, obtusa quidem, sed saepe apiculo prominulo instructa et cum bracteis densius glandulosa, glandulis, (in sicca planta,) prominulis et ignei coloris, spicae graciliores. Bracteae calycem nunc aequant, nunc duplo longiores sunt. Origanum heracleoticum Benth. lab. 326. Variat, ut O. vulgare, spicis elongatis et brevibus. Varietas spicis brevibus est O. heracleoticum Bentham. pro majore parte; varietas spicis elongatis prismaticis: O. hirtum Link sensu strictiori, Vogel. l. c. J.

O. paniculatum (Koch. D. fl. 4. p. 306., in annot.) vulgari proximum, sed spicis paniculato-dispersis et calyce bilabiato, labio superiore breviter tridentato, inferiore bipartito, transitum praebet ad sequentem sectionem.

Sect. II. Maiorana. Cal. dimidiatus, altero latere fere ad basin fissus, apice tridentatus vel integer.

3. **O. Maiorana** (L. sp. 825.) calyce dimidiato edentulo, *bracteis sulcatis* densissime imbricatis, spicis ovalibus ternatis sessilibus, foliis petiolatis ellipticis obtusis integerrimis utrinque cano-tomentosis. ☉ et ♃. Ex Africa mediterranea allata, nunc ubique in usum culinarium colitur. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 306. Maiorana hortensis Moench. meth. 406. Flores albi. — O. maioranoides Willd. sp. 3. p. 137., eadem planta est in frigidario asservata. Colit.

10. THYMUS (L. gen. n. 727.) Stamina distantia, superne patula; sacculi antherarum seiuncti, connectivo dilatato subtriangulari utrinque oblique adnati. Cor. labium superius rectum, emarginatum; inferius trifidum; annulus in tubo nullus. Calyx bilabiatus. — Flores purpurei.

Sexus polygamico-femineus floribus dimidio minoribus, staminibus in tubo corollae absconditis imperfectis et stylo porrecto instructus est. Sexus polygamico-masculus, vel potius hermaphroditus, stamina stylumque exserta et perfecta habet.

1. **T. vulgaris** (L. sp. 2. 825.) verticillis capitatis racemosisve, *foliis* linearibus vel oblongo-ovatis acutis glanduloso-punctatis, *margine revolutis in axillis fasciculatis*, floralibus lanceolatis obtusis. ♄. In locis rupestribus, (Istrien, Host.) Mai. Jun. D. fl. 4. p. 307. J.

2. **T. Serpyllum** (L. sp. 825.) verticillis capitatis racemosisve, *foliis* linearibus ellipticisve obtusis basi in petiolum brevem contractis integerrimis *planis* glanduloso-punctatis glabris hirsutisve margine postico ciliatis, floralibus subconformibus, *labio corollae superiore* emarginato *ovato-subquadrangulo*. ♄. In campis collibusque incultis, ericetis, sylvarum locis denudatis ubique. Jul.-Sept. D. fl. 4. p. 308. St. h. 70. Mire variat, quatuor vero varietates praecipue distinguendae sunt.

α. Chamaedrys, caulis bifariam pilosus: T. Chamaedrys Fries. nov. ed. 2. 197. T. Serpyllum Pers. 2. 130. T. Serpyllum *β.* L. sp. 825. T. Serpyllum, T. citriodorus, T. subcitratus et T. sylvestris Schreb. ap. Schw. et Kört. fl. Erlang. Occurrit

hirsutus, foliis utrinque et caule hirsutis, sed duo latera caulis glabra vel saltem minus hirsuta sunt: T. lanuginosus Schk. t. 164. T. Serpyllum *γ.* L. sp. 825. Vaill. t. 32. f. 6.; porro

odore citri: T. Serpyllum *δ.* L. l. c. T. citriodorus Link. en. 2. 115.

β. pulegioides, flores fere duplo majores, quam in varietate grandiflora T. chamaedryos, folia plerumque subrotunda, caetera ut hujus: Thymus pulegioides Lang. Planta vere speciosa. In Silesiae subalpinis, (im Kessel des Gesenkes.)

γ. angustifolius, caulis undique aequaliter pilosus: T. angustifolius Pers. syn. 2. 130. St. h. 70. T. Serpyllum Fries. l. c. p. 195. Folia linearia vel lineari-oblonga; occurrit quoque foliis ellipticis vel obovatis: T. Serpyllum Reichenb. fl. exc. p. 312. T. reflexus Lej. rev. 121. et floribus albis T. inodorus Lej. rev. 122.; porro foliis hirsutis: T. lanuginosus Link. en. 115.

δ. pannonicus, major Thymo angustifolio, folia plerumque oblonga vel lanceolata, basin versus attenuata, quandoque linearia, caeterum indumento Thymi angustifolii obductus: Th. pannonicus Allion. ped. 1. p. 20. Koch. syn. ed. 1. p. 558. Nota distinctionis, quam e labio superiore corollae desumpsi, non constans est. Egomet hucusque inter innumeras Thymi Serpylli formas, regiones australiores et orientales ditionis florae nostrae inhabitantes, limites frustra quaesivi. T. pannonicus dispersus est per Helvetiam australem, Tyrolem australem, Littorale austriacum, Austriam, Moroviam et Bohemiam. Variat 1. fol. ellipticis, caule quadrifariam piloso: T. montanus WK. pl. rar. h. t. 71.; 2. fol. ellipticis et caule undique pilosis, St. h. 70.; 3. foliis ellipticis utrinque hirsutis: T. nummularius MB. 2. p. 59.; 4. fol. oblongo-obovatis, vel lineari-oblongis: T. collinus MB. l. c. 3. p. 401., T. Marschallianus Willd. MB. l. c. p. 403., caule patenter piloso, et T. glabrescens Willd. en. suppl. p. 42., caule leviter pubescente; 5. fol. linearibus: T.

odoratissimus MB. l. c. 405.; 6. fol. angustioribus hirsutis: T. hirsutus MB. l. c. 406. St. h. 70.

11. SATURÉIA (L. gen. n. 707.) Stamina distantia, sub labio corollae superiori conniventia; sacculi antherarum seiuncti, connectivo dilatato subtriangulari utrinque oblique adnati. Cor. labium superius rectum, emarginatum, inferius trifidum; annulus in tubo nullus. Cal. tubuloso-campanulatus, 10 striatus. — Satureia differt a Thymo et Origano staminibus superne arcuato-conniventibus; a Calamintha calyce aequaliter 5 dentato, vel aequaliter 5 fido.

1. **S. hortensis** (L. sp. 795.) caule erecto ramosissimo herbaceo, *corymbulis axillaribus* subquinquefloris, *foliis lineari-lanceolatis* acutis *muticis.* ☉. In glareis fluviorum reg. calid., (am Isonzo in Krain, Host; wird häufig gebauet.) Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 229. St. h. 5. Flores polygamo-dioici, lilacini vel albi fauce purpureo-punctati. G.

2. **S. montana** (L. sp. 794.) caule suffruticoso *subtereti pubescente*, racemis verticillatis subsecundis, corymbulis axillaribus pedunculatis subtrifloris, *foliis* lanceolatis acuminatis basin versus attenuatis *utrinque glanduloso-punctatis, superioribus mucronatis, laciniis labii inferioris* corollae oblongis obtusis *subaequalibus*, labio superiore profunde emarginato. ♄. In montosis asperis, (Krain u. d. Littor.; südl. Tyrol.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 230. Schk. t. 156. Micromeria montana Reichenb. fl. exc. 311. Cor. alba, labio superiori dilutissime in roseum vergente vel dilute roseo, inferiori basi et fauce punctis aliquot purpureis. Tubus corollae duplo longior quam labium inferius. G.

3. **S. variegata** (Host. fl. austr. 1. 134.) *caule* suffruticoso *subtereti pubescente*, racemis verticillatis subsecundis, corymbulis axillaribus pedunculatis subtrifloris, *foliis* lanceolatis acuminatis basin versus attenuatis *utrinque glanduloso-punctatis, superioribus mucronatis, laciniis* labii inferioris corollae lateralibus retusis, *intermedia duplo latiore* subrotunda integra margine undulata, labio superiore obsolete emarginato. ♄. In montosis asperis, (in wärmern Krain u. d. Litt., Host; Fiume, Noé.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 231. Micromeria variegata Reichenb. Simillima antecedenti, sed caespitibus minus densis crescit, folia paulo angustiora, nervus medius, etiam in viva planta prominulus, et tubus corollae longitudine labii inferioris sunt; in antecedente tubus duplo longior, et labii inferioris lacinia intermedia caeteris subaequalis neque antice duplo latior est. Flores plantarum, e semine horti Vindob. eductarum, albi sunt, labio superiore dilute carneo, basi intus striolis aliquot purpureis, et labio inferiore punctis aliquot purpureis picto. Tubus corollae longitudine labii inferioris. G.

4. **S. pygmaea** (Sieb. in litt. ad Funk.) *caule* suffruticoso *quadrangulari glabro*, racemis verticillatis subsecundis, corymbulis axillaribus pedunculatis subtrifloris, *foliis* lanceolatis acuminatis basin versus attenuatis, *subtus parce glanduloso-punctatis, superioribus mucronatis,* laciniis lateralibus labii inferioris corollae retusis, *intermedia* latiore *obcordata.* ♄. In montosis rupestribus, (Krain, Fiume.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 232. S. subspicata Vis. sp. pl. dalm. p. 11. t. 4. S. illyrica Host. a. 2. p. 133. Micromeria pygmaea Reichenb. fl. exc. p. 311. Cor. violacea, maculis intense violaceis in fauce. G.

12. MICROMÉRIA (Bentham. lab. gen. et spec. p. 368.) Stam. per paria approximata. Cal. tubulosus, 13 striatus, caetera ut Satureiae. — In Micromeriis, mihi notis, quas nunc vivas examinare nequeo, calyx, accuratius inspectus, bilabiatus est, et totum genus fortasse non immerito cum Calamintha conjungatur.

1. **M. Juliana** (Benth. l. c. p. 373.) caule suffruticoso obtuse quadrangulari, floribus verticillatis, *corymbulis* verticillorum *subsessilibus* 3-5 floris *erectis densissimis fastigiatis, nucibus oblongis acuminatis mucronatis, foliis subsessilibus* pubescenti-hirtis ovatis obtusiusculis basi rotundatis margine revolutis, superioribus lineari-convolutis, floralibus erectis verticillo adpressis.

4. In locis asperis, lapidosis, (auf d. Ins. Cherso u. Osero.) Jul. Aug. Satureia Juliana L. sp. 793. D. fl. 4. p. 232. Flores purpurei. J.

2. **M. graeca** (Bentham. l. c. p. 373.) caule suffruticoso obtuse quadrangulari, floribus verticillatis, *corymbulis* verticillorum 3-5 floris *pedunculatis subsecundis, nucibus oblongis obtusis,* foliis subsessilibus pubescenti-hirtis margine revolutis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis linearibusve. 4. In locis apricis siccis et rupibus, (Gandria, Cant. Tessin.) Jun. Jul.? Satureia graeca L. sp. 794. Satureia micrantha Hoffmgg. et Lk. fl. port. 1. 142. Flores purpurei. H.

13. CALAMÍNTHA (Moench. meth. p. 408.) Cal. conspicue bilabiatus; caetera ut Satureiae.

Sect. I. Acinos Moench. meth. 407. Verticilli e pedunculis sex indivisis compositi. Calycis faux annulo pilorum obsita.

1. **C. Ácinos** (Clairvill. in Gaud. fl. helv. 4. p. 84.) verticillis sexfloris, *pedunculis indivisis,* foliis ovatis serratis, *radice simplici,* caule erecto basi ramoso, ramis adscendentibus, *calyce fructifero* apice contracto, *dentibus accumbentibus clauso.* ☉. In campis et locis incultis. Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 315. St. h. 70. C. arvensis Lam. fl. fr. 2. 394. Thymus Acinos L. sp. 826. Acinos thymoides Moench. meth. 407. A. vulgaris Pers. syn. 2. 131. Melissa Acinos Benth. lab. p. 289. Corolla dilute violacea.

2. **C. alpina** (Lam. fl. fr. 2. 394.) verticillis sexfloris, *pedunculis indivisis,* foliis ovatis serratis, *radice multicipite,* caulibus procumbentibus adscendentibus, *dentibus calycis fructiferi erecto-patulis,* fauce pilis clausa. 4. In locis subalpinis et alpinis inferioribus; cum fluviis descendens. Jul. Aug. D. fl. 4. 316. Thymus alpinus L. sp. 826. Jacq. a. t. 97. St. h. 51. Corolla dilute violacea.

Sect. II. Calamintha genuina. Verticillis e corymbis dichotomis compositi.

a. Calycis faux annulo pilorum obsita.

3. **C. grandiflora** (Moench. meth. p. 408.) verticillis corymbosis, *pedunculis dichotomis* 3-5 floris, *foliis ovatis acutis profunde et acute serratis* cauleque pilosis, nucibus subrotundo-ovalibus. 4. In locis rupestribus et sylvaticis montium et regionum subalpinarum, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, Steyermark, Krain, Litt., Istrien.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 317. St. h. 70. Melissa grandiflora L. sp. 827. Thymus grandiflorus Scop. carn. 1. 424. Flores rosei; *nuces atrae.*

4. **C. officinalis** (Moench. meth. p. 409.) verticillis corymbosis, *pedunculis dichotomis* 3-5 floris, *foliis ovatis obtusis adpresso-serratis* cauleque hirtis, fauce calycis parcius pilosa, pilis subinclusis, *nucibus subrotundis.* 4. In sylvis planitierum et montium, (Schweiz u. dch. d. Rheinfläche zerstreut bis Aachen; südl. Tyrol, Krain u. Litt.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 318. St. h. 70. C. montana *α.* Lam. fl. fr. 2. p. 396. C. menthaefolia Host. a. 2. p. 129., sec. cl. Benth., C. umbrosa Reichenb. fl. exc. p. 329., non MB., Thymus Calamintha DC. fl. fr. 3. p. 563., non Scop. Melissa Calamintha L. sp. 358. Flores purpurei, labio inferiore macula alba violaceo-punctata. *Nuces subglobosae, brunneae.*

5. **C. Népeta** (Clairvill. man. 197.) verticillis corymbosis, *pedunculis dichotomis* 12-15 floris, *foliis* subrotundo-ovatis *obtusis adpresso-serratis* cauleque hirtis, fauce calycis dense pilosa pilis emersis, *nucibus oblongis.* 4. In declivibus et convallibus calidioribus, (südl. Schweiz; Stadtmauern von Nürnberg; von Regensb. bis Oestr.; Salzb.; Tyr.; Litt.) Jul. Aug. D. fl. 4. 319. St. h. 70. C. parviflora Lam. fl. fr. 2. 396. C. trichotoma Moench. meth. 409. C. rotundifolia Host. a. 2. 131. C. obliqua Host. l. c., sec. specimen a cl. Dolliner. misso. Melissa Nepeta L. sp. 319. Thymus Nepeta Smith. brit. 642. T. Calamintha Scop. carn. 1. p. 425. Varietas humilior et glabrior est: Thymus athonicus Bernh. Melissa Nepeta *β.*

athonica Benth. lab. 387. Flores caerulescenti-purpurei. *Nuces oblongae, brunneae.*

b. Calycis faux nuda.

6. **C. thymifolia** (Reichenb. fl. exc. p. 328., non Host.) verticillis corymbosis, *pedunculis dichotomis* subquinquefloris, foliis ellipticis obtusis obsolete serratis glabris, fauce calycis glabra, *nucibus oblongis apice in mucronem angustatis.* 4. In locis rupestribus, (Krain, Görz, Kärnthen.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 320. St. h. 70. C. rupestris Host. a. 2. 131. Satureia thymifolia Scop. carn. 1. p. 428. S. rupestris Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 130. Melissa alba W. K. pl. r. h. 2. 175. t. 205. Nepeta croatica Spreng. syst. 2. 727. N. pumila Spreng. cent. sp. min. cogn. 29. Cor. alba, labio superiore dilute violaceo, inferiore violaceo-punctato. G.

14. CLINOPODIUM (Linn. gen. n. 725.) Flores involucro, e foliolis setaceis composito, verticillum totum nec singulos flores sustinente, cincti. Caetera ut Calaminthae.

1. **C. vulgare** (L. sp. 2. 821.) caulibus erectis villosis, verticillis aequalibus multifloris, involucro calycem aequante. 4. In sylvarum locis denudatis, collibus incultis, ad sepes. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 322. C. aegyptiacum Lam. dict. 2. 50., non differt. Melissa Clinopodium Benth. lab. 392. Flores purpurei.

Trib. V. *MELISSINEAE.* Bentham. lab. p. 365. Cor. bilabiata. Stam. 4, distantia, et vel superne divergentia, vel sub labio corollae superiore conniventia. Antherarum sacculi apice coniuncti, denique basi divergentes, vel ab initio fere horizontaliter divergentes, rima ambobus communi dehiscentes.

15. MELÍSSA (L. gen. n. 728.) Stam. distantia, apicibus sub labio superiori arcuato-conniventibus; antherarum sacculi apice connexi, rima dehiscentes, denique divergentes. Cor. labium superius concavum, inferius trifidum: annulus in tubo nullus. Cal. bilabiatus, supra planus, dentibus lateralibus labii superioris in carinam, per tubum decurrentem, plicatis.

1. **M. officinalis** (L. sp. 827.) herbacea, erecta, ramosa, foliis ovatis crenato-serratis, inferioribus basi subcordatis, verticillis axillaribus dimidiatis secundis, bracteis ovatis. 4. In locis sylvaticis et ad sepes, (Oestr. Litt. u. Istr.; Steyerm.; südl. Tyrol; südl. Schw.; in d. Weinbergen v. Unterelsass.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 323. St. h. 11. M. graveolens Host. a. 2. 128., sec. cl. Benth. Flores albi. Variat:

β. villosa: M. officinalis *β.* villosa Benth. lab. p. 393. M. romana Mill. dict. n. 2. M. hirsuta Hornem. hafn. 2. 562. M. cordifolia Pers. syn. 2. 132. M. altissima Sibth. et. Sm. fl. graec. t. 579., sec. Benth.

16. HORMÍNUM (L. gen. n. 730.) Stam. distantia, apicibus sub labio superiori arcuato-conniventia; antherae per paria connexae, sacculis divergentibus apice connexis, rima longitudinali communi dehiscentibus. Cor. labium superius rectum, bifidum; inferius trifidum; tubus annulo pilorum notatus. Cal. bilabiatus, dentibus lateralibus labii superioris in carinam plicatis.

1. **H. pyrenaicum** (L. sp. 831.) 4. In locis graminosis siccis alp., (Monte Calbege im C. Tessin; Wormser Joch u. d. Graubündener A.; südl. Tyrol weit verbreitet; Suchalpe in Krain; Saalfelder Kalkgebg. in Salzburg in Menge.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 328. Melissa pyrenaica Jacq. hort. vind. 2. p. 86. t. 183. Cor. violacea.

17. HYSSÓPUS (L. gen. n. 709.) Stam. distantia, superne divergentia, antherarum sacculi divergentes apice cohaerentes, rima dehiscentes. Cor. labium superius rectum, planum, bifidum; inferius trifidum, lacinia intermedia maiori, obcordata; annulus in tubo nullus. Cal. 5 dentatus.

1. **H. officinalis** (L. sp. 796.) floribus verticillato-racemosis secundis, dentibus calycis erectis subaequalibus, foliis lanceolatis integerrimis. 4. In locis apricis rupestribus, (Oestr., Krain, Litt.; südl. Tyr., hier bloss bei Rovoredo; Steyerm. bei Cilli; Unterwallis.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 233. St. h. 3. Cor. violacea.

Trib. VI. *NEPETEAE.* Benth. lab. p. 462. Cor. bilabiata. Stamina sub labio corollae superiore parallela, approximata, deflorata quandoque deflexa, superiora longiora. (Benth. l. c.) Dentes calycis fructiferi patuli vel conniventes.

18. NÉPETA (L. gen. n. 710.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela, deflorata extrorsum reflexa. Antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius planum, rectum, bifidum; inferioris lacinia intermedia rotundata valde concava; annulus in tubo nullus. Cal. tubulosus, quinquedentatus.

1. **N. Cataria** (L. sp. 796.) foliis petiolatis ovatis acutis profunde serrato-crenatis basi cordatis subtus cano-tomentosis, corymbulis pedunculatis densis multifloris, bracteis calycis tubum subaequantibus, calycis ovati pubescentis subincurvi ore obliquo, dentibus e basi lanceolata subulato-mucronatis, *nucibus laevibus glabrisque.* 4. In ruderatis circa pagos, ad vias. Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 235. Hayn. Arzngew. 4. t. 8. St. h. 84. Flor. albi, in roseum vergentes, labio inf. purpureo-punctato. Occurrit odore citri: N. citriodora Beck. fl. v. Frankf. 218.

2. **N. Nepetella** (L. sp. 797.) foliis petiolatis lanceolatis crenatis basi rotundatis cordatisve utrinque cano-pubescentibus tomentosisve, corymbulis pedunculatis multifloris, bracteis pedicello vix longioribus, *calycis* tubulosi tomentosi *incurvi ore obliquo,* dentibus e basi lanceolata subulatis, *nucibus tuberculato-scabris apice glabris.* 4. In vallibus apricis ad pedes alpium, (Wallis im Thale Tormanche u. am Matterhorn; Unteröstreich.) Jul. Aug. Gaud. helv. 4. p. 24. Cor. alba vel dilute carnea, purpureo-punctata. Occurrit porro foliis caulinis basi cordatis: N. Nepetella L. sp. 797. Sturm. h. 84. opt. Reichenb. ic. 3. f. 423. N. austriaca Host. fl. austr. 2. p. 154. N. amethystina Poir. dict. suppl. 2. 306. N. paniculata Mill. dict. n. 4. — atque foliis basi rotundatis vel subcuneatis: N. lanceolata Lam. dict. 1. 710. Sturm. h. 84. Reichenb. ic. 6. f. 805. N. angustifolia Vahl. symb. 1. 41. N. graveolens Vill. delph. 2. 366. N. arragonensis Lam. dict. 1. 703.

3. **N. nuda** (L. sp. 797.) erecta, glabriuscula, foliis cordato-oblongis crenato-serratis utrinque viridibus sessilibus, inferioribus breviter petiolatis, corymbulis pedunculatis multifloris, bracteis calyce brevioribus, *calycis* fructiferi ovati pubescentis *ore subaequali,* dentibus linearibus acutiusculis muticis, *nucibus tuberculato-scabris apice pubescentibus.* 4. In collibus incultis, ad sylvarum margines, (vom Litt. nach Steyerm., Oestr., Mähr., Böhm., Schles.; in Thüring. am Schlosse Gleichen u. bei Wandersleben; südl. Schweiz; südl. Tyrol.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 236. Jacq. a. 1. t. 24. St. h. 84. N. ucranica M. Bieb. taur. cauc. 2. 41., (non L.). Flores albi. Variat:

β. violacea, floribus dilute violaceis, punctis intense violaceis in fauce et labio inferiore: N. pannonica Jacq. a. t. 129. St. h. 84. N. paniculata Crantz. a. 270. N. violacea Vill. delph. 2. 367. — Nepeta pannonica et N. violacea L. sp. 797., sunt plantae dubiae, ut ex opere cl. Benth. p. 486. patet.

19. GLECHÓMA (L. gen. n. 714.) Stamina approximata, sub labio superiore parallela; antherae per paria in crucem dispositae, rimis dehiscentes. Cor. labium superius planum, rectum, bifidum, inferioris lacinia intermedia obcordata, plana; annulus in tubo nullus. Cal. tubulosus, 5 dentatus.

1. **G. hederacea** (L. sp. 807.) foliis crenatis reniformibus, superioribus subcordatis, verticillis 6 floris, *dentibus* calycis ovatis in aristam acuminatis *tubo triplo brevioribus.* 4. In nemoribus, ad sepes et dumeta humida, pra-

torum margines. April. Mai. D. fl. 4. p. 258. St. h. 8. Nepeta Glechoma Benth. lab. p. 485. Calamintha hederacea Scop. carn. 2. p. 423. Cor. dilute violacea, maculis intense violaceis in fauce et in basi labii inferioris. Occurrit:

β. maior, omnibus partibus duplo maior: G. hederacea *β.* maior Gaud. helv. 4. p. 46.

γ. villosa: G. heterophylla Opitz.

2. **G. hirsuta** (W. K. pl. rar. hung. 2. p. 124. t. 112.) foliis crenatis cordatis, inferioribus reniformibus, verticillis 6 floris, *dentibus* calycis lanceolatis in aristam acuminatis *tubo dimidio longioribus.* ♃. In sylvis et ad sepes, (in Unteröstr.; Cillier Kreise in Steyerm.) Mai. Jun. D. fl. 4. 259. Nepeta Glechoma *β.* hirsuta Benth. lab. 485. — Cl. Benth. hanc, et quidem non immerito, ut videtur, pro varietate G. hederaceae habet; equidem plantam vivam nondum observare potui. G.

20. DRACOCEPHALUM (L. gen. n. 729.) Stam. approximata, sub labio superiori parallela, apice antrorsum curvata; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius fornicatum; inferioris lacinia intermedia obcordata; annulus in tubo nullus. Cal. tubulosus, bilabiatus, dentatus. — Flores violacei, in varietate albi.

Sect. I. Moldavica. Antherae glabrae.

1. **D. Moldavica** (L. sp. 830.) verticillis axillaribus, *foliis lanceolatis obtuse profunde serratis* apice obtusis integerrimis, superioribus bracteisque lanceolatis acute serratis, serraturis longe mucronatis. ☉. In locis cultis, (in d. Neumark nach Rebentisch; ob bloss verwildert? Wird als Küchengewächs hin u. wieder cultivirt.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 326. G.

Sect. II. Ruyschiana. Antherae villosae.

2. **D. Ruyschiana** (L. sp. 830.) verticillis spicatis, *foliis lineari-lanceolatis indivisis integerrimis* muticis. ♃. In pascuis alpium et montium, (in d. A. v. Aelen u. Wallis gemein; südl. Tyr.; a. d. Rheingrafenfeld bei Schweinfurt; bei Kissingen; Königsberg.) Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 326. Fl. dan. t. 121.

3. **D. austriacum** (L. sp. 829.) verticillis interrupte spicatis, *foliis pinnato-quinquepartitis,* laciniis linearibus obtusis, rameis floralibusque tripartitis, laciniis foliisque supremis indivisis mucronatis. ♃. In declivibus petrosis montium et alpium, (Unteröstr. bei Petersdorf, Bertholsdorf; Böhmen bei Karlstein; Wallis am Rosé u. am Diablei.) Mai Jun. D. fl. 4. p. 326. Jacq. ic. rar. t. 112.

Trib. VII. *STACHYDEAE.* Benth. lab. p. 503. Cor. bilabiata. Stam. sub labio corollae superiore parallela, approximata, deflorata quandoque deflexa, inferiora longiora. Dentes calycis fructiferi patuli.

21. MELITTIS (L. gen. n. 731.) Stam. approximata, sub labio superiore corollae parallela, antherae per paria in crucem dispositae, rimis dehiscentes. Cor. labium superius planiusculum, rectum; inferioris lacinia intermedia obovata, plana; annulus in tubo nullus. Cal. amplus, campanulatus, lobato-bilabiatus.

1. **M. Melissophyllum** (L. sp. 832.) ♃. In sylvaticis, dumetis, (stellenw. dch. d. südl. u. mittlere Geb. bis z. Harze.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 329. Schk. t. 166. Jacq. a. t. 26. Cor. purpurea, vel albo et purpureo variegata, vel tota alba. M. grandiflora Sm. brit. p. 644., calyce 4 dentato, non differt; calyx 3, 4 et 5 dentatus, non raro in uno caule, observatur.

22. LAMIUM (L. gen. n. 716.) Stam. approximata, sub labio superiore corollae parallela; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius fornicatum; labii inferioris laciniae laterales minimae, dentiformes, vel nullae. Annulus pilorum in tubo corollae, (rarius deficiens.)

Sect. I. Orvala Benth. lab. 508. Corollae tubus rectus, intus transverse annulato-pilosus. Antherae glabrae.

1. **L. Orvala** (L. sp. 808.) foliis lato-ovatis acuminatis basi truncatis cordatisve subvillosis duplicato-profunde serratis, tubo corollae recto, basi intus piloso-annulato, margine faucis antice dente utrinque bi-trifido, *antheris glabris*. 4. In collibus herbidis inter virgulta, ad sylvarum oras et sepes, (Litt., Kärnthen, Krain, Untersteyerm., südl. Tyr.) Apr. Mai. D. fl. 4. p. 261. L. pannonicum Scop. carn. 1. 406. Orvala lamioides DC. fl. fr. 3. p. 539. — Varietas monstrosa fol. laciniato-incisis: Orvala garganica L. sp. 807. Papia Mich. gen. t. 17. Cor. purpurea, tubo albo. G.

Sect. II. Lamiopsis Dumort. fl. belg. 45. Cor. tubus rectus, intus nudus. Antherae barbatae.

2. **L. amplexicaule** (L. sp. 809.) *foliis inaequaliter* obtuse crenatis, inferioribus cordato-ovatis subrotundisve petiolatis, superioribus sessilibus amplexicaulibus sublobatis, corollae tubo recto intus exannulato, *dentibus calycis ante et post anthesin conniventibus*, antheris barbatis. ☉. In locis cultis ubique. Floret per totum fere annum, vere autem et autumno clandestine. D. fl. 4. p. 268. Schk. t. 159. Planta vernalis corollas habet imperfectas, tamen flores fertiles sunt. Reichenb. ic. 8. f. 950. Corolla purpurea ut duarum subsequentium.

3. **L. intermedium** (Fries. novit. fl. suec. ed. 2. p. 192.) *foliis inaequaliter obtuse crenatis*, inferioribus cordato-ovatis subrotundisve petiolatis, *superioribus reniformi-cordatis, supremis* brevissime petiolatis *petiolo dilatato*, tubo corollae recto aequaliter cylindrico intus exannulato, dentibus calycis post anthesin patentibus, antheris barbatis. ☉. In locis cultis, (bei Varel im Oldenb., Boeckler; bei Hamburg, Sonder.) Mart.-Oct. Flores purpurei. G.

4. **L. incisum** (Willd. sp. 3. p. 89.) *foliis inaequaliter inciso-crenatis*, inferioribus cordato-ovatis vel subrotundis petiolatis, *superioribus* ovatis subrhombeis breviter petiolatis, *petiolo dilatato*, tubo corollae recto aequaliter cylindrico intus exannulato, dentibus calycis post anthesin patentibus, antheris barbatis. ☉. In locis cultis, (Westphalen, Mecklenb., Schweiz.) Floret cum praeced. D. fl. 4. p. 266. Reichenb. ic. f. 370, 371. L. dissectum With. brit. p. 527. L. hybridum DC. fl. fr. 3. 541. L. purpureum β. hybridum Vill. delph. 2. 385. L. hybridum et dissectum Reichenb. fl. exc. p. 321. L. westphalicum Weihe bot. Ztg. — Anglica planta sec. descriptionem b. Smith. et cl. Babingt. tubum intus exannulatum habet. An igitur planta cl. Benthamii, quae tubo intus piloso-annulato describitur, ad varietatem decipientem L. purpurei pertinet?

Sect. III. Lamiotypus Dumort. fl. belg. 45. Corollae tubus supra basin curvatus, sub curvatura angustior, (in Lamio purpureo quandoque rectus,) intus transverse vel oblique annulato-pilosus. Antherae barbatae.

5. **L. purpureum** (L. sp. 809.) foliis ovato-cordatis *inaequaliter crenato-serratis petiolatis, petiolis omnibus aequilatis*, tubo corollae supra basin paulum curvato sub curvatura angustiore intusque piloso-annulato, *fauce utrinque denticulis duobus* notata, superiore subulato, dentibus calycis post anthesin patentibus, antheris barbatis. ☉. In locis cultis ubique. Mart.-Oct. D. fl. 4. 265. Fl. dan. t. 523. Flores purpurei. Variat:

β. *decipiens*, folia inaequaliter inciso-crenata, fere ut in antecedente, sed longiora ratione latitudinis et tubus corollae intus piloso-annulatus ut in illa: L. purpureum β. decipiens Sonder in litt.

6. **L. maculatum** (L. sp. 809.) foliis ovato-cordatis acuminatis inaequaliter serratis, *tubo corollae curvato* supra basin ventricoso-dilatato *infra dilatationem constricto* et intus piloso-annulato, *strictura annuloque transversis*, margine faucis utrinque dente subulato notato, antheris barbatis. 4. Ad margines sylvarum subhumidos, vias, dumeta. April-autumn. D. fl. 4. 263. L. album β. Pollich. pal. 2. 142. L. vulgatum α. rubrum Benth. lab. 514. L. rubrum Wallr. sched. 300. L. rugosum Ait. kew. 2. 296., secund. Benth.

L. maculatum Reichenb. ic. 3. f. 215., forma foliis vitta alba notatis; L. laevigatum Reichenb. l. c. f. 216., forma vulgaris, foliis subtriangulari-cordatis; L. rugosum Reichenb. l. c. f. 217., forma foliis magis ovatis. — L. laevigatum L. sp. 808., secund. Benth., qui propter hoc et L. maculatum herbar. Linn. inspexit, non differt. — Flores purpurei, labium inferius lilacinum, maculis purpureis; rarius dilute rosei sunt.

7. **L. album** (L. sp. 809.) foliis ovato-cordatis acuminatis inaequaliter serratis, *tubo corollae curvato* supra basin cum crena dilatato *sub crena constricto* et intus piloso-annulato, *strictura annuloque oblique adscendentibus*, marginibus faucis denticulis tribus minutis longioreque subulato notatis, antheris barbatis. ♃. Ad sepes, muros, nemorum oras. April. Mai. D. fl. 4. p. 262. St. h. 8. L. vulgatum *β.* album Benth. lab. 514. Flores albi, labiis ochroleucis, inferiore basi maculis pallide olivaceis picto.

23. GALEÓBDOLON (Hudson. fl. angl. 258.) Stam. approximata, sub labio corollae superiore parallela; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius fornicatum; labii inferioris laciniae omnes acutae. Annulus pilorum in tubo corollae.

1. **G. luteum** (Huds. l. c.) ♃. In sylvis et dumetis subhumidis. Mai. Jun. D. fl. 4. p. 269. Engl. bot. t. 787. G. vulgare Pers. syn. 2. 122. Galeopsis Galeobdolon L. sp. 810. Lamium Galeobd. Crantz. a. p. 202. Pollichia Galeobd. Willd. prodr. 4. 613. Leonurus Galeobd. Scop. carn. 1. p. 409. — Cor. flava, labii inf. lobo medio toto et lateralibus basi vitellinis, maculis fuscescentibus. Specimina fol. superioribus lanceolatis: G. vulgare *β.* montanum Pers. l. c.

24. GALEÓPSIS (L. gen. n. 717.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela; antherae valvulis duabus dehiscentes. Cor. labium superius fornicatum; inferius basi utrinque dente acuto cavo notatum; laciniа intermedia obtusa vel emarginata. — Antherarum sacculis, valvula dehiscentibus, Galeopsidis genus ab omnibus labiatarum generibus discedit.

1. **G. Ládanum** (L. sp. 810.) *caule pilis* deorsum adpressis *mollibus pubescente* sub geniculis non incrassato, *foliis lanceolatis vel ovato-lanceolatis* serratis subintegerrimisque, labio corollae superiore leviter denticulato. ☉. Inter segetes. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 270. St. h. 62. *Cor. purpurea,* area ochroleuca purpureo-maculata in basi labii inferioris. Occurrit:

α. latifolia, folia oblongo- vel rarius ovato-lanceolata vel ovata, remote obtusiuscule serrata, basi apiceque integerrima: G. Ladanum *α.* latifolia Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 190. G. latifolia Hoffm. D. fl. 2. 8. G. Ladanum Reichenb. fl. exc. p. 322.; occurrit quoque tubo corollae calyce duplo longiore et eundem acquante; praeterea

β. latifolia parviflora, eadem ac antecedens, sed corolla plus dimidio minor: G. intermedia Vill. delph. 2. 387. t. 9. Reichenb. ic. f. 99. G. parviflora Lam. dict. 2. 600.

γ. canescens, folia paulo angustiora, serraturis paucioribus notata; bracteae apice saepe reflexae; caulis superne et calyces pilis brevibus patentibus dense tecti, sed pili glanduliferi nulli vel paucissimi: G. canescens Schult. obs. p. 108. MB. taur. cauc. 3. 397. G. grandiflora Bl. et Fing. comp. 2. 26., (non Roth.)

δ. angustifolia, folia angustius lanceolata vel lineari-lanceolata, dentibus paucis remotis in margine instructa et saepe integerrima, calycis dentes, uti bracteae, angustiores, reflexi, et pili omnes adpressi: G. angustifolia Ehrh. herb. 137. Hoffm. D. fl. 2. 8. G. Ladanum *β.* angustifolia Wimm. et Grab. fl. sil. 2. 190. St. h. 62. Corolla magnitudine corollae var. *α.*; sed non raro quoque occurrit

ε. angustifolia parviflora, corollis duplo triplove minoribus.

2. **G. ochroleuca** (Lam. dict. 2. p. 600.) *caule pilis* deorsum adpressis *mollibus pubescente* sub geniculis non incrassato, *foliis* serratis, *caulinis*

ovatis, ramorum ovato-lanceolatis, corollae labio superiore inciso-denticulato. ⊙. Inter segetes et in campis arenosis incultis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 272. St. h. 62. G. cannabina Pollich. palat. 2. 149., (a b. Rothio male ad G. versicolorem relata,) G. villosa Huds. ang. 256., (nomen pessimum, planta enim villosa non est.) G. grandiflora Roth. tent. fl. germ. 1. 254. G. segetum Reichard. fl. moeno-francof. 2. p. 8. G. dubia Leers. herb. p. 133. *Cor.* duplo maior, quam in varietate grandiflora antecedentis, *ochroleuca*, area sulphurea in basi labii inferioris. — G. prostrata Vill. habet caulem prostratum assurgentem et folia pilis densis longis accumbentibus sericea, Sonder. Haec a botanicis regionum australiorum denuo quaerenda et ulterius observanda.

3. **G. Tetrahit** (L. sp. 810.) *caule hispido* sub geniculis incrassato, foliis oblongo-ovatis acuminatis, *tubo corollae calycem aequante vel breviore, lacinia intermedia labii inferioris subquadrata plana* crenulata obtusa vel leviter emarginata. ⊙. Inter segetes, in ruderatis, ad vias. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 273. St. h. 62. Cor. dilute purpurea vel alba, area sulphurea purpureo-maculata ad basin labii inferioris. Variat floribus dimidio minoribus.

4. **G. bifida** (v. Bönninghausen. fl. monast. prodr. p. 178.) *caule hispido* sub geniculis incrassato, foliis oblongo-ovatis acuminatis, *tubo corollae calycem non aequante, lacinia intermedia labii inferioris oblonga* integerrima apice emarginata *serius margine revoluta*. ⊙. Inter segetes et ad vias. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 274. St. h. 62. Bracteae verticillorum infimae saepissime auctae et foliiformes, Alex. Braun. Cor. parva, rosea, lacinia media labii inferioris intensius purpurea vel violacea, margine albido cincta, et basi maculis 2 flavis picta. Cum cl. a Bönningh hanc ab antecedente separavi; an sit huius varietas nec ne, ulterius inquirendum est, caeteras autem huius generis species, hic propositas, bonas species esse iudico.

5. **G. versicolor** (Curt. lond. f. 6. t. 38.) *caule hispido* sub geniculis incrassato, foliis oblongo-ovatis acuminatis, *tubo corollae calycem bis superante*, lacinia media labii inferioris subrotundo-quadrata plana crenulata obtusa vel emarginata. ⊙. In nemoribus, glareis fluviorum, ad fossas, (in Böhm., Schles., u. d. nördl. D.; auch in d. Voralp. v. Bayern, Salzb. u. Oestr.; Steyerm., Unterengadin in d. Schweiz.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 275. St. h. 62. G. cannabina Roth. tent. 1. p. 254. (non Pollich.) G. Tetrahit β. L. sp. 819. Cor. magna, sulphurea; tubus inferne albus, labium inferius basi citrinum, laciniis lateralibus a medio albis, intermedia violacea albido-marginata. Variat corollis unicoloribus luteis; conf. Mey. chl. hannov. p. 296.

6. **G. pubescens** (Bess. prim. fl. galic. 2. p. 27.) *caule pube deorsum adpressa molli tecto sub geniculis hispido et subincrassato*, foliis lato-ovatis acuminatis, inferioribus subcordatis, tubo corollae calyce longiore, lacinia media labii inferioris subquadrata plana crenulata leviter emarginata. ⊙. In agris et ad vias, (im grössern Theile v. D. u. d. Schw.; fehlt aber in d. mittl. u. untern Rheingegend, in Westphalen, Hannover u. Mecklenb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 276. St. h. 62. G. Walterina v. Schlechtend. fl. ber. p. 320. G. cannabina Gmel. bad. 2. p. 623. (non Pollich.) G. versicolor Spenn. fr. 2. 394. Cor. plerumque saturate purpurea, in basi labii inferioris dilutior ibidemque purpureo-maculata; tubus albidus superne fuscescenti-lutescens, qua ultima nota ab omnibus facile dignosci potest. — Galeopsis mollis Tausch. pl. select. videtur G. pubescentis varietas pilis caulis patulo-reflexis.

25. STACHYS (L. gen. n. 719.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela, simplicia, deflorata contorta et extrorsum reflexa, antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum; inferioris lacinia intermedia obovata vel obcordata. Annulus pilorum in tubo corollae. Nuces rotundato-obtusae.

Sect. I. Eriostachys Benth. lab. 535. Verticilli multiflori. Bracteae calycem dimidium vel totum aequantes. Flores purpurei.

1. **S. germanica** (L. sp. 812.) verticillis multifloris, *caule* erecto dense *lanato-villoso* pilis simplicibus, *foliis* petiolatis ovato-cordatis crenatis lanato-*tomentosis*, *superioribus* sessilibus angustioribus *lanceolatis*, dentibus calycis ovatis acuminatis mucronatis pungentibus. ☉. In locis incultis, asperis, ad vias, solo calcareo. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 282. Jacq. a. t. 319. St. h. 83. S. lanata Crantz. a. p. 267., non Jacq. S. polystachya Ten. neap. t. 53. syllog. p. 290. sec. specimen ab auctore in collectione Martii. (cl. Tenorius S. germanicam describit dentibus calycis obtusis et inermibus; talis vero species in Germania non crescit.). — S. biennis Roth. cat. bot. 1. 68., non differt.

2. **S. italica** (Miller. dict. n. 3.) *verticillis multifloris, caule* erecto *lanato-tomentoso, foliis* petiolatis crenulatis *tomentosis*, caulinis oblongis basi rotundatis subcordatisve, infimis in petiolum attenuatis, *superioribus* sessilibus *subtriangulari-ovatis*, dentibus calycis lanceolatis acuminatis spinuloso-mucronatis. ♃. In locis asperis, (Istr., Biasol.! Fiume, Noé.) Jul. Aug. S. salviaefolia Tenor. fl. neap. prodr. 34., syllog. p. 291. Koch. syn. ed. 1. p. 568. St. h. 83. D. fl. 4. 484. J.

3. **S. alpina** (L. sp. 812.) *verticillis multifloris, caule* erecto *hirsuto superne glanduloso-piloso*, foliis petiolatis ovato-cordatis acutis serratis, dentibus calycis ovatis obtusiusculis mucronatis. ♃. In sylvis mont. altiorum et reg. subalp., (dch. d. A. K.; a. d. Gebirgen v. Böhm., Schles., bei Herborn in Nassau, a. d. Hesselberg in Frank., in der Eifel.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 284. St. h. 51. Cor. obscure purpurea, in brunneum vergens.

Sect. II. Stachyotypus Benth. lab. 541. Verticilli 2-6 flori. Bracteae minutae. Flores purpurei.

4. **S. sylvatica** (L. sp. 811.) *verticillis* 6 *floris, caule* erecto hirsuto *superne ramoso et glanduloso-piloso, foliis* petiolatis *lato-ovatis cordatis acuminatis* serratis hirsutis, dentibus calycis e basi triangulari subulatis mucronatis, corollis calyce duplo longioribus, *stolonibus subterraneis aequilatis* apice non incrassatis. ♃. In locis nemorosis et sylvaticis subhumidis. Jun.-Aug. D. fl. 4. p. 285. Tabern. 921. f. 5. St. h. 84. Flor. brunneo-purpurei, labio inferiore striis flexuosis albidis variegato. Tubus corollae ab annulo piloso ad faucem aequilatus.

5. **S. ambigua** (Smith. in engl. bot. t. 2089.) verticillis 6 floris, caule erecto hispido pilis deorsum flexis, *foliis petiolatis e basi cordata lanceolatis* vel ovato-lanceolatis *acuminatis* serratis, dentibus calycis e basi triangulari subulatis mucronatis, corollis calyce duplo longioribus, *stolonibus subterraneis apice clavato-incrassatis*. ♃. In locis nemorosis humidis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 286. St. h. 84. Media quasi inter antecedentem et sequentem. Corolla sequentis, sed obscurius colorata, tubus ab annulo piloso versus faucem sensim paulo latior.

6. **S. palustris** (L. sp. 811.) verticillis 6-12 floris, caule erecto simplici hispido vel pilis deflexis hirto, *foliis e cordata basi lanceolatis acutis crenato-serratis pubescentibus*, inferioribus breviter petiolatis *superioribus sessilibus semiamplexicaulibus*, dentibus calycis e triangulari basi subulatis mucronatis, corollis calyce duplo longioribus, *stolonibus subterraneis apice clavato-incrassatis*. ♃. Ad ripas, in pratis paludosis et agris humidis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 286. St. h. 18. Corolla purpurea, labio inferiore lineolis albis flexuosis picto.

7. **S. arvensis** (L. sp. 814.) verticillis 6 floris caule hispido basi ramoso, ramis adscendentibus, *foliis* petiolatis *ovato-cordatis obtusis* crenatis sparsim pilosis, *floralibus* sessilibus ovato-oblongis *aristatis*, *calycibus corollam subaequantibus*, dentibus lanceolatis mucronatis. ☉. In locis cultis, (sehr zerstreut dch. D. u. d. Schw.) Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 291. St. h. 84. Glechoma Marrubiastrum Vill. delph. 2. 371. Trixago cordifolia Moench. meth. 398. Corolla dilute purpurascens.

Sect. III. Pseudo-sideritis. Verticilli 2-6 flori Bracteae minutae. Flores ochroleuci.

8. **S. annua** (L. sp. 813.) verticillis 4-6 floris, caule a basi ad apicem

ramoso superne pubescente, *foliis* glabris petiolatis crenato-serratis, inferioribus *ovali-oblongis, floralibus lanceolatis acuminatis* integerrimis *breviter mucronatis,* calycibus villosis, dentibus tubo corollae brevioribus lanceolatis mucronato-subulatis, mucrone ad apicem fere pubescente. ⊙. Inter segetes solo calcareo et argillaceo, (fast dch. d. g. Geb.) Jul.-autumn. D. fl. 4. p. 290. Jacq. a. t. 360. St. h. 84.

9. **S. maritima** (L. mant. 82.) verticillis sex- et plurifloris, caulibus adscendentibus superne foliisque superioribus tomentoso-villosis, *foliis* petiolatis *ovali-oblongis* crenatis obtusis in petiolum attenuatis, *floralibus ovato-oblongis obtusis* subapiculatis integerrimis *inermibus*, calycibus tomentoso-villosis, dentibus tubum corollae superantibus ovato-lanceolatis acuminatis ad apicem usque pubescentibus, 4. In littore maris adriatici, (bei Monfalcone, Triest u. in Istrien.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 288. Jacq. h. vind. t. 70. St. h. 84. G.

10. **S. recta** (L. mant. 82.) verticillis sex-decemfloris caulibus erectis adscendentibusve foliisque hirtis, foliis oblongis lanceolatisve basi attenuatis inferioribus petiolatis, omnibus crenatis, *floralibus superioribus ovatis acuminatis integerrimis aristatis,* calycibus hirsutis, dentibus triangularibus acuminatis mucrone glabro terminatis corollae tubum subaequantibus. 4. In montosis asperis inter virgulta. Jun.-autumn. D. fl. 4. p. 288. Jacq. a. t. 359. St. h. 84. S. Betonica Scop. carn. 1. p. 411. S. Sideritis Vill. delph. 2. 375. S. procumbens Lam. fl. fr. 2. 385. S. bufonia Thuill. par. 2. 1. p. 295.

11. **S. subcrenata** (Visiani Regensb. bot. Ztg. 1829. 1. Ergbl. p. 15.) verticillis 6-10 floris, caulibus diffusis vel adscendentibus speciminum majorum ramosissimis foliisque sparsim pilosis, *foliis caulinis oblongis lanceolatisve remote crenatis integerrimisve* basin versus attenuatis, inferioribus petiolatis, *rameis linearibus integerrimis vel parce crenatis, superioribus floralibus ovatis acuminatis integerrimis mucronatis,* calyce hirto, dentibus triangulari-acuminatis mucrone glabro terminatis tubum corollae subaequantibus. 4. In rupestribus locisque incultis, arvis, (Fiume, Veglia, Cherso.) Jul. Aug. S. ramosissima Rochel. bannat. p. 3. et 26., (nomen absque descriptione.) Specimina a cl. Bartling. inter Fiume et Kamenjak lecta exacte conveniunt cum speciminibus Stachydis ramosissimae Rochel, ab ipso auctore acceptis, et non differunt a speciminibus dalmaticis, quae ex manu b. Neumajeri habeo, nisi calycibus minoribus, nota in hoc ordine saepe ludente. Ab his differt Stachys fragilis Visian., (conf. Regensb. bot. Ztg. v. 12. Beibl. p. 14.,) caule erecto et bracteis ovato-cordatis cum bracteolis canescentibus. G.

26. BETONICA (L. gen. n. 718.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela; antherarum sacculi divergentes vel subparalleli, rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum, inferioris lacinia intermedia obtusa; annulus in tubo nullus. Nuces rotundato-obtusae. Cal. 5 dentatus.

1. **B. officinalis** (L. sp. 810.) foliis e cordata basi ovato-oblongis ovatisve hirsutis glabrisve, *calyce avenio,* corolla extus dense puberula, labiis divergentibus, superiore oblongo-ovato integerrimo crenato emarginatove serius reflexo, *staminibus labium dimidium non attingentibus.* 4. In pratis, ericetis, sylvis denutatis. Jun.-Aug. D. fl. 4. 277. Schk. t. 160. Flores purpurei. Variat:

α. hirta, caule hirto, calycibus hirsutis: B. hirta Leyser. fl. halens. p. 109., Reichenb. ic. 8. f. 953.

β. glabrata, caule calycibusque glabris: B. officinalis Leyser. fl. halens. p. 108. Spreng. s. veg. 2. 738., et Reichenb. ic. 8. f. 952. Haec varietas crescit in pratis turfosis. Occurrit etiam haec forma, sed rarissime, tubo corollae longitudine calycis.

γ. stricta, maior, hirsutior, foliis latioribus: B. stricta Ait. kew. 2. 299. Reichenb. ic. 8. f. 954. Haec copiose in subalpinis provenit.

δ. latifolia, robustior, foliis latioribus, spica densa: B. incana Reichenb. ic. 8. f. 955. Haec cultura orta est. Labium superius emarginatum, in hac varietate ne in unica quidem spica constans, in caeteris quoque varietatibus non raro observatur.

Praeterea omnes varietates, supra memoratae, obveniunt spica dense congesta, et, verticillis remotis, interrupta, atque in campis sylvisque nullibi limites reperiuntur. Forma hirta verticillis interruptis: B. serotina Host. fl. a. 2. p. 165. Praeter has notas tam in planta sylvestri exsiccata, quam in viva culta, nullum discrimen detegere potui.

2. **B. hirsuta** (L. mant. 2. 248.) foliis e basi cordata oblongis obtuse crenatis hirsutis, *calycibus reticulato-venosis*, corollis pube rara adspersis, labio superiore glabro porrecto antice latiore obtusissimo vel leviter emarginato, *staminibus labium subaequantibus.* ♃. In montosis, (in d. Walliseralpen an manchen Orten in Menge; in Krain, Host; ich habe von letzterem Orte noch kein Exemplar gesehen; südl. Tyrol auf der A. Neva seconda in Primiero, im Thal della Cima del Frate in Giudicarie.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 280. Reichenb. ic. 8. f. 956. B. densiflora Benth. lab. 532. B. Monnieri Gouan. ill. 36. B. danica Mill. dict. n. 2., sec. cl. Benth. B. incana Ait. kew. 2. 293., sec. eund. auct. Cal. duplo longior, quam in antecedente, 5-6 lineas longus, et, praecipue in planta exsiccata, reticulato-venosus. Corolla purpurea.

3. **B. Alopecuros** (L. sq. 811.) foliis e cordata basi lato-ovatis profunde crenatis hirsutis, calyce superne reticulato-venoso, *corolla glabra, labiis externe villoso-barbatis*, superiore in apicem bilobum angustato, staminibus dimidium labium non attingentibus. ♃. In pascuis alpium, (Cant. Tessin, Tyrol, Salzb., Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 281. Reichenb. ic. 8. f. 951., mala; Jacq. a. t. 78. bona, labii superioris figura bene expressa est. Corollae pallide flavae, in virescentem vergentes.

27. SIDERÍTIS (L. gen. n. 712.) Stamina cum stylo in tubo corollae abscondita, antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Annulus pilorum interruptus ad insertionem staminum. Calycis fructiferi dentes patuli. Nuces apice rotundato-obtusae.

Sect. I. Eusideritis. Folia floralia bracteiformia, flores amplectentia, margine spinoso-dentata. Calyx 5 dentatus, dentibus aequalibus. Suffrutices vel frutices.

1. **S. scordioides** (L. sp. 803.) suffruticosa, hirsuta vel subglabra, caulibus adscendentibus, *foliis* ovatis oblongis vel oblongo-linearibus basi angustatis inciso-crenatis subintegerrimisque, inferioribus muticis, superioribus mucronatis, *floralibus lato-ovatis spinoso-dentatis.* ♃. In montibus apricis reg. calid., (bisher bloss am Thoiry u. Dole im Jura.) Jul. Aug. S. hyssopifolia Gaud. helv. 4. p. 29. S. scordioides Benth. lab. p. 578. Cl. auctor coniungit S. scordioidem et S. hyssopifoliam L., ut varietates, et septem formas diversas cum multis synonymis clare distinguit. Cor. flava. H.

Sect. II. Hesiodia Benth. lab. 582. Folia floralia caulinis subconformia, at minora, subdentata, dentibus muticis. Cal. bilabiatus. Herbae annuae.

2. **S. montana** (L. sp. 802.) herbacea, radice simplici, foliis lanceolatis in petiolum attenuatis antice serratis, *calycibus corolla longioribus, labio* calycis *superiore trifido.* ☉. In arvis et vineis, (Oestr.; bei Hornburg u. Ebersrode im Geb. d. Flor. v. Halle.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 240. Jacq. a. t. 434. St. h. 4. Cor. primum concolor citrina, mox vero margine fusca, denique tota labia fusca. G.

3. **S. romana** (L. sp. 802.) herbacea, radice simplici, foliis elliptico-lanceolatis in petiolum attenuatis antice serratis, calycibus corollam aequantibus, *labio calycis superiore ovato indiviso*, inferiore quadridentato. ☉. In agris et ad littus maris, (Istrien, Veglia u. Cherso.) Jul. Aug. D. fl. 4. 241. Moris. s. 11. t. 12. f. 5. Cor. alba, labium superius quandoque colore roseo fucatum. J.

28. MARRUBIUM (L. gen. n. 721.) Nuces apice plano triangulari truncatae. Caetera ut Sideritidis. — Flores omnium albi.

1. **M. peregrinum** (L. sp. 810.) *caule ramosissimo*, ramis divaricatis, foliis cano-tomentosis infra reticulato-venosis, infimis ovatis obtusis crenatis, superioribus oblongo-lanceolatis crenato-serratis postice integerrimis, *verticillis sex-pluriflоris subfastigiatis*, calycibus 5-10 dentatis, *dentibus* bracteisque subulatis *tomentosis*. 4. In locis incultis, ruderatis, aggeribus, ad vias, (Oestr.; bei Erdeborn im Geb. der Flor. v. Halle.) Jul. Aug. D. fl. 4. 295. M. pauciflorum Wallr. sched. p. 295. Occurrit:

α. latifolium, folia latiora, tomentum paulo laxius, mucro dentium calycis longius denudatus, calyces plerique inter dentes maiores minoribus instructi: M. peregrinum *α.* L. sp. 815. M. peregrinum Willd. sp. 3. 110. Spr. hal. t. 6. f. 1. M. paniculatum Desr. in Lam. dict. 3. 716. Reichenb. ic. 2. f. 176. M. remotum Kit. in Schult. oestr. Fl. 2. 161. M. pannonicum Reichenb. fl. exc. 1. 325. Benth. lab. p. 590. M. affine Host. a. 2. 172., non Hornem. — Calyces in verticillis superioribus fere semper 5 dentati, nec 10 dentati.

β. angustifolium, folia in superiore parte caulis et ramorum angustiora, acutiora, remotius serrata, tomentum densius, praecipue in calycibus et in eorum dentibus longius adscendens: M. peregrinum *β.* L. sp. 816. M. peregrinum Jacq. a. t. 160. Benth. lab. p. 590. M. creticum Mill. dict. n. 3. Spr. hal. t. 6. f. 2. Reichenb. ic. 3. f. 461. G.

2. **M. candidissimum** (L. sp. 816., secund. cl. Benth., qui herbarium Linn. inspexit.) *caule* albo tomentoso *basi ramoso, ramis* adscendentibus *simplicibus*, foliis tomentosis subtus reticulato-venosis, inferioribus lato-ovatis inaequaliter crenatis, superioribus ovalibus crenato-serratis, *verticillis* multifloris *subglobosis*, calycibus 5-dentatis, *dentibus* bracteisque subulatis *tomentosis*. 4. In locis incultis asperis, (im Littorale bei Triest, Duino u. in Istrien.) Jul. Aug. M. incanum Desrouss. in Lam. dict. 3. 716. D. fl. 4. p. 297. M. peregrinum Reichb. ic. 4. f. 485., non Linn. M. supinum Scop. carn. 1. 414. Nomen M. candidissimi nunc anteposui, quum cl. Bentham., ut supra dictum est, herbarium Linnaeanum inspexerit; sed nunc quoque synonymon Dillenii „hort. elth. p. 218. t. 174." in systemate naturae, utpote ad aliam speciem pertinens, delendum et huic speciei synon. Dill. p. 219. t. 174., per errorem ad M. peregrinum allatum, subiungendum est. G.

3. **M. vulgare** (L. sp. 816.) caule albo-tomentoso basi ramoso, ramis adscendentibus simplicibus, foliis ovatis in petiolum decurrentibus inaequaliter crenatis tomentosis rugosis subtus reticulato-foveolatis, inferioribus cordato-subrotundis, verticillis multifloris subglobosis, calycibus 10 dentatis, *dentibus* bracteisque subulatis villosis *a medio glabris apice uncinato-revolutis*. 4. In campis arenosis, ruderatis, ad vias, muros, (in mehreren Gegenden gemein, in andern gar nicht.) Jul.-Sept. D. fl. 4. p. 298. Varietas foliis densius lanatis secundum cl. Benth. est: M. apulum Tenor. fl. neap. t. 154.

29. BALLÓTA (L. gen. 720.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela, simplicia, deflorata recta; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum; labii inferioris lacinia intermedia obcordata. Annulus pilorum in tubo corollae. Nuces rotundato-obtusae.

1. **B. nigra** (L. sp. 814.) foliis ovatis, calyce 5 dentato, dentibus ovatis aristatis. 4. In campis arenosis, ad vias, ruderata. Jun.-Aug. B. nigra Benth. lab. 597. Flores violacei, rarius albi. Variat pilis brevioribus, in caule deorsum curvatis, et longioribus rectis, hirta atque hirsuta, nec non

α. foetida, calycis dentes lato-ovati, in aristam terminati, dentem aequantem vel breviorem: B. foetida Lam. dict. 1. 357. D. fl. 4. p. 293. B. nigra Sm. brit. 635. Eadem floribus albis: B. alba L. sp. 814. Modificatio

huius varietatis, cuius arista in dentibus calycis dente ipso brevior est: B. borealis Schweigg. Reichenb. ic. 8. f. 1042.; si dentem subaequat: B. foetida Reichenb. ic. 8. f. 1041. Huius forma pilis caulis rectis patentibus: B. hirta hort. berol.

β. ruderalis, calycis dentes ovati, in aristam dente longiorem terminati: B. ruderalis Fries. fl. hall. p. 101. nov. ed. 2. p. 194. B. nigra Reichenb. ic. f. 1039. B. vulgaris Hoffmsgg. et Link. fl. port. t. 115. Modificatio huius varietatis dentibus angustioribus: B. urticifolia Ortmann. ap. Reichenb. ic. 8. f. 1040.; in speciminibus autem, ab auctore ipso collectis, quae examinavi, dentes calycis evidenter latiores sunt, quam in icone citata.

30. LEONÚRUS (L. gen. n. 722.) Stam. approximata, sub labio superiori parallela, simplicia, deflorata contorta et extrorsum reflexa; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum; inferioris laciniae obtusae, plerumque in unam acutam revolutae. Annulus pilorum in tubo corollae. Nuces plano triangulari truncatae.

1. **L. Cardiaca** (L. sp. 2. 817.) foliis inferioribus palmato-quinquefidis inciso-dentatis, superioribus integerrimis trilobis basi cuneatis, calycibus glabris, labio corollae inferiore in laciniam oblongam revoluta. 4. In ruderatis, ad vias. Jul. Aug. D. fl. 4. 299. St. h. 9. Cor. purpurea, labio inferiore medio ochroleuco et macula lutea purpureo-punctata praedito. Laciniae labii inferioris, corolla vix explicata, in unam acutam sese convolvunt.

31. CHAÏTÚRUS (Host. synops. fl. austr. p. 331.) Nuces apice plano triangulari truncatae; caetera ut Betonicae.

1. **C. Marrubiastrum** (Reichenb. fl. excurs. p. 317.) ☉. In ruderatis, ad vias, (in Steyerm. u. Oestreich u. v. da dch. Mähr., Böhm., Schles., Brandenb. u. Sachs. nach Holst. u. d. nördl. Hannover; Ostheim im Oberelsass.) Jul. Aug. D. fl. 2. 301. St. h. 84. Leonurus Marrubiastrum L. sp. 817. Jacq. a. t. 405. Flores rosei.

32. PHLOMIS (L. gen. n. 723.) Stam. approximata, sub labio superiori corollae parallela, basi adnata et sub adnata basi appendiculata; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius fornicatum; labii inferioris lacinia intermedia obcordata. Annulus pilorum in tubo corollae.

1. **P. tuberosa** (L. sp. 819.) fol. radicalibus ovatis basi profunde cordatis crenatis, floralibus oblongo-lanceolatis, bracteis subulatis hispidis, tubo calycis cauleque glabris. 4. In locis sylvaticis, ad vias, (Oestr., Mähr.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 301. Schk. t. 163. Flores purpurei. G.

Trib. VIII. *SCUTELLARINEAE*. Benth. lab. p. 416. Cor. bilabiata. Stam. sub labio corollae superiore parallela, approximata. Cal. bilabiatus, labio superiore integro vel breviter tridentato; fructifer labiis incumbentibus complanato-clausus.

33. SCUTELLARIA (L. gen. n. 734.) Stam. approximata, sub labio superiore parallela, apice antrorsum curvata; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Corollae labium superius concavum, trifidum; inferius indivisum; annulus in tubo nullus. Cal. bilabiatus, labiis integris, squama concava pone labium superius; fructifer apice compresso-clausus.

Sect. I. Lupulinaria Benth. lab. 120. Bracteae saepe membranaceae. Flores tetragono-spicati vel aequaliter subracemosi, nec secundi.

1. **S. alpina** (L. sp. 834.) caule procumbente, foliis subsessilibus vel breviter petiolatis ovatis serrato-crenatis concoloribus, *bracteis membranaceis imbricatis, spicis tetragonis*. 4. In alpium glareosis rupestribusque, (in d. südwestl. Schweiz.) Jul. Aug. Gaud. helv. 4. 98. All. ped. t. 26. f. 3. Cor. lab. superius violaceum, inferius magnum, albidum. H.

Sect. II. Galericularia Benth. lab. 436. Flores secundi axillares, vel superiores in racemum dispositi; folia floralia herbacea, caulinis conformia, sed gradatim minora.

2. **S. galericulata** (L. sp. 835.) *foliis* e basi cordata oblongo-lanceolatis *remote obtuse crenato-serratis*, floribus axillaribus oppositis secundis, calycibus glabris vel pubescentibus pilis simplicibus, *tubo corollae basi fere rectangulo-curvato* calyce multoties longiore. 4. In nemoribus humidis et ad ripas. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 331. Schk. t. 167. Cor. dilute violacea.

3. **S. hastifolia** (L. sp. 835.) *foliis* oblongo-lanceolatis *basi utrinque unidentatis* subhastatis, infimis ovatis, supremis lanceolatis basi subcordatis, floribus axillaribus oppositis secundis subracemosis, calycibus glanduloso-pubescentibus, *tubo corollae basi fere rectangulo-curvato* calyce multoties longiore. 4. In pratis humidis et ad fossas, (an einzelnen Stellen dch. d. g. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 332. Cor. violacea.

4. **S. minor** (L. sp. 835.) *foliis* oblongo-lanceolatis *basi utrinque unidentatis* subhastatis, infimis ovatis, supremis lanceolatis basi subcordatis, floribus axillaribus oppositis secundis, calycibus hirtis, pilis eglandulosis, *tubo corollae recto* basi paulum ventricoso. 4. In pratis paludosis et fossis, (a. d. Rheinfläche u. dch. d. Gebiet auf d. linken Rheinufer bis Westphalen u. v. da bis Hannov., Oldenb., Holstein.) Jul. Aug. D. fl. 4. 333. Cor. violacea. G.

34. PRUNELLA (L. gen. n. 735.) Stam. approximata, sub labio corollae superiore parallela, apice dentifera; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum; inferioris laciniae obtusae. Annulus pilorum in tubo corollae. Cal. bilabiatus, fructifer compresso-clausus.

1. **P. vulgaris** (L. sp. 837.) *staminibus longioribus apice dente spiniformi recto* instructis, *dentibus* labii superioris calycis brevissimis truncatis mucronatis, *labii inferioris* ovato-lanceolatis mucronatis *leviter ciliatis*, foliis petiolatis oblongo-ovatis integerrimis dentatis pinnatifidisve. 4. In pratis, pascuis, sylvarum locis denudatis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 334. St. h. 5. Flores violacei, rarius albi. Variat:

β. parviflora, floribus vix calyce longioribus: P. parviflora Poir. dict. suppl. 1. 711.

γ. pinnatifida, foliis pinnatifidis: P. vulgaris *β.* pinnatifida Reichenb. ic. f. 394. P. vulgaris b. intermedia Koch. et Z.z. cat. pl. pal. p. 11. P. laciniata *γ.* L. sp. 837. (et floribus albis P. laciniata *β.* L. 837.) P. intermedia Link. Ann. d. nat. Gesch. st. 1. secund. Roth. tent. 2. 2. p. 43. P. pinnatifida Pers. syn. 2. 137. P. laciniata Gaud. helv. 4. p. 104.

2. **P. grandiflora** (Jacq. fl. austr. 4. p. 40. t. 377.) *staminibus omnibus muticis, longioribus apice gibbo parvo instructis*, dentibus labii superioris calycis lato-ovatis acuminato-aristatis, labii inferioris lanceolatis in aristam acuminatis ciliatis, foliis petiolatis oblongo-ovatis integerrimis dentatis pinnatifidisve. 4. In montosis lapidosis siccis, solo calcareo, (stellenw. dch. d. g. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 335. Schk. t. 168. P. vulgaris *β.* grandiflora L. sp. 837. Flores violacei, duplo maiores, quam in specie antecedente.

β. pinnatifida, foliis pinnatifidis: P. grandiflora *β.* pinnatifida K. et Z. l. c. Gaud. helv. 4. p. 103. Jacquin. describit varietatem utramque; pinnatifidam autem pingendam curavit.

3. **P. alba** (Pallas ap. M. Bieb. fl. taur. cauc. 2. 67.) *staminibus longioribus apice spina antrorsum arcuata instructis*, *dentibus* labii superioris calycis lato-ovatis acuminato-aristatis, *labii inferioris* lanceolato-subulatis *pectinato-ciliatis*, foliis petiolatis oblongo-ovatis integerrimis dentatis pinnatifidisve. 4. In locis montosis incultis et pratis siccis, (Unteröstr., südl. Tyr., Schweiz u. hin u. wieder in d. Rheingegenden; Blankenburg am Harze.) Jul. Aug. D. fl. 4. 336. Flores ochroleuci. Dentes labii inferioris marginibus rectis acutati et inter nervos laterales non venulosi, ut in duabus an-

tecedentibus; folia angustiora; spica foliis 2 elongatis fulta. Varietatem integrifoliam Jacq. in descriptione memorat; varietas:

β. pinnatifida, foliis pinnatifidis: P. laciniata L. sp. 837., excl. variet. *β.* et *γ.* Jacq. a. t. 378. Reichenb. ic. 3. f. 393.

Trib. IX. *PRASIEAE.* Benth. lab. 646. Cor. bilabiata. Fructus drupacei.

35. PRASIUM (L. gen. n. 737.) Stam. approximata, sub labio corollae superiori parallela, simplicia; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes. Cor. labium superius concavum; inferioris laciniae obtusae; annulus pilorum in tubo corollae. Nuces subdrupacei. Cal. bilabiatus, fructifer apertus.

1. **P. maius** (L. sp. 838.) ♄. In collibus lapidosis incultis, (a. d. Insel Osero.) Mart.-Mai. Flores albi. P. minus L. secund. cl. Benth. non differt. J.

Trib. X. *AJUGOIDEAE.* Benth. lab. 657. Corolla unilabiata; labium superius nullum vel brevissimum. Nuces reticulato-rugosae. — In genere Ajugae labium brevissimum adest; in Teucrii stamina e fissura egrediuntur et labium plane deficere videtur, sed omnino adest, at bipartitum, laciniis in marginem labii inferioris translatis, qua de causa hoc e lobis quinque compositum est.

36. AJUGA (L. gen. n. 705.) Corollae labium superius brevissimum, e lobulis 2 minutis compositum; inferius trifidum, multoties maius. Stam. approximata, parallela, sacculi antherarum rima longitudinali communi dehiscentes. Annulus pilorum in tubo corollae.

Sect. I. Bugula Tournef. t. 98. Florum verticilli multiflori. Annulus pilorum in tubo corollae integer, ab insertione staminum remotus.

1. **A. reptans** (L. sp. 785.) floribus verticillatis, *stolonibus repentibus,* foliis repandis vel obsolete crenatis. ♃. In pratis et pascuis; in alpes adscendens. Mai. Jun. D. fl. 4. 215. A. reptans Host. fl. a. 2. p. 119. A. repens Host. l. c. et A. latifolia Host. l. c. sunt modificationes et vix varietates huius speciei. Flores caerulei, rarius carnei vel albi. Variat:

β. alpina, stolonibus brevibus vel nullis: A. alpina Vill. delph. 2. 347.

2. **A. genevensis** (L. sp. 785.) floribus verticillatis, *stolonibus nullis, bracteis* inferioribus trilobis dentatis integerrimisque, *superioribus verticillo brevioribus.* ♃. In campis arenosis, ericetis, ad vias. Mai. Jun. D. fl. 4. 218. A. alpina L. mant. p. 30. Sm. brit. 2. 605. A. montana Reichenb. fl. exc. p. 314. A. rugosa Host. fl. a. 2. 120. est modificatio. Flores caerulei vel carnei, ad hanc ultimam: A. foliosa Schleicher. — Ludit A. genevensis foliis grosse et profunde dentatis et repando-crenatis, radicalibus et infimis caulis minutis vel maximis, bracteis superioribus trilobis dentatisque vel ovatis integris integerrimisque. — Specimina sicca suecica et anglica, et quidem authentica, Ajugae alpinae a vulgari nostra A. genevensi distinguere nequeo. — A. alpina Thomas. pl. exsicc. est forma Ajugae pyramidalis.

3. **A. pyramidalis** (L. sp. 785.) floribus verticillatis, stolonibus nullis, *bracteis* repando-crenatis, superioribus *verticillo duplo longioribus.* ♃. In locis sylvaticis denudatis et pascuis subalpinis, (dch. d. g. Alpenk.; ausserdem selten in d. Rheinpfalz u. d. Mark Brandenburg u. um Halle.) Mai. Jun. D. fl. 4. 218. A. rupestris Schleich. exs. Flores conspicue minores quam in antecedente, caerulei.

Sect. II. Chamaepitys Tournef. t. 98. Flores in axillis foliorum solitarii, oppositi; annulus in tubo corollae ad insertionem staminum collocatus, e fasciculis pilorum interruptis compositus.

4. **A. Chamaepitys** (Schreb. unilab. p. 24.) floribus solitariis axillaribus folio fulcrante brevioribus, *tubo corollae calyce duplo longiore, foliis trifidis laciniis linearibus.* ☉. In agris et arvis, solo calcareo, (zerstreut dch. d. Geb.) Jun.-autumn. D. fl. 4. p. 220. Teucrium Chamaepitys L. sp. 787. Fl. dan. t. 733. Cor. albida, labio inferiore citrino, seriebus 4 punctorum ferrugineorum ad basin picto.

5. **A. chia** (Schreb. unilab. p. 25.) floribus solitariis axillaribus folium fulcrans subaequantibus, *corollae tubo calyce triplo longiore, foliis trifidis, laciniis linearibus.* ☉. In locis siccis, ericetis, agris sterilibus, (Istrien zwischen Rovigno u. Dignano.) Jun.? Flores flavi. J.

37. TEUCRIUM (L. gen. n. 706.) Cor. labium superius bipartitum, laciniis margini labii inferioris impositis; hinc fissura loco labii superioris et labium inferius 5 lobum; annulus in tubo nullus. Stam. approximata, e fissura labii superioris egredientia; antherarum sacculi rima longitudinali communi dehiscentes.

Sect. I. Scorodonia Adans. fam. p. 188. Cal. bilabiatus, labio superiore ovato, indiviso; inferiore quadridentato.

1. **T. Scorodonia** (L. sp. 789.) foliis cordato-ovatis vel cordato-oblongis crenato-serratis rugosis pubescentibus, racemis axillaribus terminalibusque, *labio calycis superiore ovato indiviso.* ♃. In locis asperis incultis sylvaticisque, aggeribus, (zerstreut dch. d. Geb., an manchen Orten häufig, an andern fehlend.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 221. Scorodonia heteromalla Moench. meth. p. 384. Flores albi, in viridem vergentes, staminibus fusco-rubris.

Sect. II. Scordium. Cal. quinquedentatus. Verticilli 2-6 flori, axillares, distantes; folia floralia caulinis conformia.

2. **T. Botrys** (L. sp. 786.) *foliis bipinnatifido-laciniatis,* floralibus conformibus, verticillis 2-6 floris. ☉. Inter segetes solo calcareo. Jul.-autumn. D. fl. 4. 222. Flor. purpurei.

3. **T. Scordium** (L. sp. 790.) *foliis* sessilibus crenato-serratis, inferioribus oblongis basi rotundatis, *superioribus oblongo-lanceolatis saepe postice attenuatis* et a medio deorsum integerrimis, *floralibus conformibus,* verticillis quadrifloris caule foliisque villosis vel glabriusculis. ♃. In pratis paludosis, fossis et inundatis. Jul. Aug. D. fl. 4. p. 223. Fl. dan. t. 593. Flores purpurei.

4. **T. scordioides** (Schreber. unilabiat. p. 37.) *foliis* sessilibus, inferioribus oblongo-ovatis ovatisve basi subcordatis, *superioribus ovatis,* omnibus circumcirca crenato-serratis *floralibus conformibus,* verticillis quadrifloris, caule foliisque plus minusve lanato-villosis. ♃. In fossis et ad littora maris, (bei Monfalcone in Menge, Wulfen; Veglia, Osero, Noć.) Jun. Jul. D. fl. 4. p. 224. Flores purpurei. Dignoscitur ab antecedente praecipue foliis superioribus breviter ovatis omnibusque ratione latitudinis duplo brevioribus. Indumentum in utraque specie multum variat. G.

Sect. III. Chamaedrys Dillen. gen. t. 3. Cal. 5 dentatus. Verticilli 2-6 flori, in racemum terminalem dispositi, foliis floralibus superioribus vel omnibus bracteiformibus.

5. **T. Chamaedrys** (L. sp. 790.) *foliis* petiolatis *cuneato-ovatis* incisocrenatis, *verticillis sexfloris racemosis,* caulibus procumbentibus, ramis adscendentibus pubescentibus. ♃. In collibus et montibus asperis, ad vias et muros. Jul.-Sept. D. fl. 4. p. 224. Hayn. Arzngew. 6. 4. Flores purpurei.

6. **T. flavum** (L. sp. 791.) *foliis* petiolatis subtriangulari-ovatis obtuse crenatis *basi subtruncatis, verticillis sexfloris racemosis,* caulibus adscendentibus fruticosis. ♄. In montosis lapidosis, (Görz, Triest, Fiume.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 226. Flores flavi. G.

Sect. IV. Polium Benth. lab. 684. Calyx 5 dentatus. Verticilli in capitula terminalia condensati.

7. **T. Polium** (L. sp. 792.) canescenti-tomentosum lanatum vel piloso-hispidum, foliis sessilibus cuneatis oblongis linearibusve obtusis crenatis margine revolutis tomentosis, *capitulis subrotundis ovalibusque pedunculatis*, caulibus suffruticosis adscendentibus. 4. In locis petrosis apricis, (Aquileja, Sieb.; Triest; häufig im südl. Istrien, Fiume, Bartl.) Jul. Aug. D. fl. 2. 227. Flores ochroleuci. Cl. Benth. lab. 685. cum multis synonymis sex varietates proponit, de quibus in ditione fl. nostr. repertae sunt:

γ. *vulgare*, foliis oblongis capitulisque tomentoso-lanatis, floribus albis: T. Polium L. l. c. T. Pseudo-Hyssopus Schreb. unilab. 45. T. Teuthrion Schreb. l. c. 46. T. Belion Schreb. l. c. 47. T. album Poir. dict. suppl. 2. 770.

δ. *angustifolium*, foliis linearibus vel lineari-oblongis capitulisque parvis cano-tomentosis, rarius flaventibus: T. capitatum L. sp. 792. T. flavescens Schreb. unilab. 44. T. valentinum Schreb. l. c. 46. G.

8. **T. montanum** (L. sp. 791.) *foliis lineari-lanceolatis integerrimis* subtus vel utrinque incanis, corymbis terminalibus, caulibus suffruticosis prostratis. 4. In apricis petrosis glareosis planitierum et montium, solo calcareo, (stellenw. im südl. u. mittlern Geb.) Jun.-Aug. D. fl. 4. 226. T. supinum Jacq. a. t. 417. T. supinum L. sp. 791., est forma magis angustifolia. Flores albi.

Ord. LXXXVII. VERBENACEAE. Juss. ann. mus. p. 63.

Cal. tubulosus persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, tubulosa, limbo irregulari vel inaequali,* decidua. *Stam.* 4, *didynama, vel* 2, *corollae inserta.* Ovarium liberum, 4 loculare, ovulis erectis, solitariis vel geminis. Styl. 1. *Pericarpium drupaceum, pyrenas quatuor monospermas continens, vel in nuculas* 4 *secedens.* Embryo rectus, radicula infera, ad hilum versa. Albumen nullum.

1. VITEX (L. gen. n. 790.) Cal. 5 dentatus. Cor. hypocrateriformis, limbo obliquo, 5-6 lobo, subbilabiato. Drupa sicca, nuce quadriloculari, tetrasperma.

1. **V. Agnus castus** (L. sp. 890.) foliis digitato-quinatis septenatisque, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis subtus cano-tomentosis, spicis terminalibus interruptis. ♄. In locis arenosis et in scopulis ad mare adriaticum, (Triest, Fiume.) Jul. Aug. D. fl. 4. p. 469. Schk. t. 177. Flores violacei. G.

2. VERBÉNA (L. gen. n. 32.) Cal. 5 fidus. Cor. hypocrateriformis, limbo 5 lobo subbilabiato. Fructus in nuces 4 dilabens.

1. **V. officinalis** (L. sp. 29.) spicis filiformibus paniculatis, foliis ovato-oblongis trifidis laciniatis crenatisque in petiolum latum contractis. ☉. In ruderatis, ad vias, muros. Jun.-autumn. D. fl. 4. 339. St. h. 3. Flores dilute purpurei.

Ord. LXXXVIII. ACANTHACEAE. Juss. gen. p. 102.

Semina exalbuminosa, saepe funiculis cartilagineis adscendentibus affixa. Caetera ut Antirrhinearum.

1. ACÁNTHUS (L. gen. 793.) Cal. pleiosepalus, foliola inaequalia, difformia. Cor. unilabiata, trifida. Caps. bilocularis.

1. **A. mollis** (L. sp. 891.) foliis pinnati-partitis, laciniis ovatis acutis grosse dentatis, dentibus inermi mucronatis, bracteis lato-ovatis. 4. In locis graminosis inter virgulta, pratis maritimis, (in Istrien bei Fiume.) Mai-Jul. D. fl. 4. p. 470. Lam. illustr. t. 550. f. 2. Flores fere bipollicares. La-

bium album medio in venis viridi colore et versus marginem dilute roseo suffusum; ungue alato, albido, alis rubicundis. J.

2. **A. longifolius** (Host. fl. austr. v. 2. p. 217.) foliis pinnati-partitis, laciniis oblongis sinuato-pinnatifidis dentatisque, lacinia terminali lanceolata, lobis dentibusque spina brevi: terminatis, bracteis oblongo-ovatis. 4. In locis maritimis, (auf d. Scoglio degli Olivi, einer kleinen Insel im Hafen v. Pola.) Jul. Differt a praecedente foliorum pinnis longioribus profundius sinuatis et margine spinosis, bracteisque angustioribus. Flores in specimine meo dimidio minores, quam antecedentis. — Acanthus spinosus ab his differt foliorum pinnis lanceolatis, lobis dentibusque spinis elongatis validisque terminatis. J.

Ac. longifolius Host. idem videtur atque Acanthus niger Mill. dict., de quo cl. Link. in enum. h. berol. v. 2. p. 132 dicit, valde differre ab Acantho molli spinulis foliorum 2 lineas longis, quae in illo nullae. Spinas Acanthi spinosi 6 lineas et longiores esse, ibidem meminit. Ad Ac. spinosum secund. cl. Griesebach. fl. rumel. et bithyn. pertinet Ac. spinosissimus Reichenb.

Ord. LXXXIX. LENTIBULARIEAE. Rich. in fl. paris. 1. p. 26.

Cal. divisus, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, irregularis, bilabiata, calcarata. Stam.* 2, *basi corollae inserta.* Ovarium liberum, 1 *loculare, multiovulatum, placenta centrali libera.* Styl. 1. Fructus capsularis. Embryo exalbuminosus, quandoque indivisus.

1. PINGUICULA (L. gen. n. 30.) Cor. ringens, calcarata. Cal. 5 partitus.

1. **P. alpina** (L. sp. 25.) *calcare conico*, capsula acuminato-rostrata. ☉. In pratis spongiosis alpium et reg. subalp.; in planities, alpes comitantes, descendens. April. Mai., in alpib. serius. D. fl. 1. 342. St. h. 14. P. flavescens Flörk. apud Schrad. fl. g. 53. P. alba Kuchl. in Hopp. Taschenb. 1800. p. 223. P. purpurea Willd. act. berol. 2. 112. Flores albi, maculis 2 citrinis in basi lobi intermedii labii inferioris, saepe in unam confluentibus. — Specimina lapponica non differunt.

2. **P. vulgaris** (L. sp. 25.) *calcare subulato*, capsula ovata. 4. In pratis turfosis spongiosis, (Var. *α.* zerstreut dch. d. Geb.; Var. *β.* feuchte Stellen der Gypsberge am Vorderharze; Var. *γ.* u. *δ.* auf den Alpen.) Mai-Jul. St. h. 14. Reichenb. ic. f. 175. P. vulgaris *β.* alpicola, specim. maius. Flor. violacei, vel intus lineis maculisve 2 albis notati. Variat:

α. pratensis, corolla mediocris: P. vulgaris auctorum.

β. minor, corolla dimidio fere minor: P. gypsophila Wallroth. Linnaea v. 14. p. 533.

γ. grandiflora, flores fere duplo maiores, quam in varietate *α.*: P. grandiflora Lam. dict. 3. p. 23. Koch. syn. ed. 1. p. 579. P. leptoceras Reichenb. ic. f. 171. P. vulgaris macrantha Tausch. pl. select.

δ. longifolia, flores ut in var. *δ.*, folia longiora angustiora: P. longifolia Ramond. in DC. fl. fr. 3. p. 728. Koch. syn. ed. 1. p. 579. — Secundum observationes cl. Facchini omnes hae varietates formis intermediis confluunt. In locis natalibus saltem ulterius investigandae sunt.

2. UTRICULARIA (L. gen. n. 31.) Cor. personata, calcarata. Cal. 2 phyllus. Caps. 1 locularis.

1. **U. vulgaris** (L. sp. 26.) fol. undique patentibus *pinnato-multipartitis*, laciniis capillaribus remote subtiliter spinosis calcare oblongo-conico descendente, labio corollae superiore palatum inflatum subaequante, *antheris connatis.* 4. In aquis stagnantibus. Jun.-Aug. D. fl. 1. 343. Hayn. in Schrad. journ. 1800. 1. t. 6. A. St. h. 13. — Flor. vitellini, palatum striis aurantiis.

2. **U. neglecta** (Lehmann. ind. schol. hamb. 1828.) *foliis* undique patentibus *pinnato-multipartitis*, laciniis capillaribus remote subtiliter spinulosis, calcare oblongo-conico descendente, labio corollae superiore palatum inflatum bis terve excedente, *antheris liberis*. 4. In aquis stagnantibus, (um Hamburg, besonders bei Eppendorf, Lehmann, auch in Oldenburg u. am Unterharz.) Jul. Aug. Differt ab antecedente caule tenuiore, foliis magis distantibus, labio superiore palatum bis terve excedente, nunquam breviore, calyce conspicue minore, antherisque liberis.

3. **U. intermedia** (Hayn. in Schrad. journ. 1800. 1. p. 18.) *foliis distichis dichotome multipartitis*, *laciniis* setaceis *spinuloso-denticulatis*, calcare subulato labio inferiori adpresso, labio corollae superiore integro palatum inflatum bis superante, pedunculis fructiferis erectis. 4. In aquis stagnantibus, fossis, (dch. d. g. Geb., jedoch nicht überall.) Jul. Aug. D. fl. 1. 344. U. media Schum. saell. 1. 9. St. h. 17. Hayn. l. c. t. 5. — Cor. sulphurea, labium superius et palatum striis purpureis picta.

4. **U. Bremii** (Heer. Flora der Schweiz p. 984. sec. specimen a cl. Naegelio mecum communicato,) foliis undique patentibus dichotome multipartitis, *laciniis* setaceis *glabris*, calcare subconico brevissimo, labio superiore emarginato longitudine palati depressi, *inferiore orbiculari explanato*, pedunculis fructiferis reflexis. 4. In paludosis, piscinis muscosis et fossis passim. Aug. Sept. U. pulchella C. B. Lehmann in litt. Cor. sulphurea. „Simillima Utriculari minori, sed omnibus partibus paulo robustior, sepala subrotunda subreniformia apiculo minuto, labium corollae inferius subrotundum et explanatum, palatum conspicue marginatum fusco-striatum. In U. minore sepala subrotunda, acuminata, labium corollae inferius ovatum et latere revolutum, quo conspicue angustius apparet, et alienam faciem induit palati margo in labium diffluens concolor.“ Lehm. in litt. Striae palati colorum variabiles videntur.

5. **U. minor** (L. sp. 26.) *fol. undique patentibus dichotome multipartitis, laciniis* setaceis *glabris*, calcare brevissimo subconico, labio superiore emarginato longitudine palati depressi, *inferiore ovato latere revoluto*, pedunculis fructiferis reflexis. 4. In paludosis et fossis hinc inde. Jun.-Aug. D. fl. 1. 345. Hayn. l. c. t. 6. f. B. St. h. 17. — Cor. pallide flava, palatum, (non gibbum, sed e margine elevato constans,) striis ferrugineis notatum. D. Lehmann. non nisi immaculatum vidit, quod ulterius observandum. Linnaei verba in Flor. suec. ed. 2. p. 10. „Corolla labio inferiore lateribus reflexis“ probant, plantam hic propositam veram esse Linnaeanam speciem.

Ord. XC. PRIMULACEAE. Vent. tabl. 2. p. 285.

Cal. 4-5 divisus dentatusve, persistens. *Cor. monopetala, hypogyna, regularis*, 4-5 *fida. Stam. corollae inserta, eius lobis numero aequalia et iisdem opposita*, vel numero dupla, exteriora laciniis corollae alterna, sterilia. *Ovarium liberum*, 1 *loculare, multiovulatum, placenta centrali libera*. Styl. 1. Fructus capsularis. Sem. peltata. Embryo rectus, intra albumen carnosum; radicula infera, ad hilum versa.

1. TRIENTÁLIS (L. gen. n. 461.) Cal. profunde 7 partitus. Cor. plana, 7 petala, petalis annulo intus prominente connexa, tubus nullus. Stamina annulo imposita; antherae defloratae ab apice retrorsum convolutae. Caps. subcarnosa, denique in 7 valvulas ad basin usque dehiscens. Partes floris et fructus quandoque a 5 ad 9 variant. Capsularum valvulae plures in hoc genere, sicut in Lysimachia, saepe coniuncta remanent, dum fructus semina demittit.

1. **T. europaea** (L. sp. 1. 488.) 4. In sylvis montosis humidis et ericetis spongiosis, (nördliches Gebiet, sodann in Mähr., Böhm., Schles., im Fichtelgeb. u. Harz; im Schwarzwalde u. im Ursern-Thale d. Schw.; im

Vintschgau in Tyrol.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 637. St. h. 17. Cor. nivea, annulo baseos ochroleuco, pilis glanduliferis tenuissimis obsito.

2. LYSIMÁCHIA (L. gen. n. 205.) Cal. quinquepartitus. Cor. rotata, tubo brevi vel subnullo, limbo 5 partito. Stam. in basi corollae inserta, 10, 5 exteriora breviora sterilia; vel 5, libera vel plus minusve connata. Caps. 5 valvis. — Sem. ovata vel oblonga, dorso carinata, et carina placentae affixa; umbilicus linearis, vel semina ad umbilicum excavata.

Capsula in omnibus speciebus florae nostrae 5 valvis est; omnes, quod fructum attinet, investigavi, sed in capsula aperta 2-3 valvulae saepe marginibus connexae permanent, quod generis characterem turbare nequit, et in aliis generibus quoque non raro observatur.

Sect. I. Naumburgia Moench. Flores in racemis densis axillaribus. Dens parvus inter lacinias corollae. Stam. basi annulo brevissimo connata. Sem. laevia, vix marginata; umbilicus non excavatus.

1. **L. thyrsiflora** (L. sp. 209.) *racemis axillaribus pedunculatis densis* cylindricis folio fulcrante brevioribus, foliis oppositis ternis quaternisque elongato-lanceolatis. 4. In piscinis, paludibus profundis et in fossis, (stw. dch. d. g. Geb.; an der südl. Grenze seltner.) Jun. Jul. D. fl. 2. 131. Fl. dan. 517. Naumburgia guttata Moench. meth. suppl. 23. Thyrsanthus palustris Schrank. Denkschr. d. Münch. Acad. 1813. 73. Cor. flava apice, sicut calyx, rubro-punctata.

Sect. II. Lysimastrum Dub. bot. gallic. 380. Flores axillares paniculati, verticillati, vel solitarii. Sinus inter corollae lacinias edentuli. Sem. laevigata, marginata.

a. Stamina 10, libera, alterna castrata, minora.

2. **L. ciliata** (L. sp. 210.) caule erecto, foliis oppositis ternis quaternisve petiolatis ovato-oblongis subcordatis glabris margine scabris, petiolis ciliatis, *pedunculis* axillaribus oppositis verticillatisque *apice nutantibus*, corollae laciniis subrotundis acute crenatis obtusissimis cum cuspide imposita, *staminibus* 10, *alternis sterilibus*. 4. In paludosis, ad fossas et ripas, (im Geb. d. Fl. v. Spaa, nach Lejeune wirklich eingebürgert.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 133. Flores flavi. G.

b. Stamina 5, ad tertiam longitudinis partem vel ad medium usque connata, ovarium tegentia.

3. **L. vulgaris** (L. sp. 209.) caule erecto, foliis oppositis verticillatisve breviter petiolatis oblongo-lanceolatis ovatisve subtus subvillosis, pedunculis erectis alternis verticillatisve racemosis, racemis paniculatis, *corollae laciniis* ovatis acutiusculis integerrimis *margine glabris*, *staminibus* 5 *a basi ad medium connatis*. 4. In locis paludosis, ad ripas et pratorum dumeta. Jun.-Jul. D. fl. 2. p. 130. Fl. dan. t. 689. Flores aureo-flavi. Calycis laciniae nunc latiores, nunc angustiores, nunc fructu longiores, nunc breviores. Variat in limo molli paludum stolonibus 4-8 pedalibus: L. paludosa Baumg. transs. 1. 141.; atque foliis floralibus inferioribus racemi terminalis magnis: quibus varietas haecce paene habitum L. verticillatae acquirit, sed racemi laterales eius et Lysimachiae vulgaris inter se non differunt; h. l. L. westphalica Weyh. bot. Ztg. 5. 2. 411.

4. **L. punctata** (L. sp. 210.) caule erecto, foliis oppositis verticillatisve breviter petiolatis oblongo-lanceolatis ovatisve pubescentibus, pedunculis axillaribus oppositis verticillatisve unifloris vel infimis bi-trifloris, *corollae laciniis* acutis *glanduloso-ciliatis*, *staminibus* 5 *a basi ad medium connatis*. 4. Ad ripas et aquas stagnantes, (Steyerm., Oestr., Böhm., Mähr., Zürich am Vorgebirge Horn.) Jun. Jul. D. fl. 2. 132. Jacq. a. t. 366. Specimina pedunculis verticilli infimi divisis et bi-trifloris constituunt L. verticillatam MBieb. taur. cauc. 1. 141. In planta culta vero ex una radice caules pedunculis infimis bi-trifloris et alii pedunculis omnibus unifloris progrediuntur. Flores flavi, basi ferruginea; variant toti flavi: L. villosa Schm. boh. cent. 2. p. 57. Folia subtus, quamvis non semper, punctis nigris adspersa.

c. Stamina 5, libera; vel basi brevissime connata, ovarium non tegentia.

5. **L. Nummularia** (L. sp. 211.) *caule prostrato* repente, foliis oppositis cordato-subrotundis, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus, *laciniis calycis cordatis.* 4. Ad fossarum margines, in locis paludosis, sylvis humidis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 135. Schk. t. 36. Flores citrini.

6. **L. nemorum** (L. sp. 211.) *caule prostrato*, foliis oppositis ovatis vel subcordatis acutis glabris, pedunculis axillaribus solitariis folio longioribus, *laciniis calycis lineari-subulatis.* 4. In nemoribus et sylvis frondosis subhumidis. Jun. Jul. D. fl. 2. 135. St. h. 1. Flores citrini.

Sect. III. Asterolínum Link. et Hoffmannsegg. fl. port. 332. Flores axillares, solitarii. Sinus inter corollae lacinias edentuli. Stam. libera. Sem. transversim rugosa, antice planiuscula, postice ad umbilicum excavata.

7. **L. Linum stellatum** (L. sp. 211.) caule erecto, foliis oppositis sessilibus lanceolatis acuminatis glabris margine scabriusculis, floribus axillaribus solitariis, *calycis laciniis* lanceolatis cuspidatis *corolla triplo-longioribus.* ☉. In locis apricis, (Istrien, Müller; auch von Lejeune bei Verviers gesammelt, aber wahrscheinlich mit ausländischer Wolle eingebracht, u. später nicht wieder gefunden.) Jun. D. fl. 2. 136. Asterolinon stellatum Fl. port. l. c. Link. en. h. berol. 1. p. 160. Cor. albida, minuta, laciniis lato-ovatis breviter acuminatis. J.

3. ANAGÁLLIS (L. gen. n. 206.) Cal. 5 partitus. Cor. rotata, tubo brevi vel subnullo; limbo 5 partito. Stam. 5, in basi corollae inserta, libera. Caps. circumscissa.

1. **A. arvensis** (L. sp. 211.) caule diffuso, foliis oppositis ternisve sessilibus ovatis, *laciniis corollae crenulatis minute glanduloso-ciliatis calyce paulo longioribus,* pedunculis folia superantibus. ☉. In agris, vineis et locis cultis. Jun.-autumn. D. fl. 2. p. 136. St. h. 1. A. phoenicea Lam. fl. fr. 2. 45. A. mas Vill. delph. 2. 461. Flores miniati, basi sanguinei. Variat foliis ternis; corollis albis basi sanguineis, carneis unicoloribus, et carneis ad basin laciniarum parva tantum macula sanguinea notatis: A. carnea Schrank. baier. fl. 1. 461. — Hanc speciem et sequentem varietates unius speciei esse, non negaverim, sed quum nuper eas accuratius observandi tempus defuerit, ut species propono, donec ulteriores observationes me aliud docuerint.

2. **A. caerulea** (Schreb. spicileg. fl. lips. p. 5. 1771.) caule diffuso, foliis oppositis ternisve sessilibus ovatis, *laciniis corollae crenulatis fere totis eglandulosis calyce paulo longioribus,* pedunculis folia subaequantibus. ☉. Cum antecedente, sed rarior. Jun.-autumn. D. fl. 2. p. 138. A. femina Vill. delph. 4. 336. A. Monelli Reichenb. fl. exc. p. 408., non Linn. „Anagallis foliis lanceolatis. Hospitatur in tepidario, perennis.“ Haec verba Linn. in horto ups. p. 38. de sua A. Monelli profert, quae in horto nostro quoque perennis est. Flores caerulei. Variat corollis albis et foliis ternis.

3. **A. tenella** (L. mant. 335.) *caule filiformi prostrato* basi repente, foliis oppositis petiolatis subrotundo-ovatis apiculatis, pedunculis folio longioribus, *calyce corolla triplo breviore.* 4. In locis turfosis spongiosis, (Westphalen bei Dorsten u. Schelmbeck; Ostfriesland im Hochmoore bei Aurich; im C. Waadt an mehreren Orten, Lausanne, Vevay u. a.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 139. Fl. dan. t. 1085. Jirasekia alpina Schmidt. in Ust. ann. st. 6. 124. J. tenella Reichenb. fl. exc. p. 408. Cor. rosea, venis saturatioribus.

4. CENTUNCULUS (L. gen. n. 145.) Cal. 4 partitus. Corollae tubus subgloboso-ventricosus; limbus 4 partitus, patens. Stam. 4. Caps. circumscissa.

1. **C. minimus** (L. sp. 169.) foliis alternis ovatis, floribus sessilibus. ☉. In agris, pascuis, ericetis, solo humido arenoso. Jun. Jul. D. fl. 1. p. 815. St. h. 30. Flores albi vel pallide rosei.

5. ANDRÓSACE (L. gen. n. 196., inclusa Aretia specier. plant.) Cal.

5 fidus vel 5 dentatus. Cor. hypocrateriformis vel infundibuliformis, tubo ovato apice coarctato; fauce fornicibus brevibus instructa. Ovarium 5-multiovulatum. Caps. 5 valvis.

Sect. I. Aretia Linn. Caudiculi ramosissimi, densos caespites formantes; folia imbricata atque vel omnia, vel in apice ramorum in rosulas expansa, inferiora emortua quidem, sed caeterum non mutata; pedunculi uniflori, nudi, bracteis destituti; ovula 5-8 in plantis siccis inveni. — Praeter inflorescentiam inter Aretias, sub hac sectione enumeratas, et Androsacas sectionum sequentium nullum characterem genericum hucusque reperire potui.

1. **A. helvetica** (Gaud. fl. helv. 2. p. 106.) *foliis dense imbricatis* lanceolatis *hirtis, pilis deorsum versis* simplicibus, floribus solitariis subsessilibus, corollae laciniis integris, calycis laciniis acutiusculis tubum corollae aequantibus. 4. In rimis rupium alp. altiorum, (Tyrol; bayer. Alpen; Schweiz.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 292. A. bryoides DC. fl. fr. 3. 440. Aretia helvetica Schk. t. 30. Wahlenb. helv. p. 33. Diapensia helvetica L. sp. 203. per errorem in D. fl. 2. p. 93. ad A. imbricatam relata. Flores ob pedunculos breves vix lineam longos intra folia inmersi. Cor. alba, area in medio circulari luteola, fornicibusque luteis.

2. **A. imbricata** (Lam. dict. 1. 162. illustr. t. 98. f. 4.) *foliis dense imbricatis* lanceolatis obtusis, pedunculis calycibusque *tomentoso-canis* pilis brevissimis stellulatis, floribus solitariis subsessilibus pedunculatisque, corollae laciniis integris, calycis laciniis obtusis tubo corollae longioribus. 4. In summarum alp. rupibus, (a. d. Trone in Graubünden, a. d. Grueben, Zmuth u. Fineln über Zermatten im Wallis u. a. d. Rosa; südöstl. Tyrol.) Jun. Jul. A. Aretia Lap. abr. 91. A. argentea Gärtn. fruct 3. t. 198. f. 4. A. tomentosa Schleich. exs. Gaud. helv. 2. p. 110. Haec ultima non differt nisi pedunculis longioribus; A. alpina eodem modo variat. Aretia Hall. helv. n. 618. var. γ. secund. Gaud. Corolla tubo purpureo, limbo albo, fornicibus rubicundis. Hegetschw. et Heer. fl. d. Schwz. p. 188.

3. **A. Heerii** (Aretia Hegetschweiler) *foliis dense imbricatis* lanceolatis obtusis *hirtis pilis patentibus simplicibus furcatisque,* floribus solitariis subsessilibus pedunculatisve, laciniis calycis acutis, tubum corollae superantibus. 4. In alpib. helvet. rarissima, (bis jetzt bloss in den A. des Kleinthales im Cant. Glarus gegen das Martinsloch in der Höhe von 7-8000', Heer!) Jul. Aug. Habitu A. helveticae, floribus A. glacialis. Flores rosei fauce flava, sicci in caeruleum vergentes. H.

4. **A. glacialis** (Hoppe in litt.) *foliis dense approximatis* ad apicem ramorum *rosulatis* lanceolatis acutiusculis basi attenuatis pedunculis calycibusque *pubescentibus, pilis sparsis stellatis* brevissimis *diametro pedunculorum* transversali *brevioribus,* floribus solitariis subsessilibus pedunculatisque, calycis laciniis acutis tubo corollae longioribus. 4. In alpium altiorum rupibus, (v. d. Schweiz durch Tyrol bis Steyerm. u. Kärnth.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 93. A. pennina Gaud. helv. 2. p. 108. A. alpina Lam. dict. 1. p. 162. ill. t. 98. f. 3. Koch. syn. ed. 1. p. 583. Aretia Hall. helv. n. 618. var. β. Aretia alpina Wulf. ap. Jacq. a. suppl. t. 18. A. glacialis Schleich. cat. 1821. Cor. rosea vel alba fornicibus luteis. Aretia alpina, Linn. sp. 203., ex Halleri scriptis recepta est, in quibus tres species diversae sub una comprehenduntur.

Aretia brevis Hegetschw. fl. d. Schw. p. 190., A. Charpentieri Heer. ibid. p. 987. differt a simillima Androsace glaciali foliis et calycis laciniis obtusioribus laciniisque limbi corollae paulo angustioribus et plerumque apice leviter emarginatis. Huic maxime accedit A. Wulfeniana Sieber. herb. fl. austr. n. 50., differt tantum foliis et calycis laciniis auctioribus; ambae species ulterius observandae sunt.

5. **A. pubescens** (DC. fl. fr. p. 438.) *foliis dense approximatis* ad apicem ramorum *rosulatis* lanceolatis obtusiusculis basi attenuatis pedunculis calycibusque *hirto-pubescentibus, pilis* patentibus *diametrum* transversalem *pedunculorum aequantibus simplicibus* intermixtis furcatis vel omnibus simplicibus, floribus solitariis subsessilibus pedunculatisque, laciniis calycis acutis tubo corollae longioribus. 4. In alpibus altioribus, (Cant. Waadt, Genf u. Gla-

rus.) Jun. Jul. A. alpina Gaud. helv. 2. p. 107. DC. ic. pl. rar. gall. t. 5. Aretia Hall. helv. n. 618. var. *α*. Cor. alba, centro luteola. H.

Sect. II. Chamaeiasme. Caudiculi apice rosulati, caespitem formantes; pedunculi umbellati, involucro cincti; ovarium 5-10 ovula, in A. obtusifolia 25-30, continens.

6. **A. villosa** (L. sp. 203.) radice multicipite, rosulis remotis subglobosis, *scapo umbella foliisque villosis, pilis elongatis obscure articulatis, foliis* lanceolatis basi attenuatis *integerrimis*, pedunculis sub anthesi involucrum aequantibus brevioribusque, corolla calycem superante. ♃. In alpium rupibus, (a. d. Jura, d. A. v. Krain u. Steyerm.) Jun.-Aug. Jacq. collect. 1. 131. t. 12. f. 3. A. villosa *α*. D. fl. 2. p. 99. Flores albi vel rosei, umbone luteo vel purpureo, Gaud.

7. **A. Chamaeiasme** (Host. syn. p. 95., non Wulf.) radice multicipite caespitosa, rosulis explanatis, *scapo umbella margineque foliorum villosis, pilis elongatis conspicue articulatis, foliis* lanceolatis basi attenuatis *integerrimis*, pedunculis sub anthesi involucrum aequantibus brevioribusque, corolla calycem superante. ♃. In rupibus alp. et reg. subalpin., (dch. d. g. Alpenk.) Jun.-Aug. A. villosa Jacq. a. t. 332. A. villosa *β*. D. fl. 2. p. 100. Cor. alba, umbilico luteo, Gaud.

8. **A. obtusifolia** (All. ped. 1. p. 90. t. 46. f. 1.) radice multicipite caespitosa, *scapo* pedunculis calycibus *margineque foliorum* puberulis, *pilis brevissimis in scapo* pedicellisque *stellatis, foliis* lanceolatis basi attenuatis *integerrimis*, pedunculis involucro longioribus, corolla calyce longiore. ♃. In alpium altissimarum iugis, (dch. d. g. Alpenk. u. am Basalt in d. kleinen Schneegrube d. Sudeten.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 100. A. Chamaeiasme Wulf. in Jacq. collect. 1. p. 194., sub A. villosa, (secundum descriptionem et specimina ab ipso auctore donata, in herbario Mertens. et Froelich. asservata.) A. Lachenalii Gmel. bad. 1. 437. A. lactea Vill. delph. 2. 476. Cor. alba vel rubella, tubo luteolo, Gaud. Variat *exscapa* pedunculo unico radicali: A. obtusifolia *β*. aretioides Gaud. helv. 2. p. 100.

9. **A. lactea** (L. sp. 204.) radice multicipite caespitosa, *scapo pedunculis calycibusque glaberrimis*, foliis lanceolato-linearibus linearibusque integerrimis glabris vel apice margineve parce ciliatis, pedunculis elongatis, corolla calyce longiore. ♃. In alpibus calcareis, (Jura, Tyrol, Salzb., Steyermark, Oestr.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 101. Jacq. a. t. 333. A. pauciflora Vill. delph. 2. 477. Cor. nivea, circulo aureo ad oram faucis; scapus 2-5 flores, non raro etiam unum tantum fert.

10. **A. carnea** (L. sp. 204.) radice multicipite caespitosa, scapo pedunculisque puberulis, pilis brevissimis stellulatis, *foliis linearibus a basi apicem versus attenuatis* glabris breviter ciliatis subtus carinatis apice recurvatis, pedunculis involucrum subaequantibus, corolla calyce longiore. ♃. In rupibus graniticis alpium et reg. subalpinar., (a. d. Ballon d. Vogesen, d. A. des untern Wallis u. in d. Appenzeller A.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 102. Cor. pulchre rosea, fauce flava.

Sect. III. Andraspis Dub. bot. gall. p. 382., pro parte. Radix simplex, caudiculis destituta, rosula foliorum terminata, scapum unum pluresque proferens. Flores umbellati. Ovarium multiovulatum, 15-30 ovula gerens. Fornices faucem coarctantes.

11. **A. elongata** (L. sp. 1668.) radice simplici foliorum rosula coronata, foliis lanceolatis dentatis margine *scapo* umbellaque puberulis, pilis brevissimis *stellulatis, calycibus corolla longioribus*. ☉. In collibus apricis, incultis, etiam in agris arenosis, (stw. in Oestr., Mähr., Böhm., Schles., Sachs., Thüring., bei Würzb., Regensb., in d. Rheinpfalz.) Jul. Aug. D. fl. 2. 97. Jacq. a. t. 330. A. nana Hornem. hort. hafn. 1. 184. Cor. lactea, fornicibus luteolis. G.

12. **A. septentrionalis** (L. sp. 203.) radice simplici foliorum rosula coronata, *foliis* lanceolatis *dentatis* scapo pedunculisque puberulis, pilis brevissimis stellulatis, *calycibus* glabris *corolla brevioribus*, laciniis corollae integris. ☉. In agris arenosis, (stw. in Unteröstr., Mähr., Schles., Sachs.; sodann Unterhessen, Frankf. a. M., Würzb. u. Werthheim; vereinzelt bei

Königsberg u. im Nicolaithale d. Schw.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 98. Fl. dan. t. 7. Cor. lactea, fornicibus luteis.

Sect. IV. Androsace Haller. helv. 1. p. 276. Fornices breves, ut in antecedentibus, sed erecti et faucem neutiquam angustantes; caetera ut in sec. III.

13. **A. maxima** (L. sp. 203.) radice simplici foliorum rosula coronata, foliis ellipticis lanceolatisve dentatis, *scapo* umbellaque pilosa, *pilis articulatis, calycibus corolla longioribus,* fructiferis maximis. ⊙. In agris, inter segetes, (im mittlern Wallis, in d. Rheingegend zwischen Worms, Kirchheimbolanden u. Mainz; bei Wiesbaden; an d. Mosel bei Winningen; in Unteröstr.) Apr. Mai. D. fl. 2. p. 97. Jacq. a. t. 337. Cor. alba vel rubella, fauce luteola.

6. ARÉTIA (Gaud. helv. 2. p. 95.) Cal. 5 fidus. Cor. hypocrateriformis, tubo cylindrico, ad insertionem staminum dilatato; faux fornicibus brevibus instructa. Ovarium 5 ovulatum. Caps. 5 valvis. — Ovarium in planta viva constanter quinque fert ovula, e quibus vero plerumque 2 vel 3 ad perfectionem non perveniunt. Cor. exacte ut in Primula longiflora, et genus Aretiae, a b. Gaudinio de novo constitutum, a Primula non differt nisi numero ovulorum.

1. **A. Vitaliana** (L. syst. veg. ed. Murr. p. 162.) ♃. In summarum alpium graniticarum rupibus, (in d. südl. Walliser Alpen; a. d. Schlehern im südl. Tyrol.) Jul. Aug. Primula Vitaliana L. sp. 206. Androsace Vitaliana Lap. abr. 94. D. fl. 2. p. 96. Cor. lutea.

7. PRÍMULA (L. gen. n. 197.) Cal. 5 fidus. Cor. hypocrateriformis vel infundibuliformis, tubo cylindrico, ad insertionem staminum dilatato; faux fornicibus praedita vel nuda. Ovarium multiovulatum. Caps. 5 valvis.

Sect. I. Aleuritia Dub. bot. gall. 384. Folia iuniora revolutiva, explicata plana, paulum rugosa et subtus plus minusve farina adspersa. Foliola involucri basi saccato-incrassata. *Fornices breves coloratae in fauce.*

1. **P. farinosa** (L. sp. 205.) *foliis* obovato-oblongis obtuse crenatis *glabris subtus farinosis*, umbella multiflora, *calycis dentibus ovatis*, tubo corollae ad faucem fornicibus brevibus instructo calyce et limbo subsesquilongiore, *involucri foliolis linearibus basi saccato-incrassatis.* ♃. In pratis turfosis, paludosis, planitierum, montium et alpium, (dch. d. g. Alpenk. u. die sie begleitenden Flächen von Oberschwaben, Oberbayern bis Oestreich; sodann im Norden in Mecklenb., Pommern u. Preussen; zerstreut bei Ansbach u. Würzburg.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 104. St. h. 14. Flores carnei. Stamina sexus longistyli in medio tubi, sexus brevistyli in apice tubi inserta. Variat:

β. denudata, foliis subtus farina destitutis. Haec foliis accedit ad P. strictam Hornem. hort. hafn. 1. p. 186., D. fl. 2. p. 103., quae autem calyce ventricoso et limbo corollae multo minore, tubo suo fere triplo breviore, satis differt; hanc in subalpinis Tyrolis 1813. ipsum legisse testatur cl. Lehmann., sed nuper non reperta est.

2. **P. longiflora** (Allion. ped. 1 p. 92. t. 39. f. 3.) *foliis* obovato-oblongis obsolete crenatis *glabris subtus farinosis,* umbella 2-5 flora, *calycis dentibus lanceolatis,* tubo corollae ad faucem fornicibus brevibus instructo calycem et limbum corollae fere ter superante, *involucri foliolis linearibus basi saccato-incrassatis.* ♃. In pascuis summarum alp., (in d. Schw. nur bei d. Gletschersee Matmor über Saas im Wallis; häufiger in Tyrol, Salzb. Oberkärnth., Oest.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 106. St. h. 14. Cor. carnea. Stamina semper in summo apice tubi inserta.

Sect. II. Primulastrum Dub. bot. gall. p. 383. Folia iuniora revolutiva, tenuioris substantia, rugosa, pubescentia vel tomentosa, farina destituta. *Calyx argute angulatus.* Fornices ad faucem breves, plerumque cum basi limbi concolores. Involucri foliola e basi ovata subulata.

3. **P. acaulis** (Jacq. misc. 1. 158.) *foliis* oblongo-obovatis *versus petiolum attenuatis* dentatis rugosis subtus in venis hirtis, pedunculis radicalibus

unifloris vel in scapo umbellatis, *pilis pedicellorum diametrum transversalem pedicelli superantibus*, dentibus calycis argute angulati subquinquefidi lanceolatis acuminatis, *corolla subhypocrateriformi, laciniis limbi planis.* 4. In sylvis subalpinis et in planitiebus ad radices alpium, (v. d. Schweiz durch Oberschwaben, Oberbayern bis Oestreich; wird als Seltenheit in Westphalen, Mecklenb. u. um Halle angegeben.) Floret sub finem hyemis ad initium veris. D. fl. 2. 109. St. h. 14. P. veris *γ.* acaulis L. sp. 205. P. vulgaris Smith. brit. 222. P. grandiflora Lam. fl. fr. 248. P. hybrida Schrank. baier. fl. 1. p. 449. P. sylvestris Scop. carn. 1. p. 132. P. uniflora Gmel. bad. 1. 442. Flores sulphurei, maculis 5 croceis ad faucem, raro, secund. Gaud., rubelli. Forma brevi- et longistyla ut in P. officinali et caeteris hujus sectionis. Variat:

β. caulescens, scapo 2-3 multifloro. Haec sequenti similis quidem, sed notis caeteris, speciem utramque distinguentibus, absque difficultate cognoscitur.

4. **P. elatior** (Jacq. misc. 1. 158.) *foliis* ovato-oblongis ovatisve *in petiolum alatum dentatum decurrentibus* rugosis undulato-crenatis *subtus* scapo umbellaque hirtis, *pilis pedicellorum longitudine diametri transversalis pedicelli*, umbella pluriflora, dentibus calycis argute angulati ovatis acuminatis, corolla infundibuliformi, *laciniis limbi planis*, involucri foliolis e basi ovata subulatis. 4. In sylvis et pratis sylvaticis. Mart. April. D. fl. 2. p. 108. St. h. 14., forma longistyla. P. veris *β.* elatior L. sp. 204. Flores sulphurei; variant autem circulo vitellino ad faucem, et, quamvis raro, in locis sylvestribus floribus purpureis; in hortis autem innumerae coluntur modificationes, coloribus variis splendentes, et praeterea singularis illa varietas calycantha, cuius calyx, in corollam mutatus, figuram et colorem corollae ipsius acquisivit. — Forma brevi- et longistyla ut in antecedente et sequente.

5. **P. officinalis** (Jacq. misc. 1. 159.) foliis ovatis subcordatisve in *petiolum alatum dentatum decurrentibus* rugosis undulato-crenatis *subtus* scapo umbellaque *velutinis*, umbella multiflora, dentibus calycis argute angulati inflati ovatis breviter acuminatis, corolla *infundibuliformi, laciniis limbi concavis campanulatis*, involucri foliolis e basi ovata subulatis. 4. In pratis et sylvis denudatis. Aprili et initio Maii. D. fl. 2. p. 106. St. h. 14. P. veris *α.* officinalis L. sp. 107. P. veris Lehm. monogr. p. 27. In forma brevistyla corollae tubus apice hemisphaerico-inflatus et stamina fauci inserta, in sexu longistylo stamina in medio tubi, supra insertionem cylindrico-ampliati, inserta sunt. Flores suaveolentes, citrini, maculis 5 croceis ad faucem, rarius lilacini.

6. **P. suaveolens** (Bertoloni Journ. bot. 1813. p. 76.) *foliis* ovatis subcordatisve *in petiolum parce dentatum decurrentibus*, undulato-crenatis *subtus niveo-tomentosis*, scapo umbellaque holosericeis, umbella multiflora, dentibus calycis argute angulati inflati breviter acuminatis, *corolla infundibuliformi, laciniis limbi concavis campanulatis*, involucri foliolis ex ovata basi subulatis. 4. In pratis montanis Littoralis, (auf dem Monte Maggiore u. Plavnik.) Apr. Mai. P. Columnae Ten. cat. pl. hort. neap. 1813. Columna ecphr. p. 256. icon. — Corolla ut antecedentis. G.

Sect. III. Aurícula Dub. bot. gall. p. 384. Folia iuniora convolutiva; adulta plana, subcarnosa, non rugosa. Calyx campanulatus vel oblongus teres. Faux corollae fornicibus destituta. Involucri foliola ovata.

a. Umbella specieminum maiorum multiflora; pedunculi inaequales, longiores calycem bis terve superantes. Laciniae corollae obcordatae quidem, sed non ad quartam longitudinis partem emarginatae.

7. **P. Auricula** (L. sp. 205.) *foliis* obovatis dentato-serratis subintegerrimisve margine farinosis denseve ciliatis pilis brevibus glanduliferis, scapo glabro vel superne pedicellis calycibusque farinosis, *involucro pedicellis multo breviori, foliolis ovatis obtusis, fauce corollae dense farinosa, staminibus sexus brevistyli in fauce insertis*, capsula calycem paulum excedente. 4. In rupibus regionum alpinarum et subalpinarum, etiam in planitiebus alpes comi-

tantibus, (ausser d. Alpen auch auf dem Schwarzwalde u. den Torfbrüchen von Oberbayern u. Oberschwaben.) Vere in demissis locis, in alpibus nive soluta. D. fl. 2. p. 110. St. h. 14. Occurrit foliis glabris vel glandulis breviter pedicellatis adspersis, margine breviter ciliatis ibidemque non farinosis, vel obsolete-vel dense farinosis adeo, ut ciliae farina totae obtectae sint. Stamina formae brevistylae in apice tubi infundibuliformis et formae longistylae in basi tubi cylindrici inserta. In hortis eminet floribus purpureis et versicoloribus, sylvestre vero specimen, floribus purpureis ornatum, nondum vidi. Variat:

β. ciliata, ciliae foliorum longiores: P. ciliata Moretti mem. 1. p. 249. n. 16. t. 1., (sec. Bertol.,) si folia insuper pilis brevibus glanduliferis adspersa sunt; calyces hujus quandoque farina carent.

P. marginatam Curt. mag. t. 191., P. crenatam Lam. illustr. 2. 98. f. 3., D. fl. 2. p. 112., quum pro certo non constet, eam in ditione flor. nostrae lectam fuisse, omisi. P. Auriculae similis est, sed dimidio minor, folia glaberrima et margine tantum linea pulverulenta alba cincta, profundius serrata, floresque minores et rosei sunt.

8. **P. pubescens** (Jacquin. miscellan. v. 1. p. 159. secund. specimen ab ipso Wulfenio in herbario Froelichii.) foliis obovato-oblongis, apice dentato-serratis margine dense ciliatis pilis brevibus glanduliferis, scapo glabro vel superne pedicellis calycibusque farinosis, *involucro pedicellis multo breviore, foliolis ovatis obtusis, fauce corollae dense farinosa, staminibus sexus brevistyli paulum supra medium tubi insertis*, capsula . . . . . 4. In rupibus, (häufig bei Pregraten unweit Windisch Matray in Tyrol u. auf den Pregratischen Alpen, Wulfen a. a. O. p. 157.) April, auf den Alpen später. P. helvetica Schleicher. pl. exs., (planta culta, monente Em. Thomasio.) Flores purpurei. Similis Primulae Auriculae, sed minor, tubus corollae gracilior, et staminum insertio diversa. G.

9. **P. rhaetica** (Gaudin. fl. helv. 2. p. 91.) foliis oblongo-obovatis obovatisve apice denticulato-serrulatis margine dense ciliatis, pilis brevibus glanduliferis, scapo pedicellisque glabris vel glandulis minutissimis sessilibus adspersis, *involucro pedicellis multo breviore*, foliolis ovatis obtusis, *fauce corollae non farinosa, staminibus sexus brevistyli sub apice tubi insertis.* 4. In alpibus rhaeticis. Apr. Mai. P. alpina Reichenb. icon. f. 1121. Simillima Primulae villosae, sed indumento diversa, praeterea folia magis oblonga, minus dentata et calyx conspicue minor. Flores dilute purpurei, exsiccati violacei. G.

10. **P. pedemontana** (Thomas. plant. exsicc.) *foliis* oblongis obovatisve *repando-obsolete dentatis* margine fimbriatis pilis brevibus glanduliferis, *scapo pedicellisque glandulis brevissime stipitatis viscosis adspersis, involucro pedicellis multo breviore*, foliolis ovatis obtusis, fauce non farinosa, staminibus sexus brevistyli paulum infra medium tubi insertis, capsula calycem aequante. 4. Alpes helvet., (Walliser u. Bündner Gebirge, Hegetschweiler; Vallee de Lanzo in Frölichs Sammlung.) Jun. Jul. Glandulae in foliorum margine plerumque rubicundae. H.

11. **P. villosa** (Jacq. fl. austr. 5. p. 41.) *foliis obovatis* subrotundisve in petiolum contractis *a medio ad apicem dentato-serratis supra subtusque viscoso-pubescentibus* ciliatis pilis glanduliferis, *scapo pedicellisque breviter villosis* pilis articulatis viscoso-glanduliferis, involucro pedicellis multo breviore, foliolis ovatis obtusis, fauce non farinosa, *staminibus sexus brevistyli paulum supra medium tubi insertis, calyce fructifero capsulam bis excedente.* 4. In rupibus alpium graniticarum editiorum, (a. d. südl. A. d. Schweiz u. Tyrols, u. d. Alp. zwischen Kärnthen u. Krain.) Mai., in alp. serius. P. villosa Jacq. l. c., secund. specimen e manu Wulfenii, in collectione Froelichiana asservatum, Jacq. fl. a. app. t. 27.; figura superior mediocris, inferior pessima. St. h. 24. (copia posterioris.) P. villosa Willd. herbar. 3483. fol. 2. P. ciliata Schrank. prim. fl. salisb. p. 64. n. 186. Lehm. monogr. p. 79. D. fl. 2. 113. (non P. villosa D. fl. 2. 112., quae ad P. latifoliam pertinet.) P. hirsuta DC. fl. fr. 3. p. 449., sexum brevistylum

describit. Reichenb. ic. f. 854., sexus brevistylus. P. villosa Reichenb. ic. f. 855., sexus longistylus. P. viscosa Reichenb. fl. exc. p. 403. (P. viscosam Villarsii cl. DC. ad P. viscosam suam, P. latifoliam Lap., trahit.) P. viscosa Gaud. helv. 4. p. 89., non DC. — Flores dilute purpurei, siccati violacei. Variat raro floribus albis: P. nivea hortor. P. villosa var. nivea bot. mag. 1161. P. ciliata var. Reichenb. fl. exc. p. 404. — P. villosa in horto ob viscositatem semper terrae et arenae particulis contaminata est.

12. **P. latifolia** (Lapeyrouse abr. p. 97.) *foliis* obovatis vel oblongo-obovatis in petiolum attenuatis *a medio ad apicem dentato-serratis supra subtusque pilis brevibus adspersis* ciliatisque pilis glanduliferis, scapo pedicellisque pilis glanduliferis brevibus adspersis, involucro pedicellis multo breviore, foliolis ovatis obtusis, fauce parce farinosa, *staminibus sexus brevistyli fauci insertis, calyce fructifero capsula paulo breviore.* 4. In alpibus helveticis, (Graubünden, Engadin, Wallis.) Jun. Jul. P. graveolens Hegetschw. fl. d. Schweiz p. 194. P. villosa M. et K. D. fl. 2. p. 112. P. viscosa DC. fl. fr. 3. p. 449. (describit sexum longistylum.) P. hirsuta All. ped. n. 337., sec. DC. (in herbario Willd. autem specimen P. hirsutae, a cl. Balbisio communicatum, sub n. 3483. fol. 5. asservatur, quod ad P. pedemontanam pertinet.) — Num P. viscosa Villarsii ad P. latifoliam, an ad P. villosam Jacq. pertineat, ex descriptione eius clare non elucet. H.

13. **P. venusta** (Host. flor. austr. 1. p. 248.) *foliis* obovatis dentato-serratis subintegerrimisque *utrinque glabris,* scapo glabro superne umbellaque parce calycibus margine intusque dense farinosis, *involucro pedicellis multo breviore, foliolis ovatis* obtusis, calyce corollae tubo triplo breviore dentibus ovatis *intus margineque farinosis,* capsula calycem subaequante. 4. In montanis et subalpinis, (bei Idria, Hladnik, Graf.) April. Mai. St. h. 54. Flores purpurei, exsiccati saturate violacei. Simillima P. Auriculae, sed folia utrinque glabra, margine glandulis stipitatis remotis obsita, vix ciliata, scapus superne et calyces farina paucissima adspersi et calyces margine tantum et intus dense farinosi. G.

14. **P. carniolica** (Jacq. flor. austr. 5. p. 28. app. t. 4.) *foliis* obovatis oblongisve repando-crenatis integerrimisve scapo pedunculis calycibusque *glabris, involucro pedicellis multo breviore, foliolis ovatis* obtusis, calyce corollae tubo triplo breviore, dentibus ovatis *glabris,* capsula calycem subaequante. 4. In montanis et alpinis, (Krain.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 114. St. h. 54. P. integrifolia Scop. carn. 1. 133. Flores purpurei siccati rubro-violacei. G.

Sect. IV. Arthritica Dub. bot. gall. p. 384. Folia iuniora convolutiva, adulta plana, subcarnosa. Umbella pauciflora, non raro uniflora; flores brevissime pedunculati, vel sessiles; involucri foliola oblonga vel lineari-oblonga, obtusa, pedicellos longe superantia. Laciniae corollae semibifidae, lobis divaricatis.

15. **P. spectabilis** (Tratt. tabular. 1. 426., sec. R. et S. syst. veg. 4. 146.) *foliis* elliptico-lanceolatis lanceolatisve *integerrimis glabris cartilagineo-marginatis,* margine brevissime ciliato vel minute denticulato, scapo glanduloso-scabriusculo 1-3 floro, *involucri foliolis linearibus pedicellos aequantibus superantibusque, calyce tubuloso*-campanulato *tubo corollae breviore.* 4. In glareosis alpium, in subalpina descendens, (Salzb., Tyrol, Kärnth., Krain, Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 116. P. integrifolia St. h. 24., (non bona, itaque dubia.) P. integrifolia L. sp. 205., secundum citatum ex Clusii hist. Flores purpurei. Variat:

α. ciliata, foliorum margo cartilagineus et insuper ciliis brevibus obsitus: P. integrifolia Jacq. a. t. 327. Reichenb. ic. 1. f. 69., omisso margine cartilagineo, qui nunquam desideratur. P. Clusiana Tausch. bot. Ztg. 4. 1. p. 364.

β. denticulata, foliorum margo cartilagineus, subtiliter denticulatus, ciliis destitutus: P. integrifolia Tausch. bot. Ztg. 4. 1. 364. P. calycina Reichenb. ic. 1. f. 70. D. fl. 2. p. 116., forma dentibus calycis acutiusculis; non Gaud.

Varietatem foliis dentatis nondum vidi. G.

16. **P. integrifolia** (Linn. sp. pl. 205., secund. citat. ex Hallero et locum natalem helveticum et pyrenaicum.) *foliis* ellipticis oblongisve glabris vel supra sparsim pilosis *margine* (non cartilagineo) *scapoque villosis*, scapo 1-3 floro, *involucri foliolis linearibus pedicellos superantibus*, calyce tubuloso-campanulato tubo corollae breviore. 4. In subuliginosis summarum alpium Helvetiae, (Alpen der östl. Schwz., aber bisher noch nicht in Deutschland aufgefunden.) Jul. Aug. DC. fl. fr. 3. p. 450. Gaud. fl. helv. 2. p. 93. D. fl. 2. p. 115. P. Candolleana Reichenb. ic. 6. f. 802. 803. Cur nomen, a praestantissimis viris Candollio et Gaudinio adoptatum, mutetur, non video. Linnaeus plantam helveticam, pyrenaicam et styriacam sub una specie comprehendit, et scriptores modo commemorati multis annis ante cl. Reichenb. illam quae Helvetiam et Pyrenaeos inhabitat, non vero styriacam, sub hoc nomine proposuerunt. H.

17. **P. Dinyana** (Lagger. Regensb. bot. Ztg. 22. p. 670.) *foliis* oblongo- vel lanceolato-*cuneatis antice repandis denticulatisve dentibus muticis* pubescentibus pilis brevissimis laxe adspersis margine dense breviterve ciliatis, scapo 2-4 floro, floribus breviter pedicellatis, *involucri foliolis* ovato-lanceolatis *pedicellos excedentibus*, calyce campanulato. 4. In alpibus helveticis altioribus, (Albula in Graubünden.) Jun. Jul. P. Muretiana Moritzi. flor. d. Schweiz p. 247.; monente Moritzio l. c. nomen ab ipso propositum prioritate gaudet. P. Mureti v. Charpentier in Litt. Flores purpurei. H.

18. **P. glutinosa** (Wulfen. ap. Jacq. flor. austr. 5. p. 41. append. t. 26. 1778.) *foliis cuneato-lanceolatis* obtusis *glutinosis* scapoque glaberrimis *a medio ad apicem serratis, serraturis muticis*, scapo 3-5 floro, floribus subsessilibus, *involucri foliolis ovalibus calycem aequantibus superantibusque*, calyce tubuloso-campanulato. 4. In locis humidis alpium altiorum, (Tyrol, Kärnth., Steyerm.) Jun.-Aug. P. glutinosa L. fil. suppl. p. 133. 1781. D. fl. 2. p. 117. St. h. 24., non bona. Flores saturate violacei. G.

19. **P. Allionii** (Loiseleur. notice p. 38.) *foliis obovatis mucronato-denticulatis* vel subintegerrimis *supra subtusque* scapo calycibusque *glanduloso-pilosis* viscosis, scapo 1-2 floro, floribus brevissime pedicellatis, *involucri foliolis* cuneatis *pedicellos superantibus*. 4. In rupibus calcareis, (Berg Castellazo di Paneveggio in Fiemme u. von da östl. an der obersten Baumgrenze, Facchini.) Jun. P. glutinosa All. auct. p. 6. G.

20. **P. Floerkeana** (Schrader. in Krünitz. oecon. encyl. vol. 117. p. 393., secund. Lehm. monogr. prim. p. 81.) *foliis obovatis* basi cuneatis scapoque glabris subglutinosis *antice rotundatis et fere a medio crenato-dentatis, dentibus acuminato-mucronulatis*, scapo 3-5 floro, floribus brevissime pedicellatis, *involucri foliolis ovali-oblongis calycem subaequantibus*, calyce tubuloso-campanulato. 4. In summis alpibus, (südl. Tyrol, Facchin.!, Oberkärnthen, Obersteyerm.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 118. Lehm. monogr. prim. t. 8. Cor. purpurea. Sexum longistylum non vidi. G.

21. **P. minima** (L. sp. 205.) *foliis obovato-cuneatis* scapoque glabris *antice truncato-obtusis crenatisque, crenis acuminato-mucronatis*, scapo 1-2 floro, floribus subsessilibus, involucri foliolis linearibus calycem subaequantibus, calyce tubuloso-campanulato. 4. In locis rupestribus humidis alpium, (Gotthard u. v. Graubünden dch. Tyrol, Salzb., Kärnth., Steyerm. nach Oestr.; Schneekuppe in d. Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 118. St. h. 29. Flores rosei, rarius albi. Variat, ut aliae, lobis laciniarum corollae angustioribus latioribusque; haec ultima est P. Sauteri Schultz. in Regensb. bot. Ztg. v. 19. p. 123. et

β. pubescens, Bl. et F. compend. fl. germ. 1. ed. 2. p. 332., foliis sesquipollicem longis, subpubescentibus: P. truncata Lehm. monogr. p. 87. t. 8. In alpibus Salisb. Nondum vidi.

Primulam calycinam Dub. ap. Gaud. helv. 2. p. 94. omisi, cum intra fines ditionis nostrae nondum observata sit.

8. HOTTÓNIA (L. gen. n. 203.) Cal. 5 partitus; caetera ut Primulae.

1. **H. palustris** (L. sp. 208.) floribus verticillatis pedunculatis, internodiis aequalibus, corolla calycem multum superante, foliis pectinato-pinnatifidis. 4. In fossis, paludibus, et aquis lente fluentibus. Mai. Jun. D. fl. 2. 128. Schk. t. 35. Flores albi vel dilute rosei. In sexu brevistylo stamina ad marginem faucis inserta, filamentis, anthera quadruplo longioribus, longe emergunt, stylus tubum aequat; in sexu longistylo stamina, in medio tubi inserta, filamentis, vix longitudine antherarum, non ultra tubum progrediuntur, stylus vero, tubo sesquilongior, emergit.

9. CORTÚSA (L. gen. n. 198.) Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformis, tubo brevi, stamina fauci inserta, ex annulo prominente egredientia. Ovarium multiovulatum. Caps. bivalvis, valvulis apice bifidis.

1. **C. Matthioli** (L. sp. 206.) 4. In locis irriguis, ad margines fontium et torrentium, convallium alpinarum et reg. subalpinarum, in reg. inferiorem alpium descendens, (Schwab., Bayern, nördl. Tyrol u. Steyerm.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 120. Jacq. ic. rar. t. 32. Flores purpurei. G.

10. SOLDANÉLLA (L. gen. n. 199.) Cal. 5 partitus. Cor. infundibuliformi-campanulata, limbo 5 fido, laciniis multifidis. Caps. apice circumscisse dehiscens, operculo delapso multidentata.

1. **S. montana** (Willd. en. hort. berol. 1. p. 192.) foliis subrotundis leviter remote crenatis, *scapo* 2-4 *floro, pedicellis pubescentibus, pube brevissima glandulifera*, corolla ad medium fissa, squamis faucis filamenta subaequantibus, stylo corollam aequante vel longiore. 4. In locis turfosis spongiosis, montanis et subalpinis, (Steyerm., Salzb., Oestr., Böhm.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 122. S. alpina Schm. boh. 2. p. 49. Flores exsiccati violacei. Filamenta antheris dimidio breviora. G.

2. **S. alpina** (L. sp. 206.) foliis subrotundo-reniformibus integerrimis vel subrepandis, scapo 2-4 *floro, pedicellis scabriusculis glandulis minutis sessilibus*, corolla ad medium fissa, squamis faucis filamenta aequantibus, stylo corollam aequante vel longiore. 4. In alpibus ad nivem aeternam usque; etiam in subalpina descendens, (dch. d. g. Alpenk., sodann a. d. Feldberge im Schwarzw., u. a. d. Mährischen Karpat.) Mai, ad nives liquefactas in autumn. D. fl. 2. p. 122. St. h. 20. S. Clusii Schm. boh. p. 50., non Gaud. Cor. violacea, striis saturatioribus, in laciniis corollae nervum medium aemulantibus. Filamenta antheris dimidio breviora.

3. **S. pusilla** (Baumgarten. fl. transs. 1. p. 158.) *foliis cordato-reniformibus* subrepandis, *scapo unifloro, pedicellis scabriusculis* glandulis minutis sessilibus, corolla vix ad tertiam partem fissa, laciniis rectis, squamis faucis nullis, stylo corolla breviore. 4. In summis alpibus, (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnth., Steyerm.) Floret cum antec. D. fl. 2. p. 122. St. h. 41. S. Clusii Gaud. helv. 2. p. 76., non Schm. Color corollae fere cupreus, paululum in caeruleum vergens, laciniae rectae, non extrorsum flexae, Angelis. Filamenta fere longitudine antherarum basi utrinque mucronulo praeditarum.

4. **S. minima** (Hopp. apud. Sturm. Deutschl. Flor. Heft 20.) *foliis orbiculatis, scapo unifloro, pedicellis pubescentibus*, pube brevissima glandulifera, corolla ad tertiam partem fissa, laciniis apice pantentibus, squamis in fauce brevissimis nullisve, stylo corolla breviore. 4. In alpibus et subalpinis, (Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyerm.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 124. Cor. dilute lilacina, intus purpureo-striata, striis in laciniarum basi evanescentibus, Angelis. Filamenta fere longitudine antherarum; hae basi utrinque rotundatae. G.

11. CYCLÁMEN (L. gen. n. 163.) Cal. 5 partitus. Corollae tubus brevis, campanulatus; limbus 5 partitus, refractus. Caps. 5 valvis.

1. **C. europaeum** (L. sp. 207.) corolla fauce integra, laciniis acutis, *foliis repandis vel crenulatis* subrotundis ovatisque apiculatis basi profunde cordatis sinu acuto, *crenis muticis*. 4. In sylvis montanis et subalpinis, (v. d. Schweiz dch. d. Alpenk. bis Oestr. u. v. da nach Böhm. u. Mähr.)

Aug.-Octob. D. fl. 2. p. 125. Jacq. a. t. 401. St. h. 34. Flores purpurei. — C. coum Mill., secundum cl. Reichenb. in Helvetia crescens, a C. europaea facile distinguitur foliis orbiculato-cordatis, obtusissimis, non apiculatis, vix repandis et corollae laciniis subrotundo-ovatis, rotundato-obtusis. Specimen helveticum nondum vidi.

2. **C. hederifolium** (Ait. kew. v. 1. 311.) *corollae fauce decemdentata,* laciniis acutis, foliis ovatis crenatis angulatisque basi profunde cordatis sinu clauso, *crenis angulisque muticis.* 4. In locis petrosis aridissimis, (im Wallis, Gaud.) Floret sero autumno, ante foliorum explicationem. Gaud. helv. 2. p. 74. C. neapolitanum Tenor. fl. neap. 3. p. 197. t. 118. Syllog. p. 89. Clus. hist. 1. 265. fig. sinistr. Flores purpurei. H.

3. **C. repandum** (Sibth. et Smith. prodr. fl. graec. p. 128.) corollae fauce integra, laciniis acutis, *foliis* cordatis *repandis angulatisque, angulis crenisque mucronulatis.* 4. In nemorosis, (Istrien.) April. C. hederifolium Tenor. syllog. fl. neap. p. 90. sec. specimina ab auctore in collectione Martii. Flores purpurei. Cyclamen repandum nostrum ex descriptione cl. Bertolonii ad ispsius C. vernum pertinet. J.

12. SÁMOLUS (L. gen. n. 223.) Cal. semisuperus, 5 fidus. Corollae tubus breviter campanulatus; limbus 5 partitus, patentissimus. Stam. 10; 2 fertilia, fundo corollae inserta, laciniis corollae opposita; 5 sterilia, altius inter lacinias inserta. Caps. 5 valvis.

1. **S. Valerandi** (L. sp. 243.) erectus, foliis obovatis oblongisve obtusis, racemis denique elongatis, bracteis in medio pedicellorum, capsula subglobosa. 4. In locis humidis et fossis salsis, (stw. d. d. G.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 194. Schk. 1. t. 40. Flores albi.

13. GLAUX (L. gen. n. 291.) Cal. campanulatus, 5 fidus, coloratus. Cor. o. Stam. in fundo calycis inserta, laciniis eiusdem opposita. Caps. 5 valvis.

Genus hoc fabrica floris multo affinius Amaranthaceis et Paronychieis est quam Primulaceis; cum his solummodo congruit seminis figura et embryone recto, centrali.

1. **G. maritima** (L. sp. 301.) In locis humidis salsis, (am Strande der Ost- u. Nordsee u. an d. Salinen d. Binnenlandes.) Mai. Jun. Flores rosei. G.

Ord. XCI. GLOBULARIEAE. DC. fl. fr. 3. p. 427.

Cal. 5 fidus, *aestivatione imbricatus,* persistens. *Cor. monopetala, hypogyna,* 5 fida, plerumque inaequalis. *Stam.* 4, *tubo corollae inserta, eiusdem laciniis alterna, quintum inter lacinias superiores deficiens. Ovarium* liberum, 1 *loculare,* 1 *ovulatum,* ovulo pendulo. Styl. 1. Stigma bifidum. Fructus utricularis, non dehiscens. Embryo rectus, radicula ad hilum spectante. Albumen carnosum.

1. GLOBULARIA (L. gen. n. 112.) Character Generis idem ac Ordinis. — Flores violaceo-caerulei, rarius in varietate albi.

1. **G. vulgaris** (L. sp. 139.) herbacea, radice multicipite, *foliis* radicalibus spathulatis emarginatis vel breviter tridentatis, *caulinis copiosis lanceolatis.* 4. In pratis siccis et collibus petrosis incultis, solo calcareo. Mai. Jun. D. fl. 1. p. 733. St. h. 27.

2. **G. nudicaulis** (L. sp. 140.) herbacea, *radice multicipite,* foliis radicalibus oblongo-cuneatis apice rotundato-obtusis, *caulibus nudis* vel squamis 1-2 remotis obsitis. 4. In locis rupestribus fertilioribus alpium calcarearum, hinc inde cum fluviis descendens, (dch. d. g. Alpenk., u. als Flüchtling im Isarbette bei München.) Mai-Jul. D. fl. 1. p. 734. Jacq. a. t. 230.

3. **G. cordifolia** (L. sp. 139.) suffruticosa, *procumbens, subrepens,* foliis

obovatis postice cuneato-attenuatis apice obtusissimis integris emarginatis tridentatisque. 4. In locis glareosis aridis alpinis et demissioribus, (dch. d. g. A. K. u. die d. A. begleitenden Niederungen, südlich bis Triest.) Mai. Jun. in Alpib. serius. D. fl. 1. p. 734. Jacq. a. t. 245.

Ord. XCII. PLUMBAGINEAE. Juss. gen. 92.

Cal. 5 dentatus, *plicatus*, persitens. *Cor. monopetala regularis, limbo* 5 *partito; aut* 5 *petala*, petalis unguiculatis. *Stam.* 5 *in monopetalis hypogyna, in polypetalis petalorum unguibus adnata*, aestivatione recta. *Ovarium* liberum, 1 *loculare*, 1 *ovulatum*, ovulo ex apice funiculi elongati pendulo. Styli 5; vel 1, stigmatibus 5. Capsula apice dehiscens vel indehiscens. Embryo rectus; radicula hilum spectans. Albumen carnosum.

1. STÄTICE (L. gen. n. 388.) Cal. superne scariosus. Cor. 5 petala, petalis quandoque basi connatis. Styl. 5. Caps. indehiscens.

Sect. I. Armeria DC. fl. fr. 3. p. 419. Flores in capitula collecti, involucro imbricato communi tecta. Foliola involucri exteriora basi deorsum in vaginam cylindricam producta. Capitulum e racemulis brevibus, 2-6 floris compositum; singuli flores bractea hyalina fulti. — Species huius sectionis intricatae ulterioribus indigent observationibus, quam ob rem nostras hic sic propono, quales in bot. Zeit. 6. 2. p. 689., olim descripsi. In Deutschl. flora eas cum b. amico Mertensio, ut nunc mihi persuasum habeo, immerito contraxi. —

1. **S. plantaginea** (All. ped. 2. p. 90., excl. syn. Jacq.) *caule monocephalo* nudo, *foliis* lineari-lanceolatis lanceolatisve acuminatis basi in petiolum attenuatis *tri-septemnerviis, involucri foliolis extimis cuspidatis, interioribus* obtusissimis nervo excurrente *mucronulatis*, pedicellis longitudine tubi calycis viloso-striati*), petalis rotundatis truncatisve. 4. In locis arenosis, (bisher bloss auf dem Sande u. im Kieferwalde zwischen Mainz u. Niederingelheim, aber in Menge; u. auf d. südl. Seite der Walliser A.) Jun. Jul. Armeria plantaginea Willd. en. h. berol. 1. 334. D. fl. 2. p. 436. Flores rosei. Allionii planta certo cum nostra eadem est, testantibus speciminibus prope Aug. Taurin. lectis. Armeria scorzonerifolia Willd. l. c. differt capitulis maioribus, floribus lilacinis, pedicellis calycis tubo dimidio brevioribus et petalis profundius retusis; num vero species sit, an varietas, ulterius observandum est.

2. **S. elongata** (Hoffm. Deutschl. flora ed. 2. v. 1. p. 150.) *caule monocephalo* nudo, *foliis* linearibus acutiusculis *uninerviis* ciliatis, *involucri foliolis extimis cuspidatis, interioribus* obtusissimis nervo excurrente *mucronatis*, pedicellis longitudine tubi calycis villoso-striati, petalis integris crenulatis subemarginatisve. 4. In locis arenosis, (stw. dch. d. g. Geb.) Iam Maio sparsim florere incipit atque flores fert usque in autumnum. S. Armeria L. fl. suec. p. 99. „in hortis arenosis sata ornat continuis floribus" Linn. l. c. St. Armeria β. elongata DC. fl. fr. 3. p. 419. S. Armeria St. h. 1. Pollich. pal. 1. p. 318. et plurim. auct. germ. S. arenaria Pers. 1. 332. (sec. DC. in suppl. p. 379.) Dub. bot. gall. p. 389. Armeria vulgaris Willd. en. 1. 333. D. fl. 2. p. 436. Flores rosei. A. littoralis Willd. en. l. c. non differt. Variat:

β. *pubescens*, scapo pubescente: Armeria vulgaris γ. pubescens Dethard. conspect. 28.

3. **S. purpurea** (Koch. D. fl. suppl. ined.) *caule monocephalo* nudo, *foliis* linearibus obtusis *uninerviis* basi ciliatis, involucri *foliolis extimis obtusis mucronatis, interioribus* obtusissimis nervo ante apicem evanescente *muticis*,

*) Calycis tubus in speciebus pluribus inter strias villosas interstitia glabra habet, illum villoso-striatum voco; in aliis speciebus interstitia quoque villosa sunt et totus tubus villosus fit. In siccis speciminibus autem interstitia adeo contrahuntur, ut has notas aegre distinguas.

pedicellis longitudine tubi calycis villoso-striati, petalis truncatis. 4. In pascuis et pratis uliginosis, (bisher bloss auf d. Riede bei Memmingen.) Jul. Aug. Armeria purpurea Koch. bot. Ztg. 6. 2. p. 710. Floribus saturate purpureis statim dignoscitur. Scapus elongatus, ut in S. elongata, semper glaber. Involucrum Armeriae maritimae. Bractea floris primi racemulorum dimidium calycis vix superat, secundi pedicellum aequat; in S. maritima bractea floris primi limbum calycis, secundi calycis tubum attingit, et corollae lilacinae sunt.

4. **S. maritima** (Miller. dict. n. 3.) *caule monocephalo* nudo, *foliis* linearibus *uninerviis* obtusis margine basin versus ciliatis, *involucri foliolis extimis muticis vel arista crassa herbacea terminatis, interioribus* obtusissimis ob nervum ante apicem evanescentem *muticis*, pedicellis longitudine tubi calycis ubique villosi, *petalis emarginatis*. 4. Ad littora maris occidentalis, (bei Cuxhaveu, auf Wiesen am Seestrande durch ganz Ditmarsen häufig, Sonder.) Jun. Jul., rarius iterum sub autumnum. Flores lilacini. S. Armeria Smith. brit. 341. Engl. bot. t. 226. Hoffm. D. fl. 1. 150. S. Armeria *β.* DC. fl. fr. suppl. p. 370. Armeria maritima Willd. en. h. berol. 1. 333. Koch. in d. Regensb. bot. Ztg. 6. 2. p. 706. Flores lilacini. — Differt a Statice elongata foliis obtusis, involucri foliolis omnibus obtusis, exterioribus 1-2 saepius mucrone obtuso herbaceo instructis, calyce toto villoso, atque scapis 3-4 pollicaribus fastigiatis, qui in millenis speciminibus, areas hortorum cingentibus, etiam in solo pinguissimo nunquam elongantur. G.

5. **S. alpina** (Hoppe pl. alp. exsicc.) *caule monocephalo* nudo, *foliis lineari-lanceolatis* linearibusve glabris *subtrinerviis, involucri foliolis extimis obtusis* submucronatis, *interioribus* obtusissimis nervo ante apicem evanescente *muticis*, pedicellis tubo calycis villoso-striato dimidio brevioribus, petalis emarginatis. 4. In pascuis alpium, (Wallis, Tyrol, Kärnthen, Steyerm., Oestr.) Jul. Aug. S. Armeria *γ.* alpina DC. fl. fr. 3. p. 419., excluso syn. Mill. (cuius planta folia subulata habet.) Armeria alpina Willd. en. h. berol. 1. 333. D. fl. 2. p. 488. St. h. 51. Flores rosei. Specimina a me visa glaberrima sunt. Gaudinii S. Armeriam *α.* alpinam scapo piloso foliisque ciliatis nondum vidi.

Sect. II. **Limonium** Dub. bot. gall. p. 387. Flores spicati, spicis secundis. Folia radicalia rosulata.

6. **S. Gmelini** (Willdenow. sp. pl. 1. p. 1524.) *foliis* oblongo-obovatis obovatisve mucronatis in petiolum attenuatis glabris *uninerviis*, caule erecto tereti glabro vel pubescente a medio ramoso-paniculato, *ramis patentissimis, ramulis recurvatis*, ramis infimis sterilibus, spicis secundis, floribus dense approximatis, bractea interiore margine scarioso lato cincta, dentibus calycis ovatis acutis. 4. Ad littora maris Adriatici, in Littorali austriaco. Jul. Aug. Flores violaceo-caerulei. G.

7. **S. Limonium** (L. sp. 394.) *foliis* oblongis obovatisve mucronatis in petiolum attenuatis glabris *uninerviis* caule erecto tereti glabro superne ramoso, *ramis erecto-patentibus subcorymbosis*, ramulis denique reflexis, ramis infimis sterilibus, spicis secundis, floribus dense approximatis, bractea interiore margine lato scarioso cincta, dentibus calycis ovatis acutis. 4. Ad littora maris German. septentr. Aug. Sept. Fl. dan. t. 345. S. Behen Drejer. fl. exc. hafn. p. 122. S. Pseudo-Limonium Reichenb. ic. 8. f. 959. Flores violaceo-caerulei. — Statice rariflora Drejer. fl. exc. hafn. p. 121., in proxima Dania atque in Suecia proveniens, a S. Limonio differt spicis erectis vix curvatis floribusque dissitis. G.

8. **S. globulariaefolia** (Desfontaines. fl. atlant. 1. p. 274.) glabra, *foliis* oblongo-spathulatis mucronatis in petiolum attenuatis 3-5 *nerviis, caule tereti laevi paniculato*, ramis inferioribus sterilibus, spicis secundis laxis, limbo calycis 5 partito, laciniis oblongis rotundato-obtusis fructiferi patentissimis. 4. Ad littora maris adriatici, (auf den Dünen v. Primiero zwischen Grado u. dem Ausflusse des Isonzo, Tommas.) Mai-Jul. Reichenb. ic. f. 375. Flores caeruleo-violacei. G.

9. **S. caspia** (Willdenow. en. hort. ber. 1. p. 336.) *foliis* obovatis vel lanceolato-cuneatis in petiolum attenuatis breviter mucronatis *trinerviis* glabris, *caule ramosissimo paniculato granulato-scabro*, ramis inferioribus sterilibus, spicis brevibus densifloris, bracteis exterioribus totis, interioribus a medio ad apicem albo-scariosis, dentibus calycis ovatis breviter acuminatis subtiliter denticulatis. 4. In sabulosis ad mare adriaticum, (bei Grado im östr. Littorale.) Jul. Aug. Reichenb. ic. f. 335. S. bellidifolia DC. fl. franc. 3. p. 421., non Sibth. et. Sm. Flores caerulei. G.

10. **S. cancellata** (Bernhardi apud Bertolon. fl. ital. 3. p. 525.) *tomentoso-hirta*, *foliis* obovato-spathulatis cuneatisve *emarginatis*, caule fere rectangule infracto-flexuoso ramosissimo, ramis refracto-divaricatis, inferioribus sterilibus spicis laxiusculis, laciniis calycis fructiferi oblongo-lanceolatis patentibus. 4. In rupibus ad mare adriaticum, (bei Triest u. Fiume, Scoglio Telmego auf d. Südspitze v. Istrien.) Mai. Jun. S. pubescens Koch. syn. ed. 1. p. 595. S. furfuracea Reichenb. ic. f. 327. an Lagascae? Flores caeruleo-violacei. G.

2. PLUMBÁGO (L. gen. n. 213.) Cal. tubulosus, 5 dentatus. Cor. monopetala, infundibuliformis, 5 loba. Stam. 5, hypogyna, basi dilatata. Styl. 1. Stigm. 5. Caps. apice dehiscens, 5 valvis.

1. **P. europaea** (L. sp. 215.) foliis amplexicaulibus lanceolatis margine scabris, radicalibus obovatis petiolatis, caule ramoso, laciniis corollae ovalibus. 4. In locis incultis, ad sepes (Pola in Istrien u. bei Fiume.) Aug. Sept. Col. ecphr. 1. t. 161. Cor. lilacina. J.

Ord. XCIII. PLANTAGINEAE. Juss. gen. p. 89.

Flores hermaphroditi vel dioici. Cal. 4 partitus, persistens, (in flore fem. Littorellae unisexualis 3 sepalus.) *Cor. monopetala, hypogyna*, 4 *fida, regularis, scariosa.* Stam. 4, tubo corollae vel receptaculo inserta, eiusdem laciniis alterna; filamenta per aestivationem induplicata. Ovarium liberum, 1 loculare, 1 ovulatum, ovulo erecto; vel, placenta centrali compressa bialata vel quadrialata, 2-4 loculare; ovula in angulis placentae affixa, 1-plura. Styl. 1. Embryo rectus, radicula ad hilum versa. Albumen corneum.

1. LITTORÉLLA (L. gen. n. 1328.) Monoica. Flores masculi pedunculati. Cal. 4 sepalus. Cor. tubus cylindricus, limbus 4 partitus. Stam. receptaculo inserta. Flores fem. ad basin pedunculi masculorum sessiles. Cal. 3 sepalus. Cor. oblonga, basi apiceque attenuata, ore obsolete denticulata. Nux unilocularis.

1. **L. lacustris** (L. sp. 160. et 295.) 4. In locis inundatis, piscinis et lacubus, solo arenoso, (sehr zerstreut dch. d. g. Geb.) Jun. Jul. Schk. t. 287. St. h. 41. Flores albidi. Ad latera aquarum stagnantium, aqua diminuta, frequenter, sub aqua ipsa vero nunquam floret.

2. PLANTÁGO (L. gen. n. 142.) Flores hermaphroditi. Cal. profunde 4 partitus, laciniis 5 anterioribus quandoque in unam coalitis. Cor. tubus ovatus, limbus 4 partitus, refractus. Stamina imo tubo inserta. Caps. circumscissa, placentam liberam bi-quadrialatam includens, eoque 2-4 locularis. — Flores specierum omnium albidi vel fuscescentes.

Sect. I. Plantagines genuinae. Caulis praeter capita radicis specierum perennium nullus vel brevissimus. Pedunculi radicales (scapi,) nudi. Placenta bialata.

a. Placenta bialata utrinque 2-4 sperma. Corollae tubus glaber.

1. **P. maior** (L. sp. 163.) *foliis petiolatis ovatis ellipticisve* subdentatis glabris vel sparsim pubescentibus 5-9 nerviis, *scapis adscendentibus* teretibus obsolete striatis *folia subaequantibus*, spica lineari-cylindrica elongata, bracteis ovatis obtusiusculis carinatis margine membranaceis, *calycem sub-*

aequantibus, capsula 8 sperma. ♃. In locis cultis, pascuis; in subalpina adscendens. Jul.-Octob. D. fl. 1. p. 800. Schk. t. 23. St. h. 87. In locis arenosis humidis occurrit minuta, foliis semipollicaribus, scipa 3-10 flora: P. minima DC. fl. fr. 3. p. 408. In pratis salsis obvenit scapis multo longioribus, pedalibus, plerumque erectis: P. media procera Sonder. in litt. (Diese bei Oldesloe, Sonder; bei Kissingen, Zeyher.)

2. **P. Cornuti** (Gouan. illustr. p. 6., non Jacq.) *foliis petiolatis ovatis ellipticisve* integerrimis subdentatisve glabris 5-7 nerviis, *scapis erectis* profunde striatis *folia bis terve superantibus*, spica lineari-cylindrica elongata, bracteis ovatis obtusis carinatis margine membranaceis *calyce dimidio brevioribus*, capsula 4 sperma. ♃. In pratis salsis ad mare adriaticum, (Triest.) Jul. Aug. St. h. 87. P. Gouani Spreng. s. v. 1. 433. P. limosa Kit. ap. Schult. syst. veg. 3. p. 111. sub P. maiore. P. Tabernaemontani Baumgart. en. p. 89. Spica fere nigra. G.

b. Placenta utrinque monosperma. Corollae tubus glaber.

3. **P. media** (L. sp. 163.) *foliis ellipticis* subdentatis 7-9 nerviis utrinque hirtis basi *in petiolum brevem latum contractis*, scapo tereti leviter striato, spica oblongo-cylindrica densa, bracteis ovatis acutiusculis glabris margine membranaceis, corollae tubo glabro. ♃. In pratis et pascuis, in alpes adscendens. Mai. Jun. D. fl. 1. p. 802. Fl. dan. t. 551. St. h. 87.

4. **P. altissima** (L. sp. 164.) foliis lanceolatis utrinque attenuatis subdenticulatis 5-7 nerviis glabris pilosisve, *scapo multisulcato*, spica oblongo-cylindrica densa, *bracteis* ovatis attenuato-acuminatis *scariosis glabris*, calycis laciniis lateralibus carinatis *apice rotundato-obtusis margine ciliatis*. ♃. In pratis reg. australiorum, (häufig auf den Wiesen v. Krain, südl. Tyrol.) April. Mai. P. lanceolata *β.* DC. fl. fr. 5. p. 377. Koch syn. ed. 1. p. 597. St. h. 87. G.

5. **P. lanceolata** (L. sp. 164.) *foliis* lanceolatis utrinque attenuatis subdenticulatis 3-6 nerviis *glabris hirsutisve, scapo quinquesulcato*, spica ovata vel oblongo-cylindrica densa, *bracteis* ovatis attenuato-acuminatis *scariosis glabris*, calycis laciniis lateralibus navicularibus *in apicem obtusum acuminatis margine glabris*, dorso carinatis carina ciliatis glabrisve. ♃. In pratis et pascuis ubique. April-autumn. D. fl. 1. p. 802. St. h. 7. P. lanceolata et P. decumbens Reichenb. fl. exc. p. 396. Variat:

β. capitellata, foliis angustis subhirsutis basi hirsutissimis, scapis digitalibus, spica subsphaerica: P. lanceolata *γ.* sphaerostachya D. fl. l. c. P. lanceolata *ε.* DC. l. c. Occurrit quoque scapis fere pedalibus, foliis formae vulgaris: P. lanceolata var. capitellata Sonder. in litt.

γ. lanuginosa, folia pilis longis patulis plus minusve hirsuta, quandoque hirsutissima: P. lanceolata *δ.* D. fl. 1. 803. P. lanceolata *η.* alpina Gaud. helv. 1. 398. P. lanata Portenschl. ap. Host. fl. austr. 1. 210., si folia dense lanato-pilosa sunt; P. hungarica W. K. pl. r. h. t. 203., si hirsuties in pagina superiore foliorum rarior est. P. lanata St. h. 87.

Occurrunt, ut in aliis huius generis speciebus, specimina monstrosa, spicis plurimis vel spicis foliatis praedita, quae vero varietates neutiquam constituunt.

6. **P. Victorialis** (Poiret. dict. 5. p. 377.) *foliis* lanceolatis utrinque attenuatis subdenticulatis 3-5 nerviis *adpresso-pilosis subsericeis*, scapo tereti leviter striato, spica ovata densa, *bracteis* ovatis *acuminatis scariosis medio sparsim pilosis*, calycis laciniis lateralibus subalato-carinatis carina glabris. ♃. In apricis asperis, (Litt., Krain. südl. Tyrol.) Mai. Jun. P. Victorialis DC. fl. fr. 3. p. 410. Bertol. fl. ital. 2. p. 160. St. h. 87. P. sericea W. et Kit. pl. rar. hung. 2. p. 163. t. 151. Koch. syn. ed. 1. p. 597. D. fl. 1. p. 804. P. argentea Vill. delph. 2. p. 302., non Lam., sec. DC. l. c. P. capitata Hoppe pl. exs.; Plantago n. 4. Gerard. fl. prov. p. 333. t. 12. — Cl. Bertolonius separat tanquam species diversas Plantaginem Victorialem Poir. et P. sericeam WK., verum specimina mea tergestina Plantaginis Victorialis nulla nota differunt ab hungaricis Plantaginis sericeae. G.

7. **P. Lagópus** (L. sp. 165.) foliis lanceolatis utrinque attenuatis subdenticulatis 3-5 nerviis hirsutis vel glabriusculis, scapo sulcato, spica ovata vel oblongo-cylindrica densa, *bracteis* ovato-lanceolatis *acuminatis* scariosis calyceque apice *barbato-villosis*, calycis laciniis lateralibus carinatis, corollae tubo glabro. ⊙. In locis asperis herbidis, (Istrien.) April. Mai. St. h. 87. Laciniae corollae dorso quandoque pilosae. J.

8. **P. montana** (Lam. illustr. n. 1670. dict. 5. p. 381.) foliis lanceolatis utrinque attenuatis subdenticulatis 3-5 nerviis villosis glabrisve, scapo tereti, spica ovata densa, *bracteis lato-obovatis obtusissimis breviter et obtuse mucronatis scariosis apice barbatis*, calycis laciniis membranaceis ecarinatis glabris apice barbatis. ♃. In pascuis alpium calcarearum, (Schweiz; Tyrol; Salzb.; Steyerm.; Kärnth.; Krain; im Kessel d. Sudet.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 805. St. h. 88. P. atrata Hopp. Taschenb. 1799. p. 85. P. alpina Vill. delph. 2. 302. Bertol. fl. ital. 2. p. 163. Jacq. h. vind. 2. t. 125. P. saxatilis M. Bieb. taur. cauc. 1. p. 109. Bracteae nigro-fuscae, stria dorsali viridi. Variat foliis utrinque dense villosis, subsericeis: P. montana *β.* holosericea Gaud. helv. 1. p. 400. Huius specimen helveticum nondum vidi; in alpibus pedemontanis lectam possideo.

9. **P. pilosa** (Pourrett. act. toul. 3. p. 324.) foliis lanceolatis vel lanceolato-linearibus trinerviis hirsutis, *scapo* tereti villoso, *pilis patentissimis*, spicis ovatis cylindricisve densis, *bracteis* laciniisque calycis exterioribus *herbaceis* margine submembranaceis ovatis attenuato-acuminatis pubescentibus, interioribus membranaceis stria dorsali herbacea, corollae tubo glabro. ⊙. In locis sterilibus siccis, (Istrien, Fiume.) Jun. P. holostea Lam. illustr. n. 1667. P. Bellardii All. ped. 1. p. 82. t. 85. f. 3. P. lanata Poir. voy. 2. 115. P. pilosa Roth. cat. 2. p. 10. t. 1. St. h. 88. J.

c. Placenta bialata, utrinque 1 sperma. Cor. tubus pilosus vel pubescens.

10. **P. alpina** (L. sp. 165.) foliis lanceolato-linearibus linearibusve utrinque attenuatis integerrimis vel subdentatis carnosis plerumque trinerviis *nervis non aequidistantibus, spatio interiore inter nervos laterales et medium duplo latiore quam inter nervos laterales et marginem*, scapo tereti, spica oblongo-cylindrica densa, bracteis ovatis acutis margine membranaceis calycem aequantibus, calycis laciniis anterioribus margine membranaceis parte membranacea cum herbacea aequilata, posterioribus herbaceo-carinatis carina acuta, tubo corollae villosulo. ♃. In alpium pascuis, (Schweiz, Vorarlberg, Tyrol.) In horto jam initio Maji, quo tempore de spicis Plantaginis maritimae ne vestigium quidem adest; in alpibus serius floret. D. fl. p. 806. St. h. 51. et 88.

11. **P. maritima** (L. sp. 165.) foliis linearibus vel lanceolato-linearibus utrinque attenuatis integerrimis dentatisve margine glabris vel setuloso-ciliatis carnosis trinerviis, *nervis aequidistantibus*, scapo tereti, *spica linearielongata* cylindrica densa, *bracteis ovatis acutiusculis* margine membranaceis calycem subaequantibus, calycis laciniis anterioribus margine membranaceis parte membranacea cum herbacea aequilata, *posterioribus herbaceo-carinatis carina acuta, corollae tubo villosulo.* ♃. In locis humidis ad littora maris, salinas, et in alpibus, fortasse solum salsum ibidem prodens. Jul.-Octob. Fl. dan. t. 243. St. h. 88. P. graminea Lam. illustr. n. 1685. DC. fl. fr. 3. p. 413. Variat:

α. genuina, foliis glabris integerrimis: P. maritima Roth. tent. 2. 1. p. 172. Modificatio huius angustis foliis est: P. Wulfenii Willd. en. h. berol. 1. 161., (Willdenow. in l. c. expressis verbis habet: P. Wulfeni Bernhardi;) Spreng. fl. halens. ed. 1. p. 54. (excl. syn. Wulfenii.)

β. dentata, foliis glabris, dentibus aliquot linearibus elongatis instructa: P. dentata Roth. tent. 2. 1. 173. P. bidentata Murith. bot. vales. 85. Gaud., fl. helv. 4. p. 402., si plura folia angusta medio bidentata.

γ. ciliata, foliis setuloso-ciliatis integerrimis vel dente uno alterove notatis: P. Wulfeni M. et K. D. fl. 1. p. 809. P. aspera Gaud. fl. helv. 1.

p. 403. P. alpina Sieber. herb. fl. austr. 45. P. graminea Schleich. cat. (non DC.) P. serpentina Reichenb. fl. exc. p. 397., secund. citatum Sieberi et ex loco nat. „Passeyer Thal in Tyrol“ (non Lam.)

12. **P. serpentina** (Lam. illustr. n. 1686.) foliis linearibus semitereti-trigonis siccitate carinatis margine setuloso-ciliatis, scapo tereti, spica lineari-elongata cylindrica densa, *bracteis ex ovata basi subulato-attenuatis* calycem superantibus acutis margine membranaceis, calycis laciniis anterioribus margine membranaceis, parte membranacea cum herbacea aequilata, posterioribus herbaceo-carinatis, carina acuta, *corollae tubo villosulo.* 4. In rupibus et locis saxosis asperis, (bei Fiume, Littorale, Krain, südl. Tyrol.) Jul.-Sept. P. carinata Schrad. cat. sem. h. gött. D. fl. 1. p. 810. P. Wulfeni Schreb. ap. St. h. 24. P. subulata Wulf. ap. Jacq. collect. 1. 204. t. 10. (non L.) P. Gerardi Schult. Oestr. fl. 1. p. 298. P. Holosteum Scop. carn. 1. 108. (P. carinatam, P. alpinam et P. maritimam sub hoc nomine comprehendit.) Variat:

β. longebracteata, bracteis calyce fere duplo longioribus: P. serpentina Lam. illustr. n. 1686., dict. 5. p. 383., „bractée ovale, subulée à son sommet, presqu' une fois plus longue que le calice.“ Hanc varietatem, in agro fluminensi lectam, possideo. P. Coronopus eodem modo variat. G.

13. **P. recurvata** (L. mant. p. 135.) foliis linearibus vel lanceolato-linearibus utrinque attenuatis integerrimis dentatisve margine glabris carnosis canaliculatis trinerviis *nervis aequidistantibus*, scapo tereti, spica lineari-elongata cylindrica densa, *bracteis ovatis acutiusculis* margine membranaceis *calyce brevioribus*, laciniis calycis anterioribus margine membranaceis, parte membranacea quadruplo angustiore quam pars herbacea, *posterioribus herbaceo-carinatis, carina alata, ala membranacea.* 4. In sabulosis ad mare adriaticum, (auf d. Sanddünen von Primiero zwischen Grado u. dem Ausflusse des Isonzo, Tommasini.) Jul. Aug. St. h. 88. P. incurvata Murray comm. Gött. 1780. p. 19. t. 6., (nomen Linnaeanum mutavit, quod folia saepius incurvata quam recurvata sint, sed me observante directio foliorum valde variabilis est.) P. maritima DC. fl. fr. 3. p. 412. Dub. bot. gall. p. 391. „bracteis perigonii laciniis duplo brevioribus.“ Dub. l. c. G.

Sect. II. Coronopus Tournef. inst. t. 49. Placenta 3-4 alata, semen unicum in quoque loculo gerens; caetera ut sectionis antecedentis.

14. **P. Coronopus** (L. sp. 166.) foliis pinnatifidis vel pinnatifido-dentatis, laciniis dentibusve remotis, scapo tereti, spica lineari-elongata cylindrica, bracteis e basi ovata subulatis, *calycis laciniis lateralibus* dorso alatis, *ala membranacea* ciliata, corollae tubo villosulo. ☉. In locis graminosis et sterilibus, et in littore maris, (im Litt. bei Triest. u. a. O.; in Westph., Hannov., Holst., Mecklenb., bei Genf.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 811. Fl. dan. t. 272. St. h. 88. P. integralis Gaud. fl. helv. 1. p. 405. secund. specim. a rev. Thomas. acceptis. Multum variat: foliis glabris, margine vel etiam totis hirsutis, bracteis calyce brevioribus vel multo longioribus, foliorum rachi lata et dentibus brevibus vel rachi angusta et dentibus elongatis, pinnas referentibus, et his pinnis iterum dentatis.

Sect. III. Psyllium Tournef. Caulis foliatus, in speciminibus perfectis ramosus. Pedunculi axillares. Placenta bialata.

15. **P. Psyllium** (L. sp. 167.) *caule* herbaceo erecto *ramoso*, foliis linearibus integerrimis subdentatisve, spicis ovatis laxiusculis, bracteis ex ovata basi subulatis, *calycis laciniis lanceolatis sensim acuminatis conformibus.* ☉. In locis arenosis ad littora maris, (Istrien u. a. d. Inseln; Steyerm. bei Grätz, Maly.) Jul. Aug. D. fl. 1. 814. Hayn. Arzngew. 5. t. 17. St. h. 88. G.

16. **P. arenaria** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. p. 51. t. 51.) *caule* herbaceo erecto *ramoso*, foliis linearibus integerrimis subdentatisve spicis ovato-oblongis dense imbricatis, bracteis infimis subrotundo-ovatis herbaceo-aristatis, superioribus spathulatis obtusissimis, *calycis laciniis anterioribus oblique spathulatis obtusissimis*, posterioribus lanceolatis acutis. ☉. In arenosis,

(südl. Schweiz? stw. im Littor., südl. Tyrol, in Krain, Unteröstr., Böhm., a. d. Rheinfläche, nördl. D. gegen d. Seeküste hin.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 813. P. Psyllium St. h. 7.

17. **P. Cynops** (L. sp. 167.) *caulibus* fruticosis *ramosis* basi procumbentibus, foliis anguste linearibus integerrimis, spicis ovatis, bracteis lato-ovatis obtusis, inferioribus arista filiformi herbacea terminatis, superioribus mucronatis, *laciniis calycis anterioribus lato-ovatis obtusis mucronatis*, posterioribus angustioribus carinatis carina ciliatis. ♄. In locis incultis, et ad littora maris, (in d. C. Waadt selten; bei Monfalcone nicht wieder gefunden; Baden bei Wien.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 814. Hayn. Arzngew. 5. t. 18. St. h. 88. P. Cynops et genevensis DC. fl. fr. 3. p. 415. et 416.

Subclass. IV. MONOCHLAMIDEAE.

Perigonium simplex, petalis nempe aut nullis, aut cum calyce coalitis.

Ord. XCIV. AMARANTHACEAE. Juss. gen. 87.

Perigon. 3-5 *partitum*, *scariosum*, per aestivationem imbricatum. *Stam.* 3 vel 5, *hypogyna*, libera, aut monadelpha, laciniis perigonii opposita, vel his pauciora. Ovarium liberum, 1 loculare, 1-pluriovulatum, ovulis fundo loculi affixis. Stigmata plura, vel stylus unus cum stigmatibus pluribus aut cum stigmate simplici. Fructus indehiscens, vel capsularis et circumscissus. Embryo periphericus. Albumen farinaceum. *Folia alterna, stipulis vaginisque destituta.*

1. AMARANTHUS (L. gen. 1060.) Flores monoici. Perigonium 3-5 partitum. Masc. stam. 3-5. Fem. styli 3. Caps. 1 sperma, circumscissa. N. a E. gen. 8. 3. — Flores nostrarum specierum virides vel rubro-fusci.

1. **A. sylvestris** (Desf. cat. h. par. 44.) *glomerulis triandris*, *omnibus axillaribus*, spica terminali nulla, caule primario erecto, secundariis adscendentibus, foliis rhombeo-ovatis margine undulatis apice integris, infimis leviter emarginatis, bracteis flores subaequantibus. ☉. In locis cultis, ad vias, (Fiume; um Wien; in Böhm.; a. d. Rheinfläche bei Carlsruhe u. Speier.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 5. f. 667. A. viridis All. ped. 2. p. 218. G.

2. **A. Blitum** (L. sp. 1405.) *glomerulis* triandris, axillaribus subrotundis, *terminalibus in spicas nudas* dispositis, *caulibus diffusis* adscendentibus *glabris*, foliis ovatis subrhombeis obtusissimis retusis, bracteis flore brevioribus, capsula subrotundo-ovata. ☉. In cultis, ad vias, (stw. dch. d. g. Gebiet.) Jul. Aug. A. adscendens Lois. not. p. 141. A. viridis Pollich. palat. 2. p. 607. A. Blitum var. *β*. DC. fl. fr. suppl. p. 374., (sed specimina maiora varietatem, ut opinor, non efficiunt.) A. adcendens Reichenb. ic. 5. f. 665., specimen foliis immaculatis. Variat enim foliis immaculatis et maculatis, more A. polygonoidis; varietas maculata hinc inde copiosior occurrit, quam immaculata.

Sub nomine Amaranthi Bliti cl. Reichenb. in ic. 5. f. 663. Amaranthum polygonoidem Linn. proponit; sed, num hic circa Dresdam sponte proveniat, valde dubito; ex horto botanico specimen depictum aufugisse videtur.

3. **A. prostratus** (Balb. misc. taur. p. 44. t. 10.) *glomerulis* triandris, axillaribus subrotundis, *terminalibus in spicas nudas dispositis, caulibus prostratis superne pilosis*, foliis rhombeo-ovatis antice acuminato-attenuatis apice ipso obtusis vel retusis margine undulatis, bracteis flores subaequantibus,

capsula oblongo-ovata. ⊙. In locis cultis ad vias, (im östr. Litt., Host.) Jul. Aug. Reichenb. ic. f. 666. G.

4. **A. retroflexus** (L. sp. 1407.) glomerulis spicatis pentandris, spica terminali composita, caule erecto piloso, foliis ovatis acuminatis apice ipso obtusis, *bracteis perigonio duplo longioribus subspinoso-mucronatis*, laciniis perigonii lineari-oblongis obtusis vel cum mucronulo retusis. ⊙. In locis cultis, (zerstreut durch d. Geb., an manchen Orten lästiges Unkraut.) Jul. Aug. A. spicatus Lam. dict. 1. p. 117. Reichenb. ic. 5. f. 668.

Ord. XCV. PHYTOLACCEAE. Rob. Brown. cong. 35. Chenopod. trib. Dub. bot. gall. p. 399.

Perigonium 4, 5 *partitum*, aestivatione imbricata. *Stam. in fundo perigonii inserta*, laciniis numero aequalia et alterna, vel plura. Ovarium liberum, 1-10 loculare, loculis 1 ovulatis, ovulo erecto. Styli tot quot ovarii loculi, indivisi. Bacca vera, 1-plurilocularis. Embryo pheripherieus. Albumen farinaceum. *Fol.* alterna, *stipulis vaginisque destituta.*

1. PHYTOLÁCCA (L. gen. n. 588.) Perigonium 5 partitum. Stam. 8-20. Ovarium 8-10 striatum. Stigm. 8-10. Bacca 8-10 locularis, loculis 1 spermis. N. ab E. gen. 8. 2.

1. **P. decandra** (L. sp. n. 631.) floribus decandris decagynis. ♃. Colitur in Tyroli australi et Littorali, atque occurrit ad muros, vias inque rupestribus ad litus maris adriatici, Host. Jul. Aug. D. fl. 3. p. 365. Schk. t. 126. Flores purpurascentes. Colit.

Ord. XCVI. CHENOPODEAE. Vent. tabl. 2. p. 253. Atripliceae Juss. gen. p. 83.

Perigonium 5 *partitum* vel 5 phyllum, aestivatione imbricata. *Stam. in fundo perigonii inserta*, numero laciniarum aequalia vel pauciora et laciniis opposita. Ovarium liberum vel inferne perigonio adnatum, 1 loculare, 1 ovulatum, ovulo in fundo ovarii affixo. Styl. 1, simplex, vel 2, 3, 4 partitus; stigmata indivisa. *Fructus indehiscens, siccus vel bacca spuria e calyce carnoso orta.* Embryo circularis, peripherieus vel spiralis, radicula hilum spectans; albumen farinaceum vel o. *Folia* alterna, *stipulis vaginisque destituta.* Flores hermaphroditi vel polygami.

Subord. I. *SPIROLOBEAE.* C. A. Meyer. fl. altaic. 1. 370. Sem. albumine nullo vel parco. Embryo spiralis.

Trib. I. *SALSOLEAE.* Mey. l. c. Flores hermaphroditi. Embryo spiralis. Caulis continuus.

1. SCHOBERIA (C. A. Meyer. fl. altaic. 1. 395.) Perigonium 5 partitum, inappendiculatum. Testa sem. crustacea; caetera ut Salsolae, a qua praeterea differt perigonio 5 partito, neque 5 phyllo, phyllis nunquam transverse carinatis vel transverse appendiculatis. N. ab E. gen. 7. 11.

1. **S. fruticosa** (C. A. Meyer.) fruticosa glabra, foliis semicylindricis obtusis, *stylis* 3, *seminibus nitidis laevibus.* ♄. Ad litt. maris adriat., (am Theresienlazareth in Triest, Tommas.) Jul. Aug. Salsola fruticosa L. sp. 324. Chenopodium fruticosum All. ped. 2. 198. G.

2. **S. maritima** (C. A. Meyer. fl. alt. p. 400.) herbacea glabra, foliis semicylindricis acutis, *stylis* 2, laciniis carinatis, *seminibus nitidis marginem versus subtiliter striato-punctulatis.* ⊙. In litt. maris, (a. d. nördl. u. südl.

Küste, an der Sane bei Cilli, Maly.) Aug. Sept. Chenopodium maritimum L. sp. 321. Suaeda chenopodioides Pall. ill. p. 56. S. maritima Moquin-Tand. chenop. monogr. en. p. 127. G.

2. SÁLSOLA (L. gen. n. 311., excl. spec.) Perig. 5 phyllum, dorso denique transversim carinatum vel appendiculatum. Stam. 5, in basi perigonii inserta. Stigm. 2. Utriculus depressus, membranaceus. Semen horizontale, exalbuminosum, testa membranacea. Embryo spiralis. N. ab E. gen. 7. 10.

1. **S. Kali** (L. sp. 322.) herbacea, pilis brevibus crassiusculis adspersa vel glabra, diffuse ramosa, *foliis* subulatis *apice spinosis* patentibus, floribus axillaribus solitariis, *perigonio fructus cartilagineo* enervio, laciniis acuminatis apice membranaceis medio transversim carinatis vel ibidem appendice subrotunda patente longitudinem perigonii aequante instructis. ☉. In locis arenosis et ad littora maris, (an allen Seeküsten u. a. Sandplätzen in Oestr., Böhm., Mähr., Sachs., a. d. Rheinfl. bei Schwetzingen u. Mainz.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 320. Fl. dan. t. 818. Kali Tragus Scop. carn. 1. p. 175. Variat breviter hispida et glabra, foliis crassioribus et tenuioribus atque

α. vulgaris, perigonium rosaceo-marginatum, appendix dorsi apicem laciniarum attingens: S. Kali L. l. c.

β. brevimarginata, appendix laciniarum perigonii brevissima marginem brevem cartilagineum referens: S. Tragus L. sp. p. 322.

γ. mixta, perigonia plurima ut in varietate *β*, inmixtis paucioribus varietatis *α*. in eodem caule.

2. **S. Soda** (L. sp. 323.) herbacea, glabra, ramosa, ramis adscendentibus, foliis linearibus semiteretibus acutiusculis breviter mucronulatis, *perigonio fructus membranaceo*, laciniis medio transversim carinatis. ☉. In littore maris, (bei Triest.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 322. Jacq. h. vind. 1. t. 68. Kali Soda Scop. carn. 1. p. 175. G.

Subord. II. *CYCLOLOBEAE.* Sem. albuminosa. Embryo perihericus.

Trib. II. *SALICORNIEAE.* Meyer. l. c. p. 371. Flores hermaphroditi. Embryo perihericus. Caulis articulatus.

3. SALICORNIA (L. gen. n. 10.) Perigonium carnosum, integrum, rima apertum, excavationi racheos immersum. Stam. 1, vel 2. Styl. brevissimus, stigm. 2-3. Nux perigonio persistenti inclusa. N. ab E. gen. 7. 17.

1. **S. herbacea** (L. sp. 5.) caule herbaceo ramoso articulato, articulis spicarum utrinque trifloris, *perigoniis in triangulum dispositis*, seminibus pubescentibus laevibus. ☉. In littore marino et ad salinas. Aug. Sept. D. fl. 1. 289. Schk. t. 1. S. acetaria Pall. ill. 7. — S. annua Engl. bot. t. 415., si stamen solitarium, et S. procumbens Engl. bot. t. 2475., si stamina duo in flore reperiuntur. Variat caule erecto et procumbente atque

β. pachystachya, spicis duplo crassioribus: S. radicans Sm. engl. bot. n. 1691., saltem ex specimine a Woodsio ad Sonderum misso. Haec ad mare balticum legit Detharding, (in Ditmarsen an Teichen bei Büsum am Meere.)

2. **S. fruticosa** (L. sp. 5.) caule fruticoso ramoso articulato, articulis spicarum utrinque trifloris, *perigoniis collateralibus*, seminibus glabris tuberculato-scabris. ♄. In littore maris, (Insel Osero u. Cassion bei Veglia.) Jul. Aug. D. fl. 1. 293. Arthrocnemum fruticosum Moquin-Tand. chenop. monogr. en. p. 111. Camer. epit. p. 246. Variat:

β. pachystachya, spicis duplo crassioribus: S. macrostachya Moricand. fl. venet. 1. 2., sec. Bertol. G.

Trib. III. *CHENOPODIEAE.* Mey. l. c. p. 371. Flores hermaphroditi. Embryo perihericus. Caulis continuus.

4. CORISPERMUM (L. gen. n. 12.) Perigonium e squamula hyalina, 1-5, compositum, vel nullum. Stam. 1-2. Stigm. 2. Nux compressa, altero latere convexa, altero plana vel concava, verticalis. N. ab E. gen. 7. 18.

1. **C. Marschallii** (Steven. in mem. mosq. 5. 336.) perigonio nullo, nucibus glabris suborbiculatis alatis, *ala denticulata apice excisa* in medio excisurae bimucronata, bracteis supremis ovato-lanceolatis attenuato-acutis foliisque uninerviis mucronatis. ⊙. In arenosis planitiei Rhenanae, (bei Schwetzingen, Zeyher.) Jul. Aug. St. h. 67. C. squarrosum Linn. sp. 6., sec. Link. en. 1. 7. Nuces 1 lineam longae. Stam. 1-3. — Simillimum C. canescens Kit. congruit cum isto nucibus apice excisis, differt vero perig. 2 phyllo et nucibus dimidio minoribus. G.

2. **C. intermedium** (Schweigger. Königsb. Arch. 1812. 211.) *perigonio nullo,* nucibus glabris suborbiculatis alatis, *ala lata pellucida apice integra* bimucronata, bracteis superioribus ovatis acuminatis *margine membranaceo latitudine dimidiae partis herbaceae* cinctis foliisque uninerviis mucronatis. ⊙. In arenosis maris baltici Borussiae. Jul. Aug. D. fl. 1. 281. St. h. 67. Stam. 1. — Simillimum C. Marschallii differt nucibus apice non excisis, sed cum basi stylorum persistenti rostellatis et ala earum vix denticulata. C. hyssopifolium diff. fructib. dimidio minoribus et perigon. 2 phyllo. B.

3. **C. hyssopifolium** (L. sp. 6.) *perigonio diphyllo,* nucibus glabris subrotundo-ovalibus alatis, *ala opaca margine angustissime pellucida apice integra* bimucronataque, bracteis superioribus ovatis acuminatis *margine membranaceo latitudine dimidia partis herbaceae* cinctis foliisque uninerviis mucronatis. ⊙. In locis glareosis, (am Donauufer in der Gegend von Wien, besonders bei Lobau.) Aug. Sept. Nuces dimidio minores quam in C. intermedio. G.

4. **C. nitidum** (Kitaib. bei Schult. Oestr. fl. 1. 7.) *perigonio* 2 *phyllo,* nucibus glabris subrotundo-ovalibus alatis, *ala opaca margine angustissime pellucida* vix denticulata *apice integra* bimucronataque, bracteis superioribus ovatis acuminatis, *margine membranaceo latitudine partis herbaceae* cinctis foliisque uninerviis mucronatis. ⊙. In glareosis insularum Danubii, (bei Wien, Dollin.) Jul. Aug. St. h. 67. C. purpurascens Host. fl. a. 1. p. 318. Folia angustissime linearia. Spicae elongatae, tenuissimae, laxae, bracteae superiores fere subrotundae, subito in acumen contractae. Nuces quadruplo minores, quam in C. intermedio. Stam. 5. G.

5. POLYCNÉMUM (L. gen. n. 53.) Perigonium 5 phyllum, bibracteatum. Stam. 3, annulo hypogyno inserta. Stigm. 2. Utriculus apice circumscissus, operculo adnato. Semen verticale, testa crustacea. N. ab E. gen. 7. 19.

1. **P. arvense** (L. sp. 50.) foliis rigidulis triquetro-subulatis mucronatis, floribus axillaribus sessilibus, *bracteolis perigonium vix aequantibus.* ⊙. In agris et ad vias in solo arenario et argillaceo, (stellenw. dch. d. g. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 404. St. h. 44. Variat foliis longioribus et dimidio brevioribus, patentibus et erectis, caulibus humilibus erectis: P. pumilum Hoppe; et elongatis diffusis: P. inundatum Schrank.

2. **P. majus** (Alex. Braun.) foliis rigidulis triquetro-subulatis mucronatis, floribus axillaribus sessilibus, *bracteolis perigonio longioribus.* ⊙. In agris et ad vias, (stellenw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. Fructus duplo majores quam in antecedente, planta saepe evidenter robustior facie Salsolae Kali.

6. KOCHIA (Roth. in Schrad. Journ. 1800. p. 307. t. 2.) Flores hermaphroditi. Perigon. 5 fidum, laciniis dorso denique appendiculatis. Stam. 5, in basi perigonii inserta. Stigmata 2. Utriculus depressus. Semen horizontale, albuminosum, testa membranacea. Embryo periphericus. — Differt a Salsola perigonio monophyllo et semine; a Chenopodio perigonio denique dorso appendiculato. N. ab E. gen. 7. 8.

Sect. I. Willemetia Maerklin. (non C. A. Meyer.) Appendices laciniarum perigonii alaeformes.

1. **K. Scoparia** (Schrad. halophyt. p. 18. t. 1. f. 1.) herbacea, pubescens, *foliis lineari-lanceolatis ciliatis*, floribus geminis, appendicibus perigonii fructiferi brevissimis triangularibus acutis. ⊙. In agris et locis cultis, (im Litt., Triest, Görz, Steyerm. um Grätz, Unteröstr., Böhmen, Mähren.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 323. Chenopodium Scoparia L. sp. 321. G.

2. **K. arenaria** (Roth. in Schrad. Journ. v. 2. p. 307. t. 2.) herbacea, hirsuta, *foliis subulato-filiformibus* subcarnosis *subtus sulco exaratis*, floribus subternis axillaribus sessilibus, appendicibus perigonii fructiferi subrhombeis inaequalibus. ⊙. In arenosis, (in Mähren bei Bisenz, Scharditz, u. in d. Rheinpfalz von Schwetzingen bis Worms u. Ingelheim.) Mai.-Jul. D. fl. 2. p. 324. St. h. 28. Salsola arenaria W. K. pl. rar. hung. 1. t. 78. Willemetia arenaria Maerklin. in Schrad. Journ. v. 2. p. 330. Chenopodium arenarium Fl. wett. 1. 356. Variat caulibus rubris et ciliis foliorum fere deficientibus, et

α. longifolia, foliis floralibus flores multoties superantibus: Camphorosma monspeliaca Pollich. palat. 1. p. 165., non L.

β. brevifolia, foliis floralibus florum longitudine vel eos vix superantibus: Camphorosma acuta Pollich. palat. 3. p. 317., non L. G.

3. **K. prostrata** (Schrad. halophyt. p. 16.) suffruticosa, *foliis linearibus planis pubescentibus vel villoso-canis*, floribus subternis axillaribus sessilibus, appendicibus perigonii fructiferi subrotundis disco sublongioribus. ♃. In campis arenosis, (Unteröstreich u. Mähren.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 326. Salsola prostrata L. sp. 323. Jacq. a. t. 294. Chenopodium augustanum All. ped. 2. p. 198. t. 38. f. 4. G.

Sect. II. Suaeda Reichenb. fl. exc. p. 580. Appendices laciniarum perigonii conicae, spiniformes.

4. **K. hirsuta** (Nolt. novit. flor. holsat. p. 24.) herbacea, hirsuta, foliis linearibus obtusis, floribus geminis axillaribus, *appendicibus* perigonii fructiferi *conicis*. ⊙. In locis a mari quandoque inundatis, (im Holsteinischen an der Ostsee bei Grossenbrodt unw. Heiligenhaven, bei Lütjenburg u. Hochwacht; an der Nordsee bei Büsum u. Deichsland, Nolte; im Mecklenburgischen bei Warnemünde sehr selten, Detharding.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 824. Salsola hirsuta L. sp. 323. Chenopodium hirsutum Wahlenb. suec. p. 160. Echinopsilon hirsutum Moquin-Tandon chenop. monogr. en. p. 88. G.

7. CHENOPODIUM (L. gen. n. 309.) Flores hermaphroditi. Perigonium 5 fidum, vel 5 partitum, dorso inappendiculatum. Stam. 5, in basi perigonii inserta. Stigmata 2. Utriculus depressus. Semen horizontale, albuminosum, tecta crustacea. Embryo peripheric us. N. ab E. gen. 7. 5.

Sect. I. Pes anserinus. Caulis, folia et perigonia plus minusve farinosa vel glabra, nec vero pilosa. Folia integerrima vel dentata.

1. **C. hybridum** (L. sp. 319.) *foliis cordatis* dentato-angulatis, angulis acuminatis, intermedio maiore elongato, cymis paniculatis, *seminibus foveolato-punctatis*. ⊙. In locis cultis, ad fimeta ubique. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 295. St. h. 75.

2. **C. urbicum** (L. sp. 318.) *foliis nitidis triangularibus* basi in petiolum protractis sinuato- vel repando-dentatis, *spicis* compositis *erectis* subaphyllis, seminibus laevibus. ⊙. In cultis, ad vias, pagos, (stellenw. dch. d. Geb.) Aug. Sept. St. h. 75. Semina sub lente, multum augente, subtilissime punctulata apparent. Variat:

α. foliis brevius dentatis, dentibus triangularibus acutis: C. urbicum D. fl. 2. p. 296. C. melanospermum Wallr. sched. 112. C. chrysomelanospermum Balb. obs. bot. cent. 1. 52.

β. intermedium, foliis sinuato-dentatis, dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis: C. intermedium D. fl. 2. p. 297. St. h. 75. C. urbicum Engl. bot. t. 717. C. rhombifolium Mühlenb. ap. Willd. en. h. berol. 1. 288. — Cultura, saepe repetita, edoctus sum, C. intermedium nil nisi varietatem C. urbici efficere.

3. **C. murale** (L. sp. 318.) foliis rhombeo-ovatis nitidis acute dentatis, cymis divaricatis, *seminibus opacis carinato-marginatis.* ⊙. In ruderatis, ad pagos, vias. Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 299. St. h. 75.

4. **C. album** (L. sp. 219.) *foliis rhombeo-ovatis eroso-dentatis*, superioribus oblongis integerrimis, cymis subaphyllis, *seminibus laevibus* nitidis. ⊙. Cum prioribus ubique. Jul.-Sept. C. album Smith. brit. 275. D. fl. 2. p. 299. C. leiospermum DC. fl. fr. 3. p. 392. Semina sub lente, multum augente, subtilissime punctulata apparent, quod etiam in sequente observatur. Variat foliis magis minusve dentatis vel omnibus integerrimis, atque

α. spicatum, glomerulis spicatis: C. album L. l. c. St. h. 75.

β. cymigerum, glomerulis cymosis: C. viride L. sp. 319. St. h. 75.

C. lanceolatum Merat., C. album var. C. concatenatum Thuill. par. 125., St. h. 75., C. glomerulosum Reichenb. et C. paganum Reichenb. sunt aliae modificationes. — In plerisque huius generis speciebus inflorescentia variat spicata et cymosa; in C. albo vero, ut in C. polyspermo, hic character magis eminet.

5. **C. opulifolium** (Schrad. ap. Koch. et Ziz. cat. pl. palat. p. 6.) *foliis subrotundo-rhombeis subtrilobis obtusissimis* eroso-dentatis, superioribus elliptico-lanceolatis, cymis subaphyllis, *seminibus laevibus* nitidis. ⊙. Ad vias, pagos, in ruderatis, (v. Basel dch. d. Rheinfläche stellenw. bis Westphalen; sodann in Franken u. Schles.) Jul.-Sept. D. fl. 2. p. 301. St. h. 75. Vaill. bot. par. t. 7. f. 1.

6. **C. ficifolium** (Smith. brit. 1. 276.) *foliis inferioribus trilobo-hastatis* dentatis basi attenuatis, *lobo intermedio elongato oblongo-lanceolato obtuso*, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis, cymis subaphyllis, *seminibus* nitidis *minute excavato-punctatis.* ⊙. Ad vias, pagos, (nördl. Schweiz, Rheinfläche um d. Dörfer dicht am Rheine v. Basel bis a. d. Niederlande, Böhmen, Schles., bei Dresden, Elbinseln bei Hamburg.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 302. St. h. 75. C. viride Curt. lond. t. 16. C. serotinum Huds. 106. Sut. helv. 1. 148. — C. serotinum, quod in hortis bot. colitur et cum descriptione in Linnaei amoen. acad. vol. 4. p. 309., probe convenit, multo altius est, 4-5 pedale, et admodum sero floret; apud nos sub dio semina non perficit. Distinguitur foliis caulinis latioribus, rameis integerrimis latooblongis, apice rotundato-obtusissimis, et racemis elongatis decompositis, fere ut in C. botrye.

7. **C. ambrosioides** (L. sp. 302.) *foliis lanceolatis* utrinque attenuatis remote dentatis *subtus glandulosis*, glandulis sessilibus sparsis, racemis foliosis. ⊙. In cultis et fluviorum glareis, (Oestr.; an der Mur bei Grätz u. bei Marburg in Steyerm.; Baden am Ufer d. Murg, besonders bei Rastadt.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 305. St. h. 75. Ambrina ambrosioides Spach, Moquin-Tand., Chenopodium in monogr. en. p. 39. G.

8. **C. polyspermum** (L. sp. 1. 321.) foliis ovatis integerrimis mucronatis glaberrimis, racemis aphyllis, seminibus nitidis subtilissime punctulatis, *perigonio fructus patente.* ⊙. In cultis, fluviorum glareis, ad vias. Aug. Sept. D. fl. 2. p. 304. Variat foliis oblongo-ovatis acutioribus; porro:

α. cymoso-racemosum, racemo e cymis composito: C. polyspermum auctorum plurimorum. St. h. 75.

β. spicato-racemosum, racemo e spicis parvis composito: C. acutifolium Kit. apud Schult. Oestr. fl. 1. 458. St. h. 75.

9. **C. Vulvaria** (L. sp. 321.) *foliis rhombeo-ovatis integerrimis cano-farinosis*, racemis aphyllis, seminibus nitidis subtilissime punctulatis. ⊙. Ad vias, fimeta et in ruderatis. Jul. Aug. C. olidum Curt. lond. 3. t. 20. D. fl. 2. p. 304. St. h. 75. C. foetidum Lam. dict. 1. 196.

Sect. II. Botrys. Caulis, folia et perigonia plus minusve pubescentia. Folia pinnatifido-sinuata vel bipinnatifida.

10. **C. Botrys** (L. sp. 320.) *glanduloso-pubescens, foliis* oblongis *subpinnatifido-sinuatis* obtuse dentatis, supremis bracteiformibus lanceolatis integerrimis, cymis in racemos elongatos dispositis. ⊙. In fluviorum glareis,

ruderatis, (südl. Schweiz; südl. Tyrol, Steyerm., Oestr., Schles., Böhmen u. ausserdem hin u. wieder als Gartenflüchtling.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 305. St. h. 75. Ambrina Botrys Moquin-Tand. chenop. en. p. 36. Botrydium aromaticum Spach., conf. Moq. l. c.

8. BLITUM (L. gen. n. 14., cum emendat. C. A. Meyeri.) Semina omnia erecta, vel floris supremi singulorum glomerulorum horizontalia, vel erecta horizontalibus inmixta. Stam. 1-5. Perigonium fructiferum saepe succulentum. Caetera ut Chenopodii.

Sect. I. Blitum genuinum. Perigonium fructiferum baccatum. N. ab E. gen. 7. 7.

1. **B. capitatum** (L. sp. 6.) foliis triangularibus subhastatis paucidentatis, *spicis nudis, perigoniis* fructiferis *baccatis,* seminibus margine acute carinatis. ☉. In cultis et locis glareosis, (im Littorale; Schweiz stw., gemein in Graubünden; in Oberbaden.) Jun.-Aug. D. fl. 1. 282. Schk. t. 1. f. 4. St. h. 74. Glomeruli fructus magni, ruberrimi, superiores foliis plane destituti. Flos glomerulorum terminalis 4-5 fidus, stam. 4-5 praeditus; laterales monandri.

2. **B. virgatum** (L. sp. 7.) foliis oblongo-triangularibus subhastatis profunde dentatis, *glomerulis omnibus axillaribus, perigoniis* fructiferis *baccatis,* seminibus margine obtuso hinc canaliculato. ☉. In cultis et ad vias, (im südl. Geb.) Jun.-Aug. D. fl. 1. 283. St. h. 74. et B. capitatum St. h. 2. Folia sensim minora, omnia glomerulum in basi petioli gerentia.

Sect. II. Orthosporum C. A. Meyer. Cal. fructifer exsuccus. Flores omnes 5 fidi, et omnes semine erecto instructi; vel supremus singulorum glomerulorum 5 fidus, staminibus 5 et semine horizontali, laterales 2-3 fidi, staminibus 2-3, seminibus erectis; vel plures 5 fidi cum 2-3 fidis mixti. N. ab E. gen. 7. 6.

3. **B. Bonus Henricus** (C. A. Meyer. in flor. altaic. 1. p. 11. in annot.) *foliis* triangulari hastatis *integerrimis,* spicis terminalibus axillaribusque compositis, terminalibus in spicam conicam aphyllam dispositis, *perigoniis* fructiferis *exsuccis,* seminibus omnibus erectis. ♃. Ad vias, fimeta, in alpes adscendens. Mai.-Aug. St. h. 74. Chenopodium Bonus Henricus L. sp. 318. D. fl. 2. 295. Schk. t. 56. Agathophyton Bonus Henricus Moquin-Tand. ann. sc. nat. 2. ser. 1. p. 291. t. X. f. c. Blitum Bonus Henricus Moquin-Tand. chenop. monogr. en. p. 46. 1840.

4. **B. rubrum** (Reichenb. fl. exc. p. 582.) *foliis nitidis rhombeo-triangularibus* subhastato-trilobis *sinuato-dentatis,* dentibus lanceolatis, spicis compositis foliatis, *perigoniis* fructiferis *exsuccis* seminibus laevibus erectis, semine floris terminalis glomerulorum horizontali. ☉. In ruderatis, ad pagos, vias, (stw. dch. d. g. Geb.) Jul.-Sept. St. h. 74. B. polymorphum C. A. Mey. in Led. fl. alt. p. 18. Chenopodium rubrum L. sp. 318. D. fl. 2. p. 298. Fl. dan. t. 1149. Agathophytom rubrum Reichenb. fl. sax. p. 321. Flores laterales 3 partiti, 1-2 andri, terminalis 5 partitus, 5 andrus. Variat:

β. acuminatum, caulis altior, folia in longum acumen protracta, glomeruli denique sanguinei: St. h. 74. n. 15. Chenopodium blitoides Lej. spa. 1. p. 126.

γ. paucidentatum, folia infima triangulari-hastata, superiora rhombea vel lanceolata obtusa omni fere dente destituta: St. h. 74. p. 16. Chenopodium botryoides Smith. engl. flor. 2. p. 11.

5. **B. glaucum** (Koch. D. fl. suppl. ined.) *foliis oblongis* vel ovato-oblongis obtusis, remote dentatis *subtus glaucis,* spicis aphyllis, seminibus laevibus erectis horizontalibusque. ☉. In locis humidis circa pagos. Jul.-Sept. St. h. 75. Chenopodium glaucum L. sp. 320. D. fl. 2. p. 302. Fl. dan. t. 1151. Flores quadrifidi; seminum horizontalium plura, quam verticalium.

9. BETA (L. gen. n. 310.) Flores hermaphroditi. Perigonium 5 fidum. Stam. 5, annulo carnoso, germen cingenti, inserta. Stigm. 2. Fructus perigonio adnatus. Sem. horizontale, testa coriacea. Embryo periphericus.

— Flores plerumque 2-3, basi connati, fructum spurium exhibent, et coniuncti decidunt. N. ab E. gen. 7. 16.

1. **B. vulgaris** (L. sp. 322.) radice unicauli, *caule erecto*, foliis radicalibus ovatis obtusis subcordatis, caulinis rhomboideo-ovatis, *stigmatibus ovatis*. ⊙ et ⊙. Species primaria in littore maris, (ob im Gebiete?) Var. *β.* et *γ.* in multis coluntur modificationibus. Numerus florum in glomerulo et longitudo bractearum notae sunt fallaces. Varietates praecipuae sunt:

α. maritima, tenuior, radix caule vix crassior, caulis tenuis: B. maritima M. Bieberst. taur. cauc. 1. 192., B. foliosa Ehrenb. B. vulgaris maritima Koch. syn. ed. 1., excl. syn. Linnaei. Num haec in ditione florae nostrae reperta sit, nondum constat.

β. Cicla, omnibus partibus varietati *α.* simillima, per culturam tantum aucta et pinguior: B. vulgaris Cicla L. sp. 322. var. *ζ. η.* B. hortensis Mill.

γ. rapacea, radix crassa, carnosa; herba praeterea non diversa: B. vulgaris L. sp. 322., excl. var. *ζ.* et *η.* B. vulgaris Mill. Colit.

2. **B. maritima** (L. sp. 322.) radice multicauli, *caulibus prostratis*, foliis rhombeo-ovatis breviter acuminatis, *stigmatibus lanceolatis*. ♃. Ad littora maris, (an der Nordsee.) Jul. Aug. Planta in horto in orbem prostrata et non solum radice perenni gaudet, sed bases ramorum hyemen perdurant et vere insequente novos ramos proferunt. Beta hic proposita est vera B. maritima Linn. l. c. „ob caules decumbentes“ et secundum citatum Raji, qui dicit „Radice perenni a reliquis hujus classis differt.“ G.

10. CAMPHÓROSMA (L. gen n. 64.) Flores hermaphr. Perig. campanulatum, compressum, quadrifidum, laciniis 2 oppositis maioribus. Stam. 4, in basi perigonii inserta. Styl. elongatus, bifidus. Utriculus compressus. Sem. verticale, albuminosum, testa membranacea. Embryo peripheric us. N. ab E. gen. 7. 9.

1. **C. monspeliaca** (L. sp. 178.) hirsuta, foliis bracteisque subulatis, floribus axillaribus glomerato-spicatis subsessilibus. ♃. In arenosis, (im Littorale u. Veglia.) Jul. Aug. D. fl. 1. 824. Schk. t. 26. G.

Trib. IV. *ATRIPLICEAE*. Mey. l. c. Flores diclini, monoici vel dioici, rarissime hermaphroditis mixti. Embryo peripheric us. Caulis continuus.

11. SPINACIA (L. gen. n. 112.) Flores dioici. Masc. Perig. 4 partitum. Stam. 4, in fundo perigonii inserta. Fem. Perig. 2-3 fidum; styl. 4. Pericarpium cum perigonio indurato connatum. Sem. verticale, albuminosum. Embryo peripheric us. N. ab E. gen. 7. 15.

1. **S. inermis** (Moench. meth. 318.) foliis oblongo-ovatis, fructibus inermibus. ⊙ et ⊙. Colitur cum sequente in usum culinarium. Mai. Jun. S. glabra Mill. dict. n. 2. S. oleracea *β.* L. sp. 1456. Moris. s. 5. t. 30. f. 2. Fortasse varietas sequentis. Colit.

2. **S. spinosa** (Moench. meth. 318.) foliis basi utrinque hastato-bidentatis, fructibus cornutis. ⊙ vel ⊙. Colitur. Mai. Jun. S. oleracea Mill. dict. n. 1. S. oleracea *α.* L. l. c. Lam. illustr. t. 814. Colit.

12. EUROTIA (Adanson. fam. 2. p. 260.) Flores monoici. Masc. Perig. profunde 4 partitum. Stam. 4, in fundo perig. inserta. Fem. Perig. tubuloso-urceolatum, apice bidentatum. Utriculus compressus. Sem. 1 verticale, albuminosum, testa tenuissima. Embryo peripheric us. N. ab E. gen. 7. 14.

1. **E. ceratoides** (C. A. Meyer. fl. altaic. 4. 230.) foliis lanceolatis incano-tomentosis, floribus femineis lanatis. ♄. In locis incultis, (in Unteröstreich bei Ehrensbrunn u. um d. Stadt Retz gegen Mähren zu, Host.) Aug. Sept. Axyris ceratoides L. sp. 1389. Jacq. ic. rar. t. 189. Diotis ceratoides Willd. sp. pl. 4. 1. p. 368. Koch. syn. ed. 1. p. 609. Ceratospermum papposum Pers. syn. 2. 552. Achyranthes papposa Forsk. desc. 48. G.

13. HÁLIMUS (Wallroth. sched. crit. p. 117.) Flores monoici Masc. Perig. 4-5 partitum. Stam. 4-5, in basi perigonii inserta. Fem. Perig. compressum, bilobum, lobis tridentatis. Utriculus compressus. Sem. verticale, albuminosum, testa membranacea. Embryo peripherícus, radícula apicem ovarii spectans. — Testa membranacea differt ab Atriplice. N. ab E. gen. 7. 13.

1. **H. Portulacoides** (Wallr. l. c.) caule suffruticoso adscendente, foliis oppositis integerrimis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis, *perigoniis* fructiferis *sessilibus* trilobis dorso muricatis. ♄. In locis humidis ad littora maris, (a. d. Nord- u. Ostsee u. a. Adriat. Meere.) Jul. Aug. St. h. 80. Atriplex Portulacoides L. sp. 1493. D. fl. 2. 318. Engl. bot. t. 261. Obione portulacoides Moquin-Tand. monogr. en. p. 75. G.

2. **H. pedunculatus** (Wallroth. l. c.) caule herbaceo flexuoso ramoso, foliis integerrimis obtusis basi attenuatis, *perigoniis* fructiferis *longe pedunculatis*, obverse triangularibus emarginato-bilobis denticulo interiecto. ☉. Ad littora maris et in locis salsis, (a. d. Küste d. Nord- u. Ostsee u. a. d. Salinen bei Artern in Thüring.) Sept. Oct. St. h. 80. Atriplex pedunculata L. sp. 1675. D. fl. 2. p. 318. Fl. dan. t. 304. Diotis Atriplicoides M. Bieberst. taur. cauc. 2. 397. D. atriplicina Spreng. s. veg. 3. 836. Obione pedunculata Moquin-Tand. chenop. monogr. en. p. 75. G.

14. ÁTRIPLEX (L. gen. n. 1153.) Flores monoici, (in paucis speciebus hermaphroditis mixti.) Masculi vel hermaphroditi: perigon. 3-5 partitum; stam. 3-5, in basi perigonii inserta. Fem.: perigon. compressum, bilobum vel bipartitum, lobis dentatis vel integerrimis. Utriculus compressus. Sem. verticale, albuminosum, testa crustacea. Embryo peripherícus, radícula basin vel raro apicem ovarii spectans. N. ab E. gen. 7. 12.

Sect. I. Euatriplex Meyer. in fl. altaic. I. p. 305. Flores polygami; feminei ad basin usque bipartiti, semen verticale includentes; hermaphroditi 3-5 partiti, semen horizontale includentes. Perig. fem. maturitate herbaceum vel membranaceum, foliola basi tantum connata.

1. **A. hortensis** (L. sp. 1493.) caule herbaceo erecto, *foliis cordato-triangularibus* dentatis *concoloribus opacis*, superioribus oblongis triangularibus subhastatis, *perigoniis* fructiferis *subrotundo-ovatis* breviter acuminatis reticulato-venosis *integerrimis ad basin usque bipartitis*. ☉. Colitur et occurrit in hortorum reiectamentis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 309. St. h. 79. Schk. t. 349. fruct. Variat tota sanguinea. Colit.

2. **A. nitens** (Rebentisch. prodr. fl. neomarch. p. 126.) caule herbaceo erecto, *foliis* cordato-triangularibus sinuato-dentatis *supra nitidis subtus argenteo-glaucis*, superioribus e basi triangulari sinuato-dentata longe acutatis integerrimis, *perigoniis* fructiferis ovatis acuminatis reticulato-venosis *integerrimis ad basin usque bipartitis*. ☉. In ruderatis et ad vias, (Mähren, Böhm., Schles., Niedersachsen bei Hildesheim, Berlin, Elbinseln bei Hamburg sehr häufig, nach Sonder.) Jul. Aug. D. fl. 2. 310. Schk. t. 348. St. h. 79 A. acuminata W. K. pl. rar. hung. t. 103. A. Hermanni Willemet. phyt. p. 1222. G.

Sect. II. Schizotheca. Flores monoici; feminei bipartiti.

a. Perigonium femineum maturitate herbaceum vel membranaceum, foliola basi tantum connata.

3. **A. tatarica** (L. sp. 1493.) caule herbaceo erecto, ramis erecto-patulis, *foliis inferioribus ovato-lanceolatis* dentatis subhastatis, superioribus lanceolatis integerrimis, *perigoniis* fructiferis *ovato-subrhombeis integerrimis ad basin usque bipartitis*, spicis fructiferis laxis apice nutantibus. ☉. Ad vias, in campis collibusque siccis, (a. d. ganzen Rheinfläche von Basel bis Coblenz; in Mähren, Sachsen, Thüringen.) Jul. Aug. A. tatarica Schk. t. 349. A. oblongifolia W. Kit. pl. rar. hung. t. 211. Koch. syn. ed. 1. p. 610. D. fl. 2. p. 316. St. h. 79. nr. 3. Varietas angustifolia est: A. campestris K. et Z. cat. plant. palat. p. 24. St. h. 79. n. 4.

4. **A. patula** (L. sp. 1494.) caule herbaceo, ramis inferioribus divaricatis, *foliis concoloribus* inferioribus lanceolato-hastatis dentatis, caeteris lanceolatis, supremis linearibus, *perigoniis* fructiferis *hastato-rhombeis ad basin usque bipartitis*, spicis fructiferis strictis. ⊙. Ad vias, in cultis ubique. Jul. Aug. A. patula L. sp. ob verba „foliis subdeltoideo-lanceolatis" quae minime cum foliis Atriplicis latifoliae congruunt et ob synonymon C. Bauhini et Lobelii. A. patula Pollich. pal. 2. 660. Schk. t. 347. St. h. 79. DC. fl. fr. 3. 387. et omnium auctorum ante Smithium. A. angustifolia Smith. brit. 1692. D. fl. 2. 315. Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 243. Babingt. manual. p. 252. A. virgata Hoffm. D. fl. 2. 277. Variat caule erecto et prostrato, perigoniis fructiferis muricatis vel laevibus triplo quadruplove maioribus et minoribus. Varietas:

β. microcarpa, perigoniis vix semine maioribus, adeoque convexis, luculenter muriculatis: A. erecta Sm. brit. 1093. Babingt. manual. p. 252., si folia inferiora dentata sunt. St. h. 79.

5. **A. latifolia** (Wahlenberg. fl. suec. p. 660.) caule herbaceo, ramis inferioribus divaricatis, *foliis inferioribus triangulari-hastatis dentatis superioribus hastato-lanceolatis*, supremis lanceolatis integerrimis, *perigoniis fructiferis triangularibus integerrimis denticulatisque ad basin usque partitis*. ⊙. Ad vias, in cultis. Jun.-Aug. St. h. 79. A. patula Smith. brit. 1091. Engl. bot. t. 936. D. fl. 2. p. 312. Dub. bot. gall. 398. DC. fl. fr. 5. p. 370. Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 243. Babingt. manual. p. 252. A. hastata Pollich. pal. 659., Rothii et fere omnium auctorum ante Smithium. A. hastata Schk. t. 348. Occurrit foliis dentatis et basi dente utrinque reverso subsagittato-triangularibus: A. deltoides Babingt. man. p. 253. Variat praeterea magnitudine perigoniorum, ut antecedens, foliis dentatis et integerrimis, perigoniis muricatis et laevibus atque

β. microcarpa, perigoniis vix semine maioribus, convexis: A. microsperma W. Kit. pl. rar. hung. t. 250. Babingt. manual. p. 253. A. ruderalis Wallr. sched. p. 115. St. h. 79.

γ. salina, lepidoto-incana: A. patula var. salina Wallr. sched. p. 506. A. patula *γ.* farinosa D. fl. 2. p. 313. A. oppositifolia DC. fl. fr. 5. p. 371., si folia integerrima vel subintegerrima sunt. St. h. 79. A. Sackii Rostk. et Schm. fl. sedin. p. 401. t. 1., si folia inferiora dentata sunt. St. h. 79. A. prostrata Babingt. man. p. 252., sed A. prostrata DC. fl. fr. 3. p. 387. diversa species videtur. A. laciniata Schk. t. 349., sec. Mey. chlor. Hannov. p. 468., sed icon, me iudicante, illi non congruit. Haec varietas salina ad littora maris et ad salinas habitat.

6. **A. hastata** (L. sp. 1494.) caule herbaceo, ramis inferioribus divaricatis, *foliis inferioribus triangulari-hastatis* profunde sinuato-dentatis, superioribus hastato-lanceolatis, supremis integerrimis, *perigoniis fructiferis cordato-triangularibus sinuato-dentatis ad basin usque partitis, dentibus acuminatis subulatisque*. ⊙. In ruderatis, et ad vias, (bei Berlin, nach v. Schlechtend.; Pommern, nach Rostkov.; Rügen, Sonder; Frankf. a. d. O., Buek; Königsberg, Meyer!) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 311. St. h. 79. Reichenb. ic. 1. t. 16. Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 248. A. hastata *γ.* calotheca Schumach. saell. 1. 299. G.

7. **A. littoralis** (L. sp. 1494.) caule herbaceo ramis divaricatis erectisve, *foliis lineari-lanceolatis* linearibusque argute dentatis integerrimisque, *perigoniis* fructiferis *rhombeo-ovatis dentatis*, spicis strictis. ⊙. Ad littora maris, (an d. Ost- u. Nordsee.) Jul. Aug. D. fl. 2. 316. St. h. 79. Occurrit foliis angustissimis subsemicylindricis et latioribus sinuato-dentatis. Haec ultima: A. marina auctor. Dethard. consp. fl. megap. p. 24. Sturm. h. 80. Babingt. manual. p. 252. G.

c. Perigonium femineum maturitate a basi ad medium usque cartilagineo-induratum albidumque, foliola ad medium usque connata.

8. **A. laciniata** (L. sp. 1494.) caule herbaceo, *foliis* profunde sinuato-dentatis subhastatis, inferioribus triangulari-rhombeis, superioribus hastato-

oblongis, *spicis nudis* basi tantum foliatis, *perigoniis* fructiferis rhombeis vel subtrilobis dentatis subintegerrimisve *a basi ad medium usque albo-cartilagineis connatisque.* ⊙. In ruderatis, ad vias, (Littor., Oestr., Mähren und Böhm., äusserst häufig um Prag, Kosteletzk.!; bei Würzb., Heller; bei Warnemünde, Deth.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 508. St. h. 80. A. sinuata Hoffm. D. fl. 2. 277. G.

9. **A. rosea** (L. sp. 1493.) caule herbaceo divaricato, *foliis* sinuato-dentatis, inferioribus rhombeis, superioribus ovatis, *spicis* interruptis *foliatis,* perigoniis fructiferis triangulari-rhombeis acutis dentatis *a basi ad medium usque albo-cartilagineis connatisque.* ⊙. Ad vias et in ruderatis, (Rheinfläche von Worms bis Mainz, Westphalen, Mecklenb., Pomm., Brandenb., Thüring., Sachs., Schles., Böhm., Mähr., Oestr., Krain.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 307. Schk. t. 350. St. h. 80. A. verticillata Lagasc. gen. et sp. 12. A. alba Scop. delic. insub. 2. 16. G.

15. THELÍGONUM (L. gen. n. 1098.) Flores monoici. Masc. Perig. 2 fidum. Stam. fere 12. Fem. Perig. 2 bifidum. Styl. 1; stigma simplex. Nux coriacea. N. ab E. gen. 8. 1.

1. **T. Cynocrambe** (L. sp. 144.) ⊙. In rimis saxorum in umbrosis, (auf d. Insel Cherso, Biasol.!) Jun. Schk. t. 299. Flores ochroleuci. J.

Ord. XCVII. POLYGONEAE. Juss. gen. p. 82.

Perigonium inferum, 3, 5, 6 *partitum,* aestivatione imbricatum. Stam. definita, perigonii basi inserta. Ovarium liberum, 1 loculare, 1 ovulatum, ovulo erecto. Styli 2-3. Fructus *indehiscens,* nucamentaceus vel carnosus, nudus vel laciniis perigonii interioribus, capsulam spuriam efficientibus, velatus. Embryo inversus, rectiusculus et centralis; vel curvatus et unilateralis aut periphericus. Albumen farinaceum. Folia alterna stipulata; stipulis vaginantibus.

1. RUMEX (L. gen. n. 451.) Perigon. ad basin sexpartitum, laciniis tribus interioribus maioribus, conniventibus. Stam. 6, per paria laciniis perigonii exterioribus opposita. Stigmata penicellata. Nux trigona, laciniis tribus interioribus perigonii, capsulam spuriam referentibus, tota tecta. N. ab E. gen. 8. 9.

Sect. I. Lapathum Tournef. Flores hermaphroditi vel polygami. Styli liberi. Folia basi attenuata rotundata vel cordata, sed neque hastata neque sagittata.

1. **R. maritimus** (L. sp. 478.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus subrhombeis *utrinque setaceo-bidentatis* in apice lanceolato-protracto integerrimis, omnibus calliferis, *dentibus diametrum longitudinalem laciniae attingentibus,* verticillis folio fultis, superioribus confluentibus, foliis lanceolato-linearibus in petiolum attenuatis. ⊙. Ad margines lacuum et paludum et ad littora maris. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 614. St. h. 73. n. 1. R. Anthoxanthum Murr. prodr. 52. R. aureus Wither. 356. Hoffm. D. fl. ed. 2. 1. 172. R. acutus Pollich. palat. 1. p. 359. G.

2. **R. palustris** (Smith. fl. brit. p. 394.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus ovato-oblongis *utrinque setaceo-bidentatis* in apice lanceolato-protracto integerrimis, omnibus calliferis, *dentibus lacinia perigonii brevioribus,* verticillis folio fultis remotiusculis, *foliis lanceolato-linearibus* vel elongato-lanceolatis *in petiolum attenuatis.* ⊙. In paludosis et ad margines piscinarum et lacuum, (stw. dch. d. g. G.; in d. Schweiz nur an einer Stelle bei Rheinfelden im Aargau.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 614. St. h. 73. n. 2. R. maritimus Hoffm. D. fl. ed. 2. 1. 172. R. limosus Thuill. par. 182. Variat latifolius, folia radicalia pedem longa, tres pollices lata, Sonder.

3. **R. Steinii** (Becker. fl. v. Frankf. p. 165.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus ovatis *utrinque setaceo-bidentatis* in apice protracto integerrimis,

omnibus calliferis, dentibus lacinia perigonii brevioribus, verticillis remotis, inferioribus folio fultis, superioribus nudis, *foliis radicalibus lato-oblongis basi cordatis,* caulinis e basi rotundata lanceolatis, superioribus lanceolatis. ♃. Ad Moeni ripam, (im Gebiete d. Flora v. Frankf. bei Stockach, Fechheim u. Offenbach.) Jul. Aug. St. h. 73. n. 3. Rumici conglomerato et R. nemoroso proximus, insigniter vero ab his differt perigonii laciniis subulato-dentatis; ab R. palustri radice perenni, foliis radicalibus duplo triplove latioribus, basi cordatis, caulinisque inferioribus basi non attenuatis. G.

4. **R. conglomeratus** (Murr. prod. fl. goett. p. 52.) *laciniis* perigonii fructiferi interioribus *lineari-oblongis* obtusis *integerrimis,* omnibus calliferis, *foliis infimis* cordato- vel ovato-oblongis obtusis acutisve, intermediis *cordato-lanceolatis* acuminatis, ramis patentissimis adscendentibus, *verticillis* remotis *folio fultis,* supremis tantum nudis. ♃. Ad ripas, in fossis et paludosis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 612. St. h. 73. n. 4. R. glomeratus Schreb. spic. ed. 2. p. 64. Reichenb. ic. f. 552. R. Nemolapathum Ehrh. Beitr. 1. 181. Reichenb. fl. exc. p. 570. R. acutus Sm. brit. 391. Engl. bot. 721. DeC. fl. fr. 3. p. 375. Meyer. chlor. Hannov. p. 480. R. paludosus Wither. 354. R. crispus *β.* Pollich. palat. 358. R. undulatus Schrank. bayer. fl. 1. 625. Perigonium fructiferum rarissime ad basin denticulo uno alterove minuto notatum est; qua de causa R. acutus Linn. sp. 478. „valvulis dentatis" ad hanc speciem pertinere nequit. Suspicor, R. acutum L. in R. pratensi nostro quaerendum esse.

5. **R. sanguineus** (L. sp. 476.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *lineari-oblongis* obtusis *integerrimis,* unica callifera, *foliis infimis cordato-oblongis* vel subpanduriformibus obtusis acutisve, intermediis cordato-lanceolatis acuminatis, ramis rectis erecto-patentibus, *verticillis* omnibus *nudis* vel infimis tantum folio fultis. ♃. In nemoribus humidis. Jul. Aug. R. sanguineus Smith. brit. 390. Gaud. helv. 2. p. 579. R. Nemolapathum Wallr. sched. p. 158. D. fl. 2. p. 611. R. nemorosus Meyer. chlor. Hannov. p. 479. Folia non raro supra basin paulum contracta et subpanduriformia.

α. viridis, caule et foliorum venis non coloratis: R. sanguineus *β.* viridis Sm. brit. 390. St. h. 73. n. 5. R. Nemolapathum *α.* exsanguis Wallr. l. c. R. nemorosus Schrad. ap. Willd. en. h. berol. 1. 397. R. Nemolapathum DC. fl. fr. 3. p. 373. et R. nemorosus DC. fl. fr. 5. p. 367. R. Nemolapathum Reichenb. ic. f. 551.? (in figura principali omnes verticilli foliati depicti sunt.)

β. genuinus, caule et foliorum venis sanguineis: St. h. 73. n. 6. R. sanguineus I. Gaud. helv. 2. p. 579. R. Nemolapathum *β.* sanguineus Wallr. sched. p. 159. (Die Varietät *β.* nach Rostkov. bei Stettin.)

Praeeuntibus cl. Smithio et Gaudinio nomen Linnaeanum praeposui, licet varietatem tantum designet.

6. **R. pulcher** (L. sp. 477.) *laciniis* perigonii fructiferi interioribus ovato-oblongis *foveolato-reticulatis subspinoso-multidentatis* calliferis, foliis infimis cordato-oblongis vel cordato-panduriformibus obtusis, intermediis acutis, supremis lanceolatis, ramis patentissimis, verticillis remotis plerisque folio fultis. ☉. In locis cultis, (im östr. Littorale; Oberbaden u. Oberelsass; Etschland in Tyrol; Genf bis Unterwallis, Bellenz, Lugano.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 613. St. h. 73. n. 7. Reichenb. ic. 6. f. 679. Variat foliis supra basin non contractis. R. divaricatus L. sp. 477. sec. Bertol. St. h. 73. n. 8.

7. **R. obtusifolius** (L. sp. 478.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *ovato-triangularibus postice dentatis in apicem oblongum* obtusum integerrimum *protractis,* omnibus calliferis, *dentibus triangularibus acuminatis subulatisque,* racemis aphyllis, verticillis remotiusculis, *foliis inferioribus cordato-ovatis* obtusis vel acutiusculis, intermediis cordato-oblongis acutis, supremis lanceolatis. ♃. In pratis et circa pagos. Jul. Aug. D. fl. 2.

p. 610. St. h. 73. n. 9. Reichenb. ic. 4. f. 550. R. divaricatus L. sp. p. 477. ex sententia cl. Friesii, sed rami non magis divaricati sunt, quam in varietatibus *β.* et *γ.* Variat:

β. discolor, caule petiolis venisque foliorum racemisque sanguineis: R. obtusifolius *β.* discolor Wallr. sched. 1. 168. St. h. 73. n. 10. R. purpureus Poir. dict. 5. 163. Hic in Bavaria superiore frequens.

γ. sylvestris, laciniis perigonii dimidio minoribus, parcius dentatis: St. h. 73. n. 11. R. sylvestris Wallr. sched. 161. R. obtusifolius Linn. sec. cl. Friesium. R. acutus Tausch. pl. select. Apud nos multis formis intermediis in varietatem *α.* transit.

8. **R. pratensis** (Mertens. et Koch. Deutschl. flor. 2. p. 609.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *ovatis subcordatis obtusis* anteriore vel omnibus calliferis dentatis apice integerrimis, *dentibus triangularibus acuminatis subulatisque*, racemis aphyllis, verticillis approximatis, *foliis radicalibus caulinisque inferioribus cordato-oblongis* acutis, supremis lanceolatis. 4. In pratis fertilibus, (auf d. Rheinfläche bis Westphalen; Thüringen um Halle; an d. Saale bei Rudolstadt, bei Suhl.) Jul. Aug. St. h. 73. n. 12. D. fl. 2. p. 609. R. acutus Koch. et Ziz. cat. pl. palat. p. 8., MBieberst., flor. wett. aliarumque et ex sententia cl. Friesii. R. cristatus Wallr. sched. 163. (non DeC.) Videtur forma hybrida.

9. **R. crispus** (L. sp. 476.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *subrotundis subcordatis integerrimis* vel basi denticulatis, unica omnibusve calliferis, racemis aphyllis, verticillis approximatis, *foliis lanceolatis* acutis *undulatis crispis*. 4. In pratis et cultis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 608. St. h. 73. nr. 13. Variat laciniis perigonii interioribus omnibus vel anteriore tantum calliferis.

10. **R. domesticus** (Hartmann. scand. fl. ed. 1. p. 148.) *laciniis perigonii fructiferi interioribus subrotundo-cordatis integerrimis* vel obtuse denticulatis, omnibus callo destitutis vel obsolete calliferis, racemis paniculatis aphyllis densis, *foliis radicalibus* caulinisque inferioribus *ex ovata vel subcordata basi oblongis* vel lato-lanceolatis undulatis crispatisque, petiolis supra planis linea tenui marginatis. 4. Ad ripas, (an der Elbe u. auf den Elbinseln bei Hamburg, Sonder.) Jul. Aug. Reichenb. ic. f. 526., panicula cum folio caulino intermedio. Petioli supra plani, linea elevata, tenui versus basin folii evidentiori, marginati, Sonder.

11. **R. Patientia** (L. sp. 476.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *subrotundo-cordatis* obtusis *integerrimis* vel vix denticulatis, unica callifera, racemis paniculatis aphyllis, verticillis approximatis, *foliis radicalibus* caulinisque inferioribus *ovato-lanceolatis planis* acuminatis, supremis lanceolatis, *petiolis canaliculatis*. 4. Ad fossas et pagos, (in Unterösterreich, v. Host.) Colitur quoque in usum culinarium. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 607. St. h. 73. n. 14.

12. **R. Hydrolápathum** (Hudson. fl. angl. p. 154.) *laciniis* perigonii fructiferi interioribus *ovato-triangularibus* integerrimis vel postice denticulatis, omnibus calliferis, racemis paniculatis aphyllis, *foliis lanceolatis* acuminatis *basin versus angustatis* planis margine undulato-crenulatis, *petiolis supra planis*. 4. In paludibus, fluviis lente fluentibus, piscinis et fossis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 615. St. h. 73. n. 15. Reichenb. ic. 4. f. 554. R. aquaticus Pollich. pal. 1. 361. Fries. nov. ed. 2. p. 109. Smith. brit. 394. Meyer. chlor. Hannov. 477. — Forma petioli hunc et duos sequentes praeter alias notas egregie distinguit.

13. **R. maximus** (Schreber. in Schweigg. et Kört. fl. Erlang. 1. 152.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus *triangulari-cordatis postice denticulatis*, omnibus calliferis, racemis paniculatis aphyllis, *foliis radicalibus* caulinisque inferioribus *oblongis* acutis *basi oblique ovatis cordatisve, petiolis* supra *planis* vel lato-canaliculatis utrinque costa prominula *marginatis*. 4. In fossis, piscinis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 616. St. h. 73. n. 16. R. he-

terophyllus Schultz. starg. 92. R. acutus Hartm. scand. p. 147. R. aquaticus α. heterophyllus Meyer. chlor. Hannov. 477. G.

14. **R. aquaticus** (L. sp. 479.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus ovatis subcordatisve *membranaceis* integerrimis vel subdenticulatis, *omnibus callo destitutis,* racemis paniculatis aphyllis, *foliis radicalibus cordato-ovatis* acutis basi dilatatis, petiolis supra anguste et leviter sub folio autem evidenter canaliculatis. 4. In fossis et piscinis, et ad earum margines, (sehr zerstreut durch d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 617. St. h. 74. n. 1. Reichenb. ic. 4. f. 553. opt. R. Hippolapathum β. Fries. nov. ed. 2. p. 106. R. latifolius Meyer. chlor. Hannov. 478., excl. synon. Pollichii; nam in locis a Pollichio memoratis R. aquaticus non provenit. — Verba Magistri „valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis" L. sp. pl. 479., me iudicante, omnem dubitationem de hac planta tollunt. G.

15. **R. alpinus** (L. sp. 480.) laciniis perigonii fructiferi interioribus cordato-ovatis membranaceis integerrimis vel subdenticulatis callo destitutis, racemis dense paniculatis aphyllis, *foliis radicalibus subrotundo-cordatis rotundato-obtusis* vel in apice obtuso breviter acuminatis, petiolis supra canaliculatis. 4. In alpibus, inprimis ad casas pastorum, in convalles descendens, (durch d. g. Alpenk. u. a. d. höhern Kuppen des Riesengeb., der Mähr. Geb. u. d. Schwarzw.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 617. St. h. 74. n. 2.

Sect. II. Acetosa Tournef. Flores dioici vel polygami. Styli ovarii angulis superne accreti. Folia hastata vel sagittata. Laciniae perigonii interiores in omnibus integerrimae vel leviter repando-crenulatae.

a. Flores polygami.

16. **R. scutatus** (L. sp. 480.) *laciniis perigonii* fructiferi interioribus subrotundo-cordatis integerrimis membranaceis *callo destitutis, exterioribus margini inferiori interiorum adpressis*, semiverticillis paucifloris remotis aphyllis, *foliis hastatis* ovatis subpanduriformibusque. 4. In rupestribus inter saxa, in alpibus, subalpinis et montibus humilioribus, ad muros vetustos, (dch. d. g. Alpenk. v. Oestr. bis in d. Schweiz, dch. d. Gebirge v. Böhmen, v. Würtemb., Baden u. Hessen, v. Elsass bis Lüttich.) Mai-Jul. D. fl. 2. p. 618. Var.:

α. *hastifolius,* folia utrinque sinu profundo et angusto excisa, lobus terminalis ovatus, fere latior, quam longus: St. h. 74. n. 3. R. hastifolius MB. taur. cauc. 1. 290., haec vulgatissima est.

β. *hastilis,* folia triangularia, acuta, dente baseos utrinque elongato hastata. Folia infima saepe ut in var. antecedente: St. h. 74. n. 4.

γ. *triangularis,* folia triangulari-ovata, dente baseos nullo vel brevissimo: St. h. 74. n. 5. R. glaucus Jacq. collect. 1. p. 63. ic. rar. t. 67 ; haec var. rarissima est.

b. Flores dioici.

17. **R. nivalis** (Hegetschw. et Heer. fl. der Schweiz p. 345.) *laciniis perigonii fructiferi interioribus* subrotundo-cordatis integerrimis basi callo deflexo praeditis, exterioribus refractis, *foliis* crassiusculis *subenerviis,* radicalibus exterioribus subrotundo-ovatis obtusissimis subcordatis, interioribus ovatis oblongisve hastatis, caulino solitario binis nullisve, *caule simplici verticillato-racemoso* vel sub racemo ramis paucis simplicibus, bracteis integerrimis. 4. In glareosis alpium altissimarum, (Schweiz, Bayern, Krain.) Jul. Aug. St. h. 88.

18. **R. arifolius** (All. ped. 2. p. 202., non Ait., nec L. fil.) *laciniis perigonii fructiferi interioribus subrotundis basi truncatis cordatisve* callo squamaeformi brevi rotundato vel subquadrato deflexo praeditis, exterioribus dimidiam longitudinem interiorum attingentibus refractis, *foliis* hastato-sagittatis *basi radiato-5-7 nerviis,* caulinis acuminatis, *caule superne ramoso, ramis verticillato-racemosis* stipulis caulinis integerrimis. 4. In pratis alpinis et subalpinis, (dch. d. g. Alpenk. u. auf d. Mähr. Karp., den Sudet., dem Brocken, Schwarzw. u. den Vogesen.) Jul. Aug. D. fl. 2. 620. St. h. 74. n. 6. R. montanus Poir. dict. suppl. 4. 333. Bertol. fl. it. 4. p. 255. R.

hispanica Gmel. bad. 2. p. 112. R. Acetosa δ. et ε. L. sp. 481., varietas δ. orta est ex Oxalide majori Brockenbergensi Thalii, quae synonymon refert Rumicis arifolii in Bructero provenientis; C. Bauh. sub nomine Acetosa montana maxima hanc Thalianam plantam in Pinace proposuit. Eandem plantam exhibet Acetosa montana, lato ari folio rotundo Bocc. mus. 165. t. 125., quae varietatem ε. in spec. pl. constituit. R. Acetosa β. Smith. engl. fl. 2. 196.

19. **R. Acetosa** (L. sp. 481.) *laciniis perigonii fructiferi interioribus ovato-subrotundis basi truncatis cordatisve callo* squamaeformi *brevi* rotundato vel subquadrato deflexo praeditis, exterioribus dimidiam longitudinem interiorum attingentibus refractis, *foliis* hastatis sagittatisve *venosis*, stipulis laciniato-dentatis. 4. In pratis, aggeribus, sylvarum locis denudatis ubique. 4. Mai. Jun. et in pratis iterum post foenisecium D. fl. 2. p. 619. Linn. sp. 481. var. α., fl. suec. p. 118. var. α. Smith. engl. fl. 2. p. 196. var. α. R. Pseudo-Acetosa Bertolon. fl. ital. 4. p. 252. Cl. Bertolonius Rumicem Acetosam verum in planta hortensi, quae frequenter in usum culinarem colitur, quaerendum esse censet, sed varietas α. Rumicis Acetosae sp. pl. et florae suec., vel species primaria, certissime exhibet plantam sylvestrem nostram ubique vulgarem, R. Acetosam omnium auctorum. Linnaeus plantam hortensem, quae propriam speciem exhibet et in sp. pl. et in flora suec. cum R. arifolio commiscuit. Variat R. Acetosa:

α. *vulgaris*, folia sagittata vel hastata oblonga, inferiora obtusa, superiora acuta. St. h. 74. n. 7.

β. *auriculatus*, folia inferiora hastato-sagittata oblonga, subsequentia hastata elongato-lanceolata undulata auriculis curvatis, suprema angustissima, saepe spiraliter revoluta, vel folia radicalia quoque elongato-lineari-lanceolata, caulina linearia longe attenuata, praeterea nulla alia nota a varietate β. diversus. St. h. 74. n. 8. figura principalis. R. Acetosa β. auriculatus Wallr. sched. 182. inclusa varietate sequente.

γ. *fissus*, varietas antecedens, sed auriculae foliorum bi-trifidae: R. Acetosa γ. L. sp. 481. R. Acetosa γ. fissus Koch. syn. ed. 1. p. 616. excluso synonymo R. intermedii DeC. fl. fr. suppl. p. 369. R. intermedius St. h. 74. n. 7. f. β. non DeC. — Cum varietate β. et γ. quae ubique in pratis frequenter occurrunt, non commutandus est R. Pseudo-Acetosa β. Bert. fl. ital., quocum cl. Auctor conjungit R. triangularem DeC., mihi ignotum, qui vero secundum descriptionem in fl. ital. p. 254., statura minore graciliore et fibris radicalibus crassioribus a specie primitiva, et ex De-Candollio nota evidente, scilicet perigonii phyllis exterioribus caducis, conspicue differt. Nostrae varietates magnitudine omnium partium, crassitie fibrarum radicis omnibusque notis accurate cum varietate α. conveniunt neque differunt nisi forma foliorum memorata. — R. intermedius DC., quem cum varietate γ. nostra conjunxeram, sec. descriptiones a cl. DeC. et Bertol. datas et specimina sicca monspeliensia, a R. Acetosa nostro differt phyllis perigonii interioribus reniformi-subrotundis, transverse latioribus. Bertolonius Rumicem intermedium DC. ad R. thyrsoidem Desf. refert. Haec planta, sicut simillimus R. tuberosus, qui autem praeter radicem filipendulam phyllis perigonii exterioribus longitudinem interiorem attingentibus absque difficultate cognoscitur, in Littorali et in Istria quaerendi sunt.

20. **R. hispanicus** (Acetosa Hispanica Maxima Munting dissert. de vera herba Britannica p. 225., icon bona et descriptio optima.) *laciniis perigonii fructiferi interioribus ovatis callo oblongo ultra dimidiam laciniam excurrente* praeditis, exterioribus refractis, foliis sagittatis hastatisque venosis. 4. Colitur in usum culinarem. Mai. Jun. R. Acetosa Bertolon. fl. ital. v. 4. p. 255. in annotatione. R. hispanica Gmel. bad. 3. p. 255. in annotatione, nam R. hispanica v. 2. 112., monente ipso auctore idem est ac R. arifolius All. R. Acetosa β. L. fl. suec. p. 118., quod usum culinarem attinet; planta enim Lapponica ad R. arifolium All. pertinet. — In horto nostro non nisi sexum masculum habemus, qua de causa fructus descriptionem ex flora italica mutuavi. Colit.

21. **R. Acetosella** (L. sp. 1. 481.) *laciniis* perigonii fructiferi interioribus subrotundo-cordatis membranaceis reticulato-venosis integerrimis *squama destitutis nucem aequantibus*, exterioribus erectis adpressis, foliis hastatis lanceolatis linearibusve. 4. In pascuis, agris arenosis, locis cultis ubique, praecipue in arenosis. Mai.-Jul. D. fl. 2. p. 621. Variat:

α. vulgaris, folia lanceolata, sagittata. St. h. 74. n. 9.

β. angustifolius, folia linearia vel anguste lanceolata, saepe auricula una et raro etiam auriculis ambabus destituta.

γ. multifidus, maior, foliorum auriculae bi-trifidae: R. Acetosella *δ.* lacerus et *γ.* multifidus Wallr. sched. 186. R. Acetosella *δ.* L. sp. 1. 482. et R. multifidus L. l. c. R. multifidus St. h. 74.

2. OXÝRIA (Hill. veg. syst. 10. p. 24.) Perigon. ad basin 4 partitum, laciniis 2 interioribus maioribus. Stam. 6; 2 laciniis perigonii exterioribus et 1 laciniis interioribus opposita. Stigmata 2, penicillata. Utriculus alatus, perigonium fructiferum multum superans. N. ab E. gen. 8. 10.

1. **O. digyna** (Campder. monogr. 155. t. 3. f. 3.) folia reniformia, emarginata. In alpium rupibus, (Schweiz, Tyrol, Salzb., Obersteyerm., Kärnthen.) Jul. Aug. Oxyria reniformis Hooker. fl. scot. 111. D. fl. 2. p. 606. Rumex digynus L. sp. 480. Rheum digynum Wahlenb. lapp. 101. t. 9. f. 2. G.

3. POLÝGONUM (L. gen. n. 495.) Perigon. 4-5 fidum vel partitum, superne coloratum. Stam. biserialia; seriei exterioris 5, laciniis perigonii alterna; seriei interioris 3, laciniis perigonii tribus interioribus et faciebus ovarii trigoni opposita, in quibusdam speciebus aut omnia aut pro parte deficientia. Glandulae saepe ad basin staminum. Ovarium trigonum stigmatibus 3, vel compressum stigmatibus 2, (saepe in uno specimine;) stigmate vel styli basi plus minusve connata. Nux perigonio persistente tecta. — — Stamina 5 seriei exterioris semper reperiuntur et in floribus octandris insuper tria interiora; in floribus heptandris id deficit, quod laciniae perigonii posteriori oppositum est, et duo laciniis lateralibus opposita adsunt; in floribus hexandris haec deficiunt et illud adest; in floribus pentandris omnio tria interiora evanuerunt. N. ab E. gen. 8. t. 7. et 8.

Sect. I. Bistorta Tournef. Spica unica in apice caulis simplicissimi. Stam. omnia vel 3 interiora tantum e basi glandulosa egredientia, quorum saepe 1 vel 2 deficiunt. Stylus ad basin fissus, cruribus filiformibus, elongatis; stigmata subrotunda, minutissima. Embryo lateralis; cotyledones planae, angustae. — Flores rosei vel albi.

1. **P. Bistorta** (L. sp. 516.) *caule simplicissimo monostachyo*, spica densa, foliis oblongo ovatis subcordatis undulatis, *petiolis alatis*. 4. In pratis humidis planitierum et mont. humil. Jun. Jul. D. fl. 3. p. 49. Fl. dan. t. 421.

2. **P. viviparum** (L. sp. 516.) *caule simplicissimo monostachyo*, spica densa, foliis ovalibus lanceolatisve margine revolutis striato-crenulatis, venulis marginis incrassatis, *petiolis apteris*. 4. In alpium pascuis; cum fluviis descendens, (durch d. ganze Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 3. p. 51. Fl. dan. t. 13.

Sect. II. Persicaria Tournef. Caulis ramosus, rami singuli spica terminati. Stam. exteriora eglandulosa, interiora e corona glandularum progredientia, sed fere semper eorum 1 vel 2 deficientia. Stylus ad medium vel profundius fissus; stigmata magna, capitata. Embryo ut in sect. anteced. — Omnes species huius sect. variant floribus purpureis et albis, foliis immaculatis vel macula hippocrepica fusca notatis.

3. **P. amphibium** (L. sp. 517.) *spicis* solitariis *densis* cylindricis, floribus pentandris, foliis oblongo-lanceolatis, *radice repente*. 4. In locis humidis erecta, in aqua ipsa natans. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 52. Flores purpurei. Variat:

α. natans, folia natantia, longe petiolata, glabra: P. amphibium *α.* natans Moench. hass. 328. In piscinis et lacubus.

β. coenosum, caulis, ripa vel palude exsiccata, cum foliis prostratus radices agit, apice adscendit ibidemque folia varietatis sequentis profert: P. amphibium *β.* D. fl. 2. p. 52.

γ. terrestre, erectum, folia breve petiolata, angustiora, pubescenti-scabra: P. amphibium *β.* terrestre Leers. herb. 99. Hoc in locis humidis.

δ. maritimum, caulis prostratus, folia antecedentis varietatis, sed undulata: Dethard. consp. fl. megap. 33. Hoc in arenosis maritimis provenit.

4. **P. lapathifolium** (L. sp. 517.) *spicis oblongo-cylindricis densis* erectis vel subcernuis, floribus hexandris, foliis ovatis ellipticis lanceolatisve, *ochreis* glabris vel sublanatis *breviter* et tenuissime *ciliatis*, *pedunculis calycibusque glanduloso-scabris*. ⊙. In locis humidis, ad ripas. Jul.-autumn. D. fl. 3. p. 52. Reichenb. ic. 5. f. 688., stamina per errorem hypogyna. P. lapathifolium Wahlenb. suec. p. 241. Caulis et flores virides vel rubri, vel caulis rubro-maculatus, nunc prostratus, nunc erectus. Genicula quandoque valde incrassata sunt, h. l.: P. nodosum Pers. syn. 440. Reichenb. ic. f. 689. Variat quoque

β. incanum, foliis subtus lanato-tomentosis: P. incanum Schmidt. boh. n. 391. P. tomentosum Schrank. baier. fl. 1. 669. P. Persicaria *γ.* L. sp. 1. 518.

5. **P. Persicaria** (L. sp. 518. *α.*) *spicis oblongo-cylindricis densis* erectis vel subnutantibus, floribus hexandris, foliis ovatis ellipticis lanceolatisve, *ochreis* hirsutis *longe ciliatis*, *pedunculis calycibusque eglandulosis*. ⊙. Cum antecedente ubique. Jul.-autumn. D. fl. 3. p. 55. Reichenb. ic. f. 684. P. biforme Wahlenb. suec. p. 242. Variat, ut antecedens, sui simillimum. Nuces nunc fere omnes triquetrae: P. rivulare Roth. en. 2. 185.; nunc plurimae compressae: P. lapathifolium *α.* Roth. l. c.

6. **P. mite** (Schrank. baier. fl. 1. p. 668. 1789.) *spicis filiformibus laxis pendulis* subpedunculatis, floribus hexandris, *foliis lanceolatis* vel oblongo-lanceolatis, *ochreis* hirsutis *longe ciliatis*, floribus eglandulosis. ⊙. In locis humidis, circa pagos, ad fossas, (Schweiz, Elsass, Baden, Wett., Bayern, Schlesien, Westph.) Jul.-Oct. P. laxiflorum Weih. bot. Ztg. 1826. p. 746. D. fl. 3. p. 55. P. mite Mey. chlor. Hannov. p. 475. P. dubium Stein. sec. A. Braun. bot. Ztg. 1834. P. Braunii Bl. et Fing. comp. ed. 1. p. 509. Spicae primum albidae, denique purpureae. — P. mite Pers., (1805.,) quod idem est ac P. hydropiperoides Michaux. secund. cl. Meyer. in chlor. Hannov. p. 475., non differt.

7. **P. Hydropiper** (L. sp. 517.) *spicis filiformibus laxis pendulis* inferne interruptis, floribus hexandris, foliis lanceolatis ellipticisve, *ochreis* subglabris *breviter ciliatis*, floralibus ciliis fere destitutis, *floribus glanduloso-punctatis*. ⊙. In locis humidis, fossis ubique. Jul.-autumn. D. fl. 3. p. 57. Reichenb. ic. f. 687. Flores virides, margine purpurei vel albidi, raro toti purpurei.

8. **P. minus** (Huds. fl. angl. 1. 148.) *spicis filiformibus laxis* erectiusculis, floribus pentandris, *foliis* lanceolato-linearibus *antice sensim attenuatis*, *caulinis basi rotundatis*, rameis basi acutioribus, *ochreis* adpresse pilosis *longe ciliatis*, floribus eglandulosis. ⊙. In fossis, locis humidis. Jul.-autumn. D. fl. 3. p. 58. P. Persicaria *β.* angustifolium L. sp. 1. 518. P. pusillum Lam. fl. fr. 3. 235. P. strictum All. ped. 2. p. 207. t. 68. f. 2. P. angustifolium Roth. tent. 1. 453. Flores purpurei vel raro albi. Specimina anglica cum nostris in omnibus notis conveniunt.

Sect. III. Aviculariа Meisn. polyg. p. 85. sec. Dub. bot. gall. p. 405. Flores in axillis foliorum fasciculati, vel, foliis ad apicem ramorum diminutis, spicas interruptas formantes. Stam. 8, filamenta trium interiorum basi lato-ovata, sed glandulae in basi perigonii nullae. Styl. 3, brevissimi, liberi; stigmata minutissima. Embryo ut sect. praecedentium.

9. **P. aviculare** (L. sp. 519.) *floribus axillaribus*, foliis lanceolatis ellipticisve venosis planis, ochreis subsexnerviis bifidis, laciniis lanceolatis acuminatis denique multifidis, caule ramoso, *ramis ad apicem usque foliatis*, *nucibus ruguloso-striolatis* subopacis. ⊙. Ad vias, in cultis ubique. Jul.-

autumn. D. fl. 3. p. 58. St. h. 1. Flores virides, margine purpureo vel albo. Variat caule prostrato, terrae adpresso, et

β. erectum, caule erecto: P. aviculare *β.* erectum Roth. tent. 2. 1. 454.

γ. littorale, foliis crassiusculis: P. littorale Link. en. h. berol. 1. 385. Hoc in littore maris.

10. **P. maritimum** (L. sp. 519.) *floribus axillaribus*, foliis ellipticis venosis margine revolutis, ochreis subduodecimnerviis bifidis, laciniis lanceolatis acuminatis denique multifidis, caule ramoso, *nucibus laevissimis nitidis*. ♃. In arenosis ad littus maris adriatici, (bei Monfalcone, Bartling; auf d. Insel Sansego, Tommas.) Jul. Aug. D. fl. 3. p. 60. Flores ut antecedentis. G.

11. **P. Bellardi** (Allion. fl. ped. 2. p. 205. t. 90. f. 2.) *floribus axillaribus*, foliis venosis planis ellipticis, superioribus lanceolatis acuminatis, ochreis subsexnerviis denique multifidis, caule erecto, *ramis virgatis interrupte spicatis*, spicis superne aphyllis, *nucibus subtilissime ruguloso-striolatis*. ⊙. In locis cultis, (im östr. Litt., Triest.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 60. P. patulum MBieb. taur. cauc. 1. p. 304. Flores ut antecedentis. G.

Sect. IV. Helxine D. fl. 3. p. 61. Flores in foliorum axillis fasciculati. Stam. octo, tria pro more generis profundius inserta, glandulae in basi perigonii nullae. Stylus 1, brevis, stigmate unico trilobo. Perigonium fructus auctum. Embryo ut sectionum antecedentium.

12. **P. Convolvulus** (L. sp. 522.) *caule* herbaceo *volubili* angulato-striato, foliis cordato-sagittatis, *laciniis perigonii* 3 interioribus *obtuse carinatis*, nucibus trigonis opacis. ⊙. In cultis ubique. Jul.-autumn. D. fl. 3. p. 61. Fl. dan. t. 744. Flores virides, margine et intus albi.

13. **P. dumetorum** (L. sp. 62.) *caule* herbaceo *volubili* laevi substriato, foliis cordato-sagittatis, *laciniis perigonii* 3 exterioribus *membranaceo-alatis*, nucibus trigonis nitidis. ⊙. In sepibus, dumetis. Jul. Aug. D. fl. 3. p. 62. Fl. dan. t. 756. Fagopyrum dumetorum v. Bönningh. prodr. 119. Color florum ut antecedentis.

Sect. V. Aconógonum Meisner. polyg. p. 55. Flores racemosi, racemi paniculati. Stam. 8, inter glandulas inserta. Styl. tres brevissimi, stigmatibus crassis capitatis. Fructus perigonio longior. Embryo lateralis, curvatus, cotyledonibus planiusculis albumini accumbentibus.

14. **P. alpinum** (All. ped. 1. p. 206. t. 68. f. 1.) *racemis terminalibus paniculatis*, floribus octandris, caule erecto ramoso, *foliis* oblongo-*lanceolatis* acuminatis undulatis ciliatis subtus pubescentibus in petiolum brevem attenuatis, ochreis hirsutis. ♃. In pratis fertilibus convallium alpinarum editissimarum, (im Ursern- u. Tössthale d. Cant. Uri, im Binnthale d. Wallis, Tessin.) Jul. Aug. Gaud. helv. 3. p. 46. Flores ochroleuci vel dilutissime rosei, stigmatibus purpureis. H.

Sect. VI. Fagopyrum Tournef. Flores racemosi, racemi paniculati vel corymbosi. Stam. octo, interiora tria inter glandulas inserta. Styl. 3, stigmatibus crassiusculis, capitatis Fructus perigonio longior. Embryo centralis, cotyledonibus induplicatis.

15. **P. Fagopyrum** (L. sp. 522.) *racemis* axillaribus simplicibus, terminalibus *corymbosis*, nucibus acuminatis trigonis, angulis integerrimis, caule erecto inermi, *foliis sagittato-cordatis* acuminatis. ⊙. Colitur. Jul. Aug. D. fl. 3. p. 62. St. h. 18. Flores rosei vel albi, basi virides. Colit.

16. **P. tataricum** (L. sp. 521.) floribus fasciculatis, *fasciculis* axillaribus solitariis, terminalibus *in spicas interruptas* nutantes aphyllas *dispositis*, nucibus acutis trigonis, angulis repando-dentatis, caule erecto inermi, *foliis sagittato-cordatis* acuminatis. ⊙. In agris, (bei Hamburg, in Westph.; in Hannov. ein lästiges Unkraut; Krain, Dolliner.) Jul. Aug. Flores virentes, glandulis non carentes, ut perhibet cl. v. Bönningh. G.

Ord. XCVIII. THYMELEAE. Juss. gen. 76.

Perigonium inferum, coloratum, *tubulosum*, limbo 4-, rarius 5 fido, aestivatione imbricatum. *Stam.* definita, *fauci tubove inserta*, perigonii la-

ciniis numero dupla; *antherae* biloculares, *rimis* 2 *longitudinalibus dehiscentes*. *Ovarium* liberum, 1 loculare, 1 *ovulatum*, *ovulo pendulo*. Styl. 1. Stigma 1. Fructus siccus aut baccatus. Albumen o, vel tenue et carnosum. Embryo rectus, radicula hilum spectante. Frutices fol. exstipulatis.

1. PASSERINA (Linn. gen. n. 489., ex emendat. Wickström. act. holm. 1820. p. 320.) Perigon. limbo 4 fido, persistens, marcescens. Stam. 8. Nux. N. ab E. gen. 7. 3.

1. **P. annua** (Wickstr. l. c.) caule glabro ramoso, *foliis* sparsis lanceolato-linearibus acutis *glabris* erecto-patentibus, floribus axillaribus quinis ternis solitariisve pubescentibus, laciniis perigonii anthesi peracta conniventibus. ☉. In agris et locis apricis planitierum et montium humilium, praecipue solo calcareo, (zerstreut dch. d. südl. u. mittlere Geb.) Jul. Aug. D. fl. 3. p. 47. Stellera Passerina L. sp. 512. Sck. t. 107. a. Flores virides.

2. **P. hirsuta** (L. sp. 513.) *caulibus* erectis ramosis *tomentosis*, *foliis ovatis carnosis infra glabris supra tomentosis*, floribus aggregatis, perigonio externe tomentoso subcampanulato, laciniis ovatis. ♄. In asperis sterilibus, (auf der Insel Canidole piccole bei Lossino, Dr. Sendtner, mecum comm. cl. Tommas.) Mai.

2. DAPHNE (L. gen. n. 485.) Perig. limbo 4 fido, deciduum. Drupa carne molli vel coriacea. N. ab E. gen. 7. 2.

1. **D. Mezeréum** (L. sp. 509.) *floribus lateralibus sessilibus* subternis pubescentibus, laciniis perigonii ovatis acutis, foliis lanceolatis basi cuneato-attenuatis glabris. ♄. In nemorosis, in subalpinis adscendens. Febr. Mart. D. fl. 3. p. 43. St. h. 8. Flores rosei, rarius albi.

2. **D. Lauréola** (L. sp. 510.) *racemis* brevibus subquinquefloris nutantibus *axillaribus*, floribus bracteatis glabris, foliis lanceolatis basi cuneato-attenuatis glabris. ♄. In sylvis montanis, (westl. Schweiz u. Oestreich, südl. Tyrol.) Mart. April. D. fl. 3. p. 44. Jacq. a. t. 183. Flores flavescenti-virides.

3. **D. alpina** (L. sp. 510.) *floribus terminalibus* aggregatis sessilibus *villosis*, laciniis perigonii lanceolatis acuminatis tubo triente brevioribus, *foliis* lanceolatis obovatisve *pubescentibus serius glabris* deciduis. ♄. In rupibus alpium, (dch. d. g. Alpenk.) Mai-Jul. D. fl. 3. p. 45. St. h. 22. Thymelaea candida Scop. carn. 1. p. 277. Flores albi.

4. **D. collina** (Smith. fl. graec. t. 359.) *floribus terminalibus* fasciculatis externe *tomentoso-villosis*, laciniis perigonii ovatis obtusis, *foliis* oblongo-obovatis obtusis retusisque nitidis supra glabris *subtus hirsutis* perennantibus. ♄. In petrosis, (im Isonzothale, Brignoli, conf. Host. fl. a. 1. p. 477.) Mart. Apr. D. fl. 3. p. 45. Flores rosei. Specimen ex loco designato nondum vidi. G.

5. **D. Blagayana** (Freyer.) *floribus terminalibus* fasciculatis breviter pedicellatis, tubo perigonii pilis minutis erectis adsperso, laciniis ovatis tubo triplo brevioribus, fasciculo basi bracteato, bracteis inferioribus obovatis subtus margineque sericeis sterilibus, superioribus flores inferiores fulcrantibus lineari-cuneatis tubum subaequantibus, *foliis oblongo-obovatis* obtusis breviter mucronatis *glabris*. ♄. In sylvis montanis, (auf dem St. Lorenziberge bei Billichgrätz in Krain u. Göstinger Berg bei Grätz in Steyermark.) Mai. Flores ochroleuci. Caulis filiformis repens, v. Welden.

6. **D. striata** (Trattinnick. Arch. d. Gew. Kunde 1. p. 120. t. 173.) *floribus terminalibus* fasciculatis sessilibus *glabris*, laciniis perigonii ellipticis tubo triente brevioribus, bracteis ovatis mucronulatis tubi tertiam partem attingentibus, *foliis* lineari-cuneatis obtusis emarginatisve breviter mucronatis *glabris*. ♄. In rupestribus alpium, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. Cneorum Wahlenb. helv. p. 72. (non fl. carpat.) D. Cneorum γ. D. fl. 3. p. 46. Flores rosei.

7. **D. Cneórum** (L. sp. 510.) *floribus terminalibus* fasciculatis breviter pedicellatis bracteis cauleque superne *pubescentibus,* laciniis perigonii ellipticis tubo triente brevioribus, bracteis brevissimis truncatis, *foliis* linearicuneatis obtusis emarginatisve breviter mucronatis *glabris.* ♄. In pascuis siccis, ericetis montium et planitierum, (v. d. südl. Schweiz dch. d. südl. Tyrol nach d. Littorale; v. d. Vogesen u. d. Gebirgen der Rheinpfalz dch. Schwaben, Bayern bis Unteröstreich; in Mähren u. Schlesien.) Jun. Jul. D. fl. 3. p. 46. variet. α. Jacq. a. t. 426. Pollich. palat. t. 1. f. 4. Flores rosei.

Ord. XCIX. LAURINEAE. DC. fl. fr. 3. p. 361. Lauri Juss. gen. p. 80.

Perigonium inferum 4-6 *fidum vel* 4-6 *partitum,* aestivatione imbricatum. *Stamina in basi laciniarum inserta,* 6, ordine simplici, vel 12, ordine duplici. *Antherae filamento adnatae, biloculares, loculis valvula a basi ad apicem dehiscentibus.* Ovarium liberum, 1 ovulatum, ovulo pendulo. Styl. 1. Stigm. 1. Drupa aut bacca. Albumen o, embryo rectus, radicula umbilicum spectante. Arbores vel frutices. Flor. hermaphroditi vel abortu dioici.

1. LAURUS (L. gen. n. 503.) Flores dioici. Perigon. 4 partitum. Mas. Flos. terminalis dodecandrus ovario nullo; stamina biserialia, 6 exteriora simplicia, 6 interiora in medio glandulis 2 biappendiculata. Flores laterales 9-10 andri. Fem. Stam. 4, sterilia; ovarium perfectum. Bacca. N. ab E. gen. 7. 4.

1. **L. nobilis** (L. sp. 529.) foliis oblongo-lanceolatis basi apiceque acuminatis subundulatis venosis, floribus axillaribus, fasciculatis. ♄. Europae australis indigena, nunc in Helvetia transalpina et in Littorali austriaco spontanea facta, (in Tyrol bloss cultivirt, Facchini.) April. Mai. D. fl. 3. p. 73. Schk. t. 110. Flores albi.

Ord. C. SANTALACEAE. Rob. Brown. prodr. p. 350.

Perigonium superum, 3, 4-5 *fidum,* intus coloratum, aestivatione valvatum. *Stam.* 4-5, *basi laciniarum perigonii inserta, iisque opposita. Ovarium* 1 *loculare,* 2-4 ovulatum, ovula iuxta apicem placentae centralis affixa, pendula. Styl. 1. Fructus nucamentaceus vel drupaceus, 1 spermus. Albumen carnosum. Embryo axilis, radicula hilum spectante. Folia alterna vel sparsa, exstipulata.

1. THESIUM (L. gen. n. 292.) Perig. 4-5 fidum, hypocrateriforme vel infundibuliforme. Ante stamina pilorum fasciculus. Styl. 1, stigm. simplex. Drupa 1 sperma, sicca vel succosa, perigonio persistente coronata. Flores virides, intus albi. N. ab E. gen. 7. 1.

Sect. I. Tribracteata. Caulis superne racemosus paniculatusve, racemo paniculave in apicem usque floribus obsiti. Bracteae tres sub quovis flore. Drupa sicca.

a. Perigonium defloratum ad basin usque involutum, nodum brevem in fructu formans, qui vix tertiam drupae partem attingit.

1. **T. montanum** (Ehrh. herb. exsicc. n. 2.) *radice descendente ramosa* denique multicauli, caulibus erectis superne paniculatis, panicula pyramidali, ramulis patentibus, *foliis lanceolatis* vel lineari-lanceolatis *longe acuminatis* 3-5 *nerviis,* bracteis ternis, drupis subrotundo-ovatis pedicellatis, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. ♃. In montosis asperis, sylvaticis,

(stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 282. Hayn. in Schrad. Journ. 1800. t. 6. Filamenta antheris defloratis duplo longiora.

2. **T. intermedium** (Schrader. spicileg. fl. germ. p. 27.) *radice stolonifera*, caulibus erectis adscendentibusve superne paniculatis, panicula pyramidali, ramulis patentibus, *foliis lineari-lanceolatis* linearibusve *acutis trinerviis*, bracteis ternis, drupis ovalibus oblongisve pedicellatis, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. 4. In pratis montanis et inter virgulta, (an vielen Orten häufig, an andern gänzlich fehlend.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 283. T. linophyllum Pollich. pal. 1. p. 238. et mult. auct. T. linophyllum L. sp. pl. est species non extricanda. Filamenta antheris defloratis duplo longiora. Variat:

β. fulvipes, stipes fructus fructum aequans, cum inferiore drupae parte coloratus et in viva planta succosus: T. fulvipes Griesselich. Regensb. bot. Ztg. 22. p. 17. Specimina Thesii intermedii nuper accepta me docuerunt T. fulvipes ab illo separari non posse; tamen memorabilis varietas est, quae transitum a drupa exsucca plurimarum specierum generis ad succosam T. rostrati exhibet.

3. **T. divaricatum** (Jan. ap. M. et K. D. fl. 2. p. 285.) *radice descendente ramosa denique multicipite*, caulibus erectis vel adscendentibus superne paniculatis, panicula pyramidali, ramulis patentibus, foliis linearibus acutis uninerviis vel obsolete trinerviis, bracteis ternis margine scabriusculis fructu brevioribus, *drupis cylindrico-oblongis pedicellatis*, *pedicello dimidia drupa longiore*, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. 4. In locis montosis incultis, (Triest u. Fiume.) Jul. Aug. D. fl. l. c., ubi fructus ad specimen incompletum male descriptus est. Planta non adeo divaricata ac sequens. G.

4. **T. humifusum** (DeCand. fl. fr. 5. p. 366.) radice descendente ramosa denique multicauli, caulibus prostratis vel adscendentibus racemosis vel ramosis ramis racemosis, *ramulis floriferis* longitudine floris longioribus *denique subhorizontaliter patentibus*, *angulis ramulorum margineque bractearum foliorumque superiorum denticulato-scabris*, foliis linearibus obsolete uninerviis, *bracteis* ternis *fructum aequantibus* vel intermedia ramulorum inferiorum longiore, fructibus ovatis subsessilibus, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. 4. In collibus et ad agrorum margines Austriae inferioris, (bei Wagram unweit Wien, Dolliner.) Jun. Jul. G.

5. **T. ramosum** (Hayne in Schrad. Journ. 1800. 1. p. 30. t. 7.) radice fusiformi, denique multicauli, caulibus erectis adscendentibusve ramosis, *ramis racemosis ramulisque erecto-patulis margineque foliorum superiorum bractearumque denticulato scabris*, ramulis florigeris fructu triplo quadruplove longioribus, foliis lanceolato-linearibus linearibusve subtrinerviis, *bracteis* ternis, intermedia *florum omnium fructu longiore*, fructibus ovatis subsessilibus, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. 4. In pratis siccis et pascuis montanis, (bisher bloss bei Wien u. bei Maria Zell in Steyerm.; das T. ramosum der fl. cech. ist T. intermedium.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 283. Hayn. l. c., excluso synon. Pollichii ad intermedium pertinente. T. palatinum Roth. per errorem; in Palatinatu enim non crescit. G.

6. **T. humile** (Vahl. symb. 3. 43.) radice fusiformi uni-pluricauli, caulibus erectis adscendentibusve ramosis ramis racemosis, ramulisque margineque foliorum superiorum bractearumque denticulato-scabris, *ramulis florigeris brevissimis fructu brevioribus* erectis, *fructibus* ovatis subsessilibus *caule adplicitis*, foliis linearibus uninerviis, bracteis ternis, intermedia fructu longiore, perigonio fructus involuto drupa triplo breviore. 4 vel ☉? In agris incultis Austriae inferioris, zw. Wiener-Neustadt u. Katzelsdorf, Welwitsch.) Jun. Jul. G.

b. Perigonium defloratum tubulosum, apice tantum involutum, longitudine drupae vel longius.

7. **T. pratense** (Ehrh. herb. exs. n. 12.) radice fusiformi, caulibus racemosis paniculatisve, *ramulis* fructiferis *horizontaliter patentibus*, foliis lanceo-

lato-linearibus obsolete trinerviis, bracteis ternis, *drupis* subglobosis, *perigonio fructus tubuloso* apice involuto *drupam aequante*. ♃. In pratis montanis et alpinis, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 284. Reichenb. ic. 5. f. 647. Laciniae perigonii sub anthesi horizontaliter patentes, Dr. Pfeiffer.

8. **T. tenuifolium** (Sauter. in litt.) radice fusiformi, caulibus dense caespitosis fastigiatis erectis a medio ramosis, ramis cauli approximatis erectis, inferioribus sterilibus, *ramulis* fructiferis *adscendentibus aequaliter racemosis*, foliis anguste linearibus elongatis uninerviis, bracteis ternis, *drupis subglobosis, perigonio fructus tubuloso* apice involuto *drupam aequante vel longiore*. ♃. In locis lapidosis graminosis, (am Ufer der Steyer bei Steyer in Oberöstreich.) Jun. Jul. Sauter. G.

9. **T. alpinum** (L. sp. 301.) radice fusiformi, caulibus subdiffusis simplicibus vel ramo uno alterove instructis ramisque racemosis, *ramulis* fructiferis *erecto-patentibus secundis*, foliis linearibus uninerviis, bracteis ternis, *drupis subglobosis, perigonio fructus tubuloso* apice involuto *drupam aequante vel longiore*. ♃. In ericetis et pascuis planitierum, montium et alpium. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 286. St. h. 11.

Sect. II. **Unibracteata.** Caulis fructifer apice bracteis sterilibus comosus. Bractea sub quovis flore unica. Drupa sicca vel succosa.

10. **T. ebracteatum** (Hayn. in Schrad. Journ. 1800. 1. p. 33. t. 6.) *radice repente*, racemo simplici, fructifero bracteis sterilibus apice comoso, *floribus unibracteatis*, drupis ovalibus pedicellatis coriaceis perigonio fructus tubuloso apice involuto triplo brevioribus. ♃. In collibus graminosis et in sylvis denudatis, (Mecklenb., Brandenb., Schles., Preussen.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 288. Reichenb. ic. 5. f. 649. G.

11. **T. rostratum** (Mertens. et Koch. D. fl. p. 287.) *radice praemorsa multicipite*, racemo simplici, fructifero bracteis sterilibus apice comoso, *floribus unibracteatis*, drupis subglobosis sessilibus baccatis succosis perigonio fructus tubuloso apice involuto duplo brevioribus. ♃. In pratis siccis sterilibus et in glarea torrentium in alpinis et subalpinis et cum fluviis in planities alpes comitantes descendens, (Schweiz; Bayern im Isarbette bei München, häufig mit d. Flusse aus d. Alpen herabgekommen; Tyrol, Salzb.) Jun. Jul. D. fl. 2. 287. Reichenb. ic. 5. f. 650. Drupis mollibus, succosis et pulchre citrinis ab omnibus valde diversum.

2. ÖSYRIS (L. gen. 1101.) Flores polygami. Perigon. 3 fidum. Mas. Stam. 3. Hermaphr. Stam. 3, quandoque abortiva; stigm. 3. Bacca sicca. N. ab E. gen. 3. 20.

1. **O. alba** (L. sp. 1450.) ♄. In rupestribus sterilibus Littoralis austriaci, (Triest, Fiume.) April. Mai. Schk. t. 319. Flores sordide lutei. G.

Ord. CI. ELAEAGNEAE. R. Brown. prodr. p. 350.

Perigon. inferum, intus coloratum, 2-4 fidum, laciniis per aestivationem imbricatis. *Stamina fauci perigonii inserta*, eiusdem laciniis numero aequalia et alterna, vel dupla. *Antherae* biloculares, *rimis* 2 *longitudinalibus dehiscentes*. *Ovarium* tubo perigonii inclusum, liberum, 1 *ovulatum, ovulo erecto*. Styl. 1. Stigm. 1. Drupa spuria, constans e perigonio persistente baccato et nuce crustacea. Albumen carnosum, tenue; embryo rectus, radicula infera. Arbores et frutices foliis exstipulatis argenteo- vel brunneo-lepidotis. Flores saepe unisexuales.

1. ELAEAGNUS (L. gen. n. 159.) Flores hermaphroditi; tubus gracilis; limbus campanulatus, 4-5 fidus; faux annulo conico coarctata. Stam. 4-5. Drupa spuria e calyce baccato et intus osseo, nucem includente, formata. N. ab E. gen. 3. 18.

1. **E. angustifolia** (L. sp. 176.) foliis lanceolatis acutis integerrimis utrinque argenteo-lepidotis, floribus axillaribus pedunculatis erectis solitariis ternisve. ♄. In collibus sterilibus reg. calid., (häufig a. d. Insel Osero, Host.) Mai. Jun. D. fl. 1. p. 823. St. h. 5. Flores extus argenteo-lepidoti, ut folia, intus dilute aurantiaci. J.

2. HIPPÓPHAË (L. gen. n. 1452.) Flores dioici. Masc. Perigon. bipartitum; stam. 4. Fem. Perigon. tubulosum, apice bifidum, annulo ad faucem nullo. Bacca spuria e calyce aucto et succulento, nucem includente, confecta. N. ab E. gen. 3. 19.

1. **H. rhamnoides** (L. sp. 1452.) ♄. Ad fluviorum ripas et littora maris, (a. d. Giessbächen u. Flüssen d. g. Alpenk. u. mit d. Flüssen in die Ebenen von Oberbaden, Elsass, Schwaben, Bayern u. Oestr. hinabsteigend; stw. an. d. Küste v. Holstein u. v. da bis Preuss.) April. Mai. Schk. t. 321. Flores ferruginei.

Ord. CII. CYTINEAE. A. Brogn. in annal. de scienc. nat. 1. 29.

Rhizantheae Blum. in batav. Ztg.

Flores unisexuales. *Perigonium superum*, 4-5 *partitum*, aestivatione imbricatum. *Stam.* 8, 16 vel plura, *columnae centrali adnata*. *Ovarium* 1 *loculare, placentis parietalibus*, multi-ovulatum. Albumen carnosum. Embryo axilis, rectus.

1. CÝTINUS (L. gen. 1232.) Flores monoici. Perigon. tubuloso-campanulatum, limbo 4 fido. Masc., bracteae 2 ad basin perigonii. Antherae 8, circum apicem columnae centralis sessiles. Fem. Ovarium inferum medio bibracteatum, 1 loculare, placentis 8 parietalibus.

1. **C. Hypocistis** (L. sp. 566.) ♃. Parasiticus in radicibus Cistorum, (a. d. Inseln d. Adriat. Meeres, Osero u. Veglia, Lossino.) Mai. Lam. illustr. t. 737. „Colore sanguineo, antequam flores aperuit, e longinquo cognoscitur“ Link. in Schrad. Journ. 1800. p. 48. Flores aperti luteo-rubentes, ut planta ipsa. J.

Ord. CIII. ARISTOLOCHIEAE. Juss. gen. 74., excl. Cytino.

Flor. hermaphroditi. *Perigonium superum, indivisum et oblique truncatum; vel trifidum*, laciniis aestivatione valvatis. Stam. definita, libera et apici ovarii inserta, vel cum stylo et stigmate connata. *Ovarium* 3-6 *loculare, placentis centralibus multiovulatis*. Embryo minimus, ad basin albuminis cartilaginei. Folia alterna.

1. ARISTOLÓCHIA (L. gen. n. 1022.) Perigonium tubulosum, tubo basi ventricoso, apice oblique in ligulam dilatatum. Antherae 6, sub stigmate adnatae. Caps. 6 locularis. N. ab E. gen. 8. 16.

1. **A. rotunda** (L. sp. 1364.) radice subglobosa, caulibus simplicibus erectis, foliis glabris ovatis profunde cordatis brevissime petiolatis, petiolis pedunculo multo brevioribus, *floribus solitariis, labio perigonii ovali* apice rotundato emarginato *tubum aequante*. ♃. In pratis siccis et locis incultis inter frutices, (Litt., Triest, Fiume; bei Lugano, Cant. Tessin.) April. Mai. Perigonium luteum, intus striis atro-purpureis pictum, labio luteo-fusco.

2. **A. pallida** (Willd. sp. 4. p. 162.) radice subglobosa, caulibus simplicibus erectis, foliis glabris subtriangulari-ovatis profunde cordatis petiolatis, petiolis pedunculum aequantibus vel superantibus, *floribus solitariis, labio perigonii tubo dimidio breviore ovato-lanceolato acuminato apice ipso*

obtuso. 4. In montosis inter virgulta, (Cilli in Untersteyerm., Innerkrain u. bis Triest u. Fiume; Valle Bergami im C. Tessin.) Mart. April. A. lutea Desf. annal. mus. 10. p. 295. Perigonium viridi-flavescens, intus striis longitudinalibus et macula ad basin labii atro-purpureis pictum. A. lutea Desf. e Valle Bergam. flores minores, ligula longiori instructos habet, praeterea autem non diversa est. — A. longa L., in dict. fl. nostrae nondum reperta A. pallidae simillima est, sed radicem habet fusiformem, denique cylindricam, pedem longam, caules ramosos, pubescentes, flores viridi-albos, concolores, et labium corollae fere longitudine tubi.

3. **A. Clematitis** (L. sp. 1363.) radice repente, caulibus simplicibus erectis, foliis ovatis profunde cordatis petiolatis glabris, *floribus* axillaribus *fasciculatis.* 4. In vineis, ad sepes, agrorum margines, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 6. Flores ochroleuci vel pallide flavi.

2. ÁSARUM (L. gen. n. 589.) Perigon. campanulatum, 3-4 fidum. Stam. 12, ovario imposita, antherae in medio filamentorum adnatae. Stigma radiatum, sexlobatum. Caps. 6 locularis, dissepimenta cum angulis centralibus non cohaerentia. N. ab E. gen. 8. 17.

1. **A. europaeum** (L. sp. 633.) foliis reniformibus obtusis. 4. In sylvis montanis, sepibus umbrosis. Mart. April. D. fl. 3. p. 368. St. h. 2. Flores extus viridi-fusci, intus obscure sanguinei.

Ord. CIV. EMPETREAE. Nutt. gen. 2. 233.

Flores unisexuales. Cal. 3 partitus, aestivatione imbricatus. *Pet.* 3, *sepalis alterna. Stam.* 3, *libera,* sepalis opposita, cum petalis receptaculo inserta. Antherae 2 loculares, rimis 2 dehiscentes. *Ovar. liberum, disco carnoso impositum,* 3-6 loculare; *loculis* 1 *ovulatis,* ovulo adscendente. Styl. 1. Stigma radiatum: radiis numero loculorum ovarii. Fructus drupaceus. Embryo in axi albuminis, rectus, radicula hilum spectante. Frutices foliis parvis, sempervirentibus.

1. ÉMPETRUM (L. gen. n. 1100.) Flores dioici. Cal. 3 partitus. Cor. 3 petala. Mas. Stam. 3. Fem. Styl. subnullus, stigma radiis 6-9. Drupa 1 locularis, 6-9 sperma. N. ab E. gen. 3. 17.

1. **E. nigrum** (L. sp. 1450.) procumbens, foliis oblongis linearibusve margine revolutis, marginibus in linea alba coniunctis, stigmate 9 radiato. ♄. In petrosis alpium altissimarum atque in uliginosis reg. subalpinarum montiumque altiorum; nec non in turfosis Germ. borealis, (dch. d. g. Alpenk.; Vogesen, Kniebis, Rhön, Brocken, Sudeten; von Westph. dch. Niedersachsen bis Preuss.) April. Mai. in alp. serius. Schk. t. 318. Cor. rosea, stam. purpurea.

Ord. CV. EUPHORBIACEAE. Juss. gen. 384.

Flores unisexuales. Perigonium inferum, definite divisum, vel o. Pet. perigonii laciniis alterna, vel nulla. Mas. *Stam. centro floris inserta, vel sub rudimento pistilli.* Filamenta libera vel varie connata. Fem. Ovarium liberum, sessile aut stipitatum, 3 loculare, (rarius 2 vel pluriloculare,) *loculis circa placentam centralem in orbem dispositis,* 1-2 *ovulatis; ovulis pendulis, solitariis geminisve. Stigmata divisa.* Capsula 2-3 cocca, coccis saepe elastice dehiscentibus. Albumen carnosum. Embryo rectus, axilis, radicula ad hilum versa; cotyledones foliaceae. Plantae saepe lactescentes.

1. BUXUS (L. gen. n. 1053.) Flores monoici. Masc. Cal. 3. partitus.

Pet. 2. Stam. 4. Ovarii rudimentum. Fem. Cal. 4 partitus. Pet. 3. Caps. 3 rostris, 3 locularis, loculis 2 spermis. N. ab E. gen. 3. 16.

1. **B. sempervirens** (L. sp. 1394.) foliis ovatis, petiolis margine pilosiusculis, antheris ovato-sagittatis. ♄. In montosis asperis sterilibus, (Steyer in Oberöstreich; Littorale; in Krain gegen die Meeresküste hin; in d. westl. Schweiz an vielen Orten; im Oberelsass bei Belfort auf Kalkhügeln häufig, ebenso bei Grenzach im Oberbadischen u. an d. Mosel v. Alken bis Bertrich.) Mart. Apr. Schk. t. 287. Flores flavescenti-virides.

Duae occurrunt varietates vel potius species, sed fructus varietatis β., qui fortasse differentiam praebeant, nondum vidi.

α. *arborescens*, ad 5-10 pedes altiusque adscendens folia intensius viridia, juniora saepe glaucescentia levi afflata et subopaca. Tota planta odorem gravem spargens praecipue tempestate calida. Haec in locis supra designatis. Buxus arborescens Lam. dict. 1. p. 511.

β. *humilis*, 2-3 pedalis, folia laetius viridia, nulla eorum glaucescentia. Planta inodora. Haec in Tyroli australi, (vom Gardasee zerstreut bis in die Region der Pinus Mughus, Facchini.) Buxus suffruticosa Lam. dict. 1. p. 511.

2. ANDRACHNE (L. gen. n. 973.) Flores monoici. Masc. Cal. 5 partitus. Cor. 5 petala. Stam. 5, basi rudimento styli adnata, superne libera. Fem. Cal. 5 partitus. Cor. o. Styl. 3. Caps. 3 cocca, coccis dispermis.

1. **A. telephioides** (L. sp. 1439.) caulibus herbaceis procumbentibus, foliis petiolatis ovatis breviter acuminatis glabris. ☉. In locis apricis incultis, (Insel Brioni, v. Dr. Sendtner gesammelt, Tommas.) Mai. Jun. J.

3. EUPHÓRBIA (L. gen. n. 609.) Involucrum florum proprium campanulatum, 9-10 dentatum; dentes 5 membranacei vel herbacei, erecti vel incurvati; 5, (vel 4,) cum his alternantes, extrorsum versi, supra disco carnoso nectarifluo toti vel pro parte tecti, glandulae nuncupati. Flores masculi 10-20-plures, ad basin involucri proprii inserti, squamis ciliatis vel fissis fulti, nudi, monandri, constantes e stamine solitario, pedicello imposito, florescentia peracta de pedicello deciduo. Flos femineus solitarius, in centro involucri proprii pedicellatus, persistens. Cal. minimus sublobatus vel obsoletus. Pet. nulla. Ovar. 1. Styl. 3 fidus, vel 3 partitus, cruribus bifidis vel emarginatis. Caps. 3 cocca, coccis 1 spermis, dorso dehiscentibus et, valvulis subito contortis, semina elastice eiaculantibus. N. ab E. gen. n. 11.

Sect. I. Anisophyllum Roep. ap. Dub. bot. gall. p. 412. Folia stipulata.

1. **E. Chamaesyce** (L. sp. 652.) floribus axillaribus solitariis, glandulis integris, capsulae valvulis carinatis laevibus, *seminibus transverse rugosis, foliis stipulatis oppositis* petiolatis subrotundis basi obliquis antice leviter crenatis, crenis muticis, caulibus prostratis ramosis foliisque glabris vel hirsutis. ☉. In aridis vinearum, arvorum, hortorumque areis Littoralis, Wulf. Jun.-Aug. Glandulae saturate rubrae. Variat glabra, caule villoso et caule foliisque canescenti-villosis; haec ultima est: E. canescens L. sp. 652. An h. l. quoque sit planta a b. Wulf. in Röm. arch. 3. p. 364. descripta, diiudicare nequeo, quum specimen in loco memorato lectum nondum viderim. Quam vero cl. Salzmann. sub nomine E. massiliensis DC. mecum communicavit, ea varietati pilosae E. Chamaesyces omnino simillima est, sed certo differt caulibus crassioribus, foliis maioribus et, basi excepta, in toto ambitu crenato-serrulatis, serraturis mucronulatis. G.

2. **E. Peplis** (L. sp. 652.) floribus axillaribus solitariis, glandulis integris, capsulae valvulis carinatis *seminibusque laevibus, foliis stipulatis oppositis* petiolatis oblongis obtusis emarginatis integerrimis vel postice crenulatis basi semicordatis, caulibus prostratis ramosis foliisque glabris. ☉. In littore maris adriatici, (bei Triest gegen Servola zu, Wulf.) Jul. Aug. Glandulae supra saturate rubrae. G.

Sect. II. Tithymalus. Folia exstipulata. Glandulae, (dentes involucri proprii interiores, disco carnoso tecti,) subrotundae vel transverse ovales, non vero lunatae, neque bicornes.

a. Semina evidenter exsculpta.

3. **E. helioscopia** (L. sp. 658.) umbella 5 fida, ramis trichotomis, ramulis dichotomis, *glandulis integris*, capsula laevi, *seminibus favoso-reticulatis*, foliis obovatis antice serratis. ☉. In locis cultis ubique. Jul.-Sept. Schk. t. 129. Glandulae luteae.

b. Semina laevia. Capsula verrucis obsita, haemisphaericis, breviter cylindricis vel in filum elongatis.

4. **E. platyphylla** (L. sp. 660.) umbellae 3-5 fidae ramis trichotomis, ramulis dichotomis, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* sparsis obtusis *subhemisphaericis*, seminibus laevibus, *foliis* acutis a medio inaequaliter serrulatis obverse lanceolatis *basi cordata sessilibus*, infimis obovatis obtusissimis in petiolum attenuatis, *involucellis subtriangulari-ovatis* mucronatis serrulatis, seminibus subrotundis. ☉. In locis cultis, ad vias, fossas. Jul.-Sept. Jacq. a. t. 376. E. platyphyllos K. syn. ed. 1. p. 627. Glandulae flavae. Variat:

β. literata, foliis subtus et margine dense villosis, primariis litura purpurea vel fusca notatis: E. literata Jacq. collect. 2. p. 340. ic. rar. 3. t. 482. Haec, in locis cultis et ad littora maris, (Steyer in Oberöstr., Brittinger; Triest, Tommas.; Monfalcone, C. B. Lehmann.) Simillima est E. pubescenti Vahl., E. pilosae Bert. fl. ital. v. 5. p. 89., sed in hac capsulae magis verrucosae, folia, etiam supra, villosa et semina punctulis elevatis sparsis exasperata sunt.

5. **E. stricta** (Linn. syst. nat. ed. 10. v. 2. 1049.) umbellae 3-5 fidae ramis trichotomis, ramulis dichotomis, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* sparsis *breviter cylindricis*, *foliis* acutis a medio inaequaliter serrulatis obverse lanceolatis *basi cordata sessilibus*, infimis obovatis obtusissimis in petiolum attenuatis, *involucellis subtriangulari-ovatis* mucronatis serrulatis, seminibus ovalibus laevibus. ☉. In locis sylvaticis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Jun.-Sept. Engl. bot. t. 333. E. dubia Dierb. fl. Heidelberg. 2. p. 127. E. foetida Hoppe in litt. Fructibus dimidio minoribus et verrucis, non elongatis quidem, sed tamen cylindricis, ab antecedente differt. — E. micrantha M. Bieb. taur. cauc. 1. p. 377., E. strictae simillima est, tamen, me iudicante, diversa: caule graciliore, adscendente, non stricto, foliis intense viridibus fere elliptico-lanceolatis, evidentius petiolatis et basin versus multo magis attenuatis, umbella, etiam speciminum in terra pingui cultorum, solummodo trifida, et verrucis fructus elongatis filiformibus.

6. **E. dulcis** (Jacquin. fl. austr. v. 3. p. 8. t. 213.) umbellae 5 fidae ramis semel bifidis, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* sparsis *inaequalibus obtusis*, *foliis* lanceolato-oblongis obtusis *basin versus attenuatis* integerrimis vel antice serrulatis *brevissime petiolatis*, *involucris lanceolatis*, *involucellis basi truncatis* triangulari-ovatis serrulatis, rhizomate horizontali, *caule tereti* (exsiccato) subtiliter striato. ♃. In nemoribus et pratis sylvaticis, in montosis et subalpinis, (Schweiz u. vom Oberelsass längs d. g. Alpenk. hin bis Oestr., sodann durch Böhm., Mähr., Schles. nach Thüring. u. d. Harze u. Hessen; in d. Gebirgen d. Mosel u. des Unterrheines.) April Mai. E. dulcis L. sp. 656., secundum diagnosin et auctores prolatos. Tithymalus dulcis Scop. carn. 1. p. 335. E. solisequa Reichenb. fl. exc. p. 756. Glandulae atro-purpureae. Capsulae verrucosae et pilosae. Variat:

β. purpurata, capsulae verrucosae quidem, sed pilis destitutae: E. purpurata Thuill. fl. par. 235. Reichenb. ic. 2. f. 267.

De stirpibus, quas sub sua Euphorbia dulci, E. epithymoide et E. verrucosa intellexerit Linnaeus, magna est apud auctores opinionum diversitas. B. Smith in E. verrucosa Lam., ut videtur ex specimine herbarii Linnaeani, veram Euphorbiam dulcem agnovit, sed huic opinioni contradicunt verba Linnaei „umbella 5 fida, 2 fida et folia integerrima“ nam folia E. verrucosae Lam. evidentius serrulata sunt, quam E. dulcis Jacq. et E. epithy-

moidis Jacq.; auctores quoque, a Linnaeo sub sua E. dulci citati, Euphorbiam dulcem Jacq., neque E. verrucosam Lam. descripserunt. Cl. Bertolonius sub sua E. dulci cum E. verrucosa Lam. comprehendit quoque E. epithymoidem Jacq., quae multo propius ad E. fragiferam Jan., quam ad E. verrucosam Lam., accedit. Linnaeus suam E. epithymoidem a Jacquino habuit, sed citatum ex Columnae ecphrasi ad E. fragiferam pertinet. Mutatio et translatio nominum ab una ad alteram speciem rem hucusque clariorem non reddiderunt, qua de causa nomina praetuli, quae nullo dubio subjecta sunt.

7. **E. angulata** (Jacq. collect. 2. p. 309. ic. rar. t. 481.) umbellae 5 fidae ramis erectis semel bifidis, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* sparsis obtusis *subhemisphaericis*, seminibus laevibus, *foliis* oblongo-ovalibus oblongisve *subsessilibus* antice serrulatis, *involucris ovatis* sessilibus, *involucellis basi truncatis* subtriangulari-ovatis aeque latis ac longis serrulatis, rhizomate horizontali, *caule argute angulato-striato*. 4. In montanis sylvaticis, (Oestr., Mähr. u. Steyerm.) Mai. Jun. „Glandulae flavae, dein luteae, tandem emarcidae ferrugineae" Jacq. G.

8. **E. carniolica** (Jacq. austr. app. p. 34. t. 14.) umbellae 5 fidae *ramis mutantibus semel bifidis*, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* sparsis obtusis *subsemisphaericis*, seminibus laevibus, foliis lanceolato-oblongis obtusis integerrimis basin versus attenuatis breviter petiolatis, *involucellis ellipticis basi rotundatis* integerrimis involucrisque breviter petiolatis, rhizomate horizontali. 4. In collibus apricis, (im wärmern Krain u. Steyerm.) April. Mai. Tithymalus pilosus Scop. carn. 1. p. 336. t. 21. Glandulae luteae. G.

9. **E. verrucosa** (Lam. dict. 2. 434.) umbellae 5 fidae *ramis erectis trifidis bifidis*, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis brevibus cylindricis*, seminibus laevibus, foliis oblongo-ovatis subsessilibus serrulatis, involucris ovatis, *involucellis* ellipticis obtusis *basi attenuatis* rotundatisve breviter petiolatis involucroque serrulatis, radice multicipite. 4. In locis incultis inter virgulta, ad vias, (vom Oberelsass u. der Schweiz dch. d. g. südl. D. u. nördlich bis Würzburg; vereinzelt bei Trier.) Mai. Jun. E. verrucosa DC. fl. fr. 3. p. 343. Gaud. fl. helv. v. 3. p. 284. E. dulcis Sm. fl. graec. 464. Reichenb. fl. exc. p. 757. Bertolon. fl. ital. v. 5. p. 60., excl. syn. Jacquini. Tithymalus verrucosus Scop. carn. 1. p. 336. Tota umbella sub anthesi pulchre flava est. Variat humilior, caulibus purpureis: E. flavicoma DC. cat. h. monsp. p. 110., secund. Roeper. en. euphorb. p. 61. — E. verrucosa Linnaei dubia est, sed Lamarckii, egregia descriptione illustrata, certissima.

10. **E. epithymoides** (Jacq. fl. austr. v. 4. p. 23. t. 344.) umbellae 5 fidae ramis erectis trifidis bifidis, *involucri proprii laciniis involucrum ipsum aequantibus*, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* elongatis *filamentiformibus*, seminibus laevibus, foliis oblongis sessilibus, involucellis ellipticis obtusis emarginatis basi attenuatis rotundatisve breviter petiolatis involucroque integerrimis, radice multicipite. 4. In collibus asperis sylvaticis, (Krain, Steyerm., Unteröstr., Mähren, (bei Aigenbach unweit Landshut, Dr. Einsele.) Mai. Jun. L. sp. 656., si Jacquinus veram plantam fl. austriacae ad Linnaeum miserit. Laciniis perigonii interioribus longitudine involucri ipsius facillime distinguitur ab Euphorbia fragifera Jan. et E. verrucosa Lam. Glandulae flavae; murices capsulae rubellae. G.

11. **E. fragifera** (Jan. plant. ital. exsicc. et ap. Link. in hort. berol. 2. p. 16.) umbellae 5 fidae ramis bifidis, *involucri proprii laciniis perigonio quadruplo brevioribus*, glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* elongatis *filamentiformibus*, seminibus laevibus, foliis oblongis lanceolatisve sessilibus, involucellis subrotundo-ovatis basi rotundatis integerrimis serrulatisve, radice multicipite. 4. In montosis asperis, (Steyerm., Krain u. östr. Litt.) April. Mai. E. spinosa Wulf. in Röm. arch. 3. p. 367. E. epithymoides L. sp. 656., secund. citata allegata. Hopp. et Hornsch. Reis. Tithymalus

Pithyusa Scop. carn. 2. p. 335. E. fragif. Reichenb. ic. 7. f. 870. Glandulae fusco-rubrae, sicut Scopolius eas describit. Variat fol. obtusis et acutis, caule glabro et villoso. G.

12. **E. palustris** (L. sp. 662.) *umbellae multifidae ramis trifidis bifidis,* glandulis integris, capsula verrucosa, *verrucis* oblongis *breviter cylindricis,* seminibus laevibus, foliis sessilibus lanceolatis integerrimis subdenticulatisve glabris, *involucellis* ellipticis obtusis *basi attenuatis* sessilibus. 4. In pratis humidis, ad ripas, (stw. dch. d. g. Geb.) Mai. Jun. Fl. dan. t. 886. Glandulae fulvae.

c. Semina laevia. Capsula laevis vel verruculis punctisve elevatis minutis adspersa, nec proprie verrucosa.

13. **E. procera** (MBieb. taur. cauc. 1. 378.) umbellae 5-6 fidae radiis trifidis bifidis, *glandulis integris, capsula laevi vel tuberculis minutis adspersa longe pilosa vel glabra, seminibus laevibus, foliis* sessilibus oblongo-lanceolatis *serrulatis* postice integerrimis *supra et subtus villosis* quandoque glabrescentibus, involucellis ovalibus obtusis postice rotundatis vel subattenuatis. 4. In locis sylvaticis humidiusculis inter virgulta, ad rivos, (in Oberbaden, Kärnth., Krain, Steyerm., Oestr., Mähren u. Schlesien.) Jun. Jul. Glandulae luteae. Occurrit:

α. capsulis laevibus glabris: E. procera Reichenb. ic. 2. f. 270. E. villosa WK. pl. rar. hung. 1. p. 96. t. 93., capsulae ut laeves describuntur, in diagnosi autem, e speciebus plantarum Willdenowii transscripta, verrucosae audiunt.

β. trichocarpa, capsulis laevibus, plus minusve, quandoque dense pilosis, pilis elongatis: E. mollis Gmel. bad. 2. p. 331. E. coralloides L. sp. 659., secund. cl. Roeper. in enum. euphorb. p. 60.; descriptio Linnaeana bene quadrat, sed praeter pilos capsulae nullam notam detegere possum, qua ab E. procera distinguatur.

Varietates *γ.* et *δ.* syn. ed. 1. p. 630,, quae E. pilosam MB. taur. cauc. 3. p. 328. et Linnaei secund. citatum ex Gmel. fl. sibirica comprehendunt, omisi, cum hucusque specimen in ditione fl. nostrae lectum nondum viderim. G.

14. **E. Gerardiana** (Jacq. fl. austr. 5. p. 17. t. 36.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis integris, capsula laevi* vel subtilissime punctulato-scabra, seminibus laevibus, *foliis* glaucis lanceolato-linearibus linearibusve acuminato-mucronatis *integerrimis glaberrimis,* involucellis triangulari-ovatis transverse latioribus aristato-mucronatis basi truncatis cordatisve, radice multicipite descendente. 4. In campis arenosis, ad vias, ripas, (südl. Schweiz, südl. Tyrol; Oestreich; Rheinfläche von Basel bis Westphal.; Mainthal v. Würzb. bis Frankf.; Thüring.) Jun. Jul. E. Caiogala Ehrh. Beitr. 2. 102. E. linariaefolia Lam. dict. 2. 102. E. Esula Pollich. pal. 2. p. 18. Glandulae luteae.

15. **E. pannonica** (Host. fl. a. 2. p. 566.) umbellae multifidae radiis semel bifidis *glandulis truncatis, capsula immatura dense pilosa, pilis crassiusculis* subtiliter *articulatis,* seminibus laevibus, foliis glaucis lanceolatis acutis breviter mucronulatis antice subtiliter crenulatis, superioribus latioribus, involucellis lato-ovatis obtusis mucronatis, radice multicipite. 4. In pratis, campis, ad agrorum margines, (häufig in d. Gegend v. Wien bei Lanzendorf u. Himberg, nach Host.) Jun. Glandulae luteae. „Germen pilis tectum" Host. l. c. Cl. Fenzl. misit specimina sicca; viva possedi, ex horto vindob. sub nomine E. glareosae accepta. Cum capsulis fere explicatis exsiccavi quidem, sed maturas examinare oblitus sum; anno subsequente planta periit. E. pulverulenta Kit., a D. Lang. accepta, eadem quidem planta est, varietas autem foliis angustioribus et involucellis lanceolatis. G.

Sect. III. Esula Roep. ap. Dub. bot. gall. p. 114. Glandulae lunatae vel bicornes.

a. Semina laevia. Involucella connata.

16. **E. amygdaloides** (L. sp. 663.) umbellae multifidae ramis iterato-bifidis, glandulis lunato-bicornibus, *capsulis glabris* subtiliter punctulato-scabris, seminibus laevibus, foliis pubescentibus, annotinis obovato-oblongis lanceolatisve in petiolum attenuatis, hornotinis caulium iuniorum oblongis, involucris ovatis, *involucellis in patellulam planam connatis.* ♃. In sylvis frondosis umbrosis, montium et reg. subalpinar., (Tyrol, Schweiz, Elsass u. v. da dch. Würtemberg bis Oestr., im Rhein- u. Maingebiete; Harz, Thüring., Schles., Mähr., bei Danzig.) April. Mai. E. sylvatica Jacq. a. t. 375. Glandulae luteolae vel purpureae. Involucr. propr. glabrum, in sequente villosum. — E. sylvaticam, ab E. amygdaloide diversam, mihi vero ignotam, habet Tenor. in syllog. fl. neap. p. 237.

17. **E. Wulfenii** (Hopp. bot. Ztg. 12. 1. p. 159.) umbellae multifidae ramis iterato-bifidis, glandulis lunato-excisis bicornibus, *capsulis dense villosis*, seminibus laevibus, foliis sessilibus lanceolato-linearibus integerrimis supra subtusque velutino-tomentosis, involucris obovatis oblongisve, *involucellis turbinato-connatis.* ♃. In locis saxosis asperis Littoralis austriaci, (auf Veglia bedeckt sie die Abhänge bei Castel Muschio, Noé.) April. Mai. E. Characias Wulf. in Roem. arch. 2. p. 370., sed color petalorum per errorem „primum saturate flavus, serius atro-rubens" descriptus est; petala E. Wulfenii semper mellei coloris sunt, colorem servant, et nunquam in atro-rubentem abeunt. — E. veneta Willd. en. 1. 507., commixta est ex E. Wulfenii et E. Characia, petala in descriptione E. Characiam designant; in herbario sub n. 9390. fol. 1. E. Characias; f. 2. E. Wulfenii asservatur. Venetiis nostra species non crescit, nam Ruchingeri flora „dei Liti veneti" eam non continet. G.

E. Characias (L. sp. 662.) in ditione florae nostrae nondum lecta est; differt ab E. Wulfenii, umbella multo breviore, involucellis fere planis vix pelviformibus saturate viridibus, floribus minoribus, glandulis antice truncatis, angulis acutis vel in cornicula brevia terminatis, et colore glandularum atro-purpureo sensim pallescente et in colorem sordide lateritium transeunte. E. Wulfenii iam e longinquo umbella ampla viridi-flava cognoscitur; involucella in formam fere infundibuliformem connata sunt, involucra propria maiora, glandulae antice semicirculo excisae, in cornua 2, acuta, deflexa terminantur, et color earum constanter diversus est.

b. Semina laevia, involucella libera.

18. **E. Cyparissias** (L. sp. 661.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso subtiliter punctulato-scabris, *seminibus laevibus*, *foliis exacte linearibus vel basin versus paulo attenuatis* integerrimis glabris, rameis angustissimis, involucellis rhombeo- vel subtriangulari-ovatis longitudine sua latioribus breviter acuminatis integerrimis, radice repente. ♃. In campis arenosis, ad vias. April. Mai. Jacq. a. t. 435. Glandulae cerinae.

19. **E. Esula** (L. sp. 660.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso subtiliter punctulato-scabris, *seminibus laevibus*, *foliis lanceolatis* vel lineari-lanceolatis *basin* versus *attenuatis* glabris, margine apicis scabriusculis, inferioribus subpetiolatis, rameis angustioribus, involucellis rhombeo- vel triangulari-ovatis longitudine sua latioribus obtusis mucronatis vel breviter acuminatis, radice repente. ♃. In pratis ad salicum dumeta, fossas, vias humidas, (stw. dch. d. Geb., doch vielleicht nicht in d. Schweiz.) Jun.-Aug. Glandulae cerinae. Fl. dan. t. 1270.

20. **E. salicifolia** (Host. syn. p. 267.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso punctulato-scabris, *seminibus laevibus*, *foliis lanceolatis basi apiceque attenuatis integerrimis dense pubescentibus*, involucellis rhombeo- vel triangulari-ovatis longitudine sua latioribus obtusis mucronatis vel breviter acuminatis, radice repente. ♃. In pratis, ad vias, (bisher bloss in Unteröstreich.) Mai. Jun. W. Kit. pl. r.

hung. t. 55. Rochel. bannat. t. 7. f. 16., forma angustifolia. Glandulae flavae. G.

21. **E. virgata** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. p. 176. t. 162.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso punctulato-scabris, *seminibus laevibus*, *foliis lineari-lanceolatis a medio apicem versus sensim attenuatis* integerrimis glabris *opacis*, involucellis rhombeo- vel triangulari-ovatis longitudine sua latioribus obtusis mucronatis vel breviter acuminatis, *radice descendente multicipite*. ♃. In pratis, ad vias, (Littorale, Steyerm., Oestreich, Mähren u. Böhmen.) Mai. Jun. E. uralensis Fischer. ap. Link. en. h. berol. 2. p. 14. Glandulae luteae. G.

22. **E. lucida** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 1. p. 54. t. 54.) umbellae multifidae radiis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso punctulato-scabris, *seminibus laevibus*, *foliis lanceolatis* vel lineari-lanceolatis *a medio apicem versus sensim attenuatis* integerrimis glabris *nitidis*, involucellis rhombeo- vel subtriangulari-ovatis longitudine sua latioribus obtusis mucronatis vel breviter acuminatis, *radice horizontali repente*. ♃. In pratis humidis, salicetis, ad fossas, (Mähren u. Schlesien, Frankfurt a. d. O.) Jul. Aug. Glandulae luteae denique fulvae. Folia semper nitore aliquo praeditae. Variat:

α. latifolia, foliis oblongo-lanceolatis rotundato-obtusis, caule 2-4 pedali. Wimm. et Grab. fl. sil. 3. p. 282.

β. salicifolia, foliis lineari-lanceolatis acutiusculis, caule sesquipedali. Fl. sil. l. c.

γ. linearifolia, foliis anguste linearibus acutiusculis confertis, caule subpedali. Fl. sil. l. c. G.

23. **E. saxatilis** (Jacq. fl. austr. 4. p. 23. t. 345.) umbellae 5 fidae radiis semel bifidis, *glandulis* antice truncatis *bicornibus*, *corniculis brevibus obtusis*, capsulae coccis punctulato-scabriusculis dorso tenuiter carinatis, *seminibus laevibus*, *foliis* glaucis glabris integerrimis, *inferioribus* linearioblongis cum mucrone obtusis emarginatisve *basi attenuatis*, *supremis ellipticis*, involucellis transverse latioribus obtusis mucronatis basi truncatis subcordatisve, *radice descendente multicipite*. ♃. In saxosis montosis, (Unterösstr., Steyerm., Krain, südl. Tyrol.) Mai. Jun. Glandulae cerinae. — Huic similis est E. portlandica Huds., sed facile dignoscitur foliis in apice obtuso et involucellis apice breviter acuminatis seminibusque dense foveolato-punctatis. G.

24. **E. nicaeensis** (Allion. ped. 1. p. 285. t. 69. f. 1.) umbellae multifidae radiis semel bifidis, glandulis *semilunari-truncatis vel bicornibus*, *capsulae coccis exsiccatis rugulosis dorso tenuiter carinatis*, *seminibus laevibus*, foliis glabris glaucis oblongo-linearibus obtusis vel breviter acuminatis mucronulatis integerrimis basin versus paulum attenuatis, involucellis cordato-ovatis obtusis mucronulatis. ♃. In locis sterilibus incultis, (südl. Tyrol, Krain, Littorale.) Jul. Aug. Jacq. ic. rar. t. 485. E. serotina Host. a. 2. p. 562. E. multicaulis Thuill. par. ed. 2. 1. p. 238. E. oleaefolia Gouan. in herb. Desf. Glandulae luteae. Variat *α.* glandulis bicornibus et

β. glareosa, glandulis semilunari-truncatis, corniculis nullis: E. glareosa MB. taurico-cauc. 1. p. 373. 3. p. 324. E. serotina Host. a. 2. p. 562. G.

25. **E. Paralias** (L. sp. 657.) umbellae 5 fidae rarius 3-4 fidae ramis bifidis, glandulis lunatis non bicornibus, *capsulae coccis exsiccatis rugulosis dorso sulco exaratis*, *seminibus laevibus*, foliis glabris glaucis oblongo-linearibus linearibusque acutis vel obtusiusculis muticis integerrimis, involucellis transverse ovalibus concavis muticis vel brevissime apiculatis. ♃. In arenosis maritimis ad mare adriaticum. Jun. Jacq. h. vind 2. t. 188. E. paralia Sm. engl. fl. 4. p. 63. Glandulae fulvae. G.

c. Semina rugosa, tuberculata, vel varie foveolata et exsculpta. Folia alterna vel sparsa.

26. **E. Myrsinites** (L. sp. 661.) umbellae 5-8 fidae ramis bifidis, *glandulis*

bicornibus, cornibus dilatatis, *capsula siccata rugulosa*, coccis dorso subcompressis obtuse carinatis, *seminibus foveolato-rugosis*, foliis glaucis obovato-oblongis obovatisve obtusis vel breviter acuminatis mucronatis glabris margine scabriusculis, *involucellis reniformibus* mucronulatis. ♃. In saxosis asperis ad littus maris, (auf Cherso.) Jun. Jul. Clus. hist. 2. 189. Glandulae flavae. J.

27. **E. pinea** (L, syst. nat. 2. p. 333.) umbellae 5-9 fidae ramis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso stria punctulato-scabra notatis, *seminibus foveolato-reticulatis*, *foliis* glaucis *obtusis mucronatis glabris*, inferioribus linearibus, superioribus latioribus, *supremis* foliolisque involucri ovatis *subtrilobis*, involucellis cordato-reniformibus. ♃. In locis saxosis ad littus maris, (auf Cherso, Noé; Scoglio de la Madonna di Veruda südl. v. Pola, Tommas.) Mai. Jun. E. pinea Bertolon. fl. ital. 5. p. 64. E. caespitosa Tenor. syllog. fl. neap. p. 235. E. linifolia Tenor. prodr. fl. neap. p. 29. E. pinea Guss. fl. sicul. prod. 1. 548. Linnaei diagnosis bene in plantam Gussonianam, hic propositam, quadrat. E. ragusana Reichenb. fl. exc. 873. E. coccinosperma Reichenb. fl. exsicc. 1295. Glandulae flavae. J.

28. **E. segetalis** (L. sp. 657.) umbellae 5 fidae ramis iterato-bifidis, *glandulis bicornibus*, capsulae coccis dorso stria punctulato-scabra notatis, *seminibus foveolato-reticulatis*, *foliis* glaucis *linearibus acuminatis mucronatis* glabris, *superioribus latioribus*, involucellis reniformibus vel subrhombeis mucronatis. ☉. Inter segetes, (im Wallis, in Istrien, Steyerm., Oestreich, Schlesien, bei Frankfurt a. M., Jena.) Jun. Jul. Jacq. a. t. 456. Glandulae luteae.

29. **E. Peplus** (L. sp. 653.) umbellae trifidae ramis iterato-bifidis, glandulis bicornibus, capsulae coccis dorso bicarinatis, carinis subalatis, *seminibus hinc longitudinaliter bisulcatis inde foveolato-punctatis*, *lineis dorsalibus ex foveolis quatuor formatis*, foliis petiolatis obovatis obtusissimis basi in petiolum protractis integerrimis, infimis suborbiculatis, involucellis ovatis. ☉. In cultis ubique. Jul. in hyemem. Fl. dan. t. 1100. Glandulae luteolae.

30. **E. peploides** (Gouan. fl. monsp. p. 174.) umbellae trifidae ramis bifidis, glandulis bicornibus, capsulae coccis dorso bicarinatis, carinis subalatis, *seminibus hinc longitudinaliter bisulcatis inde foveolato-punctatis*, *lineis dorsalibus ex foveolis tribus formatis*, foliis petiolatis obovatis obtusissimis emarginatisve in petiolum protractis integerrimis, infimis subrotundis. ☉. In locis incultis inter vepreta, (Istrien zwischen Pola u. Veruda an der Südspitze des Landes, bei Dignano, Lossino piccolo, Tommasin.) April. Mai. E. rotundifolia Loisel. not. p. 75. t. 5. f. 1. Glandulae rubrae vel fulvae. J.

31. **E. falcata** (L. sp. 654.) umbellae trifidae ramis iterato-bifidis, glandulis breviter bicornibus, capsulis laevibus, *seminibus seriebus 4 linearum transversalium exsculptarum notatis*, foliis lanceolatis basi attenuatis acutis vel acuminatis glabris, infimis spathulatis obtusis emarginatisve cum mucronulo, involucellis ovatis ellipticisve mucronatis. ☉. Inter segetes, (südl. Schweiz, Südtyrol, Littorale u. v. da nach Oestr., Mähren, Böhmen u. Thüringen, a. d. Rheinfläche v. Speyer bis Mainz u. stellenweise weiter bis Neuwied.) Jul.-autumn. Jacq. a. t. 121. E. arvensis Schleich. exs. Glandulae luteae. Variat foliis acuminatis, acutis et obtusiusculis, semper tamen mucronatis, atque involucellis lato-ovatis acuminatis ellipticisve acutis, porro involucellis distantibus et

β. minor, „imbricatis, foliis bracteisque acuminatis“ E. acuminata Lam. dict. 2. 426. Tenor. fl. neap. 1. p. 261. E. obscura Lois. fl. gall. ed. 2. 1. p. 339., sec. Tenor. syllog. p. 234.

32. **E. exigua** (L. sp. 654.) umbellae trifidae ramis iterato-bifidis, glandulis bicornibus, capsulis laevibus, *seminibus tuberculato-rugosis*, foliis linearibus vel lineari-cuneatis acutis vel obtusis cum mucronulo vel retusis glabris,

involucellis e basi subcordata linearibus acutis. ⊙. In agris et locis cultis. Jun.-autumn. Glandulae flavae. Variat foliis omnibus acutis et

β. truncata, foliis truncatis vel subretusis cum apiculo prominente: E. exigua *β.* retusa Roth. tent. 2. 1. 526.

γ. tricuspidata, foliis apice subito subauriculato-dilatatis retusis cum mucronulo, quasi trilobis: E. exigua *γ.* Lois. fl. gall. ed. 1. 338. E. rubra DC. fl. fr. 5. p. 359., non Cav., sec. Loisel. E. tricuspidata Lap. abr. 271. E. diffusa Jacq. misc. 2. p. 311. ic. rar. t. 88. Haec in Germ. australi. Formis intermediis in var. antecedentem transire videtur; sed vivam observandi occasio mihi nondum data fuit. Cl. Roeper. cum hac varietate E. rubram Cav., mihi nondum satis notam, quoque coniungit.

d. Semina rugosa, folia opposita decussata.

33. **E. Lathýris** (L. sp. 655.) umbellae quadrifidae ramis iterato-bifidis, glandulis bicornibus, capsulis (siccatis) rugosis, seminibus rugosis subreticulatis, *foliis oppositis decussatis* oblongo-linearibus *sessilibus*, superioribus basi cordatis, involucellis oblongo-ovatis acutis. ⊙. In locis cultis, (wild in d. südl. Schweiz, d. südl. Tyrol u. d. Littor., im nördl. Gebiete verwildert.) Jun. Jul. Glandulae pallide luteae.

4. MERCURIÁLIS (L. gen. n. 1125.) Flores dioici vel monoici. Perigon. 3 partitum. Mas. Stam. 9-12. Fem. Styl. brevis; stigmata 2, elongata. Caps. dicocca; coccis 1 spermis. N. ab E. gen. 3. 15. — Flores virentes.

1. **M. perennis** (L. sp. 1465.) caule simplicissimo, *foliis* petiolatis *ovato-oblongis lanceolatisve, floribus femineis longe pedunculatis.* ♃. In sylvis montanis. April. Mai. Fl. dan. t. 400. M. longifolia Host. a. 2. p. 666. M. Cynocrambe Scop. carn. 2. p. 266.

2. **M. ovata** (Sternb. et Hopp. Denkschr. d. bot. Ges. z. Regensb. 1815. p. 170. t. 4.) caule simplicissimo, *foliis* subsessilibus vel breviter petiolatis *ovatis, floribus femineis longe pedunculatis.* ♃. In sylvis montanis, (südl. Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark, Unteröstreich.) April. Mai. Num propria species sit, an varietas antecedentis, ulteriores observationes docebunt. G.

3. **M. annua** (L. sp. 1465.) caule ramoso, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ovatisve, *floribus femineis subsessilibus.* ⊙. In cultis et ruderatis. Jun.-autumn. St. h. 29.

Ord. CVI. URTICEAE. Juss. gen. p. 400.

Flores monoici, dioici vel polygami. Perigonium inferum, 4 partitum, rarius 3-6 partitum, laciniis per aestivationem imbricatis; vel in floribus femineis integrum. Stam. definita, libera, fundo perigonii inserta, eiusdem laciniis opposita. *Ovarium* liberum 1 loculare, 1 *ovulatum*, vel 2 loculare, loculis 1 ovulatis. Styli 2, vel 1. *Fructus indehiscens.* Embryo rectus, vel curvatus, vel spiralis. Folia stipulata, *stipulis liberis, plerumque caducis.*

Trib. I. *URTICEAE GENUINAE.* Ovarium 1 loculare. Sem. erectum, albuminosum, embryone recto.

1. URTÍCA (L. gen. n. 1054.) Flores monoici, vel dioici. Mas. Perigon. 4 partitum. Stam. 4, ante anthesin induplicata; filamenta elastice resilientia. Fem. Perigon. 2 partitum. Stigma sessile capitato-penicillatum. Nux. Flores virentes. N. ab E. gen. 3. 7.

1. **U. pilulifera** (L. sp. 1395.) foliis oppositis ovatis acuminatis inciso-serratis, *spicis femineis globosis* pedunculatis. ⊙. In cultis et ruderatis, (in d. Dorfe Windehausen bei Heringen u. um d. alte Schloss Mansfelden, um Ellrich u. Quedlinburg in Thüringen.) Jun.-Octob. Engl. bot. t. 148. G.

2. **U. urens** (L. sp. 1396.) foliis oppositis ovalibus acutis inciso-dentatis, *paniculis axillaribus* geminatis *petiolo brevioribus*. ☉. In cultis, ruderatis, ad vias, ubique. Jul.-Sept. Fl. dan. t. 739.

3. **U. dioica** (L. sp. 1396.) foliis oppositis oblongo-cordatis acuminatis grosse serratis, *paniculis axillaribus petiolo longioribus* pendulis, floribus dioicis. ♃. Ad sepes subhumidas, in sylvis. Jul.-Sept. Fl. dan. t. 746.

2. PARIETÁRIA (L. gen. n. 1152.) Flores polygami. Perigonium campanulatum, quadrifidum, florum hermaphroditorum denique elongatum. Stam. 4, ante anthesin induplicata; filamenta elastice resilientia. Stylus filiformis; stigma capitato-penicillatum. Fem. Perigon. ut hermaphroditi, sed post anthesin non elongatum et stamina o. Nux. Flores virides. N. ab E. gen. 3. 8.

1. **P. erecta** (M. et K. D. fl. 1. p. 825.) *foliis* alternis petiolatis *oblongo-ovatis*, basi apiceque acuminatis integerrimis triplinerviis pellucido-punctatis hirtis, pedunculis dichotomis, bracteis sessilibus flore brevioribus, *perigoniis campanulatis, staminigeris stamina aequantibus*, caulibus erectis simplicibus. ♃. Ad muros, in ruderatis, (stw. dch. d. Geb.) Jul.-autumn. P. officinalis Willden. sp. pl. 4. 953. DC. fl. fr. 3. p. 324. St. h. 9.

2. **P. diffusa** (M. et K. D. fl. 1. p. 827.) *foliis* alternis *ovatis* basi apiceque acuminatis integerrimis triplinerviis pellucido-punctatis hirtis, pedunculis dichotomis, bracteis decurrentibus flore brevioribus, *perigoniis staminiferis denique elongatis stamina bis excedentibus*, caulibus prostratis diffusis ramosis. ♃. Ad muros et vias, (im Rheinthale bei Heidelberg, Mainz, bis Neuwied; im Nahethale bis Creuznach hinauf; im Moselthale; bei Minden u. Göttingen; in d. ital. Schweiz u. d. südl. Tyrol; Oestr., Littor.) Jul.-autumn. P. officinalis Pollich. pal. 2. p. 658. Smith. brit. p. 189. Engl. flor. 1. p. 223. „their red calyx becoming greatly elongated as the seed ripens" et secund. specimina anglica in herb. Mertens. P. iudaica Hoffm. D. fl. 2. p. 276. Schk. t. 346. DC. fl. fr. 3. p. 824. Lam. illustr. t. 853. f. 2. MBieberst. tauric. cauc. 2. p. 440., non Linn. — P. *iudaica* (L. sp. 1192.) folia trinervia habet, nec triplinervia; conf. Smithii descriptionem P. off. in Fl. brit. p. 189. Ad hanc pertinet: Parietaria ocymi folio Bocc. sic. t. 24. A., P. lusitanica *β*. M. Bieberst. taur. cauc. 2. p. 440., non lusitanica L. et DC. — Specimen meum caucasicum P. iudaicae flores staminigeros elongatos omnino habet.

Trib. II. *CANNABINEAE*. Ovarium uniovulatum, ovulo pendulo. Albumen o. Embryo curvatus vel spiralis, cotyledonibus incumbentibus. Fructus verus, vel spurius quoque et ex spica, amentum referente, factus et siccus.

3. CÁNNABIS (Linn. gen. n. 1115.) Flor. dioici. Mas. Perigon. 5 partitum. Stam. 5. Fem. Perigon. 1 phyllum, uno latere longitudinaliter fissum. Styl. 2. Nux perigonio persistenti inclusa. N. ab E. gen. 3. 9.

1. **C. sativa** (L. sp. 1457.) ☉. Ex India orta, fere ubique colitur. Jul. Aug. Schk. t. 325. Flores virides. Colit.

4. HÚMULUS (L. gen. n. 1116.) Flor. dioici. Mas. Perigon. 5 partitum. Stam. 5. Fem. Perigon. squamaeforme, apertum, intra squamas, spicam strobiliformem formantes. N. ab E. gen. 3. 10.

1. **H. Lupulus** (L. sp. 1457.) ♃. In dumetis et sepibus; magna copia hinc inde colitur. Jul. Aug. Schk. t. 326. Flores virides. Colit.

Trib. III. *ARTOCARPEAE*. DC. fl. fr. 3. p. 318. Ovarium 1 vel 2 loculare. Sem. pendulum, albuminosum; embryo curvatus, cotyledonibus accumbentibus. Fructus spurius carnosus vel succulentus, e receptaculo ortus, vel e receptaculo et perigoniis formatus.

5. FICUS (L. gen. 1186.) Flores monoici vel dioici, in receptaculo carnoso, apice umbilicato, intus cavo inclusi. Mas. Perigon. 3 partitum. Stam. 3. Fem. Perig. 5 fidum. Ovarium 1 loculare. Styl. lateralis; stigm. 2. N. ab E. gen. 3. 6.

1. **F. Cárica** (L. sp. 1513.) foliis cordatis integris palmatisve supra scabris subtus pubescentibus. ♄. Colitur in provinciis calid. et occurrit in rupium fissuris Tyrolis australis et Helvetiae transalpinae copiose, ubi spontanea facta. Jul. Aug. Schk. t. 358. Colit.

6. MORUS (L. gen. n. 1055.) Perigonium 4 partitum. Mas. Stam. 4. Fem. Ovarium 2 loculare, loculis 1 ovulatis. Styl. 2. Fructus spurius, e receptaculo, perigoniis et utriculis succulentis formatus. N. ab E. gen. 3. 5.

1. **M. alba** (L. sp. 1398.) foliis cordatis basi inaequalibus ovatis integris lobatisve serratis, amentis femineis pedunculum subaequantibus, *perigoniis margine glabris*, stigmatibus glabris breviter papillosis. ♄. Colitur. Mai. Schk. t. 290. Fructus albus. Colit.

2. **M. nigra** (L. sp. 1398.) foliis cordatis ovatis integris lobatisve serratis, amentis femineis subsessilibus pedunculum multoties superantibus, *perigoniis margine stigmatibusque hirsutis*. ♄. Colitur. Mai. Fructus niger. Colit.

Trib. IV. *CELTIDEAE*. Dub. bot. gall. p. 421. Ovarium 1 loculare. Sem. pendulum, albuminosum; embryo curvatus, cotyledones conduplicatae. Fructus verus.

7. CELTIS (L. gen. n. 1143.) Flores polygami. Hermaphr. Perigon. 5-6 partitum. Stam. 5, 6, imo perigonio inserta. Ovarium 1 ovulatum. Styli 2. Drupa pyrena ossea. Masc. Pistillum o; caetera ut hermaphroditi. N. ab E. gen. 3. 4.

1. **C. australis** (L. sp. 1478.) foliis oblongo-lanceolatis acuminatis argute serratis supra scabris subtus molliter breviterque villosis basi inaequalibus. ♄. In montanis asperis inter virgulta reg. calid., (südl. Schweiz, südl. Tyrol, südl. Steyerm., Littor.) Mai. D. fl. 2. p. 329. Lam. illustr. t. 844. f. 1.

Trib. V. *ULMACEAE*. Mirb. elem. 2. p. 905. Ovarium biloculare. Sem. pendulum, albumen o. Embryo rectus; cotyledones planae. Fructus verus.

8. ULMUS (L. gen. n. 316.) Flores hermaphroditi. Perigon. campanulatum, 4-5 dentatum, marcescens. Stam. 4, 5-12. Styl. 2. Nux abortu 1 locularis, ala cincta. N. ab E. gen. 3. 3.

1. **U. campestris** (L. sp. 327.) foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus subsessilibus, *fructibus glabris*. ♄. In sylvis montanis. Mart. April. D. fl. 2. p. 327. Occurrit:

α. nuda, cortice ramorum laevi, non suberoso; porro, 1. foliis scabris, fructibus oblongis: U. campestris Sm. engl. fl. 2. 20., engl. bot. t. 1886. U. nuda Ehrh. Beitr. 6. p. 86.; 2. foliis scabris, fructibus orbicularibus: U. montana Sm. l. c. p. 22., engl. bot. t. 1887. U. excelsa Borkh. Forstb. p. 839. U. campestris a. latifolia Meyer. chlor. Hann. 80.; 3. foliis glabris, fructibus obovatis: U. glabra Mill. dict. n. 4. Sm. l. c. p. 23., engl. bot. t. 2218. U. campestris *β.* carpinifolia Meyer. l. c.

β. suberosa, cortice ramorum plus minusve suberoso-alato et porro, 1. foliis maioribus fructibus obovatis: U. maior Sm. l. c. 21., engl. bot. t. 2542. U. hollandica Mill. dict. n. 5.; 2. foliis minoribus, fructibus orbicularibus: U. suberosa Ehrh. Beitr. 6. 87. U. tetrandra Schk. t. 57. a. b. Fructus figura, me observante, non constans est et quidem in una eademque varietate.

2. **U. effusa** (Willd. prodr. flor. berol. n. 296.) foliis duplicato-serratis

basi inaequalibus, floribus pedunculatis pendulis, *fructibus margine villoso-ciliatis*, pedunculo multo brevioribus. ♄. In sylvis montanis hinc inde. Mart. April. D. fl. 2. p. 328. U. ciliata Ehrh. Beitr. 6. 88. U. octandra Schk. t. 57. a. b. U. racemosa Borkh. l. c. 1. 851.; U. effusa Borkh. l. c.; modificatio foliis maioribus. Stamina omnia exserta. — In Ulmo americana affini stamina inaequalis longitudinis, longiora in calyce inclusa, et fructus pedunculo vix breviores sunt. — Plurimas a variis auctoribus propositas species omnes ad duas hic enumeratas refero.

Ord. CVII. JUGLANDEAE. DC. theor. elem. ed. 1. p. 215.

Flores monoici; *masc. amentacei*. Perigonium 2-6 partitum. Stam. plurima in medio perigonii inserta; filamenta brevissima; antherae 2 loculares, longitudinaliter dehiscentes. *Flores fem. solitarii, bini ternive in apice ramulorum, involucro destituti. Cal. superus, 4 dentatus deciduus. Petala 4, herbacea.* Ovarium 1 loculare, 1 ovulatum, *ovulo erecto*. Stigmata 2, lanceolata, elongata, vel 1, peltatum, 4 lobum. Drupa carnosa, putamine 2-4 valvi. Sem. exalbuminosum. Embryo cotyledonibus carnosis, bifidis, gyroso-plicatis. Radicula supera, ab hilo remota. Arbores foliis exstipulatis, non punctatis.

1. JUGLANS (L. gen. n. 1071., excl. specieb.) Stigmata 2, lanceolata. N. ab E. gen. 3. 2.

1. **J. regia** (L. sp. 1415.) foliolis subnovenis ovalibus glabris subserratis subaequalibus, fructibus globosis. ♄. In regionibus calidioribus frequenter colitur. Mai. Schk. t. 302. Colit.

Ord. CVIII. CUPULIFERAE. Rich. bot. med. edit. germ. p. 187. Corylaceae Mirb. elem. p. 906. Quercineae Juss. dict. sc. nat.

Flores monoici; *masc. amentacei*. Amentum cylindricum vel subrotundum, e bracteis, (squamis,) compositum. Perigonium o vel 4-6 fidum. Stam. 5-20 et plura, perigonio vel bracteae inserta. Antherae biloculares, birimosae. *Feminei solitarii vel plures, aggregati, vel spicati. Perigonium ovario adnatum limbo denticulato, saepe evanescescente.* Ovarium 2-6 loculare, loculis 1-2 ovulatis, ovulis pendulis. Stigmata 2-6, basi saepe connata. *Involucrum varium post anthesin excrescens, pericarpia obtegens aut fovens,* saepe fructum spurium referens. Nux abortu 1 locularis, 1 sperma. Semen exalbuminosum. Embryo rectus, radicula hilum spectante.

1. FAGUS (L. gen. n. 1072.) Mas. Amentum subglobosum. Squamae minutae deciduae. Perigonia 5-6 fida. Stam. 10-15. Fl. femin. solitarii. Involucrum 4 fidum, 2 florum. Ovarium perigonio parvo coronatum. Stigmata 3. Pericarpium immaturum 3 loculare, loculis 2 ovulatis. Nuces maturae 1-2 spermae, involucro aucto indurato inclusae. N. ab E. gen. 1. 16.

1. **F. sylvatica** (L. sp. 1416.) foliis ovatis glabris obsolete dentatis margine ciliatis. ♄. In solo fertili planitierum, montium et reg. subalpinarum, ultra 4000 pedes adscendens. Mai. Variat foliis hepatici coloris: F. sylvatica β. Willd. sp. pl. 4. p. 459. Haec in Tyroli australi, (über Castellano im Rovoredischen, Facchini.)

2. CASTÁNEA (Tournef. inst. t. 352.) Mas. Amentum floribus glomeratis sessilibus; glomeruli bracteis fulti. Perigonium 6 partitum. Stam. 10-20. Fem. Involucrum 4 fidum, 2-3 florum. Perigon. superum 5-8

fidum. Stigmata 5-8. Ovar. 5-8 loculare, loculis 2 ovulatis. Nux unilocularis. N. ab E. gen. 1. 17.

1. **C. vulgaris** (Lam. dict. 1. p. 708.) foliis oblongo-lanceolatis acuminatis mucronato-serratis utrinque glabris. ♄. Colitur et in regionibus calidioribus sylvas format, sola cultura ortas. Jun. C. sativa Mill. dict. 11. 1. Fagus Castanea L. sp. 1416. Cam. epit. 118.

3. QUERCUS (L. gen. 1070.) Mas. Amentum. Perigonia sessilia, 5-9 partita. Stam. 5-9. Fem. Flores in axilla squamae deciduae. Involucrum ex foliolis minutis, serius in cupulam confluentibus. Perigonium minutum superum. Styl. 1. Stigmata 3. Pericarpium immaturum 3 loculare, loculis 2 ovulatis. Nux matura 1 locularis, 1 sperma.

a. Folia decidua.

1. **Q. sessiliflora** (Sm. brit. 3. 1026.) *foliis* petiolatis obovatis basi emarginatis vel in petiolum productis sinuatis *glabris, lobis rotundato-obtusis muticis, pedunculis petiolum aequantibus brevioribusve,* squamis cupulae adpressis. ♄. In locis montanis humilioribus, sylvas umbrosas constituens; in alpinis vix ultra 3000 pedes adscendit. Q. sessilis Ehrh. arb. 87. sec. Smith. Q. Robur Roth. tent. 1. 408. Schk. t. 301. b. Q. Robur *β.* L. fl. suec. ed. 2. p. 340.

2. **Q. pedunculata** (Ehrhart. arbor. n. 77.) *foliis* breviter petiolatis vel subsessilibus oblongo-obovatis basi profunde emarginatis *glabris* sinuatis pinnatifidisque, *lobis rotundato-obtusis muticis, pedunculis petiolo multoties longioribus,* squamis cupulae adpressis. ♄. In planitiebus et locis calidioribus depressis. Mai. Q. Robur Smith. brit. 1026. Q. Robur *α.* L. fl. suec. ed. 2. p. 340. Q. femina Fl. dan. t. 1180. Q. racemosa Lam. dict. 1. 715. Q. pedunculata Schk. t. 301. a.

3. **Q. pubescens** (Willd. sp. 4. 450.) *foliis* petiolatis obovatis basi emarginatis vel in petiolum productis sinuatis, *vernantibus tomentosis,* adultis subtus pubescentibus vel denique glabrescentibus, *lobis obtusis* integris vel obtuse uni-biangulatis *muticis,* squamis cupulae adpressis. ♄. In collibus et montibus sylvaticis, (am Kaiserstuhl u. a. Kalkbergen in Oberbad., südl. Schweiz bis in d. Litt.; Unteröstr., Mähren, Böhmen.) Mai. Q. lanuginosa Thuill. par. 1. 502. Q. collina Schleich. exs. Q. Robur *δ.* Lam. dict. 1. 717. Q. faginea Rohr. et May. fl. v. Mähr. p. 210., non Lam. — Specimina, huic speciei caeterum simillima, e Tyroli australi misit D. Elsmann, quorum cupulae, iam magnitudine pisi, pedunculo communi semipollicari insident; an h. l. Q. apennina Lam. dict. 1. 725. DC. fl. fr. 5. p. 352.?

4. **Q. Cerris** (L. sp. 141.) foliis obovatis oblongisve sinuatis vel pinnatifidis pubescentibus vel subtus cano-tomentosis, *lobis mucronatis, squamis cupulae elongatis lineari-subulatis patentibus contortis.* ♄. In montosis sylvaticis, (ital. Schweiz, südl. Tyrol, Untersteyerm., Krain, Litt., Unteröstr.) Mai. Q. crinita Lam. dict. 1. p. 718. Q. Cerris et austriaca Willd. sp. 4. 454. Q. Aegilops Scop. carn. 2. p. 241. Fructus perfecti infra folia collocati sunt, quum secundo anno demum ad maturitatem perveniant. Folia sinuato-dentata et pinnatifida in una eademque arbore occurrunt, quandoque folia fere ad costam mediam usque pinnatifida sunt, laciniis lanceolatis passim sublobatis.

b. Folia perennantia.

5. **Q. Suber** (L. sp. 1413.) foliis *sempervirentibus* ovatis lanceolatisve mucronatis integerrimis vel mucronato-serratis, *subtus incanis vel tomentosis, cortice rimoso-fungoso.* ♄. In collibus maritimis Istriae. Mai. Tabernaem. Krtb. 1379. J.

6. **Q. Ilex** (L. sp. 1412.) *foliis* ovatis lanceolatisve *sempervirentibus* mucronatis integerrimis vel mucronato-serratis, *subtus incanis vel tomentosis, cortice integro.* ♄. In collibus praecipue maritimis, (im Littoral. bei Triest u. a. Cherso u. Osero, aber auch im Val di Sacra im südl. Tyrol; ital.

Schweiz.) Mai. Tabernaem. Krtb. 1380. Notas, quibus praeter corticem trunci Q. Suber et Q. Ilex distingui possint, in speciminibus siccis, sub his nominibus mecum communicatis, hucusque reperire non potui, neque in scriptis auct. botanic. reperio. G.

7. **Q. Coccifera** (L. sp. 1413.) *foliis* sempervirentibus ovatis *spinoso-dentatis glabris.* ħ. In collibus Istriae. Mai. Ilex coccifera Tabern. Krtb. p. 1381. J.

4. CÓRYLUS (L. gen. n. 1074.) Mas.: Amentum, squamis obovatis, supra squamulis 2 auctis. Stam. 8, squamae inserta; antherae 1 loculares, filamenta per paria apposita, (filamentum ad basin partitum.) Fem.: Gemma squamis imbricata, superioribus fertilibus, 1 floris. Ovarium receptaculo inmersum, stigmatibus 2 filiformibus, denique emergens et involucro bilobo inciso cinctum. Pericarpium immaturum spongioso-farctum, biovulatum, perigonio minutissimo coronatum. Nux matura 1-2 sperma.

1. **C. Avellana** (L. sp. 1417.) stipulis oblongis obtusis, *involucris fructus campanulatis apice patulis* lacero-dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis. ħ. In sylvis et dumetis. Febr. Mart. Schk. t. 305.

2. **C. tubulosa** (Willd. sp. 4. p. 470.) stipulis oblongis obtusis, *involucris fructus tubuloso-cylindraceis apice coarctatis* inciso-dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis. ħ. In sylvis reg. austral., (in Istrien häufig, wo C. Avellana nur auf d. höhern kältern Bergen des Karstes vorkommt, Tommasini.) Febr. Mart. Guimp. t. 151.

C. Colurna in Hostii synopsi fl. austr. p. 523. inter plantas Austriae inferioris enumeratur; sed quum auctor in flora austriaca hunc locum natalem omiserit, eam non recepi.

5. CARPINUS (L. gen. n. 1073.) Mas.: Amentum squamis ovatis. Stam. 6-12, in basi squamae inserta. Antherae 2 loculares, loculis disiunctis. Fem.: Amentum laxum. Squamae ternae, biflorae, exterior decidua, interiores bifidae vel angulatae persistentes, in fructu valde auctae. Ovarium perigonio 6 dentato coronatum, biloculare, loculis 1 ovulatis. Stigmata 2. Nux matura 1 locularis.

1. **C. Bétulus** (L. sp. 1416.) *strobilorum squamis tripartitis*, laciniis lanceolatis, intermedia elongata serrata vel integerrima. ħ. In sylvis praecipue montanis. April. Mai. Schk. t. 304. Varietas laciniis squamarum integerrimis in Germania non infrequens est; an h. l. C. Carpinizza Host. fl. a. 2. 626.? Varietatem monstrosam:

β. incisam, foliis oblongis irregulariter inciso-serratis, (Ait. kew. 3. p. 362.,) circa Heidelberg. legit amic. C. Schimper.

2. **C. duinensis** (Scop. carn. 2. p. 243. t. 60. 1872.) *strobilorum squamis ovatis* inaequaliter serratis subangulatis *indivisis.* ħ. In sylvis reg. calid., (im Littorale gemein.) April. Mai. C. orientalis Lam. dict. 1. p. 707. Nuces triplo minores, quam in antecedente. G.

6. ÓSTRYA (Micheli. gen. p. 223.) Mas.: Amentum squamis ovatis. Stam. 6-12, basi squamae inserta. Antherae biloculares, loculis filamento fisso disiunctis. Fem.: Amentum laxum, squamis ovatis, bifloris. Ovarium perigonio coronatum, involucro urceolato basi setis copiosis cincto inclusum; styli 2, emersi. Involucrum fructus auctum, inflatum, capsulaeforme, membranaceum, in basi nucem bilocularem fovens, fructum spurium exhibens.

1. **O. carpinifolia** (Scop. carn. 2. p. 243.) strobilis ovatis pendulis, foliis ovatis acuminatis basi subcordatis, limbo perigonii fructiferi brevissimo integerrimo. ħ. Ad fluviorum ripas, in sylvaticis, (in Steyerm., Krain u. im Littorale, südl. Tyrol; C. Tessin.) April. Mai. Carpinus Ostrya L. sp. 1417. Ostrya italica carpini folio. Michel. gen. p. 223. t. 104. f. 1. 2.

Ord. CIX. SALICINEAE. Richard. in Kunth. nov. gen. amer. 2. p. 21. Amentacearum gen. Juss.

Flores unisexuales, dioici, amentacei. Amentum e squamis, (e bracteis squamaeformibus) formatum. Perigonii loco glandula, quandoque duplex, vel urceolus carnosus, oblique truncatus, ad basin genitalium, in squamarum axilla. Mas. Stam. 2-24, libera, vel monadelpha, e bractearum axilla vel ex urceolo egredientia. Fem. *Ovarium liberum*, 1 loculare, *multiovulatum* ovulis pendulis; placentis 2 parietalibus. Styl. 1. Stigmata 2, saepe bifida. Caps. 2 valvis. Sem. comosa, exalbuminosa. Embryo rectus. Radicula ad hilum spectans. Cotyledones planiusculae. Arbores aut frutices, foliis alternis.

1. SALIX (L. gen. n. 1098.) Genitalia basi glandulis 1-2 fulta; perigonium nullum.

Sect. I. Fragiles. *Squamae* amenti *concolores*, luteo-virides, ante fructus maturitatem *caducae*.

Amenta lateralia, fructifera in ramulo laterali novello, foliis 3-5 evolutis instructo, terminalia, subserotina. Glandulae nectariferae duae, altera antica, altera postica. Capsulae subsessiles vel pedicellatae. Stamina 2-10, basi paululum cohaerentia, ibidemque hirsuta. Amenti squamae citius seriusve, at semper ante fructus maturitatem, caducae. Folia lanceolata vel elliptica, exquisite acuminata, acutissima, serrata, nitida, glaberrima vel pilis adpressis sericea. Rami ad insertionem, praecipue florendi tempore, fragilissimi. Arbores procerae, speciosae.

1. **S. pentandra** (L. sp. 1442.) 5-10 *andra*, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis concoloribus caducis**), capsulis ex ovata basi attenuatis glabris breviter pedicellatis, pedicello nectarium bis superante, stylo mediocri, stigmatibus crassiusculis bifidis, fol. ovato-ellipticis vel ovato-lanceolatis acuminatis dense serrulatis glaberrimis, *stipulis ovato-oblongis aequilateris rectis*, petiolo superne multi-glanduloso. ♄. In convallibus subalpinis, ad torrentes, cum fluviis ad pedes alpium descendens; inque paludosis dumetosis Germaniae septentrionalis (dch. d. g. Alpenk.; in Böhm., Mähr. u. Schles.; im nördl. D. v. Harze an.) Mai. Jun. S. polyandra Schrank. baier. fl. 1. p. 228. S. tinctoria Smith. in Rees. cycl. n. 13., secund. engl. fl. 4. 172. Variat:

α. foliis ovato-lanceolatis, staminibus circiter quinis: S. pentandra *α.* Linn. fl. suec. ed. 2. p. 346. Hartm.! scand. ed. 2. 207. Haec sec. cl. Hartm. fere semper fruticosa est.

β. latifolia, foliis ovato-ellipticis, staminibus 5-10: S. pentandra latifolia Hartmann.! l. c. S. pentandra *β.* L. fl. suec. l. c. S. polyandra Bray. in Denkschr. d. regensb. bot. Ges. 1. 2. p. 41. t. 1. — Salicem pentandram *β.* L. suec. cl. Fries. in nov. mant. 1. p. 41., cum Salice cuspidata Schultz. combinat; sed specimen, quod cl. Hartman. mihi dedit, certissime ad S. pentandram pertinet.

Occurrit raro amentis androgynis, staminibus pro parte in pistilla monstrosa mutatis, quae secund. Wahlenb. in fl. ups. Salicem hermaphroditam L. sp. 1442. efficit.

2. **S. cuspidata** (Schultz. fl. starg. suppl. p. 47.) 4-5 *andra*, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis concoloribus deciduis*, capsulis ex ovata basi attenuatis glabris pedicellatis, pedicello nectarium ter quaterve superante, stylo mediocri, stigmatibus crassiusculis emarginatis, foliis oblongo-

---

*) Verba litteris cursivis impressa in hoc genere notas specierum sectionis, ex quibus hae statim cognoscuntur, nec semper totius generis, exhibent.

lanceolatis longe acuminatis dense serrulatis glaberrimis, *stipulis semicordatis obliquis*, petiolo superne multi-glanduloso. ♄. In pratis paludosis sylvaticis, (Pommern u. Mecklenb., Mittersill im Salzb., Hamburg.) Mai. Jun. S. cuspidata Koch. comment. d. salic. europ. p. 14., excl. syn. Linnaei. (Cl. Meyer. in chlor. Hannov. p. 485. S. cuspidatam meam ad Salicem fragilem trahit; sed descriptionem Salicis cuspidatae ad specimina, ab ipso cl. Schultzio accepta, confeci, nec eo tempore alia in Germania lecta possedi.) S. tetrandra Linn. it. Oel. in indice, ex opinione cl. Friesii, novit. suec. mant. 1. p. 41. — Cl. Schultz. hanc speciem primus omnium clare descripsit, qua de causa nomen, quod plantae imposuit, pie retinui. — Pedicellus ovarii in planta florente nectarium saepe aequat, sed florescentia peracta fit longior, et ter quaterve superat nectarium. Folia fere ut in Salicis fragilis var. decipiente; stipulae ut huius, sed folia in ramulis novellis amentigeris serrulata et inferiora tantum integerrima, in Salice fragili omnia ista folia integerrima sunt. Variat, sicut S. alba, S. rubra aliaeque staminibus et squamis amentorum masculinorum reversis; haec est: S. Meyeriana Willd. Berl. Baumz. p. 427. G.

3. **S. fragilis** (L. sp. 1443.) *diandra*, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis concoloribus deciduis*, capsulis ex ovata basi lanceolatis glabris pedicellatis, *pedicello nectarium* bis terve *superante*, stylo mediocri, stigmatibus crassiusculis bifidis, *foliis* lanceolatis acuminatis *glaberrimis vel iunioribus subsericeis* serratis serraturis inflexis, stipulis semicordatis. ♄. Ad ripas et in locis paludosis, ad sepes humidas. April. Mai. Occurrit:

α. decipiens, cortice ramulorum testaceo, gemmis atro-fuscis, foliis ramulorum infimis lato-obovatis obtusissimis: S. decipiens Hoffm. sal. 2. p. 2. t. 31. Smith. in engl. bot. t. 1937. ex specimine anglico authentico. S. vitellina L. secund. citat. hort. upsal. Fries. nov. ed. 2. p. 43. — Occurrit porro:

β. vulgaris, ramulis rufescentibus, foliis infimis ramulorum oblongo-obovatis: S. fragilis Sm. in Rees. cyclop. n. 38. engl. bot. t. 1896. S. Wargiana Lej.! fl. d. spa. 2. p. 312. S. fragilis Wargiana Lej.! revue p. 203. S. excelsa Tausch. pl. sel.

γ. Russeliana, foliis iunioribus, itaque etiam superioribus ramulorum hornotinorum versus autumnum sericeo-pilosis, serraturis plerumque minoribus, stipulis magis acuminatis: S. Russeliana Smith.! brit. 3. 1043., secund. specimen, ex horto Smithiano, a b. Mertensio mecum communicatum. S. fragilis St. h. 25. S. pendula Ser. sal. helv. p. 79. S. gracilenta Tausch. pl. sel. — Stamina in innumeris speciminibus omnium varietatum, hic enumeratarum, semper duo et nunquam plura vidi, quare S. Ehrhartiana Mey. in chlor. Hannov. p. 186., S. hexandra Ehrh. Beitr. 7. p. 138., ad quam S. Russeliana Smith. trahitur, cum nostra specie coniungi nequit. Salicis hexandrae specimen authenticum nondum vidi.

Salix fragilior Host., S. fragilissima, S. excelsior et S. palustris eiusdem auctoris sunt modificationes Salicis fragilis. S. fragilis Host. (mascula planta,) ad S. cuspidatam pertinere videtur; specimen vivum horti nostri nondum floruit.

S. viridem Friesii cl. auctor mecum communicavit; est species ab omnibus his diversa.

4. **S. alba** (L. sp. 1449.) *diandra*, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, squamis concoloribus deciduis, capsulis ovato-acutatis obtusis glabris, denique subpedicellatis, *pedicello nectarium brevissimum vix aequante*, stylo brevi, stigmatibus crassiusculis emarginatis, *foliis* lanceolatis acuminatis serrulatis *utrinque sericeis*, stipulis lanceolatis. ♄. Cum antecedente ad ripas. April. Mai. Salix alba Willd. sp. pl. 4. 710. St. h. 25. Folia pedunculorum plerumque glabra sunt margine ciliato. Variat foliis magis minusve albo-sericeis, et

β. caerulea, foliis adultioribus glabratis: S. caerulea Smith. in engl. bot. t. 2431.

γ. vitellina, ramulis vitellinis vel lacte miniatis: S. vitellina Linn. sp. pl. 2. 1442. (secund. synonyma,) et omnium auctor. germanicor. Haec surculis propagatur.

Sect. II. Amygdalinae. Squamae amenti concolores, luteo-virides, persistentes.

Amenta ut in sectione antecedente, sed squamae persistunt. Glandula nectarifera duplex. Capsulae brevius longiusve pedicellatae. Stam. 2-3, basi paulum cohaerentia ibidemque hirsuta. Folia lanceolata vel oblongo-lanceolata acuminata glaberrima, vel iuniora pilis adpressis sericeis adspersa, adulta vero glabrata. Frutices altiores, saepe arborescentes, ramis vimineis.

5. **S. amygdalina** (L. sp. 1443.) triandra, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis persistentibus concoloribus apice glabris,* capsulis ovato-conicis obtusiusculis glabris pedicellatis, pedicello nectarium bis terve superante, stylo brevissimo, stigmatibus horizontaliter divergentibus emarginatis, foliis lanceolatis oblongisve acuminatis serratis glaberrimis, stipulis semicordatis. ♄. Ad ripas et in paludosis. April. Mai. Cl. Wahlenbergio praeeunte nomen S. amygdalinae praetuli. Multifarie et foliorum latitudine et paginae inferioris colore variat: occurrit nempe foliis ovato-lanceolatis, oblongo-lanceolatis et lineari-lanceolatis, basi rotundatis et basi attenuatis, subtus viridibus, pallidius quidem, quam in pagina superiore, sed viridibus et splendentibus nec ullo modo glaucescentibus, atque subtus glaucis et niveo-glaucis opacis absque ullo nitore, vel medio glaucis opacis, basi apiceque viridibus et splendentibus; nulli inter tot modificationes limites reperiri possunt. Caeterum varietas foliis subtus glaucis, simili modo angustioribus, latioribus basi rotundioribus, vel magis attenuatis occurrit, quam varietas, cuius folia subtus virent splendentque. Squamae amenti nunc pedicello longiores, nunc eundem aequantes, nunc breviores etiam apparent. Varietas:

α. discolor, foliis subtus glaucis: S. amygdalina L. l. c. (in Suecia folia subtus semper glauca: Fries. nov. mant. 1. p. 42.) S. triandra St. h. 25. S. Villarsiana Willd. sp. pl. 4. 655., S. amygdalina Vill. delph. 3. 763., si folia elliptica et minora, pollicaria vel sesquipollicaria, qualia praecipue specimina in subalpinis enata proferunt. S. Hoppeana Willd. sp. pl. 4. p. 454., si folia lanceolata basique attenuata et si amenta plerumque apice feminea basi mascula sunt. Quandoque stamen intermedium florum superiorum in ovarium perfectum mutatur et bina lateralia immutata servantur, quo verus fit flos hermaphroditus diandrus monogynus.

β. concolor, foliis subtus viridibus vel paulum glaucescentibus: S. triandra L. sp. 1442., secund. Smith. brit. p. 1044. Salicem triandram suam Linnaeus inter plantas suecicas non enumerat.

S. sempervirens Host., S. speciosa et S. tenuiflora eiusdem auct. sunt modificationes varietatis *α.*; et S. ligustrina Host. et S. alopecuroides Tausch. pl. sel. varietatis *β.*

6. **S. undulata** (Ehrhart. Beitr. 6. p. 101.) triandra, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis persistentibus concoloribus tomentosis apice barbatis,* capsulis ovato-conicis pubescentibus glabrisve pedicellatis, *pedicello nectarium bis superante,* stylo elongato, stigmatibus bifidis, foliis lanceolatis longe acuminatis serrulatis pubescentibus denique glabratis, stipulis semicordatis. ♄. Ad ripas Germ. septentrionalis, (vom Harze an nördlich.) April. Mai. Varietas:

α. ovariis pubescentibus: S. undulata Ehrh. l. c., secund. specimina sicca authentica a. b. Mertens. mecum communicata. Hanc vivam nondum vidi; S. undulata hortor. bot., etiam Goettingensis, ad S. hippophaëfoliam pertinet.

β. lanceolata, ovariis glabris, (foliis planis, non undulatis:) S. lanceolata Smith. engl. bot. vol. 20. t. 1436. G.

7. **S. hippophaëfolia** (Thuillier. fl. par. p. 514.) diandra, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *squamis persistentibus concoloribus tomentosis apice barbatis,* capsulis ovato-conicis tomentosis glabrisve pedicellatis, *pedicello nectarium aequante,* stylo elongato, stigmatibus bifidis, foliis lanceolatis, longe acuminatis, minute glanduloso-denticulatis, pubescentibus, denique glabratis,

stipulis semieordatis. ♄. Ad ripas et vias humidas, (Rhein-, Main- u. Nahegebiet, Böhm. u. Schles., bei Bremen.) April. Mai. S. hippophaëfolia Thuill. secund. specimen e manu auctoris. Sering. sal. exs. n. 44., (excl. syn.) S. violacea Hollandr. fl. de la moselle. (non Willd.) Foliorum margo repando-obsolete denticulatus est et denticuli fere e sola glandula constant; in S. undulata Ehrh. evidenter serrulata sunt. Amenta S. hippophaëfoliae insuper omnibus partibus dimidio minora et ovaria brevius pedicellata sunt. Variat:

α. planifolia, ovariis cano-tomentosis et foliis planis.

β. undulaefolia, ovariis cano-tomentosis vel pubescentibus et foliis pulchre undulatis: S. undulata hort. Goetting. (vivam ex hoc fonte acceptam habeo.) S. undulata Ehrh. secund. Treviran. in observat. bot. p. 17. Ehrhartus fortasse hanc et antecedentem, quae plantae sibi valde similes sunt, ut species non distinxit.

γ. leiocarpa, ovariis glabris. G.

Sect. III. Pruinosae. Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia, etiam fructifera, sessilia. Antherae defloratae luteae. Cortex interior aestate citrinus.

Amenta prorsus sessilia, praecocia, basi foliis parvis squamaeformibus fulta. Capsulae sessiles vel breviter pedicellatae. Filamenta 2, libera. Folia lanceolata, longe acuminata, nitida, iuniora quandoque pube, denique evanescente, tecta, adulta glaberrima. Rami saepe pruina caesia, facile detergenda, obducti. Cortex interior aestate et autumno citrinus. Frutices altiores vel arbores, laete virides.

8. **S. acutifolia** (Willdenow. sp. 4. p. 688.) amentis sessilibus minute bracteatis, capsulis ovato-conicis glabris sessilibus, nectario ovarii basin superante, stylo elongato, stigmatibus lineari-oblongis, foliis lineari-lanceolatis longe acuminatis serratis ramulisque iunioribus glabris, *stipulis lanceolatis acuminatis.* ♄. Ad ripas, (in Schlesien u. bei Berlin, Pommern, Preussen.) Mart. S. violacea Smith. in Rees. cycl. n. 38. (non Willd.) Cortex ramorum atro-sanguineus, rore denso et caesio obductus. Simillima sequenti est, tamen crescendi modo et foliorum stipularumque forma differt et speciem propriam, me iudicante, efficit. G.

9. **S. daphnoides** (Villars. delph. 3. 765.) amentis sessilibus minute bracteatis, capsulis ovato-conicis glabris sessilibus, nectario ovarii basin superante, stylo elongato, stigmatibus oblongis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glanduloso-serratis glabris, iunioribus ramulisque tenellis villosis, *stipulis semicordatis.* ♄. In convallibus subalpinis, in planities cum fluviis descendens; in paludosis Germ. sept., (am Rheine bis Pforzheim, an den übrigen Flüssen bis zur Donau hinab; sodann in d. Flächen des nördl. Deutschlands.) Mart. April. Variat ramis rore caesio obductis eoque destitutis, ramulis iunioribus subglabris et valde hirsutis, amentis femineis villosissimis, villis stigmata aequantibus, et minus villosis, villis brevioribus, foliis latioribus et angustioribus. S. praecox Hoppe in Sturm. D. fl. 1. 25. Willd. sp. pl. 4. 670., forma vulgaris ramulis glabris. Varietas ramulis hirsutis: S. cinerea Willd. sp. pl. 460. sec. Link. en. h. berol. 2. p. 414. Varietas foliis angustioribus, amentis tenuioribus: S. pomeranica Willd. en. suppl. 66. (vivam possidemus ex horto berolinensi.) — Gemmae floriferae autumno praegrandes, quae S. praecox gemmata Ser. sal. exsicc. n. 83.

Sect. IV. Purpureae. Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia sessilia, ante folia evoluta. *Antherae purpureae, defloratae nigrae.* Cortex interior aestate citrinus.

Amenta lateralia praecocia sessilia, basi foliis parvis squamaeformibus fulta, fructifera vix breviter pedunculata. Capsulae sessiles vel breviter pedunculatae. Folia anguste lanceolata, vel etiam obovato-lanceolata, serrulata, glabra, vel iuniora pilis adpressis sericeis adspersa, serius evanescentibus. Frutices altiores, saepe arborescentes, glauco-vel obscurius virides.

10. **S. Pontederana** (Schleicher. cat. 1809.) *monadelpha*, amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ovato-lanceolatis pedicellatis tomentosis, *pedicello nectarium aequante*, stylo mediocri, stigmatibus ovatis emarginatis, foliis obovato-lanceolatis serrulatis glabris, iunioribus pubescentibus, stipulis semicordatis. ♄. In sylvis montanis, (in Böhm., Benesch; in Unteröstreich, Host; Krain, Graf; südl. Tyrol, Facchin.; Kitzbichel im nördl. Tyrol, Traunsteiner; Schweiz, Schleich.) Mart. April. S. Pontederana Willd. sp.

4. 661., (descriptio, sed non synonyma,) secund. Schleich. S. discolor Host. a. 2. 645. et S. austriaca Host. l. c. 646.

11. **S. purpurea** (L. sp. 1442.) *monandra filamentis connatis*, amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ovatis sessilibus tomentosis, *nectario ovarii basin superante*, *stylo brevi*, stigmatibus ovatis, *foliis* lanceolatis sursum latioribus acuminatis *argute serrulatis glabris planis*. ♄. Ad ripas, in pascuis humidis, subalpina adscendens. Mart. April. Salix purpurea Linn. sp. 1442. St. h. 25. S. monandra Hoffm. sal. p. 18. t. 1. f. 1. 2. et sq. Variat, uti S. aurita aliaeque, truncis humilioribus et altioribus, ramis erectioribus et magis divaricatis, purpurascentibus, corallino-purpureis, vitellinis et griseo-fuscis, foliis lineari-lanceolatis elongatis, et latius lanceolatis, vel obovato-lanceolatis brevibus; amentis, praecipue femineis, gracillimis et duplo crassioribus, parce villosis et hirsutissimis, stylo, ut in multis aliis, paullo evidentiore et subnullo, stigmatibus roseis vel flavis, brevioribus vel paullo longioribus. Inter omnes has modificationes et varietates nulli limites reperiuntur. Varietas:

α. trunco humiliori, ramis magis divaricatis, amentis gracillimis est: S. purpurea Smith.! brit. p. 1039. Willd. sp. pl. 4. 672. In specimine Smithiano herbarii Mertensii stylus manifeste conspicitur.

β. Lambertiana, amentis duplo crassioribus, foliis maioribus latioribus; caetera ut in varietate antecedente: S. Lambertiana Smith. brit. p. 1041.

γ. Helix, ramis erecto-patulis, foliis magis elongatis: S. Helix L. sp. 1444. Smith. brit. 1040.

δ. monadelpha, staminibus ad medium tantum connatis, non ad apicem ut in forma vulgari: Koch. comment. p. 26.

ε. sericea, folia iuniora pube densa sericea, serius tamen evanescente tecta: S. monandra sericea Ser. sal. helv. p. 8. — Varietatem squamis apice lateritiis misit b. Günther.

ζ. androgyna, amenta pro parte mascula et feminea: S. mirabilis Host. a. 2. p. 641.

Salix mutabilis Host., S. oppositifolia Host. et S. carniolica Host. sunt modificationes.

12. **S. rubra** (Hudson. fl. angl. p. 423.) *monadelpha*, amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ovatis sessilibus tomentosis, *nectario ovarii basin superante*, *stylo elongato*, stigmatibus oblongo-linearibus filiformibusve, *foliis* elongato-lanceolatis acuminatis *repando-denticulatis margine subrevolutis pubescentibus adultis glabratis*, stipulis linearibus. ♄. Ad ripas et in locis humidis. Mart. April. S. fissa Ehrh. arb. n. 29. Hoffm. sal. t. 13. 14. S. membranacea Thuill.! par. 515. S. virescens Vill. delph. 3. p. 385. secundum DC. fl. fr. 5. p. 349. S. concolor Host.! fl. a. 2. 639. S. olivacea Thuill.! l. c. forma foliis latioribus. Variat staminibus ad medium circiter connatis et, raro quidem, ad apicem usque connatis. Posterior est frutex masculus S. Forbyanae Smith. brit. 1041. Variat porro stigmatibus oblongo-linearibus: S. rubra Sm.! brit. 1042. et stigmatibus elongatis filiformibus; si filamenta ad apicem usque connata sunt: S. Forbyana Sm. l. c. frutex femineus:

β. sericea, foliis, etiam adultis, pagina inferiore pube densa sericea tectis: S. elaeagnifolia Tausch. pl. sel.

Sect. V. Viminales. Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia sessilia praecocia vel subcoaetanea. Antherae defloratae luteae. Capsulae sessiles vel brevissime pedicellatae, pedicello nectarium haud superante. Cortex interior virescens.

Amenta prorsus sessilia, praecocia vel subcoaetanea, basi foliis parvis squamaeformibus fulta, fructifera quandoque breviter pedunculata, bracteis in folia, minuta tamen, nec multum aucta, mutatis. Stam. libera, rarius basi connata. Folia elongata, integerrima, vel minute denticulata, subtus tomentosa. Frutices plerumque elatiores erecti, haud raro arborescentes, et tunc S. viminalis inter omnes eminet, atque pulchritudine omnes superat. Rami exquisite viminei.

13. **S. mollissima** (Ehrhart. Beitr. 6. p. 101.) *amentis sessilibus* vel bre-

viter pedunculatis basi bracteatis, capsulis ovatis conicis tomentosis sessilibus, *nectario ovarii basin superante*, stylo elongato, stigmatibus linearibus bifidis pilos squamarum aequantibus, *foliis elongato-lanceolatis* acuminatis remote repando denticulatis *iunioribus subtus tenuiter tomentosis*, stipulis ovatis acutis. ♄. Ad aquas et ripas Germ. septentrionalis, (v. Westphalen bis Pommern u. Schlesien stw.) April. S. mollissima Willd. sp. pl. 4. p. 707. (non Smith.) Wahlenberg. fl. carpat. p. 317. S. pubera Koch. apud Bönningh. flor. monaster. Novo nomine hanc speciem proposui, quum S. acuminatam Smithii pro mollissima Ehrharti haberem. — A S. viminali facile distinguitur pube foliorum tenuiore lutescente opaca, amentis laxioribus, squamis lutescenti-ferrugineis, pilis sordide albis longitudine stigmatum bifidorum. In S. viminali folia subtus albo-sericea, squamae nigro-fuscae, pili argentei sunt, ultra quos stigmata filiformia, indivisa tota eminent. — S. mollissima Sm. foliis oblongo-lanceolatis et multo latioribus, stipulis ovato-semilunatis et capsulis pedicellatis totoque habitu diversa est; S. mollissima Ehrh., hic proposita, multo propius ad S. undulatam et hippophaëfoliam accedit, a quibus vero differt ovariis sessilibus et foliis subtus evidentius pubescentibus, iunioribus tenuiter tomentosis. G.

14. **S. viminalis** (L. sp. 1448.) *amentis sessilibus* basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis sessilibus, *nectario ovarii basin superante*, stylo elongato, stigmatibus filiformibus indivisis, pilis squamarum stylo brevioribus, *foliis elongato-lanceolatis* acuminatis integerrimis subrepandis *subtus nitide sericeis*, *stipulis* lanceolato-linearibus *petiolo brevioribus*. ♄. Ad ripas et in dumetis humidis. Mart. April. St. h. 25. Squamae amenti nigro-fusci, pilis argenteis.

15. **S. stipularis** (Smith. brit. 1069.) *amentis sessilibus* basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis brevissime pedicellatis, *nectario ovarii basin superante*, stylo elongato, stigmatibus filiformibus indivisis, pilis squamarum stigma subaequantibus, *foliis elongato-lanceolatis* acuminatis integerrimis subrepandis *subtus* tomentosis *subnitidis*, *stipulis* e semicordata basi *lanceolato-attenuatis petiolum aequantibus*. ♄. Ad ripas, et in dumetis humidis, (in Unteröstr.; Schlesien u. a. d. Insel Norderney.) Mart. April. S. stipularis Koch. comment. p. 29. (non Sering.) S. longifolia Host. a. 2. p. 645. planta feminea. — Salici viminali proxima, cum S. grandifolia nullam similitudinem habet; a priori differt amentis duplo et crassioribus et longioribus, villosioribus, tomento in pagina foliorum inferiore minus adpresso, hinc non adeo nitido, (novella folia tantum indumentum nitidum habent,) et stipulis in surculis vegetis e basi semicordata longe acuminatis et denticulatis, praecipue basi. A sequente S. Smithiana differt forma foliorum ut Salicis viminalis, ovariis brevissime pedicellatis vel sessilibus, et stipulis rectis nec semilunari-curvatis.

16. **S. Smithiana** (Willd. en. h. berol. 2. p. 1008.) amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium aequante*, *stylo stigmatibus breviore*, stigmatibus filiformibus saepe bipartitis, *foliis* oblongo-lanceolatis lanceolatisve acuminatis undulato-subcrenatis minutissime denticulatis *subtus tomentosis*, *tomento subsericeo*, stipulis reniformi-semicordatis acuminatis. ♄. Ad ripas et in sepibus subhumidis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.; im Glahn- u. Nahethal d. Rheinpfalz, Bremen, Hamburg, Schlesien.) Mart. April. S. mollissima Sm. brit. 1070. S. Smithiana Koch. in Regensb. bot. Ztg. 3. 1. p. 276., modificatio ramis intense rubrofuscis; S. mollissima Koch. l. c. modif., ramis testaceis; S. lanceolata Fries. nov. ed. 2. p. 283. mant. 1. p. 61. (non Smith., nec Sering.) G.

17. **S. acuminata** (Smith. brit. 1068.) amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis pedicellatis, pedicello nectarium aequante, *stylo longitudine stigmatum*, *stigmatibus filiformibus indivisis*, *foliis* oblongo-lanceolatis acuminatis margine subundulatis minute glanduloso-denticulatis *subtus glaucis tomentosis*, *tomento opaco*, stipulis reniformi-semicordatis acutis. ♄. Ad ripas, in humidis, (bei Kaiserslautern in d. Rheinpfalz nur 1 Stock vom Männchen gefunden; Westphal.; Hannov.; Lausitz;

Schles.; Unteröstr.) April. S. acuminata Meyer. chlor. Hannov. p. 491. (non Hoffm., nec auctor. germ.) S. longifolia Host. fl. a. 2. p. 645., planta masc. secund. spec. ex horto vindob. Foliorum margines magis paralleli, quam in antecedente, et folia rigidiora, tomentum in adultis opacum. Variat:

β. virescens, tomento paginae inferioris foliorum tenuissimo vel fere toto evanescente: S. acuminata *α.* virescens Meyer. l. c. — Fruticem femineum huius speciei nondum vivum videram, quum in commentatione mea de Salic. europaeis hanc cum antecedente confudi. G.

Sect. VI. Capreae. Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia, florifera sessilia, basi foliis parvis fulta, (fructifera plus minusve pedunculata pedunculo, foliis auctis vestito. Antherae defloratae luteae. Capsulae pedicellatae, pedicello nectarium saltem bis superante.

18. **S. Seringeana** (Gaudin. fl. helv. 6. p. 251.) *amentis sessilibus arcuatis* basi bracteatis, *capsulis* ex ovata basi lanceolatis *tomentosis* pedicellatis, *pedicello nectarium bis superante, stylo elongato,* stigmatibus bifidis, foliis lanceolato-oblongis acuminatis crenulatis subtus albo-tomentosis rugoso-venosis, stipulis ovatis acutis. ♄. Ad rivulos in convallibus subalpinis, (Schweiz; Tyrol; Krain.) April. S. Seringeana Gaud. ap. Sering.! sal. helv. p. 37. S. lanceolata Ser. l. c. DC. fl. fr. 5. p. 348. (non Smith.) S. holosericea Ser. sal. exsicc. n. 70. (nec Willd.) S. Kanderiana Ser. sal. exsicc. n. 42. S. longifolia Schleich.! cat. (non Mühlenberg.) S. intermedia Host. fl. a. 2. p. 644. — S. canescens Willd. herbar. n. 18174., composita est e ramo foliifero S. acuminatae Sm. et florifero masculo S. Seringeanae. S. canescens Fries. ab his diversa est. — Nomen Salicis lanceolatae, utpote nimium ambiguum, non adhibui, idque eo magis, quod folia sensu stricto non lanceolata sunt.

19. **S. salviaefolia** (Link. apud Willd. sp. 4. 688.) *amentis sessilibus arcuatis* basi bracteatis, *capsulis* ex ovata basi lanceolatis *tomentosis* pedicellatis, *pedicello nectarium bis superante, stylo brevi,* stigmatibus oblongis subintegris, foliis oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis obsolete denticulatis subtus incano-tomentosis ruguloso-venosis, inferioribus obtusis, stipulis semicordatis acutis. ♄. In paludosis, (in d. Eymatte bei Bern; südl. Tyrol.) April. Mai. S. patula Sering.! sal. helv. p. 11. S. oleifolia Ser. sal. exsicc.! n. 1. S. oleaefolia Vill. delph. 3. 784.? S. Flüggeana Willd. sp. pl. 4. 709., ex specimine ab ipso Flügg.! in herbario Mertensii.

20. **S. incana** (Schrank. baier. fl. 1. 230.) *amentis subsessilibus arcuatis* basi bracteatis, *capsulis* ovato-lanceolatis *glabris* pedicellatis, *pedicello nectarium bis superante, stylo elongato,* stigmatibus bifidis, squamis subglabris breviter ciliatis, foliis lanceolato-linearibus acuminatis denticulatis, subtus tomentoso-incanis. ♄. In convallibus interalpinis, cum fluviis in planities descendens, (dch. d. g. Alpenk. u. v. da in die Ebenen, doch am Rheine nicht weiter als Pforzheim u. a. d. übrigen Flüssen bis an d. Donau; im Technischen an d. Weichsel, Schles.) April. Mai. S. riparia Willd. sp. pl. 698. St. h. 25. S. lavandulaefolia Lapeyr. abr. p. 601. Sering.! sal. helv. p. 70. S. angustifolia Poiret. in Duh. arboret. ed. 3. t. 29. (non Willd.) S. rosmarinifolia Gouan. hort. 501. Host. syn. p. 529. (non Linn.) S. Elaeagnos Scop. carn. 2. p. 257.?

21. **S. holosericea** (Willdenow. sp. 4. p. 708.) amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium bis terve superante,* stylo brevissimo, stigmatibus ovatis emarginatis, *foliis lanceolatis* acuminatis apicem versus *attenuatis arguteque denticulatis subtus tomentosis,* stipulis semiovatis obtusis. ♄. Ad ripas et in pratis humidis, (Gegend v. Göttingen u. um Treptow bei Berlin.) Mart. April. S. holosericea Willd. sp. pl. 4. p. 708. S. velutina Schrad. secundum specimina ex horto Gottingensi in herbario Mertensiano. — Rami, gemmae et amenta ut S. cinereae L., (S. acuminatae auct. germ.) adeoque similia sunt, ut vix discerni queant, sed folia conspicue differunt. G.

22. **S. cinerea** (L. sp. 1449.) amentis sessilibus basi bracteatis, capsulis

ex ovata basi elongato-lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium quater superante*, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis ellipticovel lanceolato-obovatis* breviter acuminatis *planis undulato-serratis cinereoviridibus supra pubescentibus subtus tomentoso-hirtis, stipulis reniformibus, gemmis incanis.* ♄. In pascuis dumetisque humidis. Mart. April. Salix cinerea Wahl. fl. suec. n. 1137. S. acuminata Hoffm. sal. p. 39. S. cinerea Sm. engl. fl. 4. 215., excl. syn. Villars. S. polymorpha Host. a. 2. p. 646. S. Hoffmanniana Bluff. et Fingerh. p. 568. — Foliis cinereo-viridibus, ramulis crassiusculis cano-tomentosis, gemmis incano-pubescentibus hanc speciem primo intuitu a Salice aurita, quacum confunditur, dignoscimus. — Variat foliis oblongo-lanceolatis et

β. obovatis: S. aquatica Sm. brit. 1065.

Salicis oleaefoliae specimina duo mecum communicavit b. amic. Mertens., in horto D. Anderson. decerpta, quae varietatibus angustifoliis S. cinereae adnumero, sed dubito, num ad veram plantam Smithianam pertineant. — Varietas amentis androgynis: S. Timmii Schk. Handb. p. 249.

23. **S. nigricans** (Fries. nov. mant. 1. p. 52.) *amentis sessilibus, fructiferis breviter pedunculatis* basi minute foliatis, capsulis ex ovata basi subulatis pedicellatis, *pedicello nectarium bis terve superante, stylo elongato,* stigmatibus bifidis, *foliis* ovatis ellipticis lanceolatisve *undulato-serratis subtus cinereis apice utplurimum viridibus, iunioribus ramulisque hirto-pubescentibus* denique glabratis, stipulis semicordatis apice recto. ♄. In nemoribus humidis, pratis uliginosis convallium subalpinarum et in planitiebus alpes comitantibus, (dch. d. g. Alpenk. u. mit d. Rheine bis Rastadt, mit den übrigen Flüssen bis zur Donau; auf d. Hetzles bei Erlangen; um Hamburg; in Ostpreussen.) April. Mai. S. phylicifolia Koch. comment. salic. p. 40. Occurrit ovariis glabris vel glabris et lineolis 2 pilosis: S. stylaris Sering. sal. helv. 62. S. phylicifolia Wahlenb. fl. lapp. n. 482. Wulf. in Jacq. collectan. 2. 139., non S. Wulfeniana Willd. S. hastata Hopp. pl. rar. cent. 4. Schk. t. 317. S. Amaniana Willd. sp. 4. 663. St. h. 25. S. Andersoniana Sm. engl. bot. t. 2343. Ad hanc vel ad sequent. variet. pertinent: S. menthaefolia Host. fl. a. 2. 649. S. rivalis Host. l. c. S. prunifolia Host. l. c. et S. parietariaefolia Host. l. c. 650. S. ovata Host. l. c. p. 648. et S. aurita Host. l. c.

β. eriocarpa, ovariis totis tomentosis vel hirtis basive macula glabra notatis: S. nigricans Wahlenb. fl. lapp. n. 485. S. rupestris Smith. engl. bot. 2342. S. Forsteriana Sm. engl. bot. t. 2343. S. hirta Sm. engl. bot. t. 1404. S. cotinifolia Sm. engl. bot. t. 1403. S. Halleri Ser. sal. exs. n. 51. — Enumerationem voluminosam specierum Schleicherianarum hic praetereo. — Forma foliorum vulgaris elliptica est, sed et lanceolata occurrunt basi apiceque attenuata, oblonga, ovata, basi rotundata, subcordata, et fere subrotunda; plerumque undulato-serrata sunt, quandoque vero et integerrima, plus minusve pubescentia et hirta. Amenta plus minusve pedunculata, pedunculo foliis quidem evolutis, sed parvis obsito; interdum sessilia quoque et minute tantum bracteata sunt. — Variat insuper

γ. concolor, folia subtus viridia et nitida: S. nigricans *γ.* punctata Hartm. scand. fl. ed 3. p. 235.; sed S. punctata Wahlenb. fl. lapp. p. 269. t. 17. f. 1. ob pedunculos amentorum gemmiferos, qua nota ad Salicem retusam accedit, ab illa omnino differt; conf. Regensb. bot. Ztg. v. 23. p. 79.

In commentatione mea de Salicibus europaeis Floram lapponicam cl. Wahlenbergii secutus sum, qui Salicis nigricantis varietatem leiocarpam sub nomine Salicis phylicifoliae proposuit. Huic S. nigricantem, quae non nisi indumento fructus diversa est, addidi. Postea vero cl. Fries. aliam S. phylicifoliam protulit; conf. subtus n. 29.

24. **S. silesiaca** (Willd. sp. pl. 4. 660.) amentis sessilibus, capsulis ex ovata basi lanceolatis glabris sericeisve pedicellatis, *pedicello nectarium ter quaterve superante,* stylo mediocri, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis obovatis* acuminatis *undulato-serratis subtus subconcoloribus, adultis glaberrimis* infimis

obtusissimis, stipulis reniformi-semicordatis. ♄. In sylvis submontanis et subalpinis, (Sudet., Gesenke u. d. Mähr. Carpat., nach Maly in Steyerm.) Mai. Jun. in horto praecocius. Occurrit ovariis glabris: S. silesiaca Willd. sp. pl. 4. p. 660.; et

β. criocarpa, ovariis tomento sericeo tectis: S. fagifolia Willd. sp. pl. 4. p. 704. — S. Capreae proxima, sed evidenter discrepat foliis adultis glaberrimis, tenuioribus, subtus vix vel parum tantum glaucescentibus, amentis multo gracilioribus, fructiferis magis laxifloris, capsulis dimidio minoribus, stylo subelongato. G.

25. **S. grandifolia** (Sering. sal. helv. p. 20.) amentis sessilibus fructiferis pedunculatis basi subfoliatis, capsulis ex ovata basi elongato-lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium sexies superante*, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis oblongo-obovatis* acuminatis *planis obsolete undulato-serratis glabris subtus cinereo-glaucis pubescentibus*, stipulis reniformibus, *gemmis glabris*. ♄. In sylvis subalpinis, (dch. d. g. Alpenk.; auf d. Feldberge d. Schwarzw.) Mart. Apr. S. stipularis Ser. sal. exsicc.! nec Smith. — Gemmae denique totae glabrae, pedicellus capsulam fere aequans; a S. cinerea differt amentis initio brevioribus et subovatis, ut in S. Caprea, foliis multo maioribus, supra glabris, intense sed laete viridibus, et ramulis adultis glabris; a S. Caprea, cuius fortasse varietas est, praecipue foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis, postremo subtus fere glabris, et stipulis in surculis vegetis omnium maximis. Seorsum proposui, ut ulterius observetur. — S. cinerascens Willd. sp. 4. 706., e paludibus Lusitaniae nondum vidi, specimen vero herbarii Willd. n. 18211., in Pyrenaeis a b. Flüggio lectum, ad S. phylicifoliae Fries., (S. arbusculae Wahlenberg.) modificationem foliis oblongis pertinet.

26. **S. Caprea** (L. sp. 1448.) amentis sessilibus basi minute bracteatis, capsulis ex ovata basi elongato-lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium quater — sexies superante*, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis* ovatis ellipticisve planis *recurvato-acuminatis obsolete undulato-crenatis supra glabris subtus glaucis tomentosis*, stipulis reniformibus, *gemmis glabris*. ♄. In sylvis et nemoribus. Mart. April. S. tomentosa Ser. sal. helv. p. 14. S. ulmifolia Thuill. par. p. 518. sec. DC. fl. fr. 5. p. 340. S. aurigerana Lap. abr. p. 598. Folia supra glabra nitida, subtus magis et mollius tomentosa, quam in affinibus, plerumque elliptica, saepe tamen et subrotunda, basi quandoque cordata, vel basin versus angustata occurrunt. Rami cum gemmis crassi et glabri. Variat foliis iunioribus utrinque tomentosis et ramulis iunioribus pubescentibus, foliisque integerrimis: S. sphacelata Willd. sp. 4. 702.; variat porro foliis integerrimis obovato-oblongis S. Caprea *β.* sphacelata Wahlenb. carp. p. 319.

27. **S. aurita** (L. sp. 2446.) amentis sessilibus, fructiferis pedunculatis basi subfoliatis, capsulis ex ovata basi elongato-lanceolatis tomentosis pedicellatis, *pedicello nectarium ter quaterve superante*, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis emarginatis, *foliis obovatis* vel oblongo-obovatis *recurvato-apiculatis undulato-serratis rugosis* superne pubescentibus *subtus glaucis tomentoso-hirtis*, stipulis reniformibus, *gemmis glabris*. ♄. In pascuis, pratis et sylvis humidis. April. Mai. S. rugosa Sering.! sal. helv. p. 18. S. uliginosa Willd. en. h. berol. p. 1007., (forma elatior, foliis obovatis.) S. aurita Willd. l. c., (forma humilior, foliis subrotundo-obovatis, dimidio minoribus.) S. heterophylla Host. a. 2. p. 650. — Singularis varietas est staminibus in quavis squama geminis ternis quaternisve, ultra medium in unum connatis: S. eladostemma Hayn. dendr. fl. p. 191. cum icone. — Ramis multo tenuioribus, amentis et gemmis minoribus, foliis rugosis, haec species a tribus praecedentibus praecipue differt; ramosissima est, ramis divaricatis. Variat rarius gemmis pubescentibus.

28. **S. depressa** (L. fl. suec. ed. 2. p. 352., secund. Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 56.) amentis fructiferis pedunculatis, pedunculo foliato, *capsulis* ex ovata basi elongato-lanceolatis *tomentosis* pedicellatis, *pedicello nectarium*

quinquies superante, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis obovatis* ellipticisve *integerrimis* vel remote-obtuse-serratis *subtus glaucescentibus velutinis pubescentibusve vel adultis glaberrimis, stipulis reniformibus.* ♄. In paludibus spongiosis, (bei Tschirnau in Schles., flor. siles.; bei Kapkeim in Ostpreussen, v. Duisburg.) April. S. livida Wahlenb. lapp. p. 272. Koch. comment. d. sal. europ. p. 39. S. arbuscula *γ.* Linn. fl. suec. ed. 2. p. 348. sec. Wahlenb. S. Starkeana Willd. sp. 4. 677. Cl. Fries. enumerat:

α. velutina, foliis velutinis superne glabrescentibus: S. sphacelata Sm. brit. 1066. et foliis utrinque tomentosis: S. livida *β.* cinerascens Wahlenb. lapp. p. 273.

β. livida, foliis mox glaberrimis subtus livido-glaucis: S. livida *α.* Wahlenb. lapp. p. 272. t. 16. f. 6. S. foliolosa Afzel.

γ. bicolor, foliis mox glaberrimis subtus glaucis, haud lividis: S. bicolor Fries. nov. ed. 2. p. 284., excluso synon. Ehrharti.

S. depressa valde similis Salici auritae, sed amenta mascula graciliora, feminea magis laxiflora, et folia adulta plana glaberrima integerrima, surculorum iuniorum laetius vigentium vero obtuse undulato-serrata. G.

29. **S. phylicifolia** (L. sp. 1442., secund. cl. Fries.) *amentis sessilibus* basi bracteatis, fructiferis subpedunculatis basi subfoliatis, capsulis ex ovata basi elongato-lanceolatis tomentosis glabrisve, *pedicello nectarium bis terve superante, stylo elongato*, stigmatibus bifidis, *foliis* ovatis ellipticis lanceolatisve remote *repando-serrulatis integerrimisve subtus glaucis, adultis glaberrimis*, stipulis semicordatis apice obliquo. ♄. In humidis subalpinis, (auf d. Brocken u. im Riesengrunde d. Sudeten.) Mai. Jun. S. bicolor Ehrh. Beitr. 5. p. 162. Koch. syn. ed. 1. 653. Meyer. chlor. Hannov. p. 494., excl. syn. Wahlenberg. S. arbuscula Wahlenb. suec. p. 638., forma maior. S. arbuscula Koch. sal. europ. p. 44. S. phylicifolia Sm. brit. 1049. Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 50. (nec Wahlenb.) S. Weigeliana Willd. sp. 4. p. 678. — Modificationes sunt: S. radicans Sm. brit. 1053. et S. Dicksoniana Sm. in engl. bot. 1390. Aliae denuo examini subjiciendae sunt. — Variat:

β. laurina, folia ovali-oblonga, obscure viridia, non laete viridia ut in caeteris modificationibus huius speciei, subtus, ut novella utrinque, pubescentia, aetate vero glabra: S. laurina Smith. tr. of. linn. soc. v. 6. p. 122. Willd. sp. 4. p. 662. S. bicolor Smith. brit. 1048. S. phylicaefolia Fries. herbar. normal. fasc. 8. n. 60. Haec planta refert varietatem obscurius tinctam, qualem in S. triandra, S. viminali aliisque reperimus. Detecta fuit a cl. Petermann ad ripas in Saxonia, (an der Elbe u. zw. Schönfeld u. Abtnaundorf ohnweit Leipzig.) — Varietas:

γ. majalis, in Germania nondum observata, ovariis glabris, est sec. cl. Hartmanum: S. majalis Wahlenberg. fl. lapp. p. 270. S. tenuifolia Sm. brit. p. 1052. sec. specim. anglicum. S. petraea Anders. sec. specimen ab ipso auctore in collectione Mertensii. G.

30. **S. glabra** (Scop. carn. 2. p. 255.) *amentis pedunculatis, pedunculo foliato*, capsulis ex ovata basi subulatis pedicellatis glabris, *pedicello nectario subduplo longiore, stylo elongato*, stigmatibus bipartitis, *foliis* ellipticis obovatisve serratis *glabris lucidis* subtus glaucis, *stipulis nullis vel glandulaeformibus*, surculorum vegetiorum petiolo multoties brevioribus, *squamis* pilosis *denique* pubescentia decisa *glabris, staminibus a basi ultra medium villosis.* ♄. In subalpinis ad rivos et declivia humida, (Bayer. Alp.; Tyrol; Salzb.; Kärnthen; Krain; Steyerm.) Jun. Jul. Iam ante quatuordecim annos hanc speciem in alpibus bavaricis vivam observavi, et in bot. Zeit. 1830. 1. p. 140. et seq. characteres eius clare exposui. Specimina herbarii Willd. S. coruscantis et S. Wulfenianae accurate cum herbario meo comparavi, ita ut de his ne minimum quidem dubium supersit. S. coruscans Willd. sp. 4. 681. herbar. 18164. fol. 1. 3. 4., (fol. 2. est S. Waldsteiniana,) S. Wulfeniana Willd. sp. 4. 660. herbar. 18114. f. 1-8. et fol. 10.; (fol. 9. est S. hastata,) S. Wulfeniana Host. fl. a. 2. 652. St. h. 25. — Cl. Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 51. S. coruscantem Willd. cum S. majali Wahlenb. coniungit, a qua certe differt. G.

31. **S. Hegetschweileri** (Heer. in der fl. der Schweiz v. Heg. et H. p. 963.) *amentis denique pedunculatis, pedunculo foliato, capsulis* ex ovata basi subulatis pedicellatis glabris *pedicello tomentoso vel totis tenuiter tomentosis, pedicello nectarium bis superante,* stylo elongato, stigmatibus bipartitis, foliis ovalibus vel oblongo-obovatis serrulatis subtus glaucis, *stipulis* ramorum iuniorum semicordatis apice recto *petiolum aequantibus,* squamis villosis, villo amenti fructiferi non crispato persistente, filamentis glabris. ♄. In convallibus alpinis Helvet., (an der Reuss im Urserenthale unterhalb Hospendal gegen Andermatt, grosse Gebüsche bildend, u. bei Samaden u. Bevers im Engadin, Heer.) Jun. Jul. H.

32. **S. hastata** (L. sp. 1443.) amentis pedunculatis, pedunculo foliato, *capsulis* ex ovata basi subulatis pedicellatis *glabris, pedicello nectario subsesquilongiore, stylo elongato,* stigmatibus bifidis, *foliis* ovatis ellipticis lanceolatisve *glabris* serrulatis, stipulis semicordatis apice recto, *squamis villosissimis, villo elongato mox crispato-contracto,* filamentis glabris. ♄. In pascuis alpinis humidis, etiam in iugis siccioribus alpium altiorum, (dch. d. g. Alpenk.; a. d. Gesenke d. Sudeten; Harz im Stollberg.) Jun. S. hastata Koch. comment. d. salic. europ. p. 42., excl. var. Wulfeniana et plurib. syn. S. Ludwigii Schk. t. 316. S. hastata Willd. sp. 4. p. 664., fol. ovatis basi cordatis, (ramulus vegetus sterilis,) S. serrulata Willd. l. c. (planta florifera.) S. malifolia Sm. brit. 1053., fol. obovato-oblongis profundius serratis. S. elegans Host. fl. a. 2. 652. Villus elongatus et candidus amentorum florentium in hac specie insignis est. Villus contortus perstat, et hac nota, stipulis magnis staminibusque glabris hanc speciem a Salice glabra distinguimus.

33. **S. myrtilloides** (L. sp. 1446.) *amentis fructiferis longe pedunculatis,* pedunculo foliato, *capsulis* ex ovata basi lanceolatis *glabris* longe pedicellatis, *pedicello nectarium quater et pluries superante,* stylo brevi, stigmatibus ovatis emarginatis, *foliis* ovatis basi subcordatis oblongis lanceolatisve integerrimis *opacis glaberrimis* subtus reticulato-venosis, squamis amenti glabris ciliatisve, *stipulis semi-ovatis.* ♄. In ericetis paludosis et pascuis spongiosis, (in Schlesien bei Oppeln; in d. bayer. Alpen u. in d. Brüchern bei München.) Mai. Jun. S. elegans Besser. en. pl. volh. p. 77. Folia opaca, non nitida, cum ramulis iunioribus interdum pilosa adulta vero cum iisdem semper glaberrima. Foliorum forma valde variabilis: occurrunt scil. subrotundo-ovata basi subcordata apice obtusissima, ovata, oblonga, acuminata, et lanceolata utrinque acuta. Haec ultima forma S. repenti satis propinqua, dum aliae diversissimae occurrunt; sed foliis subcaesio-viridibus opacis glaberrimis statim dignoscitur. Variat (in Lapponia) capsulis pilosis. G.

34. **S. ambigua** (Ehrhart. Beitr. 6. p. 103.) amentis sessilibus fructiferis breviter pedunculatis, pedunculo minute foliato, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis longe pedicellatis, *pedicello nectarium ter quaterve superante,* stylo brevi, stigmatibus ovatis emarginatis, *foliis* ellipticis obovatis lanceolatisve *recurvato-apiculatis integerrimis* vel remote denticulatis *subtus rugoso-venosis* adpresse villosis subsericeis postremo glabratis, *stipulis semiovatis* rectis. ♄. In pratis spongiosis paludosis, pascuis humidis. April. Mai. S. ambigua Ehrh. l. c. et arb. n. 109.; (specimina Ehrhartiana authentica cum suecicis comparavi.) S. plicata Fries. nov. ed. 2. p. 284. S. incubacea L. sp. 1447., et Fl. suec. ed. 2. p. 351. secund. Fries. mant. 1. p. 66., sed descriptio Linnaeana non congruit, et b. Smith. sub nomine S. incubaceae in engl. fl. 4. p. 212., secundum specimina herbarii Linnaeani S. incubaceam auctor. germ. (S. angustifoliam Wulf.) describit. S. versifolia Ser. sal. helv. p. 40., non Wahlenberg. S. ambigua Willd. sp. 4. p. 700., foliis ellipticis. S. spathulata Willd. l. c., foliis obovatis. S. prostrata Sm. brit. 3. p. 1060., foliis lanceolatis. S. aurito-repens Wimm. fl. v. Schles. p. 446. fol. oblongo-obovatis; S. cinereo-repens Wimm. l. c. varietas foliis lanceolatis. Est quasi forma intermedia inter S. auritam et repentem; ab illa differt foliis minus rugosis integerrimis vel minute denticulatis subtus subsericeis, stipulis semio-

vatis apice recto, et statura multo minore; a posteriore foliis subtus rugoso-venosis et stipulis latioribus.

Salix versifolia Wahlenberg, quae secund. Fries. genuina Salix fusca Linnaei est, Lapponiam inhabitat; S. myrtilloidi propius accedit, at stylo elongato primo intuitu a S. ambigua Ehrh. distinguitur.

35. **S. repens** (L. sp. 1447.) amentis sessilibus fructiferis ovali-cylindricis breviter pedunculatis, pedunculo foliato, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis glabrisve longe pedicellatis, *pedicello nectarium bis terve superante*, stylo mediocri, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis* ovalibus ellipticis lanceolatisve *recurvato-apiculatis* margine subdeflexis integerrimis vel remote glanduloso-denticulatis *nitidis subtus sericeis*, *stipulis lanceolatis* acutis. ♄. In pratis vilioribus, pascuis humidis et arenosis, etiam siccis, inque paludosis spongiosis. April. S. repens Koch. comment. d. salicib. europ. p. 47. S. repens Willd. sp. 4. p. 693., foliis subtus glabriusculis. S. fusca Willd. l. c. p. 694., foliis subtus sericeis. S. depressa Hoffm. D. fl. 2. p. 226., non L. fl. suec. S. fusca Meyer. chlor. Hannov. p. 495. Figura foliorum a subrotundo-ovata per omnes modificationes in anguste lanceolatam transit, pubescentia nunc parca et folia fere glabra, nunc dense sericea in inferiore vel in utraque pagina foliorum, stipulae in surculis aestivalibus satis magnae, in aliis multo minores, in aliis nullae. Varietates praecipuae sunt sequentes.

α. vulgaris, foliis lanceolatis, capsulis tomentosis: S. repens Sm. brit. 3. 1061. sec. specim. ab ipso auct.

β. fusca, foliis oblongo-ovalibus capsulis tomentosis: S. fusca Sm. brit. 3. 1060. secund. specim. ab ipso auct. S. fusca Linnaei sec. cl. Fries. eadem est ac S. versifolia Wahlenberg.

γ. argentea, foliis lato-ovalibus vel ovali-subrotundis subtus vel supra subtusque sericeis, capsulis tomentosis: S. argentea Sm. brit. 3. p. 1059. S. arenaria L. suec. ed. 2. p. 351. secund. it. gotl. 206. S. lanata Thuill.!

δ. leiocarpa, foliis subtus sericeis, ovariis capsulisque glabris: S. fusca a. leiocarpa Meyer. chlor. Hannov. l. c.

ε. finmarchica, foliis glabris superioribus novellis sericeis, capsulis glabris: S. finmarchica Willd. en. suppl. p. 66. Willd. Berl. Baumz. p. 441. secundum specimina viva ex horto berolinensi, (non Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 68., quam auctor celeb. mecum communicavit et quam nunc S. campestrem vocat. Haec Salici myrtilloidi multo propior est, quam S. auritae et repenti.) Ad S. finmarchicam Willd. pertinet S. onusta Bess. en. pl. volh. p. 78. excl. var. *γ*.

Aliae varietates et modificationes sunt: S. parvifolia Smith. in Rees. cycl. n. 102. S. adscendens Sm. l. c. n. 103. S. incubacea et S. rostrata Thuill.

36. **S. angustifolia** (Wulf. in Jacq. collect. 3. p. 48.) amentis sessilibus fructiferis cylindricis breviter pedunculatis, pedunculo foliato, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis glabrisve longe pedicellatis, *pedicello nectarium bis terve superante*, stylo mediocri, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis elongato-lanceolatis* strictis acuminatis *apice recto margine subrevolutis* integerrimis vel remote glanduloso-denticulatis *subtus sericeis*, *stipulis lanceolatis*. ♄. In paludosis turfosis, (in Kärnthen u. Krain, Unteröstr., Mecklenburg, Schlesien u. im Besenhorst bei Hamburg, dort nicht selten, aber ausserdem nicht um Hamburg, Sonder.) Mai. S. angustifolia Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 65. S. incubacea Willd. sp. 4. p. 696. et herbarii Linnaeani, conf. Smith. engl. fl. 4. 212. et 213. S. pratensis Host. fl. a. 2. p. 642. S. rosmarinifolia *β.* incubacea Koch. comment. de sal. europ. p. 49. S. fusca c. longifolia Meyer. chlor. Hannov. 1. p. 497. S. laeta Schultz. starg. suppl. 51., varietas ramis vitellinis. — Folia duplo longiora, quam in S. repente, foliis Salicis viminalis haud absimilia; hac nota et apice foliorum recto a S. repente distinguitur, foliisque magis oblongo-lanceolatis et amentis ovalibus denique elongatis a S. rosmarinifolia. Aegre hae species describuntur, quae

vivae non difficile distinguuntur. — Nomen Salicis angustifoliae anteposui, quum cl. Fries. contendet, Salicem incubaceam Linnaeani eandem esse, ac suam S. plicatam. S. incubacea herbarii Linnaeani, ut supra annotavi, ad S. angustifoliam pertinet, nec ad S. plicatam. G.

37. **S. rosmarinifolia** (L. sp. 1148.) amentis sessilibus fructiferis subrotundis breviter pedunculatis, pedunculo foliato, capsulis ex ovata basi lanceolatis tomentosis longe pedicellatis, *pedicello bis terve nectarium superante*, stylo brevi, stigmatibus ovatis bifidis, *foliis linearibus* vel lineari-lanceolatis attenuato-acuminatis *margine planis apice rectis* integerrimis vel remote glanduloso-denticulatis *subtus sericeis, stipulis lanceolatis.* ♄. In paludosis spongiosis, (im nördl. Deutschl., in Schles., Böhm. u. um Wien.) Mai. S. rosmarinifolia Koch. comment. d. sal. europ. p. 48., excl. var. *β.* et *γ.* S. tenuis, S. parviflora Host. a. p. 642., et S. littoralis Host. p. 643. Multo minus variat haec species, quam S. repens, folia semper longiora longiusque attenuata sunt et quidem in acumen rectum. G.

38. **S. Doniana** (Smith. engl. fl. 4. p. 213.) monadelpha, amentis sessilibus fructiferis subpedunculatis basi minute foliatis, capsulis ovato-conicis tomentosis pedicellatis, *pedicellis nectarium bis superantibus, stylo brevissimo*, stigmatibus brevibus emarginatis, *foliis saepe oppositis lanceolatis vel obovato-lanceolatis acutis strictis apice rectis remote serrulatis supra nitidis subtus sericeis, pilis in adultis sparsis.* ♄. Ad margines pratorum humidorum, (bei Steinfurth in Westphalen, Sonder!; Unterharz, Wallroth.) Mai. Dom. Sonder. fruticem masculum tantum detexit, femineum ex Anglia vivum possideo. — Frutex erectus, 3-4 pedalis, S. purpureae valde similis, sed femineus capsulis pedicellatis, masculus antheris defloratis luteo-fuscis, neque atris, statim dignoscitur. Amenta breviora quam in hac, tamen cylindrica. G.

Sect. VII. Frigidae. Squamae amenti apice discolores. Amenta lateralia et, saltem fructifera, plus minusve pedunculata, pedunculo foliato. Antherae defloratae luteae vel fuscae. Capsulae sessiles vel breviter pedicellatae, pedicello nempe nectarium non superante.

Frutices ramosissimi, ramis senioribus torulosis, iunioribus vix vimineis. A Capreis differt haec sectio capsulis sessilibus vel breviter pedicellatis, a Viminalibus praecipue statura fruticis ramosissimi torulosi. Amenta quidem in plerisque distincte pedunculata apparent, at in S. Lapponum saepe sessilia quoque deprehenduntur; caeterum sola exceptio a regula, mihi quidem nota.

39. **S. arbuscula** (Linn. iudicio Laestadii, Friesii et Hartmani.) amentis pedunculatis, *pedunculo foliato*, capsulis ovato-conicis tomentosis sessilibus denique brevissime pedicellatis, *nectario basin capsulae superante*, stylo elongato saepe ad medium usque fisso, stigmatibus bifidis, *foliis glabris* lanceolatis acutis vel ovatis basi apiceque obtusis breviterque acuminatis remotius densiusve serratis supra nitidis *subtus glaucis opacis.* ♄. (Schweiz u. dch. d. g. Alpenk.) Jun. Jul. „Certissime haec primaria S. arbuscula L. est, teste quoque restitutore Laestadio, etiam Wahlenbergii fl. lapp., quae collatis veg. helv. et fl. carp. confirmatur. At excludenda var. multo maior, subsequentem“ (S. phylicifoliam) „potissimum spectans.“ Fries. nov. ed. 2. mant. 2. p. 50. Cl. Wahlenberg., quem in commentatione mea de salicibus europaeis secutus sum, sub S. arbuscula comprehendit „fruticem orgyalem“ S. bicolorem Ehrh., S. Weigelianam Willd., S. phylicifoliam Fries., et „fruticem humilem.“ S. Waldsteinianam W. et S. prunifoliam Sm. Illam pro S. arbuscula Wahlenb. habui; nunc vero, auctoritate cl. Friesii, sub hoc nomine duas ultimas propono, quum botanici praestantissimi, supra memorati, in eo conveniant, hanc esse veram Linnaeanam speciem, quamquam Linnaeus sub sua S. arbuscula 3 diversas species compre hendat, nempe varietatem *α.*, quam Wahlenberg. ad suam S. arbusculam, Friesius contra ad S. maialem trahit; varietatem *β.*, quae secund. Wahlenberg. varietas S. hastatae est, et var. *γ.*, quae S. arbusculam Friesii sec. hunc auctorem, sec. Wahlenberg. autem S. lividam exhibet. Variat haec species:

α. Waldsteiniana, serraturae foliorum remotiores, magis adpressae, stylus saepissime profunde divisus; occurrunt specimina, quorum ovaria tota ad

basin usque in duo singularia divisa sunt: S. Waldsteiniana Willd. sp. 4. 679. S. coruscans St. h. 25. S. ovata Ser. sal. helv. 92. t. 2. S. arbuscula Jacq. a. t. 108., icon rudis; Wahlenb. fl. carpat. p. 316.

β. foetida, serraturae foliorum crebrae, glandula crassiore terminatae, hinc magis approximatae, stylus plerumque non fissus: S. prunifolia *β.* Koch. sal. europ. p. 59. S. foetida Schleich. cent. 2. p. 95. S. alpina Sut. helv. 2. p. 283. S. prunifolia Ser. sal. helv. p. 49. S. vaccinifolia engl. bot. t. 2341., si folia subtus pilis minutis adpressis adspersa sunt, nec hortor. bot., quae varietatem S. repentis exhibet. — S. formosa herbar. Willd. n. 18162., hanc et plures alias species comprehendit.

γ. prunifolia, serraturae foliorum subundulatae, stylus brevis, post anthesin parum tantum elongatus, squamae helvolae: S. prunifolia Smith. brit. 1054. S. venulosa Sm. brit. 1055. S. carinata Sm. brit. 1055., quae sec. specim. authentica non differunt. Specimina mea in statu florente collecta sunt; plantam fructiferam nondum vidi.

40. **S. Lapponum** (L. sp. 1447. secund. Laestad. et Fries.) *amentis sessilibus* fructiferis subpedunculatis, capsulis ovato-lanceolatis tomentosis glabrisve sessilibus denique brevissime pedicellatis, *nectario pedicellum superante vel aequante,* stylo elongato, stigmatibus linearibus bifidis, *foliis lanceolatis ellipticisve* acuminatis integerrimis serrulatisve, iunioribus sericeo-villosis, adultis supra rugosis *subtus tomentosis opacis,* stipulis semicordatis apice recurvo. ♄. In humidis uliginosis alpium, (dch. d. g. Alpenk., in d. Sudeten u. Mähr. Karpat.) Mai. Jun. S. limosa Wahlenb. lapp. p. 264. S. helvetica Vill. delph. 3. p. 783. S. nivea Ser. sal. helv. p. 51. S. lactea Bray. in Denkschr. d. Regensb. bot. Ges. 2. p. 43. t. 2. S. arenaria Willd. sp. 4. 689. Sm. brit. 1058. engl. bot. v. 26. t. 1809. St. h. 25. S. glaucophylla Willd. en. suppl. p. 66. S. Stuartiana Sm. in Rees. cycl. n. 85. engl. bot. v. 36. t. 2586. Folia subtus saepe niveo-quandoque cinereo-tomentosa supra saepe albido-villosa, adulta vero plerumque in pagina superiore integumentum exuunt et obscure viridia fiunt; tomentum paginae inferioris pilis brevibus dense intricatis formatum est: quo charactere, sicut amentis sessilibus ebracteatis vel breviter pedunculatis, pedunculo foliis aliquot minutis obsesso, a sequente optime distinguitur. — Variat:

β. foliis iunioribus tantum leviter tomentosis, explicatis utrinque glabris margine tomentoso-pubescentibus: S. arenaria *β.* denudata Tausch. pl. sel. S. glauca Sm. engl. fl. 4. 201.

Praeeuntibus cl. viris Fries. et Hartman. nomen Salicis Lapponum anteposui, sperans, fore, ut in posterum non iterum mutetur, quod facile fieri poterit, quum secundum b. Smith., in engl. fl. 4. p. 202., Salix Lapponum herbarii Linnaeani cum S. sericea, (S. glauca Fries. et Hartm.) eadem sit, et S. glauca herbarii Linnaeani ad S. limosam Wahlenberg. pertineat.

41. **S. glauca** (L. sp. 1446.) *amentis longe pedunculatis, pedunculo foliato,* capsulis ovato-lanceolatis tomentosis breviter pedicellatis, *pedicello nectarium aequante,* stylo bifido, stigmatibus elongatis bifidis, *foliis* lanceolatis ellipticisve integerrimis *subtus cinereis utrinque sericeo-villosis* denique glabrescentibus acutis, infimis obtusissimis, stipulis ovatis acutis rectis. ♄. In alpibus altissimis Helvet. austral., (vom Gotthard dch. d. südl. Kette bis zum grossen Bernhard.) Jun. Jul. S. sericea Vill. delph. 3. p. 782. Folia subtus cinerea colorata et villis longis rectis adpressis nec tomento intricato obtecta denique glabrescentia, amenta longe pedunculata, pedunculo foliis magnis obsesso. His notis a priori certo distinguitur. — Varietas foliis angustioribus acutioribus lanceolatis est S. glaucae var. *γ.* Lapponum Wahlenb.! l. c. S. albida Schleich.! cat. et S. elaeagnoides Schleich.! cat. Sering. sal. helv. p. 91. (Amenta in hac paullo magis laxiflora, quam plerumque esse solent.); varietas foliis subovalibus stipulatis et squamis amenti longioribus, fere longitudine germinis: S. appendiculata Vahl.! in flor. dan. t. 1056., S. glauca *β.* appendiculata Wahlenberg.! lapp. p. 264., squamis longioribus haec varietas praecipue differt, stipulas enim et in aliis modificationibus saepe vidi. Caeterum haec varietas sec. specimina authentica parum differt

a forma vulgari; squamae breviores et duplo longiores in aliis quoque speciebus non raro occurrunt. H.

42. **S. caesia** (Villars. delph. 3. 768.) *amentis breviter pedunculatis*, pedunculo foliato, capsulis ovato-conicis tomentosis sessilibus denique brevissime pedicellatis, *nectario basin capsulae superante*, stylo elongato vel breviusculo, stigmatibus ovato-oblongis integris bifidisque, *foliis* ellipticis lanceolatisve acuminatis *glaberrimis utrinque glaucis opacis* margine revolutis *integerrimis*. ♄. In summis alpibus, (bisher bloss auf d. Enzeindaz im Cant. Waadt u. auf d. Voralpe della Coste in Levinalongo im südl. Tyrol.) Jun. Jul. S. prostrata Ehrh. pl. sel. 159. S. myrtilloides Willd. sp. 4. 686. non L., nec Sm. Longitudo styli in hac specie, ut in S. arbuscula, variat, amenta quoque huius simillima, sed folia opaca integerrima et subtus praecipue caesio-viridia diversa sunt.

43. **S. myrsinites** (L. sp. 1445.) *amentis longe pedunculatis*, pedunculo amentum subaequante foliato superne aphyllo, capsulis ex ovata basi lanceolato-acuminatis sessilibus lanuginoso-villosis, denique brevissime pedicellatis glabratis, *nectario basin capsulae superante*, stylo elongato, stigmatibus linearibus integris bifidisque, *foliis* ellipticis lanceolatisve *utrinque reticulato-venosis lucidis concoloribus* denique glaberrimis margine *dense glanduloso-serrulatis*. ♄. In locis humidis alp. altiorum, (von der Schweiz bis Steyerm.) Jun. Jul. S. myrsinites Willd. sp. 4. 678. et S. arbutifolia Willd. l. c. 682. Ser. sal. helv. p. 44. S. dubia Sut. helv. 2. 283. S. Jacquiniana St. h. 25. Ovaria cum stylis atropurpurea, filamenta caerulea, antherae violaceae. Variat:

β. lanata, foliis undique lana subsericea densa tectis.

γ. leiocarpa, capsulis denique glabris.

δ. Jacquiniana, foliis integerrimis: S. Jacquiniana Willd. sp. p. 692. K. syn. ed. 1. p. 659. S. Jacquinii Host. syn. 529. S. fusca Jacq. austr. t. 409., non Linn. S. alpina Scop. carn. 2. p. 255. t. 61.

Sect. VIII. Glaciales. Amenta terminalia. E gemma scilicet ramorum anni praeteriti terminali ramulus novellus prodit, foliis inque eorum axillis gemmis, sequente anno sese evolventibus, vestitus, cuius apici amentum impositum est. Amenta itaque pedunculo folioso persistenti insident, quo ramus continuatur et elongatur.

Fruticuli trunco subterraneo repente, ramis adscendentibus, pygmaei.

44. **S. reticulata** (L. sp. 1446.) *amentis pedunculatis terminalibus*, capsulis ovatis tomentosis subsessilibus, nectario basin capsulae superante, stylo brevi, stigmatibus bifidis, *foliis longe petiolatis elliptico-orbiculatis* obtusis breviter apiculatis retusisve margine revolutis integerrimis supra rugosis *subtus glaucis reticulatis*, denique glabris. ♄. In rupibus humectatis et locis madidis summarum alpium, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. St. h. 25.

45. **S. retusa** (L. sp. 1445.) *amentis pedunculatis, pedunculo foliato gemmifero*, capsulis ovato-conicis glabris breviter pedicellatis, nectario pedicellum subaequante, stylo mediocri, stigmatibus bifidis linearibus, *foliis brevissime petiolatis obovatis vel oblongo-cuneatis* obtusis retusisve integerrimis vel basi glanduloso-denticulatis *parallelo-venosis glaberrimis*. ♄. In locis petrosis alpium et reg. subalpinarum; var. *γ.* in alp. altioribus. Jul. Aug. St. h. 25. var. nostra *α.* Variat:

β. maior, foliis pollicem longis, amentis multifloris: S. Kitaibeliana Willd. sp. pl. 4. p. 683., Wahlenb. carpat. p. 314.

γ. multo minor, trunco ramisque terrae adpressis implexis, foliis dimidio minoribus plerisque non emarginatis, amentis breviter pedunculatis paucifloris, 3-5-imo unifloris: S. serpyllifolia Scop. carn. 2. p. 255. t. 61. Willd. sp. pl. 4. p. 684. At Salix serpyllifolia Jacq. austr. t. 298. vulgarem formam S. retusae exhibet.

46. **S. herbacea** (L. sp. 1445.) *amentis terminalibus pedunculatis*, pedunculo bifolio gemmifero, capsulis ovato-conicis glabris subsessilibus, nectario pedicellum brevem superante, stylo brevi, stigmatibus bifidis, *foliis orbiculatis* ovalibusque obtusis retusisve serratis *glabris reticulato-venosis utrinque*

nitidis. ♄. In locis duris apricis summarum alpium inter nives perennes; etiam in Sudetis. Jul. Aug.

2. PÓPULUS (L. gen. n. 1123.) Flores dioici. Perigonium cyathiforme squamae amenti impositum. N. v. E. gen. 1. 20.

Sect. I. Leuce Dub. bot. gall. p. 427. Ramuli iuniores tomentosi vel, saltem plantarum iuvenilium, hirti. Stam. 8. Squamae amenti ciliatae.

1. **P. alba** (L. sp. 1463.) *foliis* subrotundo-ovatis angulato-dentatis *subtus* ramulisque *niveo-tomentosis, ramulorum terminalium cordatis palmato-quinquelobis*, squamis amenti feminei lanceolatis apice crenatis ciliatis. ♄. In sylvis humidis, (zerstreut dch. d. Geb., in Menge in den Wäldern der Rheinpfalz dicht am Rheine mit der folgenden.) Mart. April. P. nivea Willd. arb. 227. Gemmae tomentosae non viscosae.

2. **P. canescens** (Smith. brit. 1080.) *foliis* subrotundo-ovatis angulato-dentatis *subtus* ramulisque *cinereo-tomentosis, ramulorum terminalium cordato-ovatis indivisis*, squamis amenti feminei apice fissis margine ciliatis. ♄. Cum priori, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Mart. April. P. alba Willd. arb. 227. Gemmae canescentes non viscosae.

3. **P. tremula** (L. sp. 1464.) *foliis suborbiculatis* dentatis utrinque ramulisque *glabris* ramorum radicalium et plantarum iuniorum ovatis acutis hirtis, squamis amenti digitato-incisis dense villoso-ciliatis. ♄. In sylvis. Mart. April. Gemmae glabrae viscosae. Occurrit foliis utrinque adpresso lanuginosis: P. villosa Lang; in sylvis, passim etiam in flora Erlangensi.

Sect. II. Aigeiros Dub. bot. gall. p. 427. Ramuli etiam radicales glabri. Stam. 12-30. Squamae amenti glabrae.

4. **P. pyramidalis** (Rozier. conf. Lam. dict. 5. p. 235.) *foliis rhombeis* acuminatis serratis margine *glabris*, *ramis erectis*. ♄. Ex Oriente allata, nunc ubique viarum limitandarum causa colitur. Mart. April. P. fastigiata Poir. dict. l. c. P. dilatata Ait. kew. ed. 1. 804., nomen ambiguum. Omnes arbores hujus speciei, quas hucusque vidi, masculae erant. Colit.

5. **P. nigra** (L. sp. 1464.) *foliis triangulari-ovatis* acuminatis serratis margine *glabris* basi truncatis et serratis, *ramis patentibus*. ♄. In locis humidis, ad ripas passim. April. Dod. pempt. 836.

6. **P. monilifera** (Ait. kew. ed. 1. 3. p. 407.) *foliis triangulari-ovatis* acuminatis serratis basi truncatis et subintegerrimis *margine pubescentibus*. ♄. Ex America boreali allata nunc ad vias plantatur. April. Colit.

Ord. CX. BETULINEAE. Rich. in Kunth. nov. gen. 2. p. 21. Amentaceārum gen. Juss.

Flores unisexuales, monoici, *amentacei*. Amenta e bracteis squamaeformibus pedicellatis formata. Mas. Perigonia 3, indivisa vel quadripartita, pedicello insidentia. Stam. 2 vel 4 in quovis perigonio; (6-12 in bractea.) Fem. Amentum e bracteis in anthesi sessilibus formatum. Perigon. nullum. Ovarium 2 *loculare*, *loculis* 1 *ovulatis*; stigmata 2, filiformia. Pericarpium indehiscens, compressum, membranaceum, vel subcoriaceum, interdum lateraliter in alam expansum. Sem. in quoque loculo solitaria, pendula, exalbuminosa. Radicula ad hilum versa. Cotyledones planae. Arbores foliis alternis.

1. BÉTULA (L. gen. n. 1052.) Mas. Amentum. Squamae pedicellatae, 1 florae, lobulis 2 sub apice peltiformi. Perigonium 3 phyllum, pedicello insidens. Stam. 6. Loculi antherarum filamento bifido disiuncti. Fem. Amentum squamis oblongis, basi dilatatis, denique trilobis, basi cuneatis et

deciduis, 2-3 floris. Ovarium 2 loculare. Stigmata 2. Nux alata, 1 locularis, 1 sperma. N. ab E. gen. 10.

Sect. I. Excelsae. Folia ramoso-venosa, neque evidenter reticulato-venosa.

1. **B. alba** (L. sp. 1393.) *foliis* rhombeo-triangularibus *longe acuminatis* duplicato-serratis glabris, *amentis fructiferis longe pedunculatis* pendulis, lobis squamarum lateralibus recurvatis, nucibus ellipticis *ala cinctis nuce ipsa duplo latiore apicemque stigmatum attingente.* ♄. In sylvis, praecipue arenosis, in planitiebus reg. montanis et subalpinis. April. Mai. Variat ramulis erectis, vel elongatis et gracilibus longeque pendulis; haec B. pendula Roth. tent. 1. 405. Ramuli saepe verruculis resinosis obsiti: B. verrucosa Ehrh. Beitr. 6. 98. arb. n. 96., excl. ramis floriferis; conf. Mey. chlor. Hannov. 501. — B. hybrida Bechst. dian. 1. 80., B. aurea Borkh. Forstbot. 1. 498., est forma fruticosa, conf. Meyer. l. c. — Varietas foliis laciniatis: B. laciniata Wahlenb. fl. suec. p. 624.

2. **B. pubescens** (Ehrh. Beitr. 6. p. 98. arb. n. 67.) *foliis* ovatis rhombeisve *acutis acuminatisve* duplicato-serratis, junioribus saepe pubescentibus, adultis totis glabris vel subtus in venarum axillis barbatis, *amentis fructiferis longe pedunculatis* pendulis, lobis squamarum lateralibus recurvatis vel patentissimis retusisque, nucibus obovatis *ala cinctis latitudinem nucis aequante apicemque ipsius attingente* stigmatibus breviore. ♄. In locis humidis, paludibus spongiosis; in subalpina adscendens. April. Maio, paulo serius praecedente. B. odorata Bechst. l. c. In subalpinis saepe fruticem humilem divaricatum exhibet, foliis petiolisque glabris et quandoque axillis venarum quoque denudatis; posterior est varietas

β. carpatica: B. carpatica Willd. sp. 4. 1. p. 464. B. glutinosa Wallr. sched. p. 497.

Sect. II. Humiles. Folia subtus dense venoso-reticulata.

3. **B. intermedia** (Thomas. pl. exs.) *foliis subtus reticulato-venosis* subrotundo-ovatis subduplicato-serrato-crenatis, crenis acutis, *amentis fructiferis pedunculatis* (erectis?) *pedunculo dimidium amentum aequante vel paulo longiore,* saepe folio minuto bracteato, lobis squamarum margine contiguis, lateralibus rotundato-obtusis quam intermedius latioribus brevioribusque, nucibus oblongo-obovatis ala cinctis latitudinem nucis plerumque aequante. ♄. In paludosis turfosis, (im Jura der Schweiz.) Mai. Jun. H.

4. **B. humilis** (Schrank. baier. fl. 1. p. 421.) *foliis subtus reticulato-venosis* subrotundo-ovatis ovatisve inaequaliter crenato-serratis *serraturis acutis, amentis fructiferis* erectis breviter pedunculatis *pedunculo multo longioribus,* squamis digitato-trifidis, laciniis subaequalibus secedentibus, nucibus ala cinctis apicem nucis vix superante nuceque dimidio angustiore. ♄. In locis paludosis spongiosis, (Gegend v. Memmingen u. Kloster Roth in Oberschwaben; Trauchgan bei Hohenschwangau; Gegend v. Salzburg u. Reichenhall; zerstreut durch Mecklenburg, Pommern u. Preussen, an manchen Orten häufig; Oranienburg u. Grüneberg in Brandenburg.) April. Fl. dan. t. 91. B. fruticosa Willd. sp. pl. 4. p. 467. Berl. Baumz. ed. 2. p. 61. Koch. synops. ed. 1. p. 662. Auctoritati b. Willdenowii innixus Betulam humilem Schrankii pro Betula fruticosa Pall. proposueram, Willdenowius enim evidentissime sub hoc nomine Betulam humilem descripsit, squamas amenti feminei tripartitas lobis obtusis aequilongis dicens, conf. Berl. Baumz. l. c.; sed ab hac omnino differt genuina B. fruticosa Pallasii et quidem sequentibus: folia subtus punctulis frequentibus adspersa sunt, squamae strobilorum inaequaliter lobatae, lobi laterales abbreviati et latiores, intermedius autem elongatus est et oblongus, alaque nucem cingens profunde obcordata, auriculis ultra medium stigmatum porrectis. G.

5. **B. nana** (L. sp. 1394.) *foliis subtus reticulato-venosis* suborbiculatis obtusis vel transverse latioribus truncatoque obtusis crenatis, *crenis rotundato-obtusis, amentis fructiferis erectis sessilibus brevissime pedunculatis,* squamis digitato-trifidis, laciniis subaequalibus oblongis secedentibus, nuci-

bus subrotundo-obovatis ala cinctis nuce dimidio angustiore. ♄. In paludibus spongiosis frigidis, (Schweiz im Waadtl. u. Neuenbgr. Jura, u. bei Einsiedeln; Oberschwaben im Reichenholzrieder Moos; Oberbayern Gegend v. Schongau; Salzburg u. Reichenhall; Alpengipfel v. Steyerm. u. Kärnth.; Iserwiese u. Seefelder in d. Sudet.; Böhmerwald bei Kuschwarta; Gottesgabe im Erzgebg.; hohe Stellen des Harzes; Osterode in Preuss.) Mai. Guimp. t. 149.

2. ALNUS (Tournef. inst. t. 359.) Mas. Amentum. Squamae pedicellatae, supra triflorae, lobulis 4 ante apicem peltiformem praeditae. Perigonia in pedicello sessilia 4 fida vel 3 phylla, tetrandra. Filamenta indivisa; antherae biloculares. Fem. Amentum. Squamae ovatae, biflorae, supra squamulis 4 instructae, in fructu auctae, cuneato-obovatae, persistentes. Ovarium minutissimum. Stigmata 2 filiformia. Nux compressa, bilocularis.

Sect. I. Alnobetula. Perigonium e phyllis tribus seiunctis compositum. — Cum genere Betulae haec sectio coniungi nequit; differt squamis amenti masculi trifloris, filamentis indivisis; amenti feminei persistentibus, ante apicem lobulis 4 instructis.

1. **A. viridis** (DC. fl. fr. 3. p. 304.) *foliis* ovatis acutis vel breviter acuminatis argute duplicato-serratis *glabris concoloribus*, venis subtus hirtis, *nucibus ala lata membranacea cinctis*. ♄. In declivibus alpium et reg. subalpinarum, (in Menge in d. Granitalpen, wo sie die Pinus Pumilio ersetzt; auf d. höhern Punkten d. Schwarzwaldes.) Mai. Jun. Betula ovata Schrank. baier. fl. 1. p. 419. B. Alnobetula Ehrh. Beitr. 2. p. 72. B. viridis Chaix. ap. Vill. 3. p. 789.

Sect. II. Clethra. Perigonium quadrifidum.

2. **A. incana** (DC. fl. fr. 3. 304.) *foliis ovatis acutis* vel breviter acuminatis *argute* duplicato-*serratis subtus glaucis pubescentibus vel subtomentosis, nucibus ala membranacea destitutis*. ♄. In convallibus alpinis ad rivos, in subalpina et cum fluviis in planities descendens, (dch. d. g. Alpenk. mit d. Rheine bis Germersheim; mit d. Iller u. s. w. bis zur Donau; sodann in Mähren, Böhmen, Schles.; auf d. Brocken; d. Rhön; in Ostpreussen.) Febr.-Apr. Variat:

β. pinnatifida, foliis pinnatifido-incisis, laciniis serratis obtusis: A. incana *β.* pinnatifida Wahlenb. fl. suec. p. 622. Haec hucusque in Suecia tantum reperta est.

γ. acutiloba, foliis pinnatifidis, laciniis acutis. Tyr. austr. Sartorelli.

3. **A. pubescens** (Tausch. Regensb. bot. Ztg. 1834. p. 520.) *foliis subrotundis vel obovatis* obtusis vel superioribus acutiusculis duplicato-*crenato-serratis utrinque viridibus subtus pubescentibus* vel leviter tomentosis, *nucibus ala membranacea destitutis*. ♄. In locis humidis, ad fluvios, (Böhmen, Tausch; in Baden bei Mühlheim, b. Lang; Gegend v. Carlsruh, Alex. Braun; Wiesenthal, Döll.) Mart., (drei Wochen später als A. incana u. 10 Tage später als A. glutinosa, nach Tausch.) A. badensis Lang. A. barbata C. A. Meyer. G.

4. **A. glutinosa** (Gaertn. fruct. 1. t. 90.) *foliis subrotundis obtusissimis* retusis basi cuneatis glabris, *axillis venarum subtus barbatis*, nucibus ala membranacea destitutis. ♄. In paludosis et ad ripas. Febr. Mart. St. h. 29. Betula Alnus *α.* glutinosa L. sp. 1394. Variat:

β. incisa, fol. incisis Willd. sp. 4. 335.

γ. laciniata, fol. pinnatifidis, laciniis acutis. Willd. l. c. Varietates hasce cultas tantum vidi.

Ord. CXI. MYRICEAE. Rich. elem. bot. p. 561.

Flores unisexuales monoici vel dioici, *amentacei*, singuli in axilla bracteae seu squamae. Mas. Stam. 2, plura, libera vel monadelpha. Perigon.

nullum vel e squamulis 1-2 minutis formatum. Fem. Perigonium e squamis minimis 2-6, hypogynis, ovario saepe adnatis compositum. *Ovarium* 1 *loculare*, 1 *ovulatum*, ovulo erecto. *Stigm.* 2, *elongata*, subulata. Pericarpium indehiscens, siccum, vel squamis perigonalibus auctis et accretis drupaceum, 1 spermum. *Albumen* o. Embryo rectus, inversus, radicula apicem seminis spectante, ab hilo remota.

1. MYRÍCA (Linn. gen. 1107.) Flores dioici, amentacei, squamis unifloris; masc. stam. 4-6, in basi squamae inserta et approximata vel etiam connata. Fem. Ovar. 1, in basi perigonii, e squamulis 4 compositi, adnatum. N. ab E. gen. 3. 1.

1. **M. gale** (L. sp. 1453.) foliis lanceolatis subserratis, caule fruticoso. ♄. In ericetis humidis turfosis, (v. Westphalen dch. d. nördl. Theil v. Hannover, Oldenb., Holst., Mecklenb. bis Pommern.) April. Mai. Fl. dan. t. 327. G.

Ord. CXII. CONIFERAE. Juss. gen. 411.

Flores unisexuales; masc. amentacei; amentum e bracteis squamaeformibus vel peltatis formatum. Antherae bracteis adnatae; vel stamen 1 vel plura, filamentis in columnam connatis, apice liberis, perigonio basi squamarum amenti insidenti cinctis. Flores feminei amentacei vel terminales terni, gemini, solitariive. Ovula nuda, urceolata, apice aperta, aut carpello squamaeformi explanato ex axilla bracteae egredienti innata; aut in basi squamarum amenti inserta; in Ephedra perigonio cincta. Embryo in axe albuminis; cotyledones 2, vel plures verticillatae.

Trib. I. *EPHEDRINEAE.* Nees ab Esenb. gen. fasc. 1. Flores amentacei; amenti squamae oppositae, basi connatae. Mas. Perigonium bifidum, squamae amenti insidens. Stamen unicum vel plura, connata, apice libera; antherae biloculares. Flores fem. terminales, gemini, oppositi, erecti, involucro bipartito, e squamis 2 supremis multo maioribus et basi connatis confecto, cincti. Ovulum erectum, perigonium superans. Semen perigonio et involucro, denique succulento, baccam spuriam exhibenti, inclusum.

1. EPHEDRA (L. gen. n. 1136.) Character generis idem ac tribus. N. ab E. gen. 1. 8.

1. **E. distachya** (L. sp. 1472.) pedunculis oppositis, amentis geminis. ♄. In apricis rupestribus, (in Wallis; an d. Ruine Siegmundskron bei Botzen in Südtyrol.) April. Mai. Schk. t. 339.

Trib. II. *TAXINEAE.* Rich. Flores masc. amentacei; amenti squamae peltatae, orbiculatae, subtus antheris unilocularibus concentrice obsitae. Flor. fem. terminales, solitarii. Ovulum erectum.

2. TAXUS (L. gen. 1135.) Flores dioici; masc. amentacei, squamis peltatis, subtus antheris unilocularibus concentrice obsitis. Flor. fem. solitarii, involucro integro, (e squamis carnosis connatis orto?) initio minimo et annuliformi insidentes. Semen testa nucamentacea inclusum, involucro denique in cupulam succulentam integram, baccam spuriam exhibentem, mutato occultatum. N. ab E. gen. 1. 9.

1. **T. baccata** (L. sp. 1472.) foliis approximatis linearibus acutis, floribus axillaribus sessilibus. ♄. In sylvis montanis et subalpinis, (nur in Gegenden, welche höhere Berge haben, deswegen in Norddeutschl. nur angebauet.) Mart. April. Schk. t. 339.

Trib. III. *CUPRESSINEAE.* Rich. conif. 137. Flores masc. amentacei. Antherae 4-7, uniloculares, ad squamarum peltatarum marginem inferiorem subtus adnatae. Flores fem. in axillis squamarum amenti sessiles; vel terminales et involucro trifido cincti. Ovula erecta. Receptaculum proprium nullum.

3. JUNÍPERUS (L. gen. 1134.) Flores dioici. Masc. amentacei. Antherae 4-7, uniloculares, ad marginem inferiorem squamae ovatae peltatae insertae. Flores fem. terni, terminales, involucro carnoso, trifido, ex squamis tribus amenti connatis formato, cincti, liberi, erecti. Semina testa ossea nucamentacea praedita, in involucro aucto, carnoso, baccam spuriam exhibente, abscondita. N. ab E. gen. 1. 7.

1. **J. nana** (Willd. arb. 159.) fruticosa, decumbens, *foliis incurvatis lanceolato-linearibus* in mucronem pungentem acuminatis supra leviter canaliculatis *subtus* obtuse carinatis, *linea impressa carinam perducente*, baccis ovatis pruinosis folia subaequantibus. ♄. In locis rupestribus alpium, etiam reg. subalpinarum, (dch. d. g. Alpenk. u. in dem höhern Mähr., Böhm. u. Schles. Gebirge.) Jul. Aug. Schk. t. 338. J. sibirica Burgsd. Anleit. n. 272. J. communis *γ.* L. sp. 1470. *γ.* montana Ait. kew. 3. p. 414. *γ.* alpina Gaud. helv. 6. p. 301. Baccae atrae, caesio-pruinosae.

2. **J. communis** (L. sp. 1470.) fruticosa, erecta, denique arborescens, *foliis ternis patentissimis lineari-subulatis* in mucronem pungentem acuminatis supra leviter canaliculatis *subtus* obtuse carinatis, *linea impressa carinam perducente*, baccis ovatis pruinosis folio duplo triplove brevioribus. ♄. In collibus, ericetis, et sylvis tam siccis, quam humidis. April. Mai. Baccae atrae, pruinosae.

3. **J. macrocarpa** (Sibthorp. fl. graec.) fruticosa, *foliis ternis patentissimis* lanceolato-linearibus in mucronem pungentem acuminatis supra bisulcatis *subtus acute carinatis, baccis* ovatis globosisve *pruinosis* folium aequantibus longioribusque. ♄. In asperis, (felsige Küste zw. Triest u. Duino; bei Fiume, Noć.) Mai. Tabernaem. Krtb. p. 1358. f. 4. Baccae maximae, maturae rubrofuscae, caesio-pruinosae. Differt a J. Oxycedro praesertim baccis, quae in hoc dimidio minores, coccineae et nitidae sunt. J.

4. **J. Oxycedrus** (L. sp. 1470.) fruticosa, *foliis* ternis *patentissimis* linearibus in mucronem pungentem acuminatis supra bisulcatis *subtus acute carinatis*, baccis *globosis maturis nitidis* folium non attingentibus. ♄. In locis incultis virgultosis, (Istrien u. auf den benachbarten Inseln.) Mai. Baccae rubrae, nitidae. J.

5. **J. phoenicea** (L. sp. 1471.) *foliis* breviter ovatis obtusiusculis *sexfariam arcte imbricatis* dorso sulco impressis, baccis patentibus. ♄. In locis asperis, (auf d. Insel Cherso u. Osero.) Mai. Tabern. 1352. f. 2. Baccae rubrae. Cl. Tenor. in sylloge fl. neap. habet varietatem

β. baccis caeruleis, cum synonymo: J. lycia L. sp. 1471. J.

6. **J. Sabina** (L. sp. 1472.) foliis rhombeis acutis quadrifariam arcte imbricatis et dorso glandula impressis vel lanceolatis acuminatis patulis decurrentibus et plus minusve remotis, *baccis pedunculo recurvo pendulis.* ♄. In alpibus, (Wallis, Südtyrol, auch im Oetzthal, Matreyer Thal, Krain.) April. Mai. Baccae caeruleae.

4. CUPRESSUS (L. gen. n. 1079.) Flores monoici, amentacei; masc. antherae 4, uniloculares, ad marginem inferiorem squamae ovatae peltatae insertae. Fem. Ovula 8 et plura, in basi squamarum amenti sessilia erecta. Semina testa nucamentacea praedita. Strobilus siccus, e squamis lignosis, peltatis, angulatis, medio umbonatis, compositus.

1. **C. sempervirens** (L. sp. 1422.) ramis erectis, ramulis quadrangulis, foliis quadrifariam imbricatis obtusis adpressis convexis, strobilis subglobosis, squamis umbonatis muticis. ♄. In regionibus australioribus, (südl. Krain,

Istrien, Südtyrol, ital. Schweiz, doch wahrscheinlich nur angepflanzt.) Febr. Mart. Schk. t. 310. Colit.

Trib. IV. *ABIETINEAE.* Richard. conif. 145. Flores amentacei; masc., antherae squamis, (bracteis,) amenti subtus adnatae; filamenta o. Flor. fem., amentum e squamis ovuligeris, saepe bractea fultis, denique auctis et squamas maiores strobili sicci constituentibus, formatum. Ovula inversa, in basi squamae extus adnata.

5. PINUS (L. gen. n. 1077.) Amenta mascula: antherae 2, uniloculares, squamis subtus adnatae. Amenta feminea: squamae imbricatae; ovula ad basin squamarum gemina collateralia apice suo deorsum spectantia, ore lacero patulo instructa. Semina testa coriacea vel ossea.

Sect. I. Pinaster (Pinus Tournef. instit. 355.) Folia sempervirentia, gemina plurave fasciculata. Squamae strobili persistentes. (Squamae apice area incrassata umbonata (scuto) praeditae, in P. Cembra parva. Ala seminum decidua vel nulla.)

Folia ramorum hornotinorum, quos turiones vocant, e squamis scariosis, margine laceris constant, quae ramo evoluto decidunt, basi remanente. In axillis foliorum istorum squamaeformium cum evolutione rami novelli per anticipationem fasciculus foliorum viridium oritur, e ramulo, cuius axis non elongatur, formatus. Si vero apex rami abscinditur, e medio huius fasciculi saepe novus ramus erumpit, ramum ipsum continuans.

1. **P. sylvestris** (L. sp. 1418., excl. varietatibus.) *foliis geminis* glaucis, squamis fulcrantibus lanceolato-subulatis albo-marginatis apiceque albis fimbriatis, fimbriis arachnoideo-connexis ramulum novellum laxe involventibus, *strobilis opacis, hornotinis in pedunculo uncinato longitudine strobili ipsius ad terram deflexis* maturis conicis, scuto squamarum strobuli maturi convexo vel inferiorum obtuse rostrato, rostro brevi recurvo, alis semine triplo longioribus, amentis masculis ovatis oblongisve, antherarum crista reniformi vel breviter ovata parce obtuse denticulata. ♄. In planitiebus et montibus humilioribus, praecipue solo arenario, sylvas saepe ingentes constituens; in subalpinis rarius et raro ad altitudinem ped. 5000 adscendens. Mai. Guimp. t. 153. Antoin. conif. t. 4. f. 3. P. Mughus Jacq. ic. rar. t. 193.; non est varietas, sed P. sylvestris ipsa, quae vero in alpibus Juliis fruticosa occurrit, ut P. Mughus. P. rubra Mill. dict. n. 3.; nam P. sylvestris Mill. l. c. n. 1. est P. Pinaster „strobilis 7-8 pollices longis.“ — Strobilus apertus basi magis minusve breviter conicus.

Pinus sylvestris L. et Pinus Mughus Scop., atque praesertim huius varietas erecta, quae P. uliginosam auctorum exhibet, saepe commutantur, attamen facillime distinguendae sunt. P. sylvestris habet folia glauca vel glaucescentia strobilosque novellos, trimestres semestresve, in longo uncinato pedunculo ad terram recurvatos, qua ex nota haec species ab omnibus florae nostrae primo adspectu et constanter cognoscitur; Pinus Mughus contra habet folia gramineo-viridia strobilosque hornotinos in pedunculo breviore erectos vel paulum obliquos, sed nunquam recurvatos. Jam ex solis gemmis cognoscendae sunt, sicut plurimae huius sectionis species. Pini sylvestris gemmae per aestatem et usque ad ipsarum evolutionem in subsequente vere sunt oblongo-ovatae a medio sensim angustatae, Pinus Mughus autem habet gemmas ovato- vel oblongo-cylindricas breviter acutas vel etiam obtusas. Ab his facile distinguitur Pinus Laricio gemmis in longum rostrum acuminatis atque Pinus Pinea ab omnibus hic memoratis gemmis apice squarrosis, squamis scilicet superioribus a medio patentibus vel recurvatis. Verum inter gemmas Pini uncinatae et Pini Mughus differentiam non observare potui, sicut inter gemmas Pini Pineae et Pini Pinastri, quae ultima in ditione florae nostrae nondum lecta est.

2. **P. Mughus** (Scop. carn. 2. p. 247.) *foliis geminis* viridibus, *squamis fulcrantibus* lanceolato-subulatis superne *albo marginatis apiceque albis* fimbriatis, fimbriis arachnoideo-connexis ramulum novellum laxe involventibus, *strobilis nitidis, hornotinis in pedunculo recto strobilo ipso dimidio breviore erectis,* maturis ovalibus conicisve patentibus vel deflexis, scuto squamarum convexo vel obtuse rostrato, rostro brevi recurvo, alis semine duplo triplove longioribus, *amentis masculis ovatis,* crista antherarum reniformi vel sub-

quadrata irregulariter denticulata. ♄. In alpibus et subalpinis praecipue calcareis, ad rupes et in locis humidiusculis abunde cum fluviis in convalles descendens ibidemque in varietatem *α.* excrescens. Maio, in alpibus serius. Variat:

α. uliginosa, truncus erectus ad 40 pedes excrescens: P. obliqua Sauter. regensb. bot. Ztg. P. rotundata Link. Abh. der berl. Acad. 1827. p. 168. 170. P. uliginosa Neumann. (in Uebers. d. Arbeit. u. ℔. w. der schles. Gesellsch. 1837. p. 95.) Haec non solum in locis uliginosis sudetorum, sed frequens quoque in convallibus alpinis, etiam in sylvaticis humidis palat. superioris.

β. Pumilio, truncus adscendens, a basi ramosus ramis decumbentibus: P. Pumilio Haenke Beobacht. auf d. Riesengbg. p. 68. WK. pl. rar. hung. p. 160. t. 149. Antoin. conif. t. 3. f. 1. Pinaster Pumilio Clus. pan. p. 15. ic. (Pinus Mughus Jacq. ad Pinum sylvestrem et P. Mugho Poiret. ad Pinum uncinatam pertinent.)

3. **P. uncinata** (Ramond. ap. DC. fl. fr. 3. p. 726.) *foliis geminis* viridibus, *squamis fulcrantibus* ovato-lanceolatis acuminatis angustissime *albo-marginatis* parce fimbriatis, *strobilis nitidis, hornotinis in pedunculo strobili dimidium aequante erectis,* maturis ovalibus conicisve patentibus vel deflexis, *scuto squamarum anteriorum vel omnium elongato-rostratis, rostro recurvo,* ala semine triplo longiore, *amentis masculis ovatis,* crista antherarum subrotunda dense arguteque denticulata. ♄. In alpibus, (bisher auf den Alpen der südwestl. Schweiz.) Jun. Jul. P. uncinata Antoin. conif. t. 3. f. 3. P. Mugho Poiret. ap. Lamarck. dict. v. 5. p. 336. Gemmae ut antecedentis. H.

4. **P. Laricio** (Poiret. in Lam. dict. 5. p. 339.) *foliis geminis* viridibus, squamis fulcrantibus lanceolato-subulatis lato-albo-marginatis apiceque albis fimbriatis fimbriis liberis, *strobilis nitidis, hornotinis erectis brevissime pedunculatis, pedunculo strobilo ipso multo breviore,* maturis sessilibus patentibus conicis, scuto squamarum convexo, ala semine triplo longiore, *amentis masculis cylindricis denique valde elongatis,* crista antherarum subrotunda convexa dense arguteque denticulata subdiaphana medio obscuriore. ♄. In sylvis, praecipue solo calcareo, (in Unteröstreich u. im angrenzenden Steyermark, Antoine; in den Gebirgen von Fiume, Noé, u. als Zwergart auf den Julischen Alpen, Tommasini.) Mai. P. Laricio *β.* austriaca Antoine conif. p. 4. t. 2. f. 2. P. maritima B. minor Duham. arb. ed. 2. t. 72. bis P. maritima Koch. syn. ed. 1. p. 667. P. austriaca Höss. Anleit. p. 6. P. nigricans Host. fl. austr. 2. p. 628. Link. in Linnaea v. 15. p. 491. Höss. Beschreib. der Schwarzföhre in regensb. bot. Ztg. 1825. Beibl. p. 113. P. Pinaster Rochel. banat. p. 79. t. 39. P. nigra Link. Abh. d. Berl. Ak. 1827. p. 173. Rami juniores primum virentes deinde magis minusve fulvofusci, folia valida, rigida. Scutum squamarum strobili plano-convexum vel breviter pyramidatum. Semina latere utroque grisea, nigro albidoque nebulosa, vel altero latere pallida. Cl. Antoin. varietatem proponit *γ.* Pallasianam, conif. t. 2. f. 3., ramulis magis lutescentibus, sed vix tanquam varietas distingui potest; ad hanc pertinet, sec. cl. Antoin., Pinus Pallasiana Lamb. pin. ed. 2. 1. t. 5. P. maritima Pall. fl. taur. ined. P. halepensis MBieb. taur.-cauc. 3. p. 623. — Ab his differt P. Laricio *α.* Poiretiana Antoin. l. c. t. 2. f. 1., (P. Laricio Poiret. in Lam. dict. 5. p. 339., P. maritima Ait. kew. ed. 2. v. 5. p. 366.,) foliis duplo tenuioribus flexibilibus et saepe flexuosis, at vix specie; dijudicent, qui plantas vivas examinare et comparare possunt. Caeterum Pinus sylvestris in sylvis nostris passim quoque foliis duplo angustioribus occurrit, luditque ut P. Laricio scuto squamarum strobili fere plano et breviter pyramidato. — Pinus Pinaster Ait. kew. 3. p. 367., Antoin. conif. t. 6. f. 1., (P. maritima major Duhamel., P. Laricio Santi., non Poiret., P. sylvestris *γ.* L. sp., P. sylvestris Mill. dict., non L.,) saepe cum P. Laricione confusa, in maritimis Galliae australis et Italiae crescens, in ditione florae nostrae nondum reperta, ab hac ultima evidenter differt ramulis novellis fimbriis squamarum fulcrantium arachnoideo-

connexarum dense involutis, strobilis hornotinis pedunculo, strobili dimidium aequanti, insidentibus, seminibus duplo maioribus altero latere nigro albidoque nebulosis, altero atris, concoloribus, alisque seminum colore fuliginoso tinctis, quae in P. Laricione dilute fuscescentes sunt. G.

5. **P. Pinea** (L. sp. 1419.) *foliis geminis* glaucis, squamis fulcrantibus ovato-lanceolatis attenuato-acuminatis dense fimbriatis fimbriisque basi fuscis marginem versus dilutioribus, fimbriis liberis, strobilis lucidis fere sessilibus subrotundo-ovatis obtusis, scuto squamarum convexo medio impresso, *alis semine triplo brevioribus,* amentis masculis oblongis, crista antherarum reniformi margine lobulata arguteque denticulata. ♄. Culta in Tyroli australi. Mai. Antoin. conif. t. 3. f. 2. Camerar. epit. p. 39. ic. Colit.

Gemmae sunt ut in Pinu Pinastro Aiton., secundum specimen vivum hujus quod fructus autem nondum protulit.

6. **P. Cembra** (L. sp. 1419.) *foliis ternis quinisve* viridibus *denique* vagina delapsa *basi nudis,* squamis fulcrantibus ovato-lanceolatis subulato-attenuatis albo-marginatis parce fimbriatis fimbriis liberis, strobilis sessilibus ovatis obtusis, squamis planis erectis pubescentibus apiculatis scuto destitutis apice patulis, *seminibus apteris.* ♄. In summis alpibus, (v. d. Schweiz bis Oestreich.) Jun. Camerar. ep. 42. Antoin. conif. t. 20. f. 2. Nuces squama tectae, ut in caeteris, sed haec squama non in alam extenditur.

Sect. II. Larix Tournef. inst. t. 357. Folia decidua, plurima fasciculata, ramulorum hornotinorum solitaria. Squamae strobili persistentes. (Alae seminum persistentes. Squamae apice planae.)

7. **P. Larix** (L. sp. 1420.) *foliis fasciculatis* planis subcanaliculatis deciduis, strobilis ovatis erectis, squamis obtusissimis apice laxis. ♄. In sylvis subalpinis et alpinis ad 5200 pedes adscendens. Mai. Larix europaea hort. paris. DC. fl. fr. 3. p. 277. Abies Larix Lam. illustr. t. 785. f. 2. Koch. syn. ed. 1. p. 667. Pinus Larix Antoin. t. 21. f. 2.

Sect. III. Abies Link. Linnaea 1841. p. 525. Picea Antoine conif. p. 61. Folia sempervirentia, omnia solitaria. Semina matura cum squamis et bracteis, ab axe persistente soluta, decidua.

8. **P. Picea** (L. sp. 1420.) *foliis solitariis* distichis *emarginatis subtus albo-bilineatis,* strobilis cylindricis erectis, squamis strobili obtusissimis adpressis, bracteis squamas superantibus. ♄. In sylvis, praecipue subalpinis et alpinis ad 4500 pedes adscendens. Mai. Abies pectinata DC. fl. fr. 3. p. 276. Link. in Linnaea v. 15. p. 526. A. excelsa Link. Abh. d. berl. Akad. 1827. p. 183. A. vulgaris Poiret. in Lam. dict. 6. p. 514. Pinus Picea Antoin. conif. t. 27. f. 2. P. Abies Du Roi harbk. v. 2. p. 95. Camerar. epit. 48. et 49. ic.

Sect. IV. Picea Link. Linnaea 1841. p. 516. Folia sempervirentia, omnia solitaria. Squamae strobili persistentes.

9. **P. Abies** (L. sp. 1421.) *foliis solitariis* compressis *subtetragonis* mucronatis *viridibus,* strobilis cylindricis pendulis, squamis eroso-denticulatis. ♄. In regionibus montanis, subalpinis et alpinis; sylvas format et in alpibus ad 5500 pedes adscendit. Mai. Pinus excelsa Lam. fl. fr. v. 2. p. 202. P. Picea Du Roi harbk. v. 2. p. 110. Abies excelsa Poiret. in Lam. dict. 6. p. 518. Koch. syn. ed. 1. p. 667. Picea excelsa Link. in Linnaea v. 15. p. 517. P. vulgaris Link. Abh. d. berl. Akad. 1827. p. 180. Camerar. epit. p. 47. ic.

Class. II. ENDOGENEAE PHANEROGAMAE seu MONOCOTYLEDONEAE.

Truncus tam medulla centrali radiisque medullaribus, quam cortice vero destitutus, fibriis sparsis, per telam cellulosam perductis, constans, in margine prius, quam in centro induratus, hinc basi saepius tenuior, quam apice. Flores organis sexualibus instructi, saepissime numero ternario compositi. Antherae sacculis 2 instructae, rarius uniloculares. Embryo cotyledone unica vel potius cotyledonibus alternis praeditus.

Ord. CXIII. HYDROCHARIDEAE. DC. fl. fr. 3. p. 265.

Cal. 3 *sepalus, herbaceus. Cor. tripetala, regularis. Stam. libera,* 3, petalis alterna, vel petalorum numero dupla plurave. *Ovarium inferum,* 1-pluriloculare, multiovulatum; placentae parieti vel dissepimentis adnatae. Styli 3, 6, plerumque bifidi. Fructus indehiscens, carnosus, intus pulposus. Embryo cylindraceus, rectus. Albumen o. Flores dioici vel hermaphroditi.

1. VALLISNERIA (L. gen. n. 1097.) Flores dioici. Mas. Spadix in scapo radicali brevi erecto terminales. Flores dense congesti, spatha denique trifida involucrati, sub anthesi a pedicellis soluti in aquae superficie natantes. Cal. 3 partitus. Stam. 3, laciniis calycis alternantia. Fem. Flores solitarii terminales in scapo radicali filiformi spiraliter contorto longissimo. Spatha tubulosa, apice bifida, germen investiens. Cal. tripartitus. Corollae loco squamae tres, minutae, bifidae, cum calycis laciniis alternantes. Ovarium inferum, uniloculare, multiovulatum, ovulis parietalibus. Styl. o. Stigmata 3, ovata, bifida.

1. **V. spiralis** (L. sp. 1441.) In lacubus, (bei Spora il confine im Gardasee im südl. Tyrol, Facchini; u. in der Bucht v. Agno u. Capo di Lego des Luganersees im Cant. Tessin, Lagger.) Jul. Aug. Folia omnia radicalia, linearia, graminea, similia foliis submersis Sagittariae sagittifoliae, sed acutiuscula et versus apicem mucronato-denticulata. Flores albi.

2. STRATIÓTES (L. gen. n. 687.) Flores dioici. Cal. 3 partitus. Cor. 3 petala. Parastamina 20-30. Mas. Stam. fertilia 12. Fem. Styli 6, bifidi. Bacca hexagona, 6 locularis, polysperma. N. ab E. gen. 6. 16.

1. **S. aloides** (L. sp. 754.) foliis ensiformi-triangularibus ciliato-aculeatis. 4. In aquis stagnantibus natans, (Oestr., Mähr., Schles.; dch. d. g. nördl. D. von Westph. bis nach Ostpreussen; im Entensee bei Bürgel unweit Offenbach, ursprünglich eingesetzt, jetzt in zahlloser Menge, Lehmann.) Jul. Aug. Schk. t. 335. a. b. Flores albi. G.

3. HYDRÓCHARIS (L. gen. n. 1126.) Flores dioici. Calycis limbus tripartitus. Cor. 3 petala. Masc. Stam. 9. Pistilla 3, abortiva. Fem. Parastamina 3, filiformia. Nectarii squamae 3, carnosae. Styli 6; stigmata bipartita. N. ab E. gen. 6. 15.

1. **H. Morsus ranae** (L. sp. 1466.) In aquis stagnantibus, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. St. h. 44. Flores albi.

4. UDORA (Nutall.) Flores dioici. Cal. tripartitus. Cor. tripetala. Mas. Stam. 3. Fem. Styli 3, bifidi; stigmata elongata, plumosa. (Flores masculos nondum vidi.)

1. **U. occidentalis** (Pursh. sub Serpicula secund. Spreng. syst. veg. 1. p. 171.) foliis lanceolato-linearibus rectis tenuissime mucronulato-serrulatis, serraturis antrorsum versis. 4. In aquis stagnantibus, lacubus, (im Dammschen See in der Nähe des Bodenberges bei Stettin in Pommern häufig, Rostkov!) Florens in loco citato nondum observata est. Serpicula verticillata Rostk. et Schm. flor. sed. p. 370. Udora verticillata Sprengel., quod plantam Americae borealis attinet. Elodea canadensis Michaux. Species germanica, cuius specimina plurima, a Cl. Rostkovio lecta, possideo, exacte cum planta Americana, prope Bethlehem in Pensylvania lecta, congruit. Ab hac Udora lithuanica Besser., ab ipso cl. auctore mecum communicata, omnino differt, foliis latioribus circinato-recurvatis aculeolato-dentatis; sed haec in Germania nondum detecta est. Cl. Reichenbachius illam nondum vidisse videtur, quum eam eandem ac lithuanicam esse declaraverit, conf. fl. exc. p. 139. — Serpiculam verticillatam Indiae orientalis nondum vidi.
G.

Ord. CXIV. ALISMACEAE. Juss. dict. sc. nat. 7. 474. excl. gen.

Cal. 3 *sepalus, herbaceus. Cor. tripetala, regularis, hypogyna.* Stamina hypogyna, libera, 6 vel indefinita. *Ovaria* 3, 6, *plurima, singula stylo terminata, supera,* 1-2 *ovulata,* ovulis suturae interiori affixis. Stigmata simplicia. Carpella sicca, indehiscentia. Sem. exalbuminosum. Embryo curvatus.

1. ALÍSMA (L. gen. n. 460.) Flores hermaphroditi. Cal. 3 phyllus. Cor. 3 petala. Stam. 6. Carpella 6-plurima, 1 sperma, non dehiscentia. N. ab E. gen. 6. 18.

1. **A. Plantágo** (L. sp. 486.) scapo verticillato-paniculato, ovariis introrsum supra basin styligeris, *carpellis apice rotundato-obtusis muticis* dorso 1-2 sulcatis, *in fructum obtuse trigonum congestis,* foliis cordatis ovatis lanceolatisve. 4. In fossis et aquis stagnantibus atque in earum ripis. Var. *β.* et *γ.* non ubique. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 631. Schk. t. 102. Flores albi vel dilute rosei. Variat foliis latioribus et angustioribus, magis minusve cordatis et

β. lanceolatum, foliis lanceolatis basi attenuatis, 6 pollices longis et 1 latis: A. lanceolatum Wither. 362. A. Plantago *β.* Willd. sp. 2. 276. — Si haec varietas in aqua ipsa crescit, folia prima saepe linearia, graminea et pellucida sunt, atque supra aquam natant; occurrit quoque, licet rarius,

γ. graminifolium, foliis omnibus gramineis et natantibus, uno alterove tantum cum lamina anguste lanceolata supra aquam emergente: A. Plantago *γ.* graminifolia Wahlenb. suec. 1. 228. D. fl. l. c. A. graminifolium Ehrh. herb. A. natans Pollich. pal. 3. 319.

2. **A. parnassifolium** (L. mant. 371.) scapo verticillato-racemoso vel basi subpaniculato, *carpellis* obovatis apice extrorsum rotundatis et *introrsum aristatis multistriatis, foliis profunde cordatis* obtusiusculis. 4. In lacubus et aquis stagnantibus, (in einem kleinen See bei Tempelhof in der Gegend v. Berlin; erscheint bloss bei niedrigem Wasserstande, wenn das Wasser $^1/_2$-1 Fuss über d. Wurzeln steht, Bouché; sodann am See bei d. Basedower Theerofen u. am Longritzer See in Mecklenburg; bei Frankfurt a. d. O.; im Entensee bei Bürgel unweit Offenbach; in den Lannen bei Sicheldorf in Untersteyerm.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 631. Reichenb. ic. f. 377.

„Specimina in aqua ipsa crescentia gaudent petiolis longissimis et foliis natantibus, hoc est A. dubium Willd. prodr.; in locis autem ab aqua derelictis petioli vix biunciales sunt, hoc est A. Domasonium Willd. l. c.“ Dethard. consp. p. 32. Flores albi. G.

3. **A. natans** (L. sp. 487.) caule foliato, floribus ad genicula caulis solitariis ternis quinatisve, *carpellis* oblongis obtusis *acuminato-rostellatis multi-*12-15 *striatis* patulis, *foliis caulinis* petiolatis *ovalibus oblongisve*, radicalibus linearibus sessilibus. 4. In piscinis et aquis stagnantibus, (bei Trier, Andernach, am Unterrheine u. v. da dch. Westph., Hannov. u. d. g. nördl. D.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 632. Reichenb. ic. 1. f. 77. 78. Flores albi. Folia submersa saepe linearia et membranacea et passim omnia sic comparata sunt: A. natans sparganifolium Fries. nov. fl. suec. mant. 3. p. 183. G.

4. **A. ranunculoides** (L. sp. 487.) scapo apice umbellato vel verticillato-biumbellato, *carpellis* oblique ellipticis *quinquangularibus acutis in capitulum globosum congestis*, foliis lanceolatis trinerviis. 4. In paludibus et locis hyeme inundatis, (am Unterrheine u. v. da dch. Westphalen, Hannov. u. d. nördl. D. bis Mecklenburg; in Böhmen, Preussen, am Neuenburger See in d. Schweiz; Monfalcone.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 633. Reichenb. ic. f. 79. Flores albi. Folia passim omnia linearia, membranacea et natantia: A. ranunculoides zosterifolium Fries. in litt.

2. SAGITTARIA (L. gen. n. 1067.) Flores monoici. Cal. tripartitus. Pet. 3. Mas. Stam. numerosa. Fem. Carpella numerosa, receptaculo globoso imposita. N. ab E. gen. 6. 19.

1. **S. sagittaefolia** (L. sp. 1410.) foliis profunde sagittatis, scapo simplici. 4. In aquis stagnantibus. Jun. Jul. Schk. t. 298. St. h. 18. Variat foliis lanceolatis acuminatis et ovatis acutis: haec est S. heterophylla Schreb. in Kört. et Schw. fl. erlang. 2. 119. Pet. alba, unguibus purpureis.

Ord. CXV. BUTOMEAE. Rich. mem. du mus. 2. p. 365.

Cal. 3 *sepalus*, *quandoque coloratus et petalis similis. Cor. tripetala, hypogyna.* Stamina hypogyna, libera, definita vel indefinita. *Ovaria* 3-6, *plura*, *supera*, *seiuncta*, *vel basi connata*, *singula stigmate terminata*, *multi-ovulata*, *ovulis totam superficiem interiorem ovarii occupantibus.* Sem. exalbuminosa. Embryo in directione seminis.

1. BÚTOMUS (L. gen. n. 507.) Perigonium 6 phyllum, corollinum. Stam. 9, tria interiora. Capsulae 6, inferne connatae, introrsum dehiscentes. N. ab E. gen. 6. 20.

1. **B. umbellatus** (L. sp. 532.) In fossis, piscinis et aquis lente fluentibus. Jun.-Aug. Schk. t. 111. St. h. 18. Flores rosei.

Ord. CXVI. JUNCAGINEAE. Rich. mem. du mus. 2. p. 365.

Perigonium inferum, 6 *phyllum*, *calycinum vel subcoloratum.* Stam. 6 hypogyna. *Ovaria* 3, 6, singula stylo libero vel stigmate oblique adnato terminata, *supera*, *superne disiuncta et basi tantum connata vel in uncium* 3 *vel* 6 *sulcatum connata et maturitate in carpella totidem ab axi centrali soluta*, 1, 2 *ovulata*, *ovulis erectis.* Fructus siccus. Sem. exalbuminosa. Embryo in directione seminis, rima laterali instructus, ex qua inter germinationem plumula prodit. Flores in racemis vel spicis.

1. SCHEUCHZÉRIA (L. gen. n. 452.) Perigon. profunde 6 partitum. Stam. 6, filamentis gracilibus. Ovaria 3-6, biovulata. Styl. o. Stigma in

apice ovarii extrorsum oblique adnatum. Caps. divergentes, inflatae, basi connexae, 2 valves. N. ab E. gen. 2. 9.

1. **S. palustris** (L. sp. 482.) In paludibus turfosis; in subalpina adscendens, (stw. durch d. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 626. Schk. t. 100. St. h. 78.

3. TRIGLÓCHIN (L. gen. n. 453.) Perigon. 6 phyllum. Stam. 6, antheris subsessilibus. Ovaria 3-6, uniovulata. Styl. o. Stigmata plumosa. Caps. 3-6, axi angulari affixae, basi denique solutae et angulo interiore longitudinaliter dehiscentes. — Flores virentes. — N. ab E. gen. 2. 8.

1. **T. maritimum** (L. sp. 482.) *fructibus ovatis* angulatis *sub stigmatibus reflexis coarctatis* in capsulas 6 secedentibus, racemis elongatis. 4. Ad littora maris et in pratis salsis ad salinas. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 628. St. h. 78. G.

2. **T. palustre** (L. sp. 482.) *fructibus linearibus* angulatis *basin* versus *attenuatis* rachi adpressis in capsulas 3 secedentibus, stigmatibus sessilibus. 4. In pratis et pascuis humidis. Jun.-Jul. D. fl. 2. 627. St. h. 13. — Triglochin Barrelieri Lois. fl. gall. ed. 1. p. 725. differt caule humiliore, 5-6 pollicari, racemo 6-12 floro, fructibus erecto-patulis, non adpressis, basi non angustatis, sed ibidem paulo latioribus et supra basin paulum coarctatis.

Ord. CXVII. POTAMEAE. Juss. dict. sc. nat. p. 93.

Perigonium inferum, 4 *partitum, vel o.* Stam. libera 1, 2, 4. *Ovaria* 4, *plura, disiuncta, uniovulata, stylo vel stigmate sessili terminata.* Carpella indehiscentia, nucamentacea vel drupacea. Sem. exalbuminosum. Embryo curvatus vel involutus. Herbae sub aqua viventes foliis omnibus submersis vel superioribus natantibus. Flores hermaphroditi vel unisexuales.

1. POTAMOGÉTON (L. gen. n. 174.) Flores hermaphroditi. Perigon. 4 partitum. Antherae 4, sessiles, basi laciniarum perigonii insertae. Ovaria 4, styl. o. Drupae 4, sessiles. N. ab E. gen. 6. 13. — Flores virentes.

Sect. I. Heterophylli. Folia alterna, floralia tantum opposita, suprema in planta perfecta adulta natantia et, quod figuram et saepe quoque consistentiam eorum attinet, a submersis diversa.

a. Folia floralia omnia coriacea et natantia.

1. **P. natans** (L. sp. 182.) *foliis omnibus longe petiolatis*, iunioribus submersis angustioribus lanceolatis oblongisve, *natantibus coriaceis basi leviter cordatis* ovalibus oblongisve, petiolis *submersis sub anthesi ob laminam folii putredini destructam aphyllis*, pedunculis aequalibus, *fructus recentibus* compressis *margine obtusis* *), caule simplici. 4. In aquis stagnantibus et fluentibus. Jul. Aug. D. fl. 1. p. 836. Folium primum et secundum in caule novello vera sunt phyllodia, omni lamina destituta, ut nunc demum verno tempore observavi; subsequens fol. angustissimam habet laminam, quae vero sensim in latitudinem eo magis augetur, quo altius folium progreditur. Phyllodia autem hic descripta non nisi verno tempore reperiuntur, nam sub medium mensis Maji putredine destruuntur et sub anthesi jam

*) Fructus Potamogetonum, sicut omnes fructus drupacei, in statu recente et vivo describendi sunt, in sicco corrugantur, varias saepe formas induunt et tum notas fallaces praebent. Potamogeton natans e. gr. fructus recentes margine obtusos et rotundatos habet, qua nota optime a P. spathulato et P. rufescente, qui fructibus lenticularibus margine acutis praediti sunt, distinguitur. Sed fructus siccati in quibusdam speciebus bonos quoque characteres exhibent. In diagnosi annotavi, utrum in statu vivo, an in sicco fructus descripserim.

dudum evanuerunt, quo tempore folia inferiora, qualia cl. Gaudin. fl. helv. 1. p. 466. ipsa describit nondum vidi; memorat: „folia inferiora submersa alterna, linearia, acuta, sed mutica, angustissima, semipedalia et ultra, canaliculata, multo laetius quam caetera omnes partes plantae virentia. Foliorum imorum petioli limbo plane carentes; stipulis elongatis viridiusculis“, et in observatione „eiusmodi petioli juniores viridissimi tenerrimique mensibus Augusto et Septembri vulgo occurrunt.“ „Caeterum rami steriles foliaque formam fere referunt P. graminei et in herbariis nonnunquam sub eo nomine occurrunt.“ Quid hoc sit, plane ignoro. — Folia natantia nostrae hic descriptae speciei, saltem superiora, basi leviter cordato-excisa sunt, si cum petiolo in planum horizontale extenduntur, utrinque ad petiolum in plicam elevantur: P. natans vulgaris D. fl. 1. 837. Schk. Handb. t. 28. Fries. nov. ed. 2. p. 28. (ubi fructus e speciminibus siccis descriptus est.) Occurrit:

α. vulgaris, folia lato-ovalia, petioli mediocriter longi: P. natans *α.* vulgaris D. fl. 1. p. 837. St. h. 9., figura diminuta. Hic in piscinis et aquis stagnantibus.

β. prolixus, caules et petioli in rivulis valde elongantur et folia in rivulis strenue fluentibus saepe angustiora oblongo-lanceolata fiunt; ad hanc ultimam formam: Potamogeton natans lacustris Fries. nov. fl. suec. ed. 2. p. 28. P. serotinus Schrader. in litt. ad amicos. Folia submersa saepe numerosa basi apiceque attenuata pellucida, tamen non ita conspicue ut in P. fluitante.

2. **P. oblongus** (Viviani fragm. fl. ital. p. 2. t. 3.) *foliis omnibus longe petiolatis, submersis sub anthesi persistentibus lanceolatis, natantibus coriaceis oblongis, supremis ovatis basi leviter cordatis,* petiolis supra plano-concaviusculis, pedunculis aequalibus, *fructibus recentibus* compressis *margine obtusis,* caule simplici. 4. In fossis pratorum uliginosorum et ericetorum turfosorum. Jul. Aug. P. natans intermedius et minor D. fl. 1. p. 839. Suadente Friesio hunc nunc separavi. Differt a P. natante foliis submersis sub anthesi plerumque putredine nondum destructis, fructibusque minoribus, sed fructus praeterea exacte ut in P. natante comparati sunt et magnitudine excepta a fructibus hujus non differunt. Planta caeterum, quod magnitudinem omnium partium attinet, valde variabilis est. Folia submersa saepe anguste lanceolata, natantia prima basi in petiolum attenuata, suprema basi leviter cordata. Inter hanc in fossis minus profundis occurrit modificatio foliis natantibus pollicem vel sesquipollicem tantum longis: P. natans *ε.* minor D. fl. 1. 839. Hanc modificationem b. Schraderus in literis ad me datis P. parnassifolium suum esse declaravit. Potamogeton hic, si in paludibus turfosis, quae per aestatem aqua superficiali orbantur, provenit, in formam transit caule abbreviato et foliis omnibus conformibus formaque natantium gaudentibus.

3. **P. fluitans** (Roth. tentam. fl. germ. 1. 72. 2. 202.) *foliis omnibus longe petiolatis, submersis sub anthesi persistentibus elongato-lanceolatis membranaceis* pellucidis, *natantibus coriaceis oblongo-lanceolatis ovalibusve basi acutis vel rotundatis,* petiolis supra convexis, pedunculis aequalibus, *fructibus recentibus* compressis, *margine acutiusculo.* 4. In fluviis, (nördl. D. u. Rheingegend.) Jul. Aug. P. oblongus Mey. chlor. Hannov. p. 519. P. natans *γ.* angustatus D. fl. 1. p. 838. Descriptionem petiolorum e novitiis cl. Noltei sumsi; sed pedunculos incrassatos, qui ibidem memorantur, non reperio. Folia, etiam suprema, basi non in plicam flexa, qua nota differt a P. natante et P. oblongo, et ibidem nunc rotundata, nunc attenuata. Occurrit in fossis et paludibus, aqua stagnante repletis, foliis inferioribus tenuioris substantiae quidem et lanceolatis, sed parum pellucidis, supremisque ovalibus vel oblongis.

Petioli juniores supra plani subtus convexi, adulti supra subtusque convexi. Sonder in litt.

β. stagnatilis: P. natans *β.* explanatus D. fl. 1. 837., collatis speciminibus pluribus, in variis regionibus collectis, nunc edoctus sum, hunc Pota-

mogetonem modificationem P. fluitantis esse. — P. sparganifolius Laestad. in Fries. nov. mant. 1. p. 9. et P. variifolius Thor. lond. 47. a P. fluitante longe differunt.

4. **P. spathulatus** (Schrader. ap. Koch. et Ziz. cat. pl. palat. p. 5. et 18.) *foliis omnibus petiolatis*, submersis membranaceis pellucidis, *infimis* anguste lanceolatis *in petiolum longe cuneato-attenuatis*, sequentibus sensim magis oblongis in petiolum longum decurrentibus, *natantibus coriaceis* ovali-oblongis obtusis basi protractis *petiolo duplo triplove brevioribus*, pedunculis aequalibus, *fructibus recentibus lenticulari-compressis margine acuto instructis*. 4. In rivulis montanis, aqua fontana pura frigida repletis, (bisher bloss in d. westlichen Gegend der Rheinpfalz bei Kaiserslautern u. Zweibrücken, Limbach u. Kirkel.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 840. Species, me iudicante, certa, quae colore foliorum natantium laete et dilute viridi ab affinibus P. natante et P. rufescente iam e longinquo dignoscitur. Praeter colorem foliorum (in planta viva,) laete viridem et fructus lenticulares margineque acuto praeditos a P. natante differt foliis infimis in petiolum brevem longe et sensim attenuatis, caulinis mediis oblongis quidem, sed basi longe cuneato-attenuatis; a P. rufescente, quocum fructibus convenit, foliis caulinis intermediis longe petiolatis, nec sessilibus, et supremis quoque longe petiolatis, foliisque floralibus semper coriaceis. Caeterum folia inferiora florescentiae tempore ut in P. natante et P. rufescente plerumque putredine destructa, ideoque in caulibus sterilibus quaerenda sunt. Semina, quae e loco natali accepi, in horto nostro non germinaverunt. — Specimina, quae sub nomine P. spathulati in Germ. borcali lecta, et in collectionibus asservata hucusque vidi, ad hanc speciem non pertinent. G.

b. Folia floralia caulinis similia, seriora tantum natantia et vel coriacea vel membranacea formaque, sed non in omnibus, diversa. Folia haec natantia saepe non apparent.

5. **P. rufescens** (Schrader. in Chamiss. adnot. ad Kunth. fl. berol. p. 5.) *foliis submersis sessilibus* membranaceis pellucidis lanceolatis basi apiceque attenuatis obtusiusculis *margine laevibus*, *natantibus coriaceis* obovatis obtusis in *petiolum folio breviorem attenuatis*, pedunculis aequalibus, *fructibus recentibus lenticulari-compressis margine acuto* instructis, caule simplici. 4. In aquis stagnantibus et rivulis. Jul. Aug. D. fl. 1. p. 844. P. semipellucidum Koch. et Ziz. cat. pl. palat. p. 5. et 18. P. obscurum DC. fl. franc. suppl. p. 311. P. serratum Roth. tent. 1. 73. 2. 205. P. fluitans Sm. brit. 1391. P. annulatum Bellard. act. taur. vol. 7. p. 445. t. 1. f. 2. P. alpinum Balb. misc. p. 13. P. purpurascens Seidel. P. obtusus Ducros ap. Gaud. helv. 1. p. 468.

6. **P. Hornemanni** (Meyer. chlor. Hannov. p. 521.) *foliis omnibus petiolatis membranaceis pellucidis margine laevibus*, submersis inferioribus lanceolatis, *natantibus subcordato-ovatis*, petiolis folium dimidium aequantibus, pedunculis aequalibus, fructibus recentibus compressis margine obtusis, caule ramoso. 4. In aquis stagnantibus, (auf d. Rheinfläche; in Westphalen, Lauenburg u. Ostfriesland, im Waadtlande u. C. Bern d. Schw.) Jul. Aug. P. coloratus Hornem. fl. dan. t. 1449. P. plantagineus Ducros. ap. Roem. et Schult. s. veg. 3. 504. D. fl. 1. p. 842. Planta nunc tota rufa, nunc laete viridis. Fructus recentes, ut in P. natante, margine obtusi. — Lubenter cum cl. Mayero huic plantae nomen botanici meritissimi impono. Variat foliis superioribus subrotundo-ovatis, qui P. plantagineus rotundifolius D. fl. l. c.

7. **P. gramineus** (L. sp. 184.) *foliis submersis membranaceis pellucidis* lanceolato-linearibus anguste vel lato-lanceolatis acuminatis *basin versus attenuatis sessilibus margine scabriusculis*, supremis brevioribus latioribus petiolatis, *natantibus lanceolatis ovatisve longe petiolatis coriaceis*, his saepe deficientibus, *pedunculis* apicem versus *incrassatis*, fructibus recentibus compressis margine obtusis, caule ramosissimo. 4. In aquis fluentibus et stagnantibus. Jul. Aug. P. heterophyllus Schreb. spicil. fl. lips. p. 21. D. fl. 1. 843. Variat:

α. graminifolius, folia submersa lanceolato-linearia, utrinque attenuata, flaccida, caulis elongatus. Specimen possideo foliis 5 pollices longis, 3 lineas latis: P. gramineus *α.* graminifolius Fries. nov. ed. 2. p. 36. P. heterophyllus *γ.* elongatus D. fl. 1. p. 845. P. gramineum L. suec. 2. n. 151., conf. Fries. l. c. Occurrit 1. caulibus foliisque longissimis intra fluviorum et rivorum aquas fluitantibus: P. gramineus a. fluvialis Fries. l. c. 2. caule erecto ramosissimo, foliis brevioribus, summis passim latioribus et curvatis: P. gramineus b. lacustris Fries. l. c. Hoc quoque cum foliis supremis natantibus coriaceis et longe petiolatis possideo. Varietas *α.*, hic proposita, nomen P. graminifolii omnino meretur, sed in totam speciem minime quadrat.

β. heterophyllus, folia submersa breviora, recurvata, plerumque rigidiora, non raro rigida: P. gramineus *β.* heterophyllus Fries. l. c. P. heterophyllus *α.* foliosus D. fl. 1. 844. P. Proteus heterophyllus Cham. et Schlechtend. in Linnaea 2. p. 202. P. hybridum Thuill. fl. par. P. augustanum Balb. misc. p. 14. t. 3. P. distachyum Bellard. et P. crassipes Kit. fide herb. Willd. conf. Linnaeam l. c. Folia natantia coriacea saepe longissime petiolata sunt.

γ. Zizii, duplo triplove antecedentibus formis maior, folia praecipue superiora, obtusa, at semper mucrone praedita, et saepe evidenter undulata: P. heterophyllus *δ.* latifolius D. fl. 1. p. 845. P. Proteus B. Zizii Cham. et Schlechtend. l. c. p. 201. Non raro formam cornutam efficit, foliis scilicet plurimis limbo orbatis et fere ad nervum medium reductis. Aqua diminuta, folia petiolata coriacea profert, ut antecedens; sed in aqua ipsa talem formam, quamquam multo rariorem, quoque vidi. Ad varietatem foliis supremis coriaceis pertinet P. lucens *δ.* coriaceus D. fl. 1. p. 850., per errorem ad P. lucentem relatus. P. lucens *β.* heterophyllus et *γ.* amphibius Fries. l. c. p. 34., etiam ad hanc varietatem pertinere videntur. — Formis intermediis abit in antecedentem, ut saepius observavi.

Cl. Reichenbach in cent. XVII. Iconograph. Potamogetones pulchris figuris illustravit; quod autem determinationes attinet, non ubique adsentire possum. *Potamogeton Zizii* ut varietas Potamogetonis lucentis proponitur, dum situ et dispositione nervorum in foliis cum Potamogetone gramineo exacte conveniat, et a P. lucente plane differat; specimen vero in tab. XXXVIII, plantam sterilem referens, nempe figura inferior, quae transverse subjecta est, omnino ad P. lucentem pertinet, neque ad P. Zizii, id est, cum varietate majore P. graminei convenit, non vero cum P. lucente.

8. **P. nitens** (Weber. fl. hols. suppl. n. 11. secund. Nolt. nov. fl. hols. p. 18.) *foliis submersis membranaceis pellucidis* lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis muticis *basi rotundatis semiamplexicaulibus margine scabriusculis, natantibus* oblongis lanceolatisve in petiolum attenuatis *coriaceis,* his saepe deficientibus, pedunculis apicem versus plerumque crassioribus, fructibus exsiccatis compressis margine carinatis, caule ramosissimo. 4. In aquis fluentibus et stagnantibus, (bisher bloss im nördl. Deutschl.) Jul. Aug. P. nitens Fries. l. c. p. 34. D. fl. 1. 846. Variat, ut antecedens:

α. salicifolius, folia submersa lineari-lanceolata stricta; caulis elongatus: P. nitens *α.* salicifolius Fries. l. c. p. 34. P. gramineum Wahlenb. ups. p. 57. (In fl. suec. cum P. antecedente iungi videtur; Fries. l. c.) Haec varietas provenit in fluviis et rivulis.

β. heterophyllus, folia submersa breviora, lanceolata, quandoque ovato-lanceolata, recurva, caulis brevior ramosissimus: P. nitens *β.* heterophyllus Fries. l. c. p. 35. P. heterophyllus lacustris Cham. adn. p. 5. P. curvifolius Hartm. scand. ed. 2. p. 45. P. Proteus curvifolius Ch. et Schl. in Linn. 2. p. 205. G.

Sect. II. Homophylli. Tota planta submersa, spicis sub anthesi tantum emersis. Folia alterna, floralia opposita, omnia membranacea, lanceolata et latiora, ad figuram subrotundam usque.

9. **P. lucens** (L. sp. 183.) *foliis omnibus submersis membranaceis* pellucidis *petiolatis* ovalibus lanceolatisve mucronatis *margine serrulato-scabris,*

pedunculis superne incrassatis, fructibus recentibus compressis margine obtusis leviter carinatis, caule ramoso. 4. In aquis stagnantibus et fluentibus. Jul. Aug. D. fl. 1. p. 848. Fl. dan. t. 195. P. serratum Web. prim. fl. hols. p. 16. P. Proteus A. lucens Ch. et Schl. in Linnaea 2. p. 197. Occurrit foliis ovalibus et lanceolatis, etiam sub forma cornuta, si lamina folii brevior angustiorque evadit et apice spinaeformi terminatur: P. acuminatum Schum. saell. 1. p. 49.; vel si tota lamina evanescit, remanente solo nervo medio paulum incrassato. — Forma heterophylla in D. fl. 1. p. 848. memorata, non ad P. lucentem, sed ad P. graminei varietatem γ. Zizii pertinet. — P. longifolius Gay. in Poir. dict. suppl. 4. 535. (P. macrophyllus Wolfgang. sec. specimen, a cl. Bessero missum,) Potamogetoni lucenti similis est, sed folia multo angustiora, lanceolata, utrinque acuta, in petiolum pollicarem attenuata, 8 pollices longa, 8 lineas lata, margine laevia sunt. In Helvetia provenire dicitur, sed nec Gaud., neque egomet specimen helveticum vidimus.

10. **P. decipiens** (Nolte in litt. ad amicos.) *foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis basi rotundata sessilibus* ovalibus oblongisve obtusis *mucronatis margine laevibus*, pedunculis aequalibus, fructibus . . . . . 4. In fluviis, (Lauenburg im Schellsee u. in der Bille, sodann bei Kiel, Nolte in litt. 1845; in der Bille bei der Aumühle unweit Bergedorf Fl. von Hamburg, Sonder in litt.) Jul. Aug. Nolte apud Reichenb. fl. exsicc. n. 1603. Differt a P. lucente venis foliorum approximatis et margine foliorum non denticulato; a P. praelongo foliis basi non dilatatis et apice non cucullato-contractis, a P. Zizii, cui valde accedit, foliis superioribus sessilibus neque in petiolum attenuatis. Fructus nondum vidi. G.

11. **P. praelongus** (Wulf. in Roem. arch. 3. 331.) *foliis omnibus submersis* membranaceis pellucidis *e basi ovata amplexicauli elongato-oblongis* lanceolatisve obtusis muticis apice cucullato-contractis *margine laevibus*, pedunculis aequalibus, *fructibus siccatis* compressis *dorso alato-carinatis*, caule ramoso. 4. In fluviis et lacubus, (von Holstein u. Lüneburg durch d. nördl. D. bis Pommern u. Brandenb.; in d. Alpenseen d. Schweiz u. in dem Laibachflusse in Krain.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 851. Reichenb. ic. 2. f. 323. P. lucens Web. prim. fl. hols. p. 15. P. flexuosum Schleich.! P. flexicaulis Dethard. im Strelitz. Anzeig. 1809. n. 50. P. acuminatum Wahlenb. fl. ups. n. 116.

12. **P. perfoliatus** (L. sp. 182.) *foliis omnibus submersis* membranaceis pellucidis *e basi cordata amplexicauli ovatis vel ovato-lanceolatis margine scabriusculis*, pedunculis aequalibus, fructibus recentibus compressis margine obtusis, caule subramoso. 4. In stagnis et fluviis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 1. 851. Variat foliis cordato-subrotundis: P. Loeselii R. et S. s. veg. 3. p. 508.; foliis cordato-oblongis, 3 pollices longis, 1 latis, medio paulo latioribus, et foliis cordato-lanceolatis.

13. **P. crispus** (L. sp. 183.) *foliis omnibus submersis* membranaceis pellucidis sessilibus lineari-oblongis obtusiusculis breviter acuminatis serrulatis *undulato-crispis*, pedunculis aequalibus, fructibus compressis rostratis, caule ramoso compresso. 4. In aquis stagnantibus et fluentibus. Jul. Aug. Fl. dan. t. 927. D. fl. 1. 852.

Sect. III. Chloephylli. Tota planta submersa, spicis sub anthesi tantum emersis. Folia graminea, exacte linearia, omnia conformia, sessilia et alterna, floralia solummodo opposita.

14. **P. compressus** (L. sp. 183.) *foliis omnibus* submersis membranaceis pellucidis sessilibus *exacte linearibus* obtusis breviter mucronatis *multinerviis, nervis* 3-5 *validioribus, spicis cylindricis* 10-15 *floris*, caule alato-complanato ramoso. 4. In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Jul. Aug. P. zosteraefolius Schumacher. en. 1. p. 50. D. fl. 1. p. 853. Reichenb. ic. 2. f. 308. P. complanatus Willd. berl. Mag. 5. p. 248. P. cuspidatum Schrad. ap. Sm. engl. fl. 1. 234. G.

15. **P. acutifolius** (Link. ap. Roem. et Schult. syst. veg. 3. p. 513.) *fo-*

liis omnibus submersis membranaceis pellucidis sessilibus *exacte linearibus* apice cuspidatis *multinerviis, nervis* 3-5 *validioribus, spicis* 4-6 *floris, fructiferis subrotundis,* caule alato-complanato ramosissimo. 4. In aquis stagnantibus et rivulis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 854. Reichenb. ic. 2. f. 309. G.

16. **P. obtusifolius** (Mert. et Koch. Deutschl. fl. 1. p. 855.) *foliis omnibus* submersis membranaceis pellucidis sessilibus *exacte linearibus* obtusis breviter mucronulatis 3-5 *nerviis, pedunculis spicam* 6-8 floram continuam *aequantibus,* caule compresso marginibus rotundato ramosissimo. 4. In lacubus et piscinis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. P. gramineum Sm. brit. 196. P. compressum Roth. tent. et alior. P. gramineus Gaud. helv. 1. p. 476.

17. **P. pusillus** (L. sp. 184.) *foliis omnibus* submersis membranaceis pellucidis sessilibus *exacte linearibus* acutiusculis mucronulatis 3-5 *nerviis, pedunculis spica* 4-8 flora saepe interrupta *duplo triplove longioribus*, fructibus oblique ellipticis, caule e tereti compresso ramosissimo. 4. In aquis stagnantibus et rivis. Jul. Aug. D. fl. 1. p. 856. Variat:

α. maior, foliis latioribus, lineam fere latis: P. compressus D. fl. 1. p. 856. Sm. brit. 195. P. pusillus a. maior Fries. l. c. p. 48. var. a. Cham. et Schl. in Linnaea 2. p. 172.

β. vulgaris, foliis dimidiam lineam circiter latis: P. pusillus b. vulgaris Fries. l. c. P. pusillus *α.* maior D. fl. 1. p. 856.

γ. tenuissimus, foliis angustissimis, quandoque quartam vel quintam lineae partem vix latis: P. pusillus *β.* tenuissimus D. fl. 1. p. 856.

18. **P. trichoides** (Cham. et Schlechtend. in Linnaea 2. p. 176., excl. synon. M. et K. Deutschl. fl.) *foliis omnibus* submersis membranaceis pellucidis sessilibus *setaceo-linearibus* acuminatis *uninerviis aveniis,* pedunculis spica 4-8 flora saepe interrupta duplo triplove longioribus, *fructibus semiorbiculatis,* caule teretiusculo ramosissimo. 4. In lacubus et piscinis, (Schlesien, Berlin, Bremen u. auch bei Nürnberg, erst in neuerer Zeit an einer Stelle gefunden, Sturm jun.) Jul. Aug. — Descriptio Potamogetonis gracilis Fries. l. c. p. 50. egregie cum nostra planta congruit, excepta fructus adumbratione, quem elliptico-globosum, haud compressum auctor describit. G.

Sect. IV. Coleophylli. Tota planta submersa, spicis sub anthesi tantum emersis. Folia graminea, exacte linearia, omnia conformia, alterna, basi vaginantia, vagina stipulae adnata.

19. **P. pectinatus** (L. sp. 183.) *foliis* omnibus submersis membranaceis pellucidis *basi vaginantibus linearibus* vel lineari-setaceis acutis uninerviis transverse venosis, venis crassiusculis, spicis longe pedunculatis, *fructibus oblique obovatis* subsemiorbicularibus compressis, *siccatis dorso carinatis stylo brevi adscendente terminatis.* 4. In stagnis et fluviis. Jul. Aug. P. pectinatus D. fl. 1. p. 857. (excl. P. marino Linnaei.) — P. zosteraceus Fries. nov. ed. 2. p. 51., foliis 3-5 nerviis latioribus a P. pectinato diversus, in ditione flor. nostr. nondum inventus est.

20. **P. marinus** (L. sp. 184.) *foliis* omnibus submersis membranaceis pellucidis *basi vaginantibus linearibus* vel lineari-setaceis acutis uninerviis transverse venosis, venis crassiusculis, spicis longe pedunculatis, *fructibus obovato-subglobosis, siccatis corrugatis dorso lato-rotundato ecarinatis stigmate lato sessili coronatis.* 4. In aqua salsa ad littora maris, (nördl. D.; auch in einem kleinen Teiche auf d. Alpe zw. Badia u. Gardona im südl. Tyrol.) Jul. Aug. P. marinus Fries. l. c. p. 54. P. setaceum Schummach. saell. p. 51. P. filiformis Pers. syn. 1. 152. Nolt. nov. fl. hols. p. 20. Cham. et Schlecht. Linnaea 2. p. 168. (excl. syn. M. et K. Deutschl. flor.) — Fructus plus quam dimidio minores quam in Potamogetone pectinato. Ab hoc autem evidenter differt memorabilis illa planta a Dom. Gehrhard prope Stötteritz (Fl. lips.) lecta, cujus mentionem feci sub Potamogetone marino (in Synops. ed. 2. p. 781. verbis: „Planta rara, mihi nondum satis clara, ..., fructus recentes, uti e cortice valde collapso et corrugato conjicere licet,

succulenti videntur.“) et de qua tria possideo specimina. Fructus plus duplo majores sunt, flavi, eximie corrugati et dorso obtusissimi. Fructus magnitudine conveniunt cum P. pectinato, sed stigmate lato sessili, carina dorsali deficiente caeterisque notis, quas proposui, ab isto luculenter differt. G.

Sect. V. Enantiophylli. Tota planta submersa, spicis sub anthesi tantum emersis. Folia pellucida, conformia, omnia opposita.

21. **P. densus** (L. sp. 182.) *foliis omnibus oppositis* et submersis membranaceis pellucidis sessilibus amplexicaulibus ellipticis lanceolatis vel linearilanceolatis, spicis alaribus breviter pedunculatis, defloratis reflexis, fructibus siccatis compressis lato-carinatis rostratis. 4. In aquis stagnantibus et fluentibus, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 859. Fl. dan. t. 1264. Var.:

α. foliis ovatis acuminatis: P. densus L. l. c.

β. lancifolius, foliis e basi ovata sensim et fere in recta linea attenuato-acutis, 1 pollicem circiter longis, 3-4 lineas latis: P. oppositifolium DC. fl. fr. 3. p. 186. P. serratum L. sp. 183.

γ. angustifolius, idem ac antecedens, sed foliis lineam vel sesquilineam tantum latis: P. oppositifolium *β.* lancifolium D. fl. 1. p. 860. DC. fl. fr. 5. p. 311. P. setaceum L. sp. 184.

2. RUPPIA (L. gen. n. 175.) Flores hermaphroditi. Perigon. o. Stam. 2. Filamenta brevissima squamaeformia. Antherarum sacculi filamento utrinque inserti, basi divergentes, apice contigui. Ovaria 4; styl. o. Nuces (drupae siccae?) 4, denique longe stipitatae. N. ab Esenb. gen. 6. 12.

1. **R. maritima** (L. sp. 184.) *antherarum sacculis oblongis,* fructibus ovatis oblique erectis. 4. In fossis et paludosis ad maris littora, (am Adriat. Meere, d. Ost- u. Nordsee, im Fürstenth. Göttingen im Denkenhäuser Sumpfe.) Aug. in autumn. Reichenb. ic. 2. f. 307. R. maritima *α.* D. fl. 1. p. 861. G.

2. **R. rostellata** (Koch. ap. Reichenb. ic. 2. p. 66. f. 306.) *antherarum sacculis subglobosis,* fructibus subsemilunari-ovatis e basi obtusa adscendentibus. 4. In fossis ad littora maris et ad salinas, (an d. Ostsee u. bei Artern im Magdeb.) Aug.-autumn. R. maritima *β.* D. fl. 1. p. 861. R. obliqua G. F. Meyer. Mspt. R. rostellata chlor. Hannov. p. 527. G.

3. ZANICHELLIA (L. gen. 1034.) Flores monoici; masc. et fem. in eadem vagina. Mas. Perigon. o. Stam. 1. Fem. Perigon. campanulatum. Stylus persistens; stigma oblique peltatum. Nuces 3-5 pluresve, singulae carpophoro filiformi insidentes. N. ab E. gen. 6. 11.

1. **Z. palustris** (L. sp. 1375.) fructibus breviter pedicellatis, *stylo fructum dimidium aequante.* 4. In aquis stagnantibus et fluentibus. Jul.-Sept. Occurrit, caule in aquis altioribus elongato, fluitante, basi non repente: Z. major Bönningh. ap. Reichenb. ic. 8. f. 1005., et caule in aqua non alta ad genicula radicante: Z. repens Bönningh. fl. monast. prodr. p. 273., Reichenb. ic. 8. f. 1003.; praeterea fructibus dorso vix alatis, ibidem alato-crenatis, utrinque alatis, atque, destructo alae parenchymate, ibidem spinulosis.

2. **Z. pedicellata** (Fries. nov. mant. 3. p. 135.) fructibus longiuscule pedicellatis, *stylo gracili fructum aequante.* 4. In aqua marina inque fossis ad salinas sitis. Jul.-Sept. Z. palustris *β.* pedicellata Wahlenb. fl. suec. p. 577. Occurrit iisdem formis, ut antecedens. Forma fructu ala dorsali lata praedito: Z. pedunculata Reichenb. ic. f. 1007.; forma fructu utrinque alato: Z. gibberosa Reichenb. ic. f. 1006.

3. **Z. polycarpa** (Nolte novit. fl. hols. p. 75.) fructibus sessilibus vel brevissime pedicellatis, *stylo quartam fructus partem aequante.* 4. In fundo maris versus littora, (in dem Meere an der Küste der Ostsee bei Heiligenhaven, Nolte in briefl. Mittheilungen 1845; in den Novitiis florae holsat. ist gar kein Standort angegeben u. bei Reichenb. pl. exsicc. n. 1102 heisst es bloss: Küste v. Holstein; in Salzwasser an der Küste der Nordsee bei Brunsbüttel, Sonder.) Jul.-Sept. Reichenb. ic. f. 1004. G.

Ord. CXVIII. NAIADEAE. Link. Handb. 1. p. 820. Naiades Juss. et DC. fl. fr. 2. p. 585. pro parte.

Flores unisexuales, sparsi. Spatha multiflora in folium terminata, vel uniflora et perigonium urceolatum referens. Stam. libera 1, 3. Filamenta o, anthera sessilis. *Ovarium unicum,* uniloculare, uniovulatum; stigma 1, sessile, (in Naiade vix conspicuum,) vel 2-3, filiformia. Pericarpium nucamentaceum, vel subdrupaceum. *Semen exalbuminosum.* Embryo rectus vel arcuato-flexus. Herbae sub aqua viventes. Flores unisexuales.

1. NAIAS (L. gen. 1096.) Flores monoici vel dioici. Mas. Spatha monophylla urceolata, apice 2-3 dentata, perigonium simulans, antheram arcte includens. Anthera, (in N. maiori,) 4 locularis, in valvulas 4 revolutas dehiscens. Fem. Spatha ut in mare. Ovarium sessile, 1 loculare, 1 ovulatum, ovulo erecto. Stylus (in Naiade maiori) o, stigma non conspicuum, (Thedenius.) Si planta extra aquam eminet vel in limo longius viva conservatur anthera filamento elevatur, quomodo a b. Michelio gen. pl. t. 8. depicta fuit. N. ab E. gen. 6. 10.

1. **N. maior** (Roth. tent. 2. 2. p. 499.) foliis linearibus repando-dentatis, dentibus mucronatis, *vaginis integerrimis.* ☉. In lacubus et piscinis, (stw. dch. d. Geb.) Aug. Sept. Naias marina *α.* L. sp. 1441. N. fluvialis Lam. dict. 4. 416. N. monosperma Willd. sp. pl. 4. 331. St. h. 41. Ittnera Naias Gmel. bad. 3. p. 590. t. 3.

2. **N. minor** (Allion. fl. ped. 2. p. 221.) *foliis* anguste linearibus *repando-dentatis* recurvatis, dentibus mucronatis, *vaginis ciliato-denticulatis.* ☉. In stagnis et fossis, (stw. dch. d. Geb.) Aug. Sept. Schk. 3. p. 252. t. 296. N. fragilis Rostk. et Schm. fl. sed. 382. Caulinia fragilis Willd. sp. 4. p. 182. Ittnera minor Gmel. bad. 3. p. 592. t. 4.

3. **N. flexilis** (Rostk. et Schm. fl. sed. p. 382.) *foliis* anguste linearibus *minutissime* mucronulato-*denticulatis, vaginis ciliato-denticulatis.* ☉. In fundo arenoso lacuum, (bisher bloss im Geb. d. Flor. v. Stettin, aber häufig im Binowschen See.) Aug. Sept. Caulinia flexilis Willd. sp. 4. 183. G.

2. ZOSTÉRA (L. gen. n. 1032.) Spatha pedunculata, depressa, in folium terminata. Spadix linearis, trinervis, nervo medio lateris anterioris fructifero. Perigonium o. Flores nudi; masculi ex sola anthera, feminei e solo pistillo, sub apice affixo, formati. Styl. 1. Stigm. 2. (In monoicis antherae biseriales cum biserialibus pistillis alternant. N. ab E. gen. 6. 14.)

1. **Z. marina** (L. sp. 1374.) foliis trinerviis, *spathae pedunculo superne latiore,* nucibus striatis. ♃. In fundo arenoso maris. Aug. D. fl. 1. p. 280. Schk. t. 279. G.

2. **Z. nana** (Roth. en. pl. germ. 1. p. 8. 1827.) foliis uninerviis, *spathae pedunculo aequalis* latitudinis, nucibus maturis laevibus. ♃. In fundo arenoso maris insulam Norderney alluentis. (Mertens!) Jul. Aug. Z. Noltei Hornem. fl. dan. v. 12. p. 3. t. 2041., (sec. Meyer. in chlor. Hannov. p. 529.) Z. uninervis Reichenb. fl. exc. 137. (Num Z. uninervis Vahl., e mari rubro, „foliis spithameis et ultra" ad nostram speciem pertineat, dubito, in nostra enim folia non ultra digitum longa sunt. Fructus perfectos Z. nanae nondum vidi. G.

Ord. CXIX. LEMNACEAE. Link. Handb. z. Erkenng. d. Gew. 1. p. 289.

Perigonium monophyllum, compressum, integrum vel margine crenulatum. *Stam.* 1-2, hypogyna, altero serius explicato. Antherae didyma, biloculares. *Ovarium liberum,* 2-6 ovulatum, ovulis erectis. Styl. brevis; stigma obtusum.

Fructus utricularis, hyalinus. Sem. exalbuminosa. Embryo breviter arcuatus, inversus, radicula supera, ad chalazam, seminis apicem occupantem, versa. Sub germinatione cotyledon in corpus foliiforme extenditur, e cuius nervo medio subtus fibrae radicales simplices serius propullulant. — Herbulae aquaticae, natantes, aphyllae, caule in formam folii dilatato, articulato, plura folia, unum ex altero egrediens, aemulante. Articuli hi foliiformes subtus e foveola fibras radicales emittunt, in aquam dependentes, quae initio breves et in vagina, sulco paginae inferioris folii adplicita, inclusae, deinde elongantur, vaginam, relicto parvo urceolo, avellunt et in apice sub forma calyptrae continent.

1. LEMNA (L. gen. n. 1038.) Character ordinis. Lemnae perennes sunt ut Oxalis stricta, Solanum tuberosum aliaeque stirpes gemmis perhyemantibus sese propagantes. N. ab E. gen. 6. 9.

1. **L. trisulca** (L. sp. 1376.) *frondibus lanceolatis* denique petiolatis, prolificationibus cruciatim cohaerentibus, radicibus solitariis. ⊙. In aquis stagnantibus submersa. Apr. Mai. D. fl. 1. 294. St. h. 44. Staurogeton Reichenb. consp.

2. **L. polyrrhiza** (L. sp. 1377.) frondibus subrotundo-obovatis, *radicibus fasciculatis*. ⊙. In aquis stagnantibus natans. Apr. Mai. D. fl. 1. 296. St. h. 44. Spirodela polyrrhiza Schleiden in Linnaea v. 13. p. 392.

3. **L. minor** (L. sp. 1376.) *frondibus obovatis utrinque planis*, prolificationibus sessilibus, radice solitaria. ⊙. In aquis stagnantibus natans. Apr. Mai. D. fl. 1. 295. St. h. 44.

4. **L. gibba** (L. sp. 1377.) *frondibus obovatis* convexiusculis *subtus* spongioso-*convexis*, prolificationibus sessilibus, radice solitaria. ⊙. In aquis stagnantibus natans. Apr. Mai. D. fl. 1. 295. St. h. 44. Telmatophace gibba Schleid. in Linnaea v. 13. p. 391.

5. **L. arrhiza** (L. mant. 2. p. 294.) *frondibus* ellipticis subrotundisve, *subtus globoso-convexis radice destitutis*. ⊙. In aquis stagnantibus natans, (Gebiet der Fl. v. Spaa, Lejeun. fl. de spa. 2. p. 208.) Florens nondum reperta est. Michel. gen. t. 11. f. 4. St. h. 44. Inter plantas ditionis florae nostrae nunc recepi hanc speciem, licet specimina in loco designato lecta nondum viderim, cum a cl. Doctore J. F. Hoffmann in provinciis adjacentibus copiose reperta sit. Frondes quadruplo minores quam in Lemna minore et subtus jam a prima juventute globoso-convexae, quae in L. gibba in juventute subtus planae sunt ibidemque serius demum cellulis quasi spumosis obteguntur. Frondis superficies superior plana est, vel in medio paulum umbonata, et laete diluteque viridis, inferior latior subgloboso-convexa minusque colorata, fere pellucida. Figura frondis paulo variabilis plus minusve elliptica, vel obovata vel subrotunda, (conf. egregiam descriptionem cl. Hoffmanni in Wiegmann's Archiv für Naturgesch. 1840. p. 138.,) ideoque nunc non dubito, quin italica planta et gallica ad eandem speciem pertineant.

Ord. CXX. TYPHACEAE. Juss. gen. 25.

Flores monoici, in spicas densissimas cylindricas vel globosas congesti: spicae superiores masculae, inferiores femineae. Perigonium e squamis 3 pluribusque vel setis formatum. Mas. Stam. 3, libera vel connata, seu potius antherae tres pluresve filamento simplici insidentes. Fem. *Ovarium liberum*, 1 ovulatum, ovulo pendulo. Styl. 1. Stigm. simplex. Pericarpium non dehiscens, siccum. Embryo rectus, in centro albuminis.

1. TYPHA (L. gen. n. 1040.) Spicae cylindricae vel denique ellipticae.

Spica mascula: flores nudi, 2-3 andri, setis cincti; filamenta connata vel apice libera. Spica feminea: flores feminei neutris mixti nudi, plures receptaculis pedicelliformibus brevibus inserti. Flores feminei: ovarium oblongum, denique longe stipitatum, stipite setis elongatis basi adsperso; stylus filiformis, stigma spathulato-ovatum vel lineare et elongatum. Flores neutri, (in omnibus speciebus obvii,) clavati, obtusi, mucrone stylum aemulante imposito, longe stipitati, stipite basi setis elongatis adsperso. Utriculus monospermus. Spicae in omnibus speciebus anthesi incipiente tenues sunt, peracta anthesi duplo triplove crassiores evadunt.

1. **T. angustifolia** (L. sp. 1377., excl. var. *β.*) *foliis* anguste linearibus *culmo florente longioribus*, spicis cylindricis remotis, filamentis florum masculorum anthera sesquilongioribus, floribus femineis plerisque basi bractea filiformi apice subspathulato-dilatata setas aequante fultis, *stigmate elongato anguste lineari longe attenuato longe ultra setas emergente.* 4. In aquis stagnantibus et fluviis. Jul. Aug. Fl. dan. t. 815. T. angustifolia Reichenb. fl. germ. exsicc. n. 701., planta fructifera; T. elatior Reichenb. fl. g. exsicc. n. 702., eadem planta florens. Variat latitudine foliorum in uno eodemque loco a lineis 2 ad 4. Spicae femineae rufo-fuscae anthesi incipiente $1^1/_2$—2 lineas latae sunt, anthesi peracta 5-6 in diametro transversali habent. Nil fallacius, quam latitudo foliorum et crassities spicarum in T. angustifolia et T. latifolia. — T. elatior Boenningh., quam D. Sonder in locis in prodr. fl. monast. designatis copiose vidit, est T. angustifolia L. ipsa; beatus v. Boenningh. specimina minora ejusdem speciei pro T. angustifolia habuit.

2. **T. latifolia** (L. sp. 1377.) *foliis* lato-linearibus *culmo florente longioribus*, spicis cylindricis contiguis, raris remotiusculis, filamentis florum masculorum anthera dupla triplove longioribus, floribus femineis bractea destitutis, *stigmate obliquo spathulato-ovato acuto* cum colorata parte *ultra setas emergente.* 4. In aquis stagnantibus, fluviis. Jul. Aug. Schk. t. 271. Folia 3-6 lineas lata. Spica feminea nigra in viridem vergens, sub anthesi incipiente 2 lineas, fructifera 6-7 lineas in diametro transversali habet. Occurrit raro spicis paulum remotis.

3. **T. Shuttleworthii** (Koch. et Sonder.) foliis linearibus *culmo florente longioribus*, spicis cylindricis contiguis, filamentis florum masculorum anthera duplo triplove longioribus, floribus femineis bractea destitutis, *stigmate obliquo spathulato-lanceolato acuto, setis apicem stigmatis aequantibus.* 4. Ad ripas, (an der Aar in der Schweiz im Canton Bern u. auch bei Aarau noch gesammelt, Shuttleworth.) Jul. Aug. Planta 2-3 pedalis, quantum dijudicare licuit ex speciminibus a me visis, folia 2-4 lineas lata, spica feminea sub finem anthesis crassa, cinerea, punctulis nigris nebulosa, stigmatibus fuliginosis scilicet sub apicibus setarum absconditis. H.

4. **T. minima** (Hopp. pl. exsicc. cent. 3.) *foliis caulium florigerorum* lanceolatis *caule multo brevioribus*, fasciculorum sterilium anguste linearibus, spicis cylindricis, femineis florigeris anguste cylindricis fructiferis crassis ovalibus. 4. In paludosis, (bei Salzburg; auf d. Fläche d. Rheines gegen den Fluss hin, in Oberbaden u. d. Elsass; am Bodensee; in d. südlichen Schweiz.) April. Mai. T. minor Smith. fl. brit. 960. T. angustifolia *β.* L. sp. 1378.

2. SPARGANIUM (L. gen. n. 1041.) Spicae globosae. Flores perigonio paleaceo segregati. Drupa sicca, sessilis. N. ab E. gen. 2. 2.

1. **S. ramosum** (Huds. fl. angl. ed. 2. p. 401.) foliis basi triquetris lateribus concavis, *caule ramoso*, stigmate lineari. 4. In fossis, ad ripas. Jul. Aug. Schk. t. 282. S. erectum *α.* L. sp. 1378.

2. **S. simplex** (Huds. fl. angl. ed. 2. p. 401. exclusa varietate *β.*) foliis basi triquetris lateribus planis, *caule simplici, stigmate lineari.* 4. In stagnis et fossis. Jul. Aug. Schk. t. 282. S. erectum *β.* L. sp. 1378.

3. **S. natans** (L. sp. 1378.) foliis decumbentibus planis, *caule simplici,*

stigmate oblongo, spica mascula subsolitaria. 4. In piscinis et paludibus. Jul. Aug. Fl. dan. t. 260.

Ord. CXXI. AROIDEAE. Juss. gen. p. 23.

Spadix carnosus, simplex, floribus totus vel pro parte dense tectus, unisexualibus et nudis, vel hermaphroditis et perigonio 4-6 phyllo instructis, phyllis squamaeformibus. Stam. in unisexualibus filamentis brevissimis in structa, ovariis intermixta, vel supra ovaria collocata; in hermaphroditis perigonii phyllis opposita; filamentis longitudine perigonii praedita. Ovaria libera, 1-3 locularia, multiovulata. Styl. 1 vel stigm. 1. Pericarpium non dehiscens, siccum vel baccatum. Sem. 1 vel plura, albuminosa. Embryo in axi albuminis, rectus, teres, rima longitudinali, in qua plumula posita est.

Trib. I. *AROIDEAE VERAE.* Brown. Flores perigonio destituti.

1. ARUM (L. gen. n. 1028.) Spatha cucullata. Spadix apice nudus. Perigon. nullum; flores masculi e sola anthera, feminei e pistillo constructi. Antherae multiseriales, superiores; pistilla ad basin spadicis inserta. Bacca 1 sperma. N. ab E. gen. 2. 5.

Sect. I. Dracunculus Tournef. Glandulae cirrhiformes 2-3 seriales supra antheras spadici insertae.

1. **A. maculatum** (L. sp. 1370.) *foliis* hastato-sagittatis, *concoloribus vel fusco-maculatis, spadice recto* spatha breviore clavato, clava stipite suo triplo breviore. 4. In nemorosis umbrosis planitierum et montium humiliorum. Mai. St. h. 44. Folia plerumque concolora, raro maculis fuscis adspersa. Spadix atro-purpureus.

2. **A. italicum** (Mill. dict. n. 2.) *foliis* hastato-sagittatis *albo venosis, spadice recto* spatha breviore clavato, clava stipitem suum aequante. 4. In vineis et sylvaticis reg. calid., (bei Fiume gemein.) April. Spadix flavus J.

Sect. II. Arisarum Tournef. Glandulae cirrhiformes nullae.

3. **A. Arisarum** (L. sp. 1370.) foliis cordato-sagittatis mucronatis lobis basceos obtusis, *spadice* cylindraceo apice subclavato *incurvato* spatha cucullata breviore. 4. In vineis et umbrosis reg. calid., (bei Fiume u. auf d. benachbarten Inseln.) Mart. J.

2. CALLA (L. gen. n. 1030.) Spatha explanata. Spadix undique tectus staminibus et paucioribus ovariis his intermixtis. Perigon. o. Mas. Stam. 1; anthera didyma. Fem. Ovar. 1. Bacca. N. ab E. gen. 2. 4.

1. **C. palustris** (L. sp. 1373.) foliis cordatis, spatha plana. 4. In paludosis, (stw. dch. d. Gebiet, aber nicht in d. Schweiz.) Jul. Aug. St. h. 5. Spatha supra nivea. G.

Trib. II. *ORONTIACAE.* Brown. Flores perigonio praediti.

3. ÁCORUS (L. gen. n. 434.) Spatha nulla. Perig. hexaphyllum, persistens. Stam. filiformia, receptaculo inserta; stigma obtusum, sessile. Caps. 3 locularis, non dehiscens. N. ab E. gen. 2. 3.

1. **A. Calamus** (L. sp. 462., excl. var. *β.*) scapi apice foliaceo longissimo. 4. In aquis stagnantibus et fluviis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 569. Schk. t. 97.

Ord. CXXII. ORCHIDEAE. Juss. gen. p. 64.

Perigonium superum, petaloideum, sexpartitum, irregulare, subringens: laciniae tres exteriores et duo interiorum labium superius, (galeam,) tertia interiorum, situ primario superior, ex torsione ovarii vero plerumque inferior, forma et saepe directione diversa, labium inferius, (labellum,) referentes. Ovarium uniloculare, multiovulatum, placentis parietalibus. Stam. 3, ovario inserta. *Filamenta cum stylo arcte connata,* gynostemium componentia: duo lateralia sterilia, intermedio fertili, vel rarius duo lateralia fertilia, intermedio sterili. Anthera bilocularis: loculi dissepimentis incompletis saepe bi- vel quadrifidi; sacculi discreti et lateribus styli ultra producti adnati, vel coaliti et tunc anthera immobilis et persistens, vel mobilis, operculiformis et decidua. Pollen conglobatum in massas ceraceas vel granulosas, granulis facile separabilibus vel elastice cohaerentibus. Stigma in anteriore et superiore styli parte situm, area visco obducta et superius apiculo vel lamina, (rostello,) terminatum. Capsula rimis 3 longitudinalibus dehiscens. Sem. scobiformia. Embryo ad basin albuminis carnosi. Herbae, foliis vaginantibus vel amplexicaulibus, interdum in squamas decolores contractis, floribus spicatis bracteatis, radice fasciculata vel e tuberibus 2 integris palmatisve composita, quorum alterum quotannis perit.

Trib. I. *OPHRYDINEAE.* Anthera tota adnata. Massae pollinis lobulatae, elastice cohaerentes.

1. ORCHIS (Linn. gen. n. 1009., excl. spec.) Perigonium ringens, laciniis 3 vel 5 in galeam conniventibus. Labellum patens, subtus postice calcaratum, gynostemio ad antheram usque adnatum, aestivatione erectum, a laciniis perigonii exterioribus imbricatim tectum. Anthera tota adnata; loculi paralleli, inferne accumbentes, cum interiecto processu rostelli, basi bursicula communi coniuncti. Massae pollinis lobulatae, pedicellatae. Ovarium contortum. N. ab E. gen. 5. 1.

§. 1. Bracteae uninerviae. Tubera indivisa.

a. Labellum tripartitum, lacinia media antice dilatata bifida, ut plurimum cum denticulo in sinu fissurae hiantis.

1. **O. fusca** (Jacq. fl. austr. 4. t. 307.) *labello* penicellato-punctato *tripartito, laciniis lateralibus linearibus, intermedia a basi sensim dilatata obcordata* plerumque cum dente interiecto setaceo, lobis ovatis subtruncatis eroso-crenatis, calcare ovario plus duplo breviore, perigonii laciniis in galeam ovatam conniventibus inferne coalitis, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovario multoties brevioribus*, foliis oblongis, tuberibus indivisis. 4. In sylvaticis montanis, solo calcareo. Mai. Jun. St. h. 41. O. militaris *β.* et *γ.* L. sp. 1334. Galea atropurpurea, punctis saturatioribus, vel virescens et punctis atropurpureis adspersa, labellum album vel dilute roseum punctis purpureis hirsutis pictum. O. moravica Jacq., icon. rar. t. 182., est modificatio floribus pallidioribus et labelli lacinia media parum tantum emarginata.

2. **O. militaris** (L. fl. suec. p. 310.) *labello* penicillato-punctato *tripartito, laciniis lateralibus linearibus, intermedia lineari apice dilatata bifida* cum dente interiecto setaceo, *lobis oblongis divaricatis* apice crenulatis, calcare ovario plus duplo breviore, perigonii laciniis in galeam ovato-lanceolatam conniventibus inferne coalitis, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovario multoties brevioribus*, foliis oblongis, tuberibus indivisis. 4. In collibus calcareis inter virgulta. Mai. Jun. Hall. helv. t. 28. f. 1. Galea cinerea vel pallide purpurea, labellum dilute purpureum, medio albidum, punctis purpureis pictum. — Varietatem lobis laciniae mediae labelli linearibus et fere

in omnibus floribus uninerviis circa Mühlheim in Brisgovia legit mecumque communicavit beat. Lang. Haec bene convenit cum Orchide macra Lindl., Babingt. man. p. 290., sed mihi non nisi varietas videtur, saltem quod nostram speciem attinet; anglicam stirpem nondum vidi. Orchis Simia ab hac satis differt lobis laciniae mediae lacinia ipsa duplo longioribus.

3. **O. Simia** (Lam. fl. franc. ed. 1. p. 507.) *labello* subvelutino-punctato *tripartito, laciniis lateralibus anguste linearibus integerrimis incurvatis, intermedia bifida cum interiecto dente lineari, cruribus elongatis cum laciniis labii lateralibus conformibus* lacinia ipsa duplo longioribus, calcare ovario duplo breviore, perigonii laciniis in galeam ovato-lanceolatam conniventibus inferne coalitis, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovario multoties brevioribus*, foliis oblongis, tuberibus indivisis. 4. In collibus calcareis, (in d. Schweiz hin u. wieder; Südtyrol; im Elsass u. in Oberbaden; im Littorale.) Mai. O. tephrosanthos Vill. delph. 2. p. 32. O. militaris ε. L. sp. 1334. Column. ecphr. p. 320. fig. dextra. Galea purpurascenti-cinerea; labellum dilute purpureum vel albidum, saturatius purpureo-punctatum.

4. **O. variegata** (All. ped. 2. p. 147.) *labello* punctato-glabro *tripartito, laciniis lateralibus oblongis intermedia lato-obcordata* plerumque cum mucrone interiecto, omnibus acute dentatis, calcare ovarium dimidium aequante vel superante, perigonii laciniis in galeam conniventibus, omnibus attenuato-acutis, 2 intimis dorsali paulo tantum brevioribus, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovarium dimidium aequantibus superantibusque*, foliis oblongis, tuberibus indivisis. 4. In pratis et pascuis montanis, (im südl. Hannover; Pommern bei Stettin; Halle; Mähren; in Oberschlesien im Teschensch.; Littorale; Steyermark; Südtyrol; Oberbaden.) Mai. Jacq. ic. rar. 3. t. 599. O. Simia Vill. delph. 2. 33., secund. synon. Haller. (non Lam.) Orchis tridentata Scop. carn. 2. p. 190., nomen, prioritate quidem gaudens, tamen ob Orchidem tridentatam Mühlenbergii, ne confusio oriatur, adhibere nolui. Flores pallide purpurei, labellum purpureo-punctatum. Caulis in hoc ut plurimum sexfolius, in antecedente quadrifolius. — O. acuminata Desf. atl. 2. p. 318. t. 247. huic valde similis est, differt autem perigonii laciniis longe acuminatis et cuspidatis, 2 interioribus dimidio fere brevioribus, quam 3 exteriores. G.

5. **O. ustulata** (L. sp. 1333.) *labello* velutino-punctato *tripartito, laciniis lateralibus oblongo-linearibus* apice subcrenatis, *intermedia bifida* plerumque cum denticulo interiecto, *lobis oblongo-linearibus* subcrenatis, calcare ovario triplo breviore, perigonii laciniis in galeam subglobosam conniventibus ovatis liberis, interioribus subspathulatis obtusis, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovarium dimidium aequantibus*, foliis oblongo-lanceolatis, tuberibus indivisis. 4. In pratis fertilibus, (dch. d. g. Gebiet, doch gegen Norden nur bis an die nördliche Grenze d. Harzes.) Mai. Jun. St. h. 12. Galea obscure atropurpurea, labellum album, guttulis intense purpureis.

b. Labellum profunde trifidum, lacinia intermedia oblonga integra vel truncato-emarginata.

6. **O. coriophora** (L. sp. 1332.) *labello semi-trifido* dependente, *laciniis subaequalibus, media* oblonga *integra*, lateralibus subrhombeis brevioribus, calcare conico arcuato descendente ovario duplo triplove breviore, perigonii laciniis in galeam conniventibus acuminatis, *bracteis* membranaceis *uninerviis ovarium aequantibus* vel superantibus, foliis lineari-lanceolatis, tuberibus indivisis. 4. In pratis, (im südl. u. mittlern Gebiete.) Mai. Jun. Jacq. a. t. 122. Galea sordide fusco-purpurea, labellum medio dilute rubellum punctis obscure purpureis, laciniis viridibus margine rubello.

7. **O. globosa** (L. sp. 1332) labello semi-trifido porrecto, laciniis oblongis, intermedia latiore truncato-emarginata saepe cum mucrone interiecto, calcare subcylindrico arcuato descendente ovario duplo triplove breviore, *perigonii laciniis* campanulato-galeatis ovatis *cuspide spathulata terminatis*, bracteis uninerviis ovarium aequantibus superantibusve infimis quandoque trinerviis, foliis lanceolatis, tuberibus indivisis. 4. In pratis alpinis et sub-

alpinis, (Vogesen, Schwarzwald, dch. d. g. Alpenkette, Mähr., Böhm., Riesengeb., Erzgeb., Frankf. a. d. O.) Mai. Jun. Jacq. a. t. 265. Nigritella globosa Reichenb. fl. exc. p. 121. Flores purpurei, labello punctato.

c. Labellum trilobum, lobis latis brevibus.

8. **O. Morio** (L. sp. 1333.) *labello trilobo, lobis latis*, intermedio truncato-emarginato, calcare cylindrico vel subclavato horizontali vel adscendente ovarium subaequante, *perigonii laciniis* obtusis, *omnibus in galeam conniventibus, bracteis uninerviis* vel infimis subtrinerviis ovarium aequantibus, foliis oblongo-lanceolatis, bulbis indivisis. 4. In pratis. April. Mai. Schk. t. 271. Flores purpurei, venis galeae viridibus validis. Variat floribus saturate violaceis, purpureis, roseis et albis.

9. **O. Spitzelii** (Sauter.) *labello trilobo* subvelutino dependente, *lobis latis* crenatis, intermedio emarginato, calcare conico-cylindrico verticaliter descendente ovario paulo breviore, *perigonii laciniis* obtusis, lateralibus patentibus, *intimis* 2 *apice truncatis emarginatisque, bracteis uninerviis* ovarium aequantibus, foliis oblongo-obovatis obtusis, tuberibus indivisis. 4. In locis graminosis alpium, (a. d. Weissbachelalpe im Buchweissbach bei Saalfelden in Salzb., v. Spitzel, u. auf Voralpen im Val di Ledro in Südtyrol, Facchini.) Jun. Flores purpurei. G.

10. **O. pallens** (L. mant. 292.) *labello leviter trilobo integerrimo* vel vix crenulato basi holosericeo, calcare cylindrico horizontali vel adscendente ovarium subaequante, *perigonii laciniis* ovatis obtusis, tribus interioribus subaequalibus, *duobus lateralibus denique reflexis, bracteis uninerviis* ovarium aequantibus, *spica explicata ovata, foliis obovato oblongis* obtusis, tuberibus indivisis. 4. In sylvaticis et montibus virgultis, solo calcareo, (zerstreut dch. d. südl. Gebiet u. bis an d. nördl. Grenze v. Thüringen.) April. Mai, omnium maxime praecox. Jacq. a. t. 45. Flores ochroleuci, rarissime purpurei. Ab Orchide sambucina facile dignoscitur bracteis multo minoribus uninerviis, nec reticulato-venosis, ab O. mascula, cui valde affinis, praeter notas propositas tempore florendi multo praecociori et odore gravi ingrato et a subsequente spica densa et foliis latis.

11. **O. provincialis** (Balbis. misc. alt. p. 20. t. 2.) *labello trilobo crenato vel subintegerrimo* supra holosericeo, calcare anguste cylindrico curvato-adscendente ovarium subaequante, *perigonii laciniis* ovatis obtusis, *duabus lateralibus patentibus* vel subreflexis, *bracteis uninerviis* ovarium aequantibus, spica explicata laxa, foliis *lanceolatis* mucronulatis, tuberibus indivisis. 4. In collibus virgultis, (südl. Istrien, um Pola u. an andern Orten, Tommasini.) Mai. Flores pallide flavi, labio saturatiore in medio punctis rubellis adsperso. Bertol. amoen. it. p. 199. J.

12. **O. mascula** (L. sp. 1333.) *labello profunde trilobo*, basi hirto, *lobis latis dentatis*, intermedio cum dente interiecto emarginato, calcare cylindrico horizontali vel adscendente ovarium subaequante, *perigonii laciniis* ovato-oblongis obtusis acutis acuminatisve, duobus intimis dorsali brevioribus, *duobus lateralibus denique reflexis, bracteis uninerviis* ovarium aequantibus, *spica explicata elongata laxa*, foliis oblongis lanceolatisve. 4. Mai. Jun. Flores purpurei. Calcar. in spica explicata semper horizontale vel adscendens vidi, etiam in speciminibus obtusifloris. Variat:

α. obtusiflora, perig. laciniis obtusis.

β. acutiflora, perig. laciniis acutis vel breviter acuminatis; haec forma caeteris vulgatior est: Hall. helv. t. 33. f. sinistra.

γ. speciosa, perig. laciniis longe acuminatis: O. speciosa Host. fl. a. 2. 527. O. mascula Jacq. ic. rar. t. 180., sed color labelli cum natura non congruens.

§. 2. Bracteae 3-plurinerviae et vel infimae, vel omnes simul reticulato-venosae. Tubera indivisa vel (in O. sambucina) apice breviter biloba.

13. **O. laxiflora** (Lam. fl. fr. 3. p. 504.) labello trilobo, lobis lateralibus

antice rotundatis, intermedio profunde emarginato latiore breviore vel paulo longiore, *calcare cylindrico horizontali vel adscendente* ovario breviore, perigonii laciniis oblongis obtusis, lateralibus reflexis, *bracteis* 3-5 *nerviis*, inferioribus simul venosis, spica elongata laxa, *foliis lanceolato-linearibus, tuberibus indivisis.* 4. In pratis turfosis paludosis, (stw. in d. südl. u. mittlern Gebiete, sehr selten im nördlichen.) Mai. Jun. Flores purpurei. Variat:

α. Tabernaemontani, labelli lobo medio conspicue breviore: O. laxiflora Lam. l. c. O. Tabernaemontani Gmel. fl. bad. 3. p. 542. et

β. palustris, labelli lobo medio laterales aequante vel paulo longiore: O. palustris Jacq. collect. 1. p. 75. ic. rar. t. 181.

14. **O. sambucina** (L. sp. 1334.) labello breviter trilobo, calcare conico-cylindrico descendente ovarium aequante, perigonii laciniis lateralibus patentibus, *bracteis omnibus nervosis* venosisque flore longioribus, caule 4-6 folio, *foliis* lanceolatis *antice latioribus* basin versus attenuatis, *tuberibus oblongis integris vel apice breviter* 2-3 *lobis.* 4. In sylvis montanis et subalpinis, (im südl. u. mittlern Gebiete bis z. Harze.) Mai. Jun. Jacq. a. t. 108. O. latifolia Scop. carn. 2. p. 196. Flores inodori, ochroleuci, labello dilute flavo, basi punctulis purpureis adsperso. Variat:

β. purpurea, floribus purpureis: O. incarnata Willd. sp. 4. 30. et auctor. germ.

15. **O. papilionacea** (L. sp. 1351.) *labello* subrotundo-ovato *dentato indiviso*, calcare subulato descendente ovario breviore, perigonii laciniis in galeam ovato-lanceolatam conniventibus, *bracteis* 3-5 *nerviis*, foliis lanceolatis, tuberibus indivisis. 4. In pratis reg. calid., (im wärmern Krain, Scopoli; in Istrien, Müller!) Mart. O. rubra Jacq. ic. rar. 1. 183. Flores purpurei. G.

§. 3. Bracteae tri-plurinerviae et vel infimae, vel omnes simul reticulato-venosae. Tubera palmata.

16. **O. maculata** (L. sp. 1335.) labello trilobo, calcare conico-cylindrico descendente ovario breviore, perigonii laciniis lateralibus patentibus, *bracteis trinerviis venosisque*, intermediis ovarium aequantibus, infimis idem superantibus, *caule solido subdecemfolio, foliis superioribus diminutis bracteiformibus, supremo a spica longe remoto,* intermediis lanceolatis utrinque attenuatis, infimis oblongis, *tuberibus palmatis.* 4. In sylvis et pratis humidis. Jun. Hall. helv. t. 32. Flores dilute lilacini, maculis lineolisque purpureis variegati. Folia saepe fusco-maculata. Variat floribus niveis impunctatis et foliis immaculatis; sed rarissime.

17. **O. latifolia** (L. sp. 1334.) labello trilobo, calcare conico-cylindrico descendente ovario breviore, perigonii laciniis lateralibus sursum reflexis, *bracteis* inferioribus et intermediis flore longioribus, omnibus *trinerviis venosisque, caule fistuloso* 4-6 folio, *foliis patulis, inferioribus ovalibus oblongisve obtusis, superioribus minoribus lanceolatis acuminatis, tuberibus palmatis.* 4. In pratis, praecipue humidis, frequens. Mai. Jun. Orchis latifolia St. h. 7. Fries. nov. ed. 2. mant. 1. p. 16. O. maialis Reichenb. ic. f. 770. O. comosa Scop. carn. 2. p. 198. Flores purpurei, folia saepe fusco-maculata.

18. **O. incarnata** (L. fl. suec. p. 312. sp. 1335. sec. cl. Fries.) labello trilobo, calcare conico-cylindrico descendente ovario breviore, perigonii laciniis lateralibus patentibus postea sursum reflexis, *bracteis* omnibus flore longioribus *trinerviis venosisque, caule fistuloso* 4-6 folio, *foliis erectis cauli parallelis elongato-lanceolatis attenuatis apice cucullato-contractis*, supremo basin spicae superante, infimo breviore patulo, *tuberibus palmatis.* 4. In pratis turfosis paludosis. Jun., serius antecedente; quum haec iam defloruit, flores aperire incipit. O. angustifolia Wimm. et Grab. fl. sil. 2. p. 252. Koch. syn. ed. 1. p. 687. O. incarnata Fries. herbar. norm. fasc. 7. n. 65. et 66., novit. mant. 3. p. 127., et sq., (non 2., p. 54., quae ad

sequentem pertinet.) Wimm. fl. schles. p. 328. O. latifolia Reichenb. icon. 6. 769. — „Orchidi latifoliae simillima est," sed caulem habet „dimidio minorem et bracteas vix flore aut germine longiores" L. suec. p. 312., quod cum sequente, neutiquam vero cum O. angustifolia congruit, quae saepissime caulem habet robustiorem altioremque, quam Orchis latifolia, et bracteas, etiam superiores, flore longiores. G.

19. **O. Traunsteineri** (Sauter. in litteris.) labello trilobo, calcare conico-cylindrico ovario breviore, perigonii laciniis lateralibus sursum reflexis, *bracteis trinerviis venosisque*, inferioribus florem aequantibus, superioribus flore brevioribus, *caule fistuloso* 4-5 folio, *foliis* inferioribus *lanceolato-linearibus erecto-patulis, superioribus linearibus erectis apice planis subcanaliculatis, tuberibus palmatis.* 4. In pratis turfosis, uliginosis Tyrolis, Helv. Mai. Jun. Planta in statu vivo accuratius describenda. O. angustifolia Fries. mant. 3. p. 130. O. incarnata Fries. mant. 2. p. 54. Reichenb. ic. 8. f. 1140. (excluso synonymo Loiseleurii, qui nullam Orchidem angustifoliam descripsit, sed qui in flora gallica, ed. 2. p. 267., Orchidis latifoliae varietatem angustifoliam, (O. divaricatam Rich. ined.,) spica conferta, labello subcuneato, lobo intermedio obsoleto, bulbo bipartito praeditam proponit, quae vero in nostram speciem non quadrat. — „O. haematodes Reichenb. fl. exc. p. 126. et p. 140. n. 857., quod locum natalem prope Bregenz. et inventorem, D. Sauterum attinet, et O. sambucina incarnata var. subalpina Reichenb. l. c. p. 140. n. 853. huc pertinent." Traunsteiner. in litt.

2. ANACAMPTIS (Richard. mem. du mus. d'hist. nat. 4. p. 19.) Antherarum loculi bursicula uniloculari conjuncti. Massae pollinis retinaculo communi insertae; caetera ut Orchidis.

1. **A. pyramidalis** (Richard. l. c.) labello semitrifido basi bilamellato, lobis oblongis obtusis aequalibus integerrimis, calcare filiformi ovarium aequante vel superante, perigonii laciniis ovato-lanceolatis acutiusculis, lateralibus patentibus, bracteis basi trinerviis, spica densa, foliis lanceolato-linearibus, tuberibus indivisis. 4. In pratis et collibus dumetosis solo calcareo, (zerstreut dch. d. Geb.) Mai.-Jul. Orchis pyramidalis L. sp. 1332. Koch. syn. ed. 1. p. 688. Jacq. a. t. 266. Flores purpurei.

3. GYMNADENIA (R. Brown. pro parte.) Bursicula ad basin loculorum antherae nulla; caetera ut Orchidis. N. ab E. gen. 5. 6.

1. **G. conopsea** (R. Brown. in hort. kew. ed. 3. v. 5. p. 191.) labello trifido, lobis ovatis obtusis, *calcare filiformi ovario fere duplo longiore, perigonii laciniis exterioribus patentissimis,* bracteis trinerviis ovarium aequantibus longioribusve, spica cylindrica elongata, foliis elongato-lanceolatis, tuberibus palmatis. 4. In pratis, praecipue montanis. Jun. Jul. Reichenb. ic. 6. f. 816. Orchis conopsea L. sp. 1335. Flores purpurei, rarius albi. Ad hanc posteriorem pertinet O. ornithis Jacq. fl. a. t. 138.; est specimen albiflorum, cui, monente Jacquinio filio in litt. ad amicum Zeyher., apices tuberum abscisi fuerunt. Variat porro maior, spica densiore, florum odore levi; et minor, paulo serius florens, racemo laxiore odoreque florum intensiore.

2. **G. odoratissima** (Richard. mem. du mus. d'hist. nat. IV. p. 35.) labello trifido, lobis ovatis obtusis, *calcare filiformi ovarium subaequante, perigonii laciniis exterioribus patentissimis,* bracteis trinerviis ovarium aequantibus longioribusque, spica cylindrica elongata, foliis lineari-lanceolatis linearibusque, tuberibus palmatis. 4. In pratis subalpinis et alpinis, rarius etiam in montibus humilioribus, (dch. d. g. Alpenk., a. d. Voges.; Würtemberg; Oberbaden; bei Zweibrücken in d. Rheinpfalz, in Westphalen.) Jun. Jul. Orchis odoratissima L. sp. 1335. Jacq. a. t. 264. Flores purpurei; variant rosei et rarius albi.

3. **G. albida** (Richard. mem. du mus. d'hist. nat. IV. p. 35.) labello profunde trifido, laciniis integerrimis, lateralibus acutis, intermedio duplo latiore oblongo obtuso, *calcare ovario triplo breviore, perigonii laciniis in*

galeam subrotundam conniventibus, bracteis trinerviis ovarium aequantibus, spica elongata subsecunda, foliis infimis oblongo-obovatis, superioribus lanceolatis, *tuberibus fasciculatis*. 4. In locis graminosis alpium et reg. subalp., rarius etiam in montibus humilioribus, (dch. d. g. Alpenk.; Voges., Oberbaden, Hundsrück, Würtemb., Schles., Böhm., Erzgeb., Harz, Moselgeb. bis nach d. Niederlanden; Holstein u. Preussen.) Jun.-Aug. Satyrium albidum L. sp. 1338. Orchis albida Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 201. Peristylus albidus Lindl. Koch. Taschenb. p. 491. Habenaria albida R. Brown. in hort. kew. ed. 2. v. 2. 195. Hall. helv. t. 26. Flores parvi, albidi.

4. HIMANTOGLÓSSUM (Spreng. s. veg. 3. 694.) Labellum contortum, aestivatione spiraliter convolutum; caetera ut Orchidis. N. ab E. g. 5. 3.

1. **H. hircinum** (Rich. l. c.) labello tripartito, *laciniis linearibus, intermedia longissima subcontorta*, lateralibus multo brevioribus undulato-crispatis. 4. In collibus dumetosis, pascuis montanis et locis sylvaticis, solo calcareo, (stw. dch. d. südliche u. mittlere Geb. bis an d. nördl. Grenze v. Thüringen.) Mai. Jun. Satyrium hircinum L. spec. 1337. Spenn. Handb. d. angew. Bot. 1. 189. Jacq. a. t. 367. Loroglossum hircinum Rich. mem. du mus. 4. p. 46. Orchis hircina Swartz. act. holm. 1800. 207. Galea albida, interne striis purpureis et viridibus, labellum albido-viride, punctis rubentibus adspersum.

5. COELOGLOSSUM (Hartman. scand. fl. ed. 1. p. 329. 1820., non Lindley. Peristylus disposit. gen. huius operis p. XLVIII.) Calcar brevissimum scrotiforme. — „Herbae habitu Platantherae per veteris orbis regiones tropicas et boreales temperatas dispersae, rectius fortassis cum Platanthera, a qua sola perigonii forma et labelli calcare brevissimo recedunt, conjungendae.“ Endl. gen. pl. n. 1517. sub Peristylo. N. ab E. gen. 5. 8.

1. **C. viride** (Hartm. l. c.) *labello lineari apice tridentato*, dente intermedio brevissimo, lateralibus porrectis, *calcare brevissimo scortiformi*, perigonio in galeam connivente. 4. In pratis humidis etiam in sylvis frondosis, in alpes adscendens, (zerstreut dch. d. Geb.) Jun., in alpib. serius. Satyrium viride L. sp. 1337. Orchis viridis Swartz. act. holm. 1800. 207. Gymnadenia viridis Richard. Reichenb. ic. 6. f. 813. Habenaria viridis R. Brown. verm. Schrift. ed. N. ab E. vol. 2. p. 9. K. syn. ed. 1. p. 690. Peristylus viridis Lindl. Koch. Taschenb. p. 491. Flores luteo-virentes. — Nomen Peristyli postposui, quum nomen Coeloglossi Hartm. prioritate gaudeat.

6. PLATANTHERA (Richard. l. c. p. 20.) Perigonium ringens, laciniis 3-5 in galeam conniventibus. Labellum patens, subtus postice calcaratum, gynostemio ad antheram usque adnatum. Anthera tota adnata, loculi inferne sinu stigmatis excisi ab ipsis invicem remoti; rostellum nullum. Massae pollinis lobulatae; glandulae nudae, bursicula deficiente. Ovarium contortum. Calcar in nostris elongatum filiforme. N. ab E. gen. 5. 7.

1. **P. bifolia** (Richard.) labello indiviso lineari, *calcare* ovario sesquiduplo longiore *filiformi*, *antherae loculis parallelis*. 4. In sylvis umbrosis. Jun. Jul. Reichenb. ic. 9. f. 1143. Orchis bifolia L. sp. 1331. O. bifolia *β.* brachyglossa Wallr. sched. p. 486. Habenaria bifolia R. Brown. pr. fl. nov. holl. p. 312. Variat labello breviore. Platanthera brachyglossa Reichenb. ic. 9. f. 1144. est modificatio stigmate retuso, sed nota haec constans non est. Flores in nostris albi.

2. **P. chlorantha** (Custor. ap. Reichenb. in Mösl. Handb. 2. p. 1565.) labello indiviso lineari, *calcare* ovario duplo longiore *filiformi-subclavato*, *antherae loculis* apice contiguis inferne *divaricatis*. 4. In sylvis umbrosis. Jun. Jul. Reichenb. ic. 9. f. 1145. Orchis bifolia *α.* macroglossa Wallr.

sched. p. 486., secund. citat. Halleri, helv. t. 35. O. bifolia β. elatior Gaud. helv. 5. p. 425. O. virescens Zollik. ap. Gaud. l. c. p. 497.

7. NIGRITELLA (Richard. de orch. annot. p. 19.) Perigonium patulum, subcampanulatum, resupinatum. Ovarium non contortum, caetera ut Ophrydis. — N. ab E. gen. 10. 8. Glandulas Richard. seminudas dicit, mihi prorsus nudae visae sunt.

1. **N. angustifolia** (Richard. de orchid. annot. p. 19.) labello ovato acuminato, perigonii laciniis lanceolatis acuminatis, *calcare obovato ovario triplo breviore.* 4. In locis graminosis alpinis et subalpinis, (dch. d. g. Alpenk.) Mai-Aug. Satyrium nigrum L. sp. 1338. Jacq. a. t. 368. Orchis nigra Scop. carn. 1123. Flores atropurpurei, odorem Vanillae spargentes; variant rarius purpurei, rarissime carnei, Traunstein. Spica ovata densissima; folia linearia breviter denticulato-ciliata, ut in subsequente.

2. **N. suaveolens** (Koch. D. fl. manuscript.) labello ovato dente utrinque in medio obtuso instructo ideoque subtrilobo, lobo medio producto apice ipso obtuso, perigonii laciniis ovato-lanceolatis acutiusculis, *calcare cylindrico-subulato ovarium aequante.* 4. In alpibus rarissima, (auf d. Dolaz in d. Schweiz u. auf d. Sollstein bei Zierl in Tyrol; Kärnthen.) Jul. Aug. N. fragrans Sauter. ap. Reichenb. ic. 8. f. 1010. Orchis suaveolens Vill. delph. 2. p. 31. t. 1. icon mala, ut plurimae in hoc, caeterum egregio, opere, DC. fl. fr. 5. p. 331., ex herbario Villarsii plantam suam descripsit; conf. fl. fr. l. c. Gaud. helv. 5. p. 446. Spica huius fere cylindrica, flores maiores et laete purpurei.

8. OPHRYS (L. gen. n. 101., exclus. specieb.) Perigonium patens. Labellum patens, ecalcaratum, gynostemio ad antheram usque adnatum. Anthera tota adnata; loculi paralleli quidem, sed basi disiuncti. Rostellum o. Massae pollinis lobulatae, pedicellatae; glandula quaeque bursicula propria inclusa. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 5.

1. **O. muscifera** (Hudson. fl. angl. ed. 1. p. 340.) *labello* oblongo subvelutino *macula in medio subquadrata glabra* notato perigonio duplo longiore *trifido,* lobis lateralibus lanceolatis, intermedio duplo longiore apice profunde bilobo *exappendiculato,* laciniis perigonii 2 interioribus villosis linearibus convolutis et filiformibus. 4. In montosis sylvaticis, solo calcareo, (stw. im südl. u. mittlern Geb.; in Mecklenb. selten.) Jun. O. myodes Jacq. misc. 2. p. 373. Swartz. l. c. 45. St. h. 40. O. insectifera α. myodes L. sp. 1343. Orchis muscaria Scop. carn. v. 2. 193. Labellum intense purpureo-fuscum, macula in medio griseo-caerulescente et basi gibberulis 2 nitidis atro-fuscis notatum. Perigon. viride.

2. **O. aranifera** (Hudson. angl. ed. 2. 392.) *labello* oblongo-obovato integro convexo tumido margine reflexo *apice obtuso vel leviter emarginato exappendiculato* piloso *medio lineis* 2 *vel* 4 *longitudinalibus* basi transversim coniunctis *glabris* notato, laciniis perigonii exterioribus labellum subaequantibus, *interioribus brevioribus glabris.* 4. In collibus et montibus calcareis, (stw. v. d. Schweiz dch. Tyrol, Oberbaden, Würtemberg bis Oestreich u. d. Littorale; v. Elsass bis Mainz u. bis Würzburg.) Mai. Jun. Reichenb. ic. 9. f. 1154-1156. O. fucifera Curt. lond. fasc. 6. t. 67. Labellum integrum, vel dente obtuso minuto utrinque in medio marginis instructum, sed quadrilobum non dicendum. Color eius purpureo-fuscus vel marginem versus lutescens; lineae glabrae sunt lividi coloris; plerumque earum duae adsunt, rarius quatuor: O. atrata Lindl. In planta sicca praeter numerum striarum inter O. araniferam et O. atratam notam distinctivam non reperi. Perigonium viride.

3. **O. Bertolonii** (Morett. pl. ital. dec. 6. p. 9.) *labello* lato-obovato planiusculo piloso *ante apicem* paulum adscendentem *macula subquadrata glabra notato* obtusissimo *integro apice breviter trilobo,* lobo medio angusto dentiformi apice glabro, laciniis perigonii interioribus lineari-lanceolatis acutis glabris margine pubescentibus, gynostemio rostrato-acuminato. 4. In

collibus graminosis, (Istrien u. Veglia.) April. Mai. O. Speculum Bert. amoen. ital. p. 201. Reichenb. ic. 9. f. 1157. 1158. Labellum atro-purpurascens, macula glabra pallidior. J.

4. **O. arachnites** (Reichard. fl. moeno-francof. 2. p. 89. 1772.) *labello* lato-obovato *integro* convexo tumido margine explanato truncato-obtusissimo velutino *basi maculis rivulisve glabris anastomosantibus variegato apice leviter emarginato cum appendice glabra sursum flexa*, laciniis perigonii 2 interioribus brevibus ovatis velutinis, gynostemio breviter rostrato. 4. In collibus calcareis incultis dumetosis, (stw. im südl. u. mittlern Geb.) Jun. O. insectifera *γ.* L. sp. 1343. O. oestrifera Reichenb. fl. exc. p. 128. non MBieberst. O. fuciflora Rchb. ic. 9. f. 1162-1165. Orchis Arachnites Scop. carn. 2. p. 194. var. 1. Perigonium roseum. Labellum intense purpureo-fuscum, basi luteo-variegatum; appendix apicis virenti-flava. Protuberantiae in utroque latere labii sunt nunc breves obtusae, nunc conicae et duplo triplove longiores, sed inter has formas limites reperire non potui. — Ophrys andrachnitis Reichenb. ic. 9. f. 1168. (exclus. syn. Scopolii) perigonii laciniis interioribus glabris, mihi ignota est. Scopolii Orchis Arachnites fl. carn. 2. p. 194, e tribus diversis speciebus composita est, quarum opercula, (perigonii laciniae interiores.) „villosa" describit.

5. **O. apifera** (Hudson. fl. angl. ed. 1. 340., ed. 2. 391.) *labello* subrotundo-obovato convexo *tumido* velutino *variegato quinquefido, lobis* 2 posterioribus ovatis patulis basi gibbere hirsuto instructis, 3 *anterioribus recurvatis subtus conniventibus, intermedio in appendicem glabram terminato*, laciniis perigonii interioribus brevibus hirtis. 4. In collibus calcareis dumetosis, (stw. v. d. Schweiz u. d. Elsass dch. Oberbaden u. Würtemberg u. d. südl. Deutschl. bis Ungarn u. auf d. Südseite der Alpen dch. Tyrol; im Rheinthale bei Mainz, Trier, bei Verviers; im Mainthale bei Würzb.) Jun. Jul. Reichenb. ic. 9. f. 1159. O. insectifera *ι.* L. sp. 1343. Labellum fuscum picturis luteis.

O. Pseudospeculum per errorem in synopsin recepta fuit.

9. CHAMAEORCHIS (Richard. de orch. annot. p. 447.) Perigonium galeatum; caetera ut Ophrydis. N. ab E. gen. 10. 9., Chamaerepes.

1. **C. alpina** (Richard. l. c.) *labello ovato-oblongo* obtuso *basi utrinque dente obsoleto* notato, foliis anguste linearibus caulem aequantibus superantibusque. 4. In alpium editiorum pascuis, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. Ophrys alpina L. sp. 1342. Jacq. en. vind. t. 9. Chamaerepes alpina Spreng. syst. veg. 3. p. 702. Flores minuti, flavo-virides.

10. ÁCERAS (Rob. Brown. in hort. kew. ed. 3. t. 5. p. 191.) Labellum ecalcaratum. Antherae loculi basi bursicula communi uniloculari coniuncti. Massae pollinis retinaculo unico communi insertae; caetera ut Orchidis. N. ab E. gen. 5. 4.

1. **A. anthropophora** (R. Brown. l. c.) labello tripartito, lacinia intermedia lineari bifida saepe cum interiecto denticulo, lacinulis *laciniisque* lateralibus *lineari-filiformibus*. 4. In collibus et pratis montosis subhumidis, solo calcareo, (Schweiz, Oberelsass, Oberbaden u. Würtemberg; bei Trier, Linz am Rheine u. bei Halle, an beiden letzten Orten sehr selten.) Mai. Jun. Ophrys anthropophora L. sp. 1343. Loroglossum anthropophorum Rich. l. c. p. 32. Fl. dan. t. 103. Perigonium virens, margine purpureo; labellum cinnabarino-ferrugineum, dein aureo-flavescens.

11. HERMINIUM (R. Brown. hort. kew. 5. p. 191.) Perigonium campanulatum, laciniis labelloque erectis. Labellum basi saccato-gibbum, obtuse carinatum, ecalcaratum. Caetera ut Platantherae. N. ab E. gen. 5. 9.

1. **H. Monorchis** (R. Brown. l. c.) *laciniis perigonii interioribus trilobis*, lobo medio elongato, labello profunde trifido, laciniis linearibus, lateralibus subhastato-patentibus, intermedia duplo longiore. 4. In pratis et pascuis

montanis et collibus graminosis, in alpes adscendens, (sehr gemein dch. d. g. Alpenk. u. stw. dch. d. Gebiet.) Mai. Jun. Ophrys Monorchis L. sp. 1342. Fl. dan. t. 102. Flores parvi, viridi-luteoli.

12. SERAPIAS (L. gen. n. 1012., excl. specieb.) Labellum ecalcaratum, geniculatum, trilobum, lobo medio maiore refracto-dependente. Ovarium non contortum. Antherae loculi basi bursicula communi uniloculari coniuncti. Massae pollinis retinaculo unico communi insertae. Caetera ut Orchidis. N. ab E. gen. 10. 7.

1. **S. cordigera** (L. sp. 1345.) *articulo labelli posteriore bilobo, basi intus lamellis* 2 *oblongis obsito, anteriore lato-ovato* vel subcordato *acuminato* basi barbato venis lateralibus repetito ramosis praedito. 4. In collibus incultis, (auf der Insel Levano grande unweit Promontore in Istrien, Dr. Sendtner.) Mai. Perigonium rubro-lateritium, striis longitudinalibus saturatioribus, phylla 2, interiora atro-rubra, labium concolor, basi canaliculatum, canaliculi parietes, (lamellae labello adpressae) atrorubentes. Bert. amoen. ital. p. 203. J.

2. **S. Pseudo-cordigera** (Moricand., Sebast. rom. plant. fasc. 1. p. 14. t. 4.) *articulo labelli posteriore bilobo basi intus lamellis* 2 *oblongis obsito, anteriore lanceolato vel oblongo-lanceolato attenuato-acuminato* basi barbato venis lateralibus parce ramosis et saepe ante marginem anastomosantibus praedito. 4. In collibus incultis pratisque montanis, (C. Tessin, südl. Tyrol, Litt.) Apr. Mai. S. Lingua Bertol. amoen. ital. p. 202. Gaud. fl. helv. v. 5. p. 463. S. cordigera Heg. et Heer. Flor. d. Schwz. p. 878. Koch. syn. ed. 1. p. 693. S. longipetala Pollin. fl. veron. Orchis Lingua Scop. carn. 2. p. 187. Labellum rubro-lateritium auriculis saturatioribus. Caulis pedalis sesquipedalis.

3. **S. Lingua** (L. sp. 1344.) articulo *labelli posteriore bilobo basi intus callo simplici* obsito, anteriore oblongo-lanceolato acuto basi parce barbato. 4. In collibus incultis virgultis, (Fiume, Insel Osero, Noé; auf Promontore in Südistrien, Dr. Sendtner.) Apr. Mai. S. Lingua DC. fl. fr. 3. p. 256. S. oxyglottis Bertol. amoen. ital. p. 202. — Caulis semipedem non superans. Flores duplo minores quam in antecedente; secund. descriptionem Bertolonii perigonium pallide rubellum est striis saturatioribus, callus in basi labelli atro-ruber limbo albo, labelli lobi laterales atro-rubri, lobus anterior persicinus. — Orchis macrophylla Colum. ecphr. 1. p. 321. ic. p. 322. a cl. Bertolonio ad S. Linguam relata, quae secundum descriptionem Columnae caulem habet tri pedalem et folia ima sesquipedalia, ad illam speciem pertinere nequit; conf. descriptionem Columnae p. 321. Ad hanc pertinet S. Lingua *β.* L. sp. 1345. J.

4. **S. triloba** (Vivian.) articulo posteriore labelli brevissimo angusto lobis obsoletis, *anteriore trifido,* denticulato, laciniis lateralibus oblique ovatis, intermedio ovato acuminato basi parce barbato. 4. In prato prope Tergestum unicum tantum specimen legit cl. Tommasin. Mai. G.

Trib. II. *LIMODOREAE.* Anthera libera. Massae pollinis e lobulis numerosis angulatis elastice cohaerentibus compositae, vel farinaceae, glandulae nudae basi sua saepe adhaerentes.

13. EPIPOGIUM (Richard.) Perigonium resupinatum, patens. Labellum geniculatum, lamina erecta in calcar inflatum erectum postice terminata. Anthera breviter stipitata, apici stigmatis trifido immersa. Massae pollinis lobulatae, stipitatae. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 10. 10.

1. **E. Gmelini** (Richard. l. c. p. 36.) aphyllum, caule vaginato pauciflore, floribus pendulis. 4. In sylvis umbrosis, in ligno putrido insidens, parasiticum, (am Fusse d. Alpen von d. Schweiz bis Oestr. stellenweise u. auf höhern Bergen, d. Vogesen, Schwarzw., Sudeten, Harze; u. ausserdem zerstreut, wiewohl selten im Gebiete.) Jul. Aug. E. aphyllum Bl. et Fing.

comp. fl. g. ed. 1. 2. p. 432. Satyrium Epipogium L. sp. 1338. St. h. 18. Jacq. austr. t. 84. Limodorum Epipogium Swartz. nov. act. ups. 6. p. 80. Epipogium Gmel. sib. 1. p. 11. t. 2. f. 2. — Planta decolor, perigonium flavescens, calcar dilute carneum.

14. LIMODÓRUM (Tournef. inst. 250. Rich. l. c. p. 20.) Perigonium erecto-patens. Labellum geniculatum, deorsum calcaratum, lamina erecta. Anthera terminalis, libera. Gynostemium cum labello non connatum. Pollen pulvereum. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 11.[f]

1. **L. abortivum** (Swartz. nov. act. holm. 6. p. 80.) aphyllum, scapo vaginato, labello ovato undulato, calcare subulato ovarii longitudine. 4. In collibus dumetosis et sylvis, Schweiz, Oberbaden am Kaiserstuhle, bei Trier, in Oestreich u. d. Littorale; Steyermark; südl. Tyrol.) Mai. Jun. Orchis abortiva L. sp. 1336. St. h. 40. Serapias abortiva Scop. carn. 2. 205., planta tota dilute violacea, scapo lineisque perigonii saturatioribus.

15. CEPHALANTHÉRA (Richard. de orchid. annot. p. 21.) Perigonii laciniae erectae, subconniventes. Labellum ecalcaratum, geniculatum, articulo inferiore saccato-concavo. Anthera terminalis libera. Pollen pulvereum. Ovarium contortum. N. ab E. gen. 5. 12.

1. **C. pallens** (Richard. l. c.) *ovario glabro,* labelli lamina cordato-ovata longitudine sua latiore, laciniis perigonii omnibus obtusis, *bracteis ovarium superantibus*, foliis ovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis. 4. In sylvaticis, (stw. dch. d. g. Geb.) Mai. Jun. Hall. helv. t. 41. Serapias grandiflora Scop. carn 2. p. 203. S. longifolia Huds. 393. S. lancifolia Roth. tent. 2. 2. 409. Epipactis grandiflora Sm. engl. fl. 4. p. 44. (Serapias grandiflora L. syst. nat. ad Cephalantheram ensifoliam pertinere videtur.) E. pallens Swartz. l. c. 232. Flores flavescenti-albidi.

2. **C. ensifolia** (Richard l. c.) *ovario glabro,* labelli lamina obtusissima transverse latiori, laciniis perigonii exterioribus acutis, *bracteis ovario multo brevioribus*, infimis quandoque idem aequantibus, foliis lanceolatis superioribus lineari-lanceolatis acuminato-acutis. 4. In locis sylvaticis, (stw. dch. d. Gebiet, aber viel seltner als vorige.) Mai. Jun. Serapias ensifolia Sm. fl. brit. 945. Schk. t. 274. S. grandiflora Fl. dan. t. 506. Epipactis ensifolia Swartz. l. c. p. 232. Flores nivei, macula in apice labelli flava.

3. **C. rubra** (Richard. l. c.) *ovario pubescente,* laciniis perigonii omnibus acuminatis, labelli lamina ovata acuminata lacinias interiores aequante. 4. In sylvis et collibus dumetosis calcareis, (stw. dch. d. Gebiet.) Jun. Jul. Epipactis rubra All. ped. 2. p. 153. Serapias rubra L. syst. nat. ed. 13. 2. 594. Fl. dan. t. 345. Flores pulchre purpurei.

16. EPIPACTIS (Richard. l. c. p. 21.) Ovarium non contortum, basi in stipitem contortum attenuatum. Gynostemium breve. Perigonium campanulato-patulum. Caetera ut Cephalantherae. N. ab E. gen. 5. 10.

1. **E. latifolia** (Allion. fl. ped. 2. p. 151.) *foliis* ovatis *nervisque pubescenti-scabris* internodio longioribus, perigonio denique patentissimo, laciniis omnibus glabris, articulo labelli anteriore acuminato apice recurvo, *gibbis baseos laevibus.* 4. In sylvis et collibus dumetosis incultis. Jul. Aug. Flores virentes vel dilute in roseum vergentes, labelli articulus anterior lilacinus.

2. **E. rubiginosa** (Gaud. fl. helv. 2. p. 182. E. latifolia *β.* rubiginosa.) foliis ovatis margine *nervisque pubescenti-scabris* internodio longioribus, perigonio campanulato patulo, laciniis tribus exterioribus parce pubescentibus, articulo labelli anteriore acuminato apice recurvo, *gibbis baseos plicato-crispis.* 4. In collibus sterilibus. Jun. E. latifolia *β.* rubiginosa Gaud. fl. helv. 5. 465. Koch. syn. ed. 1. p. 695. E. media Fries. novit. mant. 2. p. 54. Serapias latifolia atro-rubens Hoffm. D. fl. 2. p. 182. Reichenb. ic. 9. f. 1141. Flores sordide violacei vel virides et ferrugineo suffusi.

3. **E. microphylla** (Ehrh. Beitr. 4. p. 42.) foliis ovato-lanceolatis lan-

ceolatisve margine pubescenti-scabris *in nervis glabris*, intermediis superioribusque internodia aequantibus brevioribusve, perigonio campanulato, laciniis apice porrectis, tribus exterioribus pubescentibus, articulo labii anteriore acuminato apice recurvo, *gibbis baseos plicato-crispis*. 4. In sylvis umbrosis, (in Westphalen, am Harze, im südl. Hannov. u. in Thüring., bei Ebern-dorf in Kärnthen, R. Graf.) Jun. Jul. W. Kit. pl. r. hung. t. 270. Flores virentes, margine rubeoli, labellum margine albidum. G.

4. **E. palustris** (Crantz. a. 2. p. 262.) foliis lanceolatis, *lamina labelli subrotunda obtusa* perigonii lacinias aequante. 4. In pratis paludosis, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. Hall. helv. t. 39. Serapias palustris Scop. carn. 2. 204. S. longifolia L. syst. nat. ed. 12. 2. 593. Flores cinereo-virentes, interne basi in roseum vergentes, labellum album rubro-striatum.

17. LISTÉRA (Rob. Brown. hort. kew. ed. 3. p. 201.) Perigonium ringens, laciniis in galeam conniventibus. Labellum ecalcaratum, deflexum. Gynostemium postice terminatum processu ovato, in cuius basi vel apice anthera inserta est. Anthera libera, sessilis, persistens. Pollen farinaceum. Rostellum lamellatum, lamella integra. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 14.

1. **L. ovata** (Rob. Brown. l. c.) *caule bifolio*, foliis ovatis oppositis, *labello lineari bifido*. 4. In pratis montanis et sylvarum locis graminosis. Mai. Jun. Ophrys ovata L. sp. 1340. Epipactis ovata All. ped. 2. p. 151. St. h. 29. Schk. t. 273. Flores virentes.

2. **L. cordata** (Rob. Brown. l. c.) *caule bifolio*, foliis cordatis oppositis, *labello trifido* laciniis lateralibus linearibus brevibus, *intermedia bifida*, cruribus elongatis linearibus acuminatis. 4. In sylvis umbrosis montanis et subalpinis, (Schweiz u. längs d. ganzen Alpenkette, Vogesen, Oberbaden, Würtemb., Schles., Böhm., Mähren, Harz, Fichtelgeb.) Mai.-Jul. Ophrys cordata L. sp. 1340. Epipactis cordata All. ped. 2. p. 152. Flores virentes.

18. NEOTTIA (Linn. act. ups. 1740. p. 33.) Perigonium campanulatum, subgaleatum. Labellum ecalcaratum, porrectum, basi concavum, non inclusum. Anthera terminalis, libera, sessilis, margini posteriori gynostemii inserta, persistens. Pollen farinaceum. Rostellum lamellatum, linguaeforme, integrum. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 15.

1. **N. Nidus avis** (Richard.) 4. In radicibus arborum sylvarum umbrosarum parasitica. Mai. Jun. Ophrys Nidus avis L. sp. 1339. Neottidium Nidus avis v. Schlechtend. fl. berol. p. 454. Epipactis Nid. av. All. ped. 2. p. 151. *Planta aphylla, tota albido-fuscescens.*

19. GOODIERA (Rob. Brown. hort. kew. ed. 3. v. 5. 197.) Perigonium ringens. Labellum ecalcaratum, inclusum, inferne saccato-gibbum, superne recurvum. Anthera libera, pone rostellum inserta, stipitata, persistens. Pollen e granulis angulatis. Rostellum lamellatum, bifidum. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 10. 11.

1. **G. repens** (Rob. Brown. l. c. p. 198.) *foliis radicalibus ovatis petiolatis reticulatis*, caule superne floribusque pilosis. 4. In sylvis umbrosis, montanis et subalpinis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. Satyrium repens L. sp. 1839. Jacq. a. t. 369. Neottia repens Swartz. l. c. p. 226. Flores albidi.

20. SPIRANTHES (Richard.) Perigonium ringens. Labellum inclusum, ecalcaratum, basi canaliculatum, superne recurvum. Anthera libera, pone rostellum inserta, sessilis, persistens. Pollen e granulis subquaternatim cohaerentibus. Rostellum lamellatum, lamella ovata, apice bifida. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 13.

1. **S. aestivalis** (Richard.) *caule foliato*, foliis lanceolato-linearibus, spica spirali, labello oblongo-ovato apice rotundato. 4. In pascuis et pratis humidis spongiosis, (stw. im Elsass bis Heidelb. und Dürkheim; Würtemb.; bei Lüttich; Tyrol; am Bodensee bei Bregenz; in der Schweiz nicht selten.)

Jul. Reichenb. ic. 2. f. 337. Neottia aestivalis DC. fl. fr. 3. p. 258. Ophrys aestivalis Lam. dict. 4. p. 567. O. aestiva Balb. add. p. 96. Flores albi.

2. **S. autumnalis** (Richard.) caule aphyllo vaginato, *foliis radicalibus* ovatis vel ovato-oblongis in petiolum contractis *cauli lateraliter appositis*, spica spirali, labello obovato emarginato. 4. In pascuis montanis humidis, (stw. dch. d. Geb.) Aug.-Oct. Ophrys spiralis L. sp. 1340. St. h. 12. Neottia spiralis Sw. l. c. 226. Flores albidi.

Trib. III. *MALAXIDINEAE.* Anthera libera. Pollen ceraceum vel e granulis denique in massam ceraceam confluentibus.

21. CORALLORRHIZA (Hall. hist. 2. p. 159.) Perigonium ringens. Labellum basi cum laciniis perigonii lateralibus coniunctum, et calcar breve, ibidem adnatum, referens. Anthera libera, terminalis, decidua. Pollen in massulas 4, solidas, subglobosas, denique ceraceas conglobatum. N. ab E. gen. 10. 10.

1. **C. innata** (R. Brown. in hort. kew. p. 209.) spica pauciflora, perigonii laciniis acutis, inferioribus deflexis, labello oblongo obtuso utrinque obtuse unidentato disco longitudinaliter bicalloso. 4. In sylvis umbrosis, montanis et subalpinis, (v. d. Schweiz dch. d. g. Alpenk.; ausserdem sehr zerstreut dch. D.) Jun.-Aug. C. Halleri Richard. Ophrys corallorrhiza L. sp. 1349. Haller helv. t. 44. Flores virescenti-albidi.

22. STURMIA (Reichenb. icongr. bot. 4. 4. p. 39.) Perigonium patens. Labellum erectum, posticum, ecalcaratum. Gynostemium apicem versus marginatum. Rostellum obtusum. Anthera terminalis, decidua. Pollen ceraceum, globulos duos, ex duobus corpusculis compositos, referens. — Liparis Richard; sed Liparis est piscium genus iam ab Artedio conditum. N. ab E. gen. 10. 13.

1. **S. Loeselii** (Reichenb. l. c.) caule triquetro basi bifolio, foliis elliptico-lanceolatis, spica 3-8 flora, *labello ovato obtuso* crenulato longitudine laciniarum perigonii. 4. In paludibus spongiosis, (Südtyrol; im Wallis bei Sitten, bei Zürich; im Elsass bei Strassburg, Hagenau; bei Trier; im Badischen bei Waghäusel; Hengster fl. d. Wett.; Würtemberg, am Bodensee; Salzburg am Zellersee; Schlesien; in Böhmen u. im nördlichen D. vom Harze an.) Jun.-Aug. Ophrys Loeselii L. sp. 1341. Fl. dan. t. 877. O. liliifolia Lam. dict. 4. 469. Liparis Loeselii Rich. orch. 38. Flores flavo-virentes.

23. MALÁXIS (Swartz. act. holm. 1800. 133.) Perigonium patentissimum, laciniis subaequalibus. Labellum laciniis conforme, ecalcaratum, posticum. Anthera terminalis, libera, sessilis, persistens. Pollen ceraceum, in massas 4 oblongas conglobatum. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 16.

1. **M. paludosa** (Swartz. l. c.) *caule* pentagono inferne 3-4 *folio*, *labello* concavo *acuminato*. 4. In paludibus turfosis spongiosis inter sphagna, (stw. im nördl. D. v. Unterrheine u. Westphalen bis Preussen, im südwestlichen seltner; Bodensee, Schwarzwald, Rheinpfalz v. Bitsch bis Kaiserslautern u. Homburg, in Hengster. fl. d. Wett.) Jul. Aug. Ophrys paludosa L. sp. 1341. Fl. dan. t. 1234. Flores viridi-flavescentes. G.

2. **M. monophyllos** (Swartz. l. c.) *caule subunifolio* triquetro, *labello* concavo *acuminato*. 4. In locis muscosis, graminosis, humidis reg. subalpinarum, (sehr zerstreut dch. d. Alpenk. von d. Schweiz dch. Tyrol, Salzb., Krain, Kärnth. u. Steyerm.; sodann im Hengster fl. d. Wett., im Gesenke der Sudet. u. in d. kalten Brüchen v. Preussen.) Jul. Ophrys monophyllos L. sp. 1342. Wulf. in Jacq. collect. t. 13. f. 2. Microstylis monophylla Lindl. Koch. Taschenb. p. 196. Genus Mycrostylis, charactere nimis levi a genere Malaxide diversum, iterum delevi. Flores virescentes.

Trib. IV. *CYPRIPEDIEAE.* Flores diandri.

24. CYPRIPÉDIUM (L. gen. n. 1015.) Perigonium patens. Labellum ventricosum inflatum. Gynostemium apice trifidum, lobis lateralibus antheriferis, medio sterili. Ovarium non contortum. N. ab E. gen. 5. 17.

1. **C. Calceolus** (L. sp. 1346.) caule folioso, lobo gynostemii incurvi deflexo ovato obtuso, labello subcompresso perigonii laciniis breviore. 4. In locis sylvaticis umbrosis, (stw. dch d. südl. u. mittlere Geb. bis zum Harze, auch noch bei Stettin.) Mai. Jun. St. h. 8. Perigonium purpureofuscum; labellum flavum.

Ord. CXXIII. IRIDEAE. Juss. gen. p. 57.

Perigonium superum, petaloideum, sexpartitum. *Stam.* 3, basi segmentorum exteriorum perigonii inserta. *Anderae extrorsum dehiscentes.* Ovarium triloculare, multiovulatum, ovulis biserialibus, placentis centralibus. Stigmata 3, simplicia vel laciniata vel petaloidea. Caps. 3 valvis, valvis septiferis. Embryo intra albumen. Herbae radicibus tuberosis, rarius bulbosis.

1. CROCUS (L. gen. n. 55.) Perigonium corollinum, regulare, infundibuliforme, tubo longissimo, limbo sexpartito, campanulato. Stigma trifidum vel tripartitum, laciniis sursum latioribus, convolutis, denticulatis incisisve. N. ab E. gen. 5. 21.

1. **C. biflorus** (Mill. dict. n. 4.) spatha diphylla, fauce perigonii glabra, stigmate profunde trifido perigonio breviore, laciniis tubaeformibus apice denticulatis, *tunicis radicalibus chartaceis laevibus in lacinias latas apice fissas secedentibus.* 4. In herbidis sylvaticis, (um das Dorf Comen, zwei u. eine halbe Stunde ungefähr von Triest entfernt, Tommasini.) Mart. Flos albus vel violaceo colore leviter suffusus vel laciniae 3 exteriores striis longitudinalibus saturate violaceis pictae, faux lutea. Tunicis radicalibus facillime dignoscitur. G.

2. **C. vernus** (All. ped. n. 309.) spatha monophylla, scapo arcte vaginato, perigonii fauce barbata, *stigmate* trifido *limbo perigonii subduplo breviore,* laciniis erectis sursum cristato-dilatatis denticulatis, *tunicarum radicalium fibris capillaribus anastomosantibus, areolis oblongis angustis.* 4. In alpibus et subalpinis, in montes humiliores et planities descendens, (Schweiz u. dch. d. g. Alpenk. bis Oestreich u. bis an das adriat. Meer; auch im Würtembergischen bei Zavelstein.) Mart. Apr., in alpib. serius. D. fl. 1. 406. St. h. 22. Jacq. austr. app. 36. C. sativus *β.* vernus L. sp. 50. C. sativus Scop. carn. 1. 37. — Flores saturate vel dilute violacei concolores, vel albi et violaceo-vittati, vel toti albi. Faux alba vel violacea, nunquam lutea, Bertol. fl. ital. 1. p. 208. Variat insuper floris limbo sesquipollicari et stigmate antheras superemineute: C. vernus grandiflorus Gay. bull. scienc. 11. 137.; limbo pollicari tantum: C. vernus parviflorus Gay. l. c. et flore albo: C. albiflorus Hopp. et Hornsch. Tageb. 187. St. h. 22. — C. verni var. *β.* Sturm. h. 27. refert C. luteum Lam., specie diversum, in ditione florae nostrae autem nondum repertum.

3. **C. variegatus** (Hopp. et Hornschuch. Tageb. 187.) spatha diphylla, fauce perigonii glabra, *stigmate* trifido *limbo perigonii subduplo breviore,* laciniis erectis sursum latioribus denticulatis incisisque, *tunicarum radicalium fibris validis reticulatis anastomosantibus, areolis subrotundisve.* 4. In locis graminosis asperis circa Tergestum. Febr. Mart. D. fl. 1. 407. St. h. 54. C. reticulatus *β.* MB. taur. cauc. 1. p. 28. Flor. dilute caerulei, laciniae 3 exteriores externe vittis 3 violaceis fimbriato-striolatis pictae; faux luteola. G.

4. **C. sativus** (All. ped. n. 310.) spatha diphylla, fauce perigonii barbata, *stigmate* tripartito *limbum perigonii aequante, laciniis* elongatis superne paulum incrassatis apice dentatis patentibus *lateraliter exsertis,* tunicarum radicalium fibris capillaribus anastomosantibus, areolis angustis. 4. Colitur

in Austria, in Tyroli australi et Vallesia calidiore. Sept. Oct. Hayn. Arzngew. 6. 25. Flores violacei, faux perinde violacea. Colit.

2. TRICHONÉMA (Ker. in annal. of. bot. 1. 222. 1805.) Perigonium corollinum, regulare, tubo brevi, limbo sexpartito, patente. Stigmata 3, bipartita, laciniis angustissimis recurvatis. Sem. subrotunda. N. ab E. gen. 5. 20.

1. **T. Bulbocodium** (Ker. l. c.) fol. subulatis compressis sulcatis rectis dein tortuoso-recurvis, spatha interiore lato membranaceo-marginata, staminibus pistillo brevioribus. 4. In locis graminosis, (bei Fiume u. Istrien.) Febr. Mart. D. fl. 1. 408. Ixia Bulbocodium L. sp. 51. Romulea Bulbocodium Sebast. et Maur. fl. rom. p. 17. Jacq. ic. rar. 271. Flores intus a basi ad medium saturate lutei, reliqua parte violacei vel albidi. J.

3. GLADÍOLUS (L. gen. n. 57.) Perigonium corollinum, 6 partitum, irregulare, subbilabiatum. Stigmata 3, sursum dilatata. Stam. adscendentia. Sem. plus minusve alata. N. ab E. gen. 5. 19.

1. **G. palustris** (Gaud. fl. helv. 1. p. 97.) *fibris tunicarum radicalium validis reticulatis, areolis ovatis subrotundisve,* laciniis perigonii superioribus lateralibus rhombeo-ovatis, antheris filamento brevioribus, auriculis baseos antherarum obtusis parallelis, lobis stigmatis sursum sensim dilatatis fere a basi papilloso-ciliatis, capsula oblongo-obovata aequaliter sexsulcata apice rotundata non impressa. 4. In pratis humidis et paludosis, (Gegend v. Berlin, Schles., Böhm., Oestr., Krain, Gebirge zw. Istrien u. Innerkrain, südl. Tyrol, Salzburg, Fuss der bayer. Alpen, Elsass, Rheinpfalz.) Mai. Jun. St. h. 83. G. Boucheanus Schlechtend. Linnaea v. 7. p. 488. G. communis Wimm. schles. fl. p. 368. G. pratensis Alb. Dietrich. fl. boruss. t. 13., secund. D. Dietrich. synops. 1. p. 157. G. tenuis. M. Bieb. taur. cauc. 1. p. 29. sec. cl. Buek. — Flor. purpurei, macula albida saturatius purpureo-marginata lanceolata in laciniis corollae inferioribus tribus, sicut in omnibus nostrae florae. Dignosc. facile areolis subrotundis ovatisque retis valide tunicarum radicalium et figura capsulae. Sem. ut in sequente.

2. **G. communis** (L. sp. 52.) *fibris tunicarum radicalium validiusculis parallelis* superne anastomosantibus, areolis linearibus angustis, laciniis perigonii superioribus lateralibus rhombeo-ovatis, antheris filamento brevioribus, auriculis baseos antherarum obtusis parallelis, *lobis stigmatis sursum sensim dilatatis fere a basi papilloso-ciliatis,* capsula obovata trigona apice impressa, *angulis superne in carinam obtusam elevatis.* 4. In pratis, (bisher bloss bei Frankf. a. d. Oder u. bei Stettin;) in hortis ubique colitur. Mai. Jun. St. h. 56. et h. 83. Color florum ut in antecedente, sed ungues laciniarum et tubus perigonii in colorem rubiginosum vergunt; in G. palustri ungues laete purpurei sunt, et tubus vix ad rubiginosum tendit. Sem. latoalata. G.

3. **G. illyricus** (Koch. ap. Sturm. h. 83. icon et descriptio.) *fibris tunicarum radicalium tenuibus parallelis dense spicatis* superne anastomosantibus areolis copiosis angustissimis, laciniis perigonii superioribus lateralibus rhombeo-ovatis vel rhombeo-oblongis, antheris filamento brevioribus, auriculis baseos antherarum acuminatis denique divaricatis, *laciniis stigmatis a basi ad medium linearibus margine glabris supra medium subito in laminam subrotundo-ovatam dilatatis* margine papilloso-ciliatis, capsula obovata trigona apice impressa, angulis superne in carinam obtusam elevatis. 4. In pratis humidis reg. austral., (Krain, Triest, Fiume.) Mai. St. h. 83. Dignoscitur antherarum auriculis denique divaricatis, stigmate, (quod vero in planta viva et in statu penitus evoluto inquirendum,) et seminibus triangularibus, angulis anguste alatis. Folia plerumque acutissima. G.

4. **G. imbricatus** (Linn. sp. 52.) *fibris tunicarum radicalium parallelis dense congestis* superne anastomosantibus, areolis angustissimis, laciniis perigonii superioribus lateralibus rhombeo-ovatis, antheris filamento brevioribus,

auriculis baseos antherarum parallelis, *laciniis stigmatis sursum sensim dilatatis fere a basi papillis ciliatis,* capsula obovata trigona, apice impressa *angulis ubique rotundatis.* 4. In pratis humidis et turfosis, (Wobschna in Böhm., Grafsch. Glatz, Frankf. a. d. O., Steiger im Thüringer Wald, häufig in Haferfeldern bei Reihwiesen im Mährisch-Schlesischen Gebirge, Schauer; in Ostpreussen, Duisburg.) Jun. St. h. 56. et 83. G. rossicus Pers. syn. 1. 46. G. neglectus Schult. obs. p. 14. G. galiciensis Bess. Sem. ala lata cincta. Dignoscitur floribus valde approximatis, minoribus, post exsiccationem in caeruleum vergentibus, folio infimo plerumque obtuso, temporeque florendi seriore. G.

5. **G. segetum** (Gawler. bot. Mag. 719.) fibris tunicarum radicalium parallelis validiusculis superne anastomosantibus areolis oblongis ovalibusque, laciniis perigonii lateralibus lineari-cuneatis a suprema remotis, *antheris filamento longioribus,* capsula globosa trisulcata apice impressa gibbis rotundatis non in carinam compressis. 4. In arvis, (Stramare, zwischen Zaule u. Muchia bei Triest, in Istrien u. bei Fiume.) Mai. Jun. St. h. 83. G. communis Sibth. et Sm. fl. graec. prodr. 1. p. 25. fl. graec. t. 37. Bertolon. fl. ital. 1. p. 227. G. Ludovicae Jan. elench. 1. G. italicus Gaud. helv. 1. 96. G.

4. IRIS (L. gen. n. 59.) Perigonium corollinum basi tubulosum, limbo sexpartito, laciniis alternis reflexis, alternis erectis vel conniventibus. Stigma tripartitum, petaloideum. N. ab E. gen. 5. 18.

Sect. I. Barbatae. Laciniae exteriores perigonii basi interne linea, dense pilosa, praeditae.

1. **I. pallida** (Lam. dict. 3. 294.) *barbata,* fol. ensiformibus, caule plurifloro foliis longiore, *spathis iam ante anthesin totis scariosis,* laciniis perigonii interioribus longitudine exteriorum subrotundo-ovatis subito in unguem contractis, staminibus dimidium laciniarum stigmatis adaequantibus, antheris filamento brevioribus post anthesin a medio uncinato-recurvatis, laciniis stigmatis oblongis medio paulo latioribus lobis ovatis porrectis. 4. In locis lapidosis Istriae. Mai. Jun. St. h. 87. Flores pallide violacei, laciniis basi fusco-venosis. Bracteis sub anthesi totis membranaceis et floribus suaveolentibus distincta. J.

2. **I. germanica** (L. sp. 55.) barbata, foliis ensiformibus, caule plurifloro foliis longiore, *spathis sub anthesi a basi ad medium herbaceis,* laciniis perigonii interioribus longitudine exteriorum lato-obovatis subito in unguem contractis, *antheris filamentum aequantibus,* laciniis stigmatis oblongis apice latioribus *lobis* ovatis *divaricatis.* 4. In rupibus et locis montanis lapidosis, (im südl. Tyrol, der südl. Schweiz, u. überhaupt im südl. Gebiet, ausserdem wohl an den meisten angezeigten Orten verwildert.) April. Mai, praecocius quam I. pallida, I. sambucina et I. squalens. D. fl. 1. 413. St. h. 87. Flores inodori, intense violacei, unguibus flavicantibus fusco-venosis. Perigonii laciniae exteriores fere verticaliter deflexi, qua nota et caule magis paucifloro, floribus maioribus inodoris, aliter coloratis, atque tempore florendi praecociore a sequentibus duobus statim dignoscitur. — Iris florentina (L. sp. 55. St. h. 87.) in Germ. et Helv., quantum scio, nondum observata, sed in hortis passim culta, distinguitur ab Iride germanica: Folia latiora, interiora acuta quidem, sed nec longe nec tenuiter acuminata, flores albi saepe dilute in caerulescentem vergentes, unguibus caeterum ut in illa flavicantibus fuscoque venosis, laciniae perigonii interiores oblongo-obovatae, stigmatis laciniae in medio paulo latiores lobis porrectis non divaricatis. Odor florum suavis, at levior quam in I. pallida.

3. **I. sambucina** (L. sp. 55.) barbata, foliis ensiformibus, caule plurifloro foliis longiore, *spathis sub anthesi a basi ad medium herbaceis,* laciniis perigonii exterioribus obovatis, interioribus longitudine exteriorum ovalibus crena acuta evidenter emarginatis basi subito in unguem contractis, *filamentis anthera sesquilongioribus,* laciniis stigmatis oblongis medio paulo latioribus, *lobis ovatis margine suo interiore contiguis.* 4. In locis lapidosis

et declivibus montium lapidosorum, (im Würtembergischen an vielen Orten, bei Monheim an der Donau, Ehrenbreitstein am Rheine.) Jun., serius Iride squalente. D. fl. 1. 415. St. h. 87. Jacq. h. vind. 1. t. 2. Flores odore gravi, odoris corticis interioris Sambuci nigrae aemulo, praediti, minores quam in I. germanica: laciniae perig. exteriores patentes et multo minus reflexae quam in antecedentibus, violaceae margine et postice albae, venis saturatioribus pictae; unguis lutescens, venis fuscis; interiores dilute caerulescenti-cinereae, in margine et ungue luteae; stigmatis laciniae luteae. Caulis 6-8 florus foliis sub anthesi duplo longior. G.

4. **I. squalens** (L. sp. 1. 56.) barbata, foliis ensiformibus, caule plurifloro foliis longiore, *spathis sub anthesi a basi ad medium herbaceis,* laciniis perigonii exterioribus obovatis, interioribus longitudine exteriorum ovalibus apice integris vel leviter emarginatis basi subito in unguem contractis, *filamentis anthera sesquilongioribus*, laciniis stigmatis oblongis medio paulo latioribus, *lobis ovatis porrectis secedentibus.* 4. In locis lapidosis et montium declivibus, (um Heidelberg, am Schlossberge bei Oppenheim.) Jun., serius quam Iris germanica et praecocius quam I. sambucina. Simillima est huic, sed notis supra datis et florescentiae tempore diversa. Flores odorem melleum spargunt. Lamina laciniarum exteriorum perigonii dilutius violacea, laciniae interiores dilute sordide luteae. G.

5. **I. bohemica** (F. W. Schmidt. bohem. cent. 4. p. 5. et 6. n. 303.) barbata, *foliis* ensiformibus *caulem floriferum aequantibus* fructiferum duplo superantibus, *caule plurifloro,* pedunculo inferiore sub medio vel in basi caulis oriente, *spathis totis membranaceo-herbaceis ovato-oblongis* inflatis dorso curvatis sub anthesi vegetis serius apice marcescentibus, laciniis perigonii interioribus longitudine exteriorum ovalibus subito in unguem contractis, *ovario subtereti,* subaequaliter sexsulcato. 4. In locis apricis, (an sonnigen Rändern u. Blössen kleiner Gehölze, im Mittelholze u. Lindholze bei Halle, v. Schlechtend.; an d. Gebirgen der Moldau bei Kuchelbad, Sct. Procop u. Troja in Böhmen, Pohl; am Abhange des Georgenberges bei Striegau in Schlesien, Schauer.) Mai. I. nudicaulis Schauer flora 1843. p. 506. an Lamarckii?, quae vix sine inspectione speciminis authentici et vivi eruenda sit. I. bohemica Fieber. ap. St. h. 56. Flores violacei. Spathae totae virides excepto margine angusto membranaceo saepe colorato. „Germen teretiusculum sulcis sex inscriptum" Schmidt l. c. G.

6. **I. Fieberi** (Seidl. in oek. techn. fl. böhm. 1. p. 48.) barbata, *foliis* ensiformibus *caulem floriferum aequantibus* fructiferum duplo superantibus, caule plurifloro, pedunculo inferiore sub medio vel in basi caulis oriente, *spathis membranaceo-herbaceis inflatis lanceolatis attenuatis* apice marcescentibus, laciniis perigonii interioribus longitudine exteriorum ovalibus subito in unguem contractis, *ovario obtuse trigono* lateribus profundius sulcatis. 4. In pratis apricis sylvaticis inque rupibus, (bei Kottwitz in Schlesien, Schauer; auf dem Berge Geltsch im Leitmeritzer Kreise in Böhmen, Seidl.) Mai. I. Fieberi Fieber ap. St. h. 56. I. biflora Schauer flora 1843. p. 510. an Linn., quae Lusitaniam inhabitat.? I. nudicaulis Wimm. et Grab. fl. siles. 1. p. 31. Flores ut antecedentis. Spathae inflatae quidem sed non gibbo ventricosae, virides cum tinctura levi violacea versus marginem. G.

7. **I. hungarica** (Waldst. et Kit. pl. rar. hung. v. 3. p. 251. t. 226.) barbata, *foliis* ensiformibus *caulem floriferum aequantibus* fructiferum duplo superantibus, caule plurifloro, pedunculo inferiore sub medio vel in basi caulis oriente, *spathis membranaceo-herbaceis ovatis gibbo-inflatis fere totis coloratis* apice marcescentibus, laciniis perigonii interioribus longitudine exteriorum ovalibus subito in unguem contractis, *ovario obtuse trigono* lateribus profunde sulcatis. 4. In montosis, (am Millerschan in Böhmen, Fieber.) Mai. St. h. 56. I. bisflorens Host. fl. a. 1. p. 46. Spathae breves valde gibbae fere totae violaceo-coloratae, flores antecedentis. — Iridis n. 7—8. hic propositae observationibus continuatis accuratius limitandae et firmandae sunt. G.

8. **I. variegata** (L. sp. 56.) *barbata*, fol. ensiformibus falcatis caulem pluriflorum subaequantibus, *spathis herbaceis*, perigonii *laciniis oblongo-obovatis, interioribus versus basin sensim attenuatis.* 4. In collibus herbidis et locis sylvaticis Austriae. Mai. Jun. Jacq. austr. t. 5. St. h. 40. Flores pulcherrimi, lutei, laciniae exteriores venis fusco- vel atro-purpureis eleganter pictae.

9. **I. pumila** (L. sp. 56.) *barbata*, fol. ensiformibus caule *unifloro brevissimo* longioribus, *tubo exserto*, laciniis perigonii oblongo-obovatis. 4. In collibus apricis, (häufig in Oestreich, im übrigen Geb. hin u. wieder auf Mauern, wahrscheinlich ursprünglich angepflanzt.) April. Mai. D. fl. 1. 411. Jacq. austr. t. 1. St. h. 40. Var. floribus violaceis, dilute caeruleis et albis. G.

10. **I. lutescens** (Lam. dict. 3. 297.) *barbata*, fol. ensiformibus rectiusculis *caule subunifloro* brevioribus, *tubo spathis incluso*, laciniis perigonii oblongo-obovatis. 4. Ad rupes calcareas, (am Schlosse Tourbillon bei Sitten in der Schweiz.) Mai. D. fl. 1. 412. „Flores albido-flavescentes, laciniis exterioribus obsolete violaceo-venosis, interioribus fere unicoloribus, nec nisi prope basin venis purpureis insignitis.“ Gaud. Caulis 6-8 pollicaris. H.

Sect. II. Imberbes. Perigonii laciniae exteriores barba destitutae.

11. **I. Pseud-Ácorus** (L. sp. 56.) imberbis, foliis ensiformibus lanceolato-linearibus caulem teretem pluriflorum subaequantibus, *laciniis* perigonii exterioribus ovatis lato-unguiculatis, *interioribus linearibus angustioribus brevioribusque quam stigmatis laciniae.* 4. In fossis et aquis stagnantibus. Jun. Jul. D. fl. 1. 417. Fl. dan. t. 494. — Flores flavi, laciniae exteriores loco barbae macula fulva, venis atris vel atropurpureis tenuissimis pulchre picta, notatae.

12. **I. sibirica** (L. sp. 57.) *imberbis*, fol. ensiformibus linearibus *caule tereti* fistuloso subbifloro brevioribus, *laciniis perigonii exterioribus obovatis in unguem brevem attenuatis*, ovario trigono, capsula breviter apiculata. 4. In pratis, (in der nördlichen Schweiz u. dch. d. g. G. zerstreut, doch nicht überall.) Jun. D. fl. 1. 419. I. pratensis Lam. dict. 3. 300. St. h. 40. Laciniae perig. exteriores dilute caerulei, venis violaceis reticulati, ungue brunneo-flavescente; interiores violacei, venis saturatioribus.

13. **I. spuria** (L. sp. 58.) imberbis, fol. ensiformibus lanceolato-linearibus *caule* paucifloro *tereti* farcto brevioribus, *laciniis perigonii exterioribus subrotundis ungue lanceolato brevioribus*, ovario hexagono, capsula longe rostrata. 4. In pratis udis, (in Oestreich, Jacq., u. erst wieder auf der Rheinfläche in der Gegend von Mainz zwischen Bauschheim und Astheim, Ziz.!) Jun. D. fl. 1. 418. I. spathulata Lam. dict. 3. 300. Jacq. a. t. 4. St. h. 40. Lamina laciniarum exteriorum albido-flavicans, venis caeruleis pulchre picta, ungues utrinque oblique striati; laciniae interiores violaceae, unicolores. G.

14. **I. graminea** (L. sp. 58.) imberbis, fol. ensiformibus linearibus *caule ancipiti* subbifloro multo longioribus, *lamina laciniarum perigonii exteriorum appendiciformi ovata multo breviori quam unguis dilatatus*, ovario hexagono. 4. In pratis et collibus herbidis, (in Schlesien im Teschenschen, Böhmen, Oestreich, Steyerm., Krain, Litt., Berg Camiol in Vestino, Facchin.; Bayern bei Hohenschwangau, Oberschwaben, Würtemb. am Prassberg bei Wangen, auf d. Ballon d. Voges.) Mai. Jun. D. fl. 1. 419. Jacq. austr. t. 2. St. h. 40. — Laciniarum perig. exteriorum unguis valde dilatatus, purpureus, medio linea flava notatus, lamina albida venis violaceis picta; laciniae interiores saturate violaceae. G.

Iris foetidissima in ditione florae nostrae non crescit.

Ord. CXXIV. AMARYLLIDEAE. R. Brown. prodr. 296. Narcissi Juss. gen. 54., excl. gen.

Stam. 6, antheris introrsis. Caetera ut Iridearum.

1. STERNBERGIA (Waldst. et Kitaib. pl. r. hung. 2. p. 172.) Perigon. superum, infundibuliforme, tubo recto, sensim ampliato, limbo regulari, 6 partito. Filamenta summo tubo inserta, recta, 3 breviora. Styl. trigonus, stigma trilobum. Caps. baccata, indehiscens.

1. **S. lutea** (Ker. R. et S. syst. veg. 7. 2. p. 795.) foliis linearibus, flore erecto, scapo ancipiti, laciniis perigonii ovali-oblongis obtusis. 4. In locis graminosis, (bei Rovigno in Istrien, Insel Lossino.) Autumno. Amaryllis lutea L. sp. 420. Clus. hist. 164. J.

2. AGÁVE (L. gen. n. 431.) Perigon. superum infundibuliforme, limbo regulari, 6 partito. Stam. tubo corollae affixa, aeque ac stylus filiformia, ante anthesin inflexa, sub anthesi exserta. Capsula 3 valvis. N. ab E. gen. 10. 6.

1. **A. americana** (L. sp. 461.) foliis dentato-spinosis, scapo ramoso, tubo corollae medio angustato, staminibus corolla longioribus stylo brevioribus. 4 sed monocarpaea. In rupestribus, (auf d. Südspitze der Insel Cherso, Noć.) Jun. Flores viridi-flavi. J.

3. NARCISSUS (L. gen. n. 403.) Perigon. hypocrateriforme, limbo regulari, 6 partito. Paracorolla, (corona,) campanulata, fauci perigonii inserta. Stam. tubo inserta, alterna breviora.

1. **N. poëticus** (L. sp. 414.) foliis linearibus obtusis planiusculis obtuse carinatis, scapo compresso ancipiti sulcato unifloro, *ovario sub anthesi compresso-ancipiti, corona brevissima in patellam planiusculam expansa margine crenulato coccineo* cincta, staminibus tribus stylum paulum superantibus, tribus brevioribus fauci inclusis, perigonii laciniis ovatis. 4. In pratis et locis graminosis reg. calid., (im Geb. hin u. wieder in Grasgärten verwildert.) April. Mai. Schk. t. 90. Limbus niveus, corona flava, margine cinnabarino. Folia glauca. Ovarium viride quidem, sed non saturatius, quam scapus. Tubus evidenter compressus, sulcis 4-5 perductus.

2. **N. radiiflorus** (Salisb. prodr. 225.) foliis linearibus obtusis planiusculis obtuse carinatis, scapo compresso ancipiti sulcato unifloro, *ovario sub anthesi tereti, corona brevissima* cupulari *erecta* margine *crenulato coccineo* cincta, staminibus omnibus cum anthera tubo longioribus. 4. In montosis et subalpinis, (Monte Spaccato im östr. Litt., Steyermark, im Waadtlande u. Wallis.) Apr. Mai. Bulbus magis oblongus, quam in antecedente, planta minor, folia et caulis angustiora, ovarium gracilius oblongum teres saturate viride, tubus gracilis, laciniae perigonii angustiores magis dissiti, albae quidem sed paulum sordide albae nec niveae, corona brevis ut in antecedente sed a basi erecta, non explanata, flava margine coccineo.

3. **N. biflorus** (Curt. mag. t. 197.) foliis linearibus obtusis planiusculis obtuse carinatis, scapo compresso ancipiti striato bifloro, *corona brevissima patellaeformi margine crenulato decolore* cincta, perigonii laciniis ovatis. 4. In pratis region. australis, (auf Bergen bei Botzen seltner als Narc. Pseudo-Narcissus u. Narc. incomparabilis; im Wallis u. d. Gegend des Genfersees.) April. Mai. Limbus sordide albus, corona flava margine albido. Folia magis viridia, quam in antecedentibus, sed subtus pari modo carina obtusa sulcata perducta.

4. **N. Tazetta** (L. sp. 416.) foliis linearibus, obtusis planiusculis, scapo compresso ancipiti laevi 3-10 floro, *corona cyathyformi integerrima laciniis perigonii* lanceolato-ovatis acutis *triplo breviore.* 4. In locis lapidosis ad mare adriaticum, (auf d. Insel Osero u. St. Andrea bei Rovigno.) Mart. Limbus perigonii albus, corona flava. J.

5. **N. incomparabilis** (Mill. dict. n. 3.) foliis linearibus planiusculis ecarinatis medio bistriatis, scapo subcylindrico ancipiti unifloro, *corona campanulata erecta margine crenulato-crispa laciniis perigonii dimidio breviore.* 4. In pratis reg. austral. (um Botzen, Baron v. Hausmann; Krain, Freyer.) Initio Aprilis.

6. **N. Pseudo-Narcissus** (L. sp. 414.) foliis linearibus subcanaliculatis ecarinatis medio bistriatis, scapo compresso ancipiti unifloro, *corona campanulata* margine undulata et inaequaliter crenata *lacinias perigonii aequante.* 4. In pratis montanis, (stw. im Gebiete.) Mart. April. Flos flavus, corona aurea, vel subconcolore.

4. LEUCOIUM (L. gen. 402.) Perigonium 6 partitum, campanulatum; laciniis aequalibus, apice incrassatis. Filamenta aequalia.

1. **L. vernum** (L. sp. 414.) *spatha uniflora,* stylo clavato. 4. In nemoribus et pratis humidis, (stw. dch. d. Geb.) Febr. Mart. St. h. 11. Flores albi, perig. laciniae apice viridi notatae.

2. **L. aestivum** (L. sp. 414.) *spatha multiflora,* stylo filiformi-clavato. 4. In pratis humidis, (Steyerm., Krain, Oestr., Böhm., Erzgeb., Westph., Hamburg, Lübeck, an manchen Orten häufig.) Mai. Jacq. a. t. 203. St. h. 88. Flores ut antecedentis. G.

5. GALANTHUS (L. gen. n. 401.) Perigonium 6 partitum, laciniis 3 exterioribus patentibus; 3 interioribus erectis, brevioribus emarginatis.

1. **G. nivalis** (L. sp. 413.) in nemoribus et pratis humidis, (zerstreut durch d. Geb.) Febr. Mart. St. h. 2. Flores candidi, perig. laciniae interiores externe apicem versus macula semilunari et interne lineis 8 flavo-viridibus pictae.

Ord. CXXV. ASPARAGEAE. Juss. gen. p. 40.

Perigonium inferum, petaloideum, sexfidum vel hexaphyllum, vel 4-8 *partitum.* Stam. tot, quot perigonii laciniae, receptaculo vel perigonio inserta. Antherae introrsae. *Ovarium liberum* 3 loculare, loculis 1-pluriovulatis, ovulis angulo-centrali affixis. Styl. 1-3. *Fructus succulentus, indehiscens,* trilocularis, quandoque abortu 1 locularis, 1 spermus. Flores in nonnullis generibus unisexuales.

1. ASPÁRAGUS (L. gen. n. 458.) Flores abortu dioici. Perigonium campanulatum, sexpartitum, basi in tubulum saepe pedicelliformem contractum. Stam. 6. Ovar. 3 loculare, loculis 2 ovulatis. *Styl.* 1, *stigmata* 3, *reflexa.* — Folia ramea ad squamas reducta, in axillis fasciculum foliorum filiformium, quae ex ramulo contracto non elongato formata sunt, gerunt. N. ab E. gen. 2. 14.

1. **A. officinalis** (L. sp. 448., var. γ. excl. var. α. et β.) caule herbaceo tereti erecto, *foliis* fasciculatis setaceis teretibus *ramulisque glaberrimis* laevibus, *tubulo perigonii limbum dimidium aequante,* filamentis florum masculorum longitudine antherae oblongae. 4. In pratis fertilibus, (stw. durch d. Geb.) Jun. Jul. Schk. t. 96. Flores virescenti-albi ut in sequentibus.

2. **A. scaber** (Brignol. fasc. pl. forojul.) caule herbaceo tereti erecto, *ramulorum* tenuiter angulato-striatorum *striis foliorumque* fasciculatorum setaceorum *angulis denticulato-scabris, tubulo perigonii limbum dimidium aequante,* filamentis florum masculorum longitudine antherae oblongae. 4. In locis graminosis, (im Littorale bei Triest, bei Fiume u. auf den Inseln.) Mai. Jun. A. amarus DC. cat. hort. monsp. 81. A. officinalis α. L. sp. 448. A. marinus Reichenb. fl. exc. p. 118. G.

3. **A. tenuifolius** (Lam. dict. 1. 294.) caule herbaceo tereti erecto, *foliis*

fasciculatis *capillaceis ramulisque glaberrimis, tubulo perigonii* brevissimo *limbo multoties breviore,* filamentis florum masculorum anthera subrotunda multo longioribus. 4. In sylvis et pratis montanis reg. calid., (Istrien, Litt., Krain., Cilli in Steyerm.) Mai. Jun. A. sylvaticus W. K. t. 201. A. officinalis *β.* L. sp. 448. G.

4. **A. acutifolius** (L. sp. 449.) caule fruticoso inermi angulato, *ramulis pubescentibus,* foliis linearibus teretiusculis rigidis mucronatis sempervirentibus, *tubulo perigonii limbum aequante.* ♄. In dumetis et montosis herbidis, inter frutices, (Litt., Triest, Fiume.) Aug. Sept. A. Corruda Scop. carn. 1. p. 248. G.

2. STREPTOPUS (Michaux. bor. amer. 1. p. 200.) *Perigonium ad basin usque* 6 *partitum.* Ovarium triloculare, *loculis multiovulatis.* Styl. 1, *stigma obtusum.* Bacca. N. ab E. gen. 2. 18.

1. **S. amplexifolius** (DC. fl. fr. 3. 174.) foliis amplexicaulibus cauleque glabris. 4. In sylvis alpinis et subalpinis, (v. d. Schweiz dch. d. Alpenk. bis Oestreich; in Böhm., Schles., Erzgeb., Voges.) Jul. Aug. St. h. 41. S. distortus Mich. l. c. Uvularia amplexifolia L. sp. 436. St. h. 41. Flores albidi. Bacca rubra.

3. PARIS (L. gen. n. 500.) Perigon. horizontaliter patens, ad basin usque 8 partitum, laciniis 4 exterioribus calycem, 4 interioribus angustioribus corollam referentibus. Stam. 8; antherae in media filamentorum adnatae. *Styl.* 4, stigmata simplicia. Bacca 4 locularis, loculis 4-8 spermis. N. ab E. gen. 2. 19.

1. **P. quadrifolia** (L. sp. 527.) foliis quaternis, laciniis perigonii exterioribus lanceolatis interiores latitudine longitudineque superantibus. 4. In nemoribus umbrosis. Mai. St. h. 12. Flores virides, ovarium et stigmata atropurpurea. Occurrit foliis et partibus floris tri-pentameris.

4. CONVALLARIA (L. gen. n. 425., excl. spec.) *Perigon.* campanulatum vel tubulosum, 6 *fidum vel* 6 *dentatum.* Ovarium 3 loculare, *loculis* 2 *ovulatis. Stigma obtusum,* trigonum. Bacca loculis 1 spermis.

Sect. I. Polygonatum Tournef. Perig. cylindrico-tubulosum. Flores albi apice virides. N. ab E. gen. 2. 16.

1. **C. verticillata** (L. sp. 451.) caule erecto angulato, *foliis verticillatis.* 4. In sylvis montanis, (zerstreut dch. d. Geb.) Mai. Jun. Fl. dan. t. 86. Bacca rubra.

2. **C. Polygónatum** (L. sp. 451.) *caule angulato, foliis amplexicaulibus* alternis ovato-oblongis ellipticisve obtusiusculis *glabris,* pedunculis axillaribus 1-2 floris *staminibusque glabris.* 4. In sylvis montanis lapidosis. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 564. Fl. dan. t. 277. Filamenta longitudine antherarum, supra medium tubi inserta. Bacca violacea ut in sequentibus duabus.

3. **C. latifolia** (Jacq. fl. a. 3. p. 18. t. 232.) *caule angulato, foliis breviter petiolatis* alternis ovatis acuminatis *subtus in nervis pubescentibus,* pedunculis axillaribus 1-4 floris pubescentibus, staminibus glabris. 4. In sylvis montanis, (Oestr., Steyerm.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 565. Flores magnitudine florum C. Polygonati. G.

4. **C. multiflora** (L. sp. 1. 432.) glabra, *caule tereti, foliis amplexicaulibus* alternis ovato-oblongis ellipticisve obtusiusculis *glabris,* pedunculis axillaribus 3-5 floris glabris, *filamentis pilosis.* 4. In sylvis subhumidis. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 365. Schk. t. 97. Flores dimidio angustiores, quam in C. Polygonato, basi subventricosi; stamina brevissima, in superiore parte tubi inserta. Var.:

β. bracteata, pedunculi inferiores in ramulum elongati et ad basin florum folio minuto uno alterove obsiti: C. bracteata Thomas. Gaud. helv. 2. p. 531.

Sect. II. Coelocrinon. Lilium convallium Tournef. Flores campanulati, toti albi. N. ab E. gen. 2. 15.

5. **C. maialis** (L. sp. 441.) scapo nudo semitereti, floribus racemosis nutantibus. 4. In sylvis umbrosis. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 563. St. h. 14.

5. MAIÁNTHEMUM (Wiggers. primit. fl. holsat. p. 15. 1780.) *Perigon.* 4 *partitum;* laciniis horizontaliter patentibus, reflexisve. Stam. 4. Styl. 1, stigma obtusum. Bacca 2 locularis, loculis 1 spermis. N. ab E. gen. 2. 17.

1. **M. bifolium** (DC. fl. fr. 3. p. 177.) caule bifolio, foliis alternis petiolatis cordatis. 4. In sylvis umbrosis. Mai. Jun. D. fl. 1. p. 820. M. Convallaria Wiggers. l. c. Convallaria bifolia L. sp. 452. St. h. 13. Fl. dan. t. 291. Sciaphila convallarioides Wib. werth. p. 147. Smilacina bifolia Desf. Flores albi.

6. SMILAX (L. gen. n. 1120.) Flores dioici. Perig. ad basin usque 6 partitum. Mas. Filamenta libera. Fem. Ovarium 1, 3 loculare, loculis uniovulatis. *Styl.* 3, breves. Stigmata obtusa. Bacca abortu 1-2 sperma. N. ab E. gen. 2. 12.

1. **S. aspera** (L. sp. 1458.) caule aculeato angulato, foliis subhastato-cordatis ovatis lanceolatisve 7-9 nerviis aculeato-dentatis coriaceis. ♄. In dumetis ad litus maris adriatici, Host.. Duino, Kützing. Aug. Sept. Schk. t. 328. Flores virescentes. G.

7. RUSCUS (L. gen. n. 1139.) Flores dioici. Perigon. ad basin usque 6 partitum. Mas. Filamenta in tubulum ovatum connata, cuius apici antherae 3 impositae sunt. Fem. Filamenta perinde in tubulum connata, sed antheris sterilibus instructa. Styl. 1. Stigma capitatum. Bacca 3 locularis, loculis dispermis. — Folia caulina et ramea huius generis parva sunt et squamiformia, ut in Asparago; ramulorum vero cum ramulo in folium ovatum vel oblongum coriaceo herbaceum dilatata et cum ramulo connata sunt. Ramulus adnatus in nostris speciebus in medio folii terminatus est, ibidem saepe florum fasciculum fert et alio folio minuto praeter bracteas sub fasciculo gaudet. — N. ab E. gen. 2. 13.

1. **R. aculeatus** (L. sp. 1474.) foliis ovatis in mucronem acutissimum acuminatis supra floriferis, *fasciculis subbifloris* basi folio *minuto scarioso* cuspidato *uninervio* fultis. ♄. In locis incultis inter frutices, in sylvis, (Istrien, Littorale, südl. Tyrol u. südl. Schweiz.) Mart. April. St. h. 41. Flores virescentes ut in sq.

2. **R. Hypoglossum** (L. sp. 1474.) foliis oblongo-lanceolatis acuminatis muticis supra floriferis, *fasciculis plurifloris* basi *folio minuto herbaceo* lanceolato acuto 3-5 *nervio* fultis. ♄. In locis montanis sylvaticis, (Steyermark im Teufelsgraben bei Cilli, Zechent., auf d. Wotschberg im Cillier Kr., Maly.; im wärmern Krain u. im Litt.) Mart. April. G.

Ord. CXXVI. DIÓSCOREAE. Rob. Brown. prodr. fl. nov. holland. p. 294.

Ovarium inferum, (perigonium adhaerens); caetera ut Asparageárum.

1. TAMUS (L. gen. 1119.) Perigon. campanulatum, limbo sexpartito. Mas. Stam. 6. Fem. Perigonium ovario adhaerens, limbo sexpartito, persistente. Stam. 6, brevissima, abortientia. Ovarium triloculare, loculis biovulatis. Stylus trifidus; stigmata reflexa. Bacca. N. ab E. gen. 2. 20.

1. **T. communis** (L. sp. 1458.) foliis cordatis acuminatis indivisis. 4. Ad sepes et in dumetis umbrosis, ad rivulos, (Littorale, Krain, südl. Tyrol, Schweiz, Oberbaden, Rheinwälder bei Carlsruh, Elsass bei Mühlhausen und Strassburg.) Mart. April. Engl. bot. t. 91. Flores virescentes.

Ord. CXXVII. LILIACEAE. DC. theor. elem. ed. 1. p. 249.

Perigonium inferum, petaloideum, sexfidum vel hexaphyllum. Stam. 6, receptaculo vel perigonio inserta. Antherae introrsae. *Ovarium liberum*, 3 loculare, multiovulatum, ovulis biseriatis, angulo centrali affixis. Styl. 1. Stigmata 3, aut 1, triquetrum. *Fructus* siccus, dehiscens, *valvis medio septigeris.* Embryo intra albumen.

Trib. I. *TULIPEAE.* Perigon. hexaphyllum. Capsulae loculi polyspermi. Sem. plana, seriatim dense superimposita. Testa seminis semper pallida vel fusca, non crustacea.

1. TÚLIPA. Perig. 6 phyllum. Nectar. o. Styl. o. Stigma trilobum. Sem. plana.

1. **T. sylvestris** (L. sp. 438.) caule 1 floro glabro, flore ante anthesin nutante, perigonii phyllis interioribus *staminibusque basi barbatis.* 4. In agris, vineis, et pratis sylvaticis, (stw. im südlichen und mittlern Geb., seltner im nördl.) Mai. Jun. Schk. t. 93. St. h. 29. Flos flavus.

2. **T. Oculus solis** (St. Ammans. fl. agen. 145. t. 3.) caule unifloro glabro, foliis oblongo-lanceolatis, perigonii phyllis exterioribus acuminatis, interioribus obtusis apiculatis, omnibus ovato-lanceolatis *staminibusque glaberrimis,* filamentis longitudine antherarum. 4. In agris et locis cultis, (bisher bloss bei Sitten im Wallis.) Mai. T. acutiflora Poir. dict. 8. 134. Flos saturate purpureus, phyllis basi macula magna atrocaerulea, flavo-marginata. Tulipa Gesneriana ab hac differt, perigonii phyllis omnibus obtusissimis exterioribus cum apiculo, interioribus cum crena, et filamentis antherа dimidio brevioribus. H.

2. FRITILLARIA (L. gen. n. 411.) Perigon. 6 phyllum; phyllis basi fovea nectarifera. Stylus apice trifidus.

1. **F. montana** (Hopp. conf. bot. Ztg. 15. 2. p. 476.) caule uniflore foliato superne nudo, *foliis floralibus* 2 *oppositis a caulinis, longe remotis,* foliis lanceolatis linearibus attenuato-acutis alternis, infimis 2 oppositis, perigoniis tesselatis. 4. In montanis herbidis Littoralis. Mai. F. pyrenaica D. fl. 2. 537., non Linn. F. tenella Reichenb. fl. exc. p. 102, non MBieberst. conf. Koch. l. c. Flores lutescentes maculis rufo-brunneis. — Fritillariae montanae Hopp. alia species similis est, quam in ed. 1. synopsis sub nomine F. involucratae Allionii proposui, quae vero certe differt: folia eius longiora subfalcata sunt et aequaliter distant, hinc caulis superne non nudus; caulinorum duo paria opposita vel duo paria opposita unumque solitarium adsunt, floralium 3, verticillata, petala insuper obtusiora, rotundato-obtusa, et latitudine magis aequalia sunt. Copiam speciminum, in alpibus Pedemontanis maritimis inter Tenda et Col di Tenda a Dom. Schneider, collectorum, de quibus adhuc specimina sex in herbario asservo, examinavi. Multo propius accedit ad F. montanum quam ad F. Meleagridem et sine dubio ab hac differt. Cl. Bertolonius F. involucratam All. ad varietatem F. Meleagridis, „flore viridi lutescente tesselato, sepalis obtusis" adducit. Fl. ital. 4. p. 75. G.

2. **F. Meleágris** (L. sp. 436.) caule uni-bifloro foliato, *foliis* linearibus canaliculatis recurvatis subaequaliter distantibus, *omnibus alternis,* perigoniis tesselatis, phyllis perigonii apice contractis. 4. In pratis humidis, (Steyermark; Krain; Böhm.; bei Hildesheim; Hamburg; in Holst.; bei Steinfurt u. Sassenberg in Westph.; im C. Neufchatel; bei Ansbach.) Apr. Mai. D. fl. 2. p. 537. Jacq. a. app. t. 32. St. h. 18. Flores carnei vel lutescentes, pulcherrime sanguineo-tesselati; variant rarissime albi et immaculati.

3. LILIUM (L. gen. n. 40.) Perigon. 6 phyllum, campanulatum, vel revolutum; phyllis basi sulco longitudinali nectarifero canaliculato vel clauso notatis. Stylus indivisus; stigma trigonum. Semina plana.

1. **L. bulbiferum** (L. sp. 1. 433.) *foliis sparsis, floribus erectis,* perigonio campanulato intus verrucis carnosis scabro. 4. In sylvis montanis, subalpinis et alpibus, (stw. dch. d. Alpenk., sodann a. d. Harze; in Thüring.; Sachsen; Böhmen; Oberbaden; Würtemberg, bei Frankfurt a. Main.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 535. Jacq. a. t. 226. Flores crocei, masculis fusco-rubris.

2. **L. carniolicum** (Bernhard. conf. M. et K. D. fl. 2. p. 536.) *foliis* omnibus erecto-patulis aequaliter *sparsis* lanceolatis acutis margine nervisque 5-7 in pagina inferiore pubescenti-scabris, superioribus sensim minoribus, caule glabro, *floribus nutantibus, perigoniis revolutis.* 4. In montanis et subalpinis, (in Steyerm., Krain u. im Littorale nicht selten.) Mai.-Jul. L. chalcedonicum D. fl. 2. p. 55. Host. fl. a. 1. p. 425. Jacq. a. app. t. 20., non Linn. Perigonium miniatum vel fulvum, intus a medio versus unguem multis lineolis elevatis fusco-purpureis, partim in verruculas filiformes protractis, obsessum; ungues virentes. — L. chalcedonicum Linn. multum differt: folia lanceolato-linearia, attenuata, apice ipso vero obtusa, subtus glabra et margine tantum pubescenti-scabra, contorta, in medio caulis subito minora linearia que et fere cauli adpressa sunt, („caulis usque ad apicem foliis vestitus confertis" Linn. sp. pl. p. 434.), caulis praecipue in striis pubescenti-scaber, flos cinnabarinus, verruculis concoloribus; 14 diebus serius floret. — Lilio carniolico magis accedit L. pomponium Linn. quam L. chalcedonicum. Flos illius similis flori L. carniolici, sed folia multo copiosiora et densiora, lanceolato-linearia, superiora sensim angustiora, linearia densissimeque congesta sunt, tamen patula, (cauli non adpressa, ut in L. chalcedonico), atque subtus in nervis glabra margineque tantum ciliata apparent. G.

3. **L. Martagon** (L. sp. 435.) *foliis verticillatis* elliptico-lanceolatis acuminatis margine scabris, caule pubescenti-scabro, floribus nutantibus, perigoniis revolutis. 4. In sylvis montanis, (stw. dch. d. g. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 536. Jacq. a. t. 351. Flores dilute violaceo-carnei, maculis parvis purpureo-fuscis.

4. LLOYDIA (Salisbur.) Perigonium 6 phyllum, patens; phyllis intus supra basin fovea nectarifera, inferne plica transversali marginata, praeditis. Stylus indivisus; stigma trigonum. Semina plana.

1. **L. serotina** (Salisbur.) 4. In locis apricis graminosis rupestribus summarum alpium, (von d. Schweiz durch Tyrol, Salzb., Kärnth. u. Steyermark.) Jun.-Aug. Anthericum serotinum L. sp. 444. St. h. 28. Phalangium serotinum Lam. dict. 5. 241. Ornithogalum striatum MB. t. c. 1. 272. Flos albus, phylla intus striis tribus rubellis; ungues luteoli. Non est planta serotina, Facchini.

Trib. II. *ASPHODELEAE.* Perigonium 6 phyllum. Capsulae loculi oligospermi. Sem. figurae variae, saepe testa atra crustacea instructa. — Testa atra et lutescens in diversis speciebus generis eiusdem occurrit, in quod in posterum accuratius inquirendum est.

5. ERYTHRONIUM (L. gen. n. 414.) Perigon. 6 phyllum, basi campanulatum, deinde patens, postremo reflexum; phyllis 3 interioribus basi intus bicallosis. Stylus trifidus. Sem. rotundata.

1. **E. Dens canis** (L. sp. 437.) foliis oblongo-ellipticis phyllisque perigonii acutis. 4. In montosis sylvaticis, (in der westlichen Schweiz sehr selten; im Littorale; in Krain und Steyerm.; Wald Hradiso an d. Sazawa in Böhm., Sekera; Valsugana im südlichen Tyrol, Facchini.) April. Mai. St. h. 34. Flos roseus.

6. ASPHÓDELUS (L. gen. n. 421.) Perigon. profunde 6 partitum, patens. Nectarium e basi dilatata staminum, fornicis instar ovarium obtegentium, formatum. Stylus indivisus. Sem. angulata. Pedicelli articulati ut in Antherico.

Sect. I. Rhizophylli. Stam. omnia erecto-patentia vel inferiora declinata. Folia caulina nulla. Flores albi.

1. **A. ramosus** (L. sp. 444.) foliis lato-linearibus planis, *caule aphyllo ramoso*, ramis racemosis, floribus confertis, *filamentorum basi subrotundo-obovata obtusissima* abrupte in filamentum abeunte, capsula globosa. ♃. In collibus lapidosis reg. calid., (bei Fiume, Noé.) Mart. April. D. fl. 1. p. 555., excl. syn. Sturm. h. 6., quae icon Asphodelum fistulosum refert. J.

2. **A. albus** (Miller. dict. n. 3.) foliis lato-linearibus planis, *caule aphyllo simplicissimo*, racemo conferto, *filamentorum basi oblongo-lanceolata in filamentum attenuata*, capsula ovata trigona, angulis tribus interiectis obsoletis. ♃. In montanis, (Krain; Littorale; Castellano Roveredo gegenüber im südl. Tyrol; monte generoso, Cant. Tessin.) Mai. Jun. Occurrit racemo inferne ramo uno alterove aucto: A. neglectus Schult. syst. veg. 7. p. 489. Koch. Syn. ed. 1. p. 709. monente cl. Tommasinio. G.

3. **A. fistulosus** (L. sp. 444.) *foliis subulatis* semiteretibus fistulosis, *caule nudo* ramoso, floribus solitariis remotis. ☉. In locis incultis et cultis, (auf dem Scoglio grande im Hafen v. Pola auf der Mittagsseite häufig, Tommasini.) April. A. ramosus St. h. 6. Perig. album vel dilute carneum stria media virente vel purpurea. J.

Sect. II. Coleophylli. Flores flavi, stamina declinata. Caulis foliorum vaginis totus vel pro parte tectus. Asphodeline Reichenb. fl. exc. p. 116.

4. **A. luteus** (L. sp. 443.) foliis subulatis triquetris striatis laevibus basi in vaginam membranaceam dilatatis, *caule simplicissimo foliorum vaginis ad racemum usque tecto*, floribus confertis, bracteis flores subaequantibus. ♃. In collibus lapidosis reg. calid., (bei Fiume u. auf Veglia.) Mai. Jun. Jacq. h. vindob. t. 77. Asphodeline lutea Reichenb. fl. exc. p. 116. J.

5. **A. liburnicus** (Scopol. carn. 1. p. 245. t. 12., pessima.) foliis subulatis triquetris striatis in striis denticulato-scabris basi in vaginam membranaceam dilatatis, *caule simplicissimo superne nudo*, floribus laxe racemosis, bracteis pedicello multo brevioribus. ♃. Inter dumeta pratorum reg. calid., (bei Fiume.) Jun. Jul. A. creticus Lam. dict. 1. p. 297. Willd. sp. 2. p. 133. Nomen a b. Scopolio huic plantae impositum prioritate gaudet. Asphodeline liburnica Reichenb. fl. exc. p. 116. J.

7. ANTHÉRICUM (L. gen. n. 422., exclus. spec.) Perig. 6 phyllum, patens. Nectarium nullum. Stam. receptaculo inserta, filamenta subulata. Antherae incumbentes, (dorso affixae.) Stylus indivisus. Sem. angulosa. Pedicellus geniculo instructus; perigonium scilicet basi in stipitem teretem, cum pedicello articulatum protractum. — Flores albi.

1. **A. Liliago** (L. sp. 445.) foliis linearibus subcanaliculatis erectis caule aphyllo simplicissimo brevioribus, *stylo declinato*. ♃. In collibus herbidis virgultis et locis rupestribus montosis, (stw. dch. d. g. Geb., aber nicht im Littorale, in Oestreich, Mähren u. nicht in Schlesien.) Mai. Jun. D. fl. 2. 557. Jacq. h. vind. t. 83. Phalangium Liliago Schreb. spic. p. 36. Occurrit caule ramo uno alterove aucto.

2. **A. ramosum** (L. sp. 445.) foliis linearibus canaliculatis erectis caule aphyllo ramoso brevioribus, *stylo recto*. ♃. In montosis lapidosis, (stw. dch. d. g. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 558. St. h. 56. Phalangium ramosum Lam. dict. 5. 250.

8. PARADISIA (Mazzugati viag. alle Alp. Giul. p. 27., sec. Bertolon. fl. ital. v. 4. p. 132.) Perigon. 6 phyllum, infundibuliforme. Ovarium carpophoro brevi supra receptaculum elevatum. Stam. ad apicem carpophori sub ovario inserta. Antherae incumbentes, stylus indivisus, stigma obsolete trilobum. Sem. angulata. N. ab E. gen. 6. 2.

1. **P. Liliastrum** (Bertoloni l. c. p. 133.) ♃. In pascuis montanis et alpinis, (in d. Schweiz nicht selten u. bis z. Ortles in Tyrol; im südlichen

Tyrol weiter verbreitet; a. d. Alpe Plecken im Gailthale in Kärnth.) Jul. Aug. P. hemeroanthericoides Mazzuc. l. c. Anthericum Liliastrum L. sp. 445. D. fl. 2. p. 558. Hemerocallis Liliastrum L. sp. ed. 1. p. 324. Czackia Liliastrum Andrz. Koch. syn. ed. 1. p. 710. „*Flores candidi speciosi, Lilium candidum aemulantes, sed saltem duplo minores.*“ Gaud.

9. ORNITHÓGALUM (L. gen. n. 418., excl. spec.) Perigonium 6 phyllum, patens. Nectarium o. Stamina receptaculo inserta vel parum tantum basi perigonii adhaerentia; antherae incumbentes, (dorso affixae.) Stylus indivisus, stigma obtusum. Sem. ovato-subglobosa vel angulata. Pedunculi non articulati. Spatha o.

Sect. I. Stam. lanceolata, simplicia.

1. **O. sulphureum** (Röm. et Schult. syst. veg. v. 7. p. 519.) *racemo elongato* multifloro, *pedunculis* patentibus, *fructiferis scapo adpressis, bracteis ovato-lanceolatis sensim in acumen attenuatis,* phyllis perigonii lineari-oblongis, stylo stamina aequante, *ovario ovato apicem versus angustiore,* foliis viridibus lanceolato-linearibus planiusculis vel modice canaliculatis. 4. In collibus incultis, pratis, (zerstreut im südl. Gebiete.) Mai. Jun. O. pyrenaicum Gouan. illustr. p. 26., flores sulphureos dicit. O. pyrenaicum Bertoloni fl. ital. v. 4. p. 101. O. stachyoides Host. austr. 1. p. 432. Anthericum sulphureum Waldst. et Kit. pl. rar. hung. 1. p. 98. t. 95. Flores sulphurei, phyllis dorso stria lutescenti-viridi. Simillimum Ornithogalo pyrenaico, et specimina male exsiccata vix distinguenda sunt, tamen, me judicante, speciem diversam exhibet. Differt ab illo praeter tempus florendi praecocius et colorem florum foliis minus profunde canaliculatis, viridibus, colore foliorum Hyacinthi orientalis, jam sub anthesi incipiente superne emarcidis, et ovario ovato apicem versus paulo angustiore, nec utrinque aequaliter rotundato. — Folia non sunt hysteranthia „cum saepe reperim scapum floriferum sine foliis, putavi (in amoen. ital.) folia sese hysteranthia; sed bulbis in hortum translatis, vidi haec praecedere scapum, et statim post inflorescentiam evanescere.“ Bertoloni fl. ital. 4. p. 102.

2. **O. pyrenaicum** (L. sp. 440.) *racemo elongato* multifloro, *pedunculis* patentibus, *fructiferis scapo adpressis, bracteis ovato-lanceolatis sensim in acumen attenuatis,* phyllis perigonii lineari-oblongis, stylo stamina aequante. *ovario ovali* basi apiceque aequaliter rotundato, foliis glaucis linearibus profunde canaliculatis. 4. In pratis et locis incultis, (im südl. Gebiet.) Jun, Jul., quatuordecim diebus serius quam antecedens. D. fl. 1. p. 550. Jacq. a. t. 103., („huc pertinet, nec ad O. sulfureum,“) sic Smith. brit. 1. p. 363. DC. fl. fr. 3. p. 216. Flores albidi, levi tinctura caeruleo-viridi, phylla subtus stria glauco-viridi. „Flores albido-virescentes“ Smith. brit. l. c. „Petala pallent, nec vere albent, notata in medio linea longitudinali subvirente, idque in postica parte manifestius“ Jacq. fl. austr. v. 2. p. 2. — Flores siccati magis flavescunt.

3. **O. stachyoides** (Schultes. fil. in Roem. et Schult. syst. veg. v. 7. p. 518.) *racemo elongato* multifloro, *pedunculis* patentibus, *fructiferis scapo adpressis, bracteis ovatis subito in acumen longum contractis,* phyllis perigonii lanceolato-oblongis, stylo stamina paulo superante, foliis linearibus canaliculatis. 4. In agris, (in den wärmern Gegenden um Triest u. in Istrien, Tommasini.) Mai. Jun. O. stachyoides Ait. kew. ed. 2. v. 2. p. 259.? filamenta alterna enim paulo tantum, nec dimidio breviora sunt. O. pyrenaicum β. stachyoides DC. fl. fr. 3. p. 216. Dub. bot. gall. p. 467. Flores albi, phyllis stria dorsali viridi. Pedunculi paulo breviores et sub anthesi erectiores quam in antecedentibus, a quibus eximie diversum bracteis subito in acumen longum setaceum contractis, quod, ut in speciminibus exsiccatis clarius elucescat, bractea in guttulis aliquot aquae frigidae explanetur necesse est. — Nostra hic descripta planta sec. cl. Gussonium sub nomine O. narbonensis in Herbario Linnaeano asservatur, conf. Bertol. fl. ital. 4. p. 102., sed O. narbonense Dodonaei certe aliam speciem exhibet. G.

4. **O. arcuatum** (Steven in act. mosq. v. 7. p. 75.) *racemo elongato* multifloro, *pedunculis angulo recto patentibus, fructiferis arcuatim adscendentibus,* bracteis ovato-lanceolatis sensim in acumen attenuatis, phyllis perigonii ellipticis, *stylo staminibus breviore dimidium ovarii attingente,* foliis linearibus canaliculatis. 4. In pomariis graminosis, (bei Steyer in Oestreich, Sauter.) Jun. Flores albi, stria in dorso phyllorum viridi nulla vel obsoleta.

5. **O. comosum** (Linn. sp. 440.) *racemo denique oblongo, pedunculis floriferis fructiferisque angulo semirecto patentibus omnibus denique aequilongis,* phyllis perigonii oblongis obtusis, staminibus edentulis, foliis e basi lanceolato-lineari attenuatis glaucis linea alba destitutis ciliatis. 4. In collibus incultis inter vepreta, (um Fiume, Noé.) Mai. Jun. Flores candidi stria dorsali viridi, ut in sequentibus tribus. Stamina deflorata a medio extrorsum curvata. Jacq. ic. rar. t. 426., Ornithogalum pannonicum albo flore Clus. hist. 1. p. 187. J.

6. **O. collinum** (Gussone fl. sicul. 1. p. 412.) *floribus corymbosis, pedunculis floriferis fructiferisque angulo semirecto patentibus inferioribus longioribus,* phyllis perigonii lato-oblongis obtusis, staminibus edentulis, foliis linearibus flaccidis viridibus linea media alba notatis saepe ciliatis. 4. In pratis montanis, (um Wien, Erxleben; am Karstgebirge, Tommasini.) Mai. Jun. O. collinum Bertol. fl. ital. 4. p. 97. O. saxatile Visian. Regensb. bot. Ztg. 1829. Ergänz. Bl. p. 10., secundum specimina dalmatica. Cl. Bertolonius in flora italica cum O. collino conjungit Ornithogala sequentia mihi haud nota. 1. O. tenuifolium Guss. (O. Gussonii Tenor.), quod cl. Tenorius in sua Sylloge foliis filiformibus et phyllis perigonii acutis distinguit, 2. O. orthophyllum Tenor. foliis 5 lineas latis non ciliatis stria latissima alba notatis, floribus racemosis instructum et 3. O. garganicum Tenor. foliis 6 lineas latis non ciliatis, stria alba destitutis. — O. montanum Cyrill. ab his differt staminibus perigonio plus duplo brevioribus, folia ejus lanceolata sunt, linea alba destituta, non ciliata. G.

7. **O. umbellatum** (L. sp. 441.) *floribus corymbosis, pedunculis inferioribus fructiferis horizontaliter patentibus* fructu adscendente, phyllis perigonii oblongis obtusis, staminibus edentulis, foliis linearibus canaliculatis glabris stria media alba. 4. In pratis, agris, (zerstreut durch d. Geb.) Apr. Mai. Jacq. a. t. 343.

8. **O. refractum** (Waldst. et Kit. in Willd. en. hort. berol. p. 18.) *floribus corymbosis, pedunculis inferioribus fructiferis a scapo divaricato-refractis* fructu adscendente, bracteis pedunculo vix longioribus, phyllis perigonii oblongis obtusis, staminibus edentulis, foliis linearibus canaliculatis glabris stria media alba. 4. In agris et vineis, (um Triest, Tommasini.) Apr. Mai. Reichenb. ic. f. 265., haud bona. — Simile Ornithogalum exscapum habet bracteas ovato-oblongas, breviter acutas, pedunculos aequantes vel superantes, et statura minus est. G.

Sect. II. Albucea Reichenbach. Stamina tridentata.

9. **O. nutans** (L. sp. 441.) *floribus laxe racemosis* jam sub anthesi secundis pendulisque, staminibus omnibus tridentatis, alternis dimidio brevioribus, dentibus lateralibus filamentorum longiorum antheram inapertam paulum superantibus, *ovario* ovato *apice profunde umbilicato* sub anthesi stylo evidenter breviore, *pedicellis sub anthesi ovario longioribus*, foliis hoc tempore totis vegetis. 4. In pratis agris, (zerstreut dch. d. Geb.) Apr. Mai. Stigma capitato-triquetrum. Capsula lato-ovalis apice profunde umbilicata, aequaliter sexsulcata. Sem. brunnea scrobiculato-reticulata globosa.

10. **O. chloranthum** (Sauter in Koch. Taschenb. der deutsch. u. schweiz. Flora p. 508.) *floribus approximato-racemosis* sub anthesi horizontalibus denique secundis pendulisque, staminibus omnibus tridentatis, alternis dimidio brevioribus, dentibus lateralibus filamentorum longiorum antheram inapertam aequantibus brevioribusque, *ovario* oblongo *apice obtuso non umbilicato* longitudine styli, *pedicellis sub anthesi ovario duplo brevioribus,* foliis hoc tem-

pore superne emarcidis. 4. In locis graminosis et pomariis, (bei Steyer in Oestreich.) Apr. Mai. Flores interne albi, externe in phyllis stria lata intense viridi. Stigma triquetrum stylo non latius. Capsula oblongo-ovata apice obtusa, non umbilicata, subaequaliter sexsulcata. Sem. ut antecedentis, sed dimidio minora. G.

10. GAGEA (Salisbur. in ann. of. bot. 2. p. 555.) Perigonium 6 phyllum, superne patens, cum staminibus persistens. Nectarium o. Antherae erectae, (nempe basi sua apici filamenti insertae.) Stylus indivisus, stigma trigonum. Sem. rotundata. — Testam seminum in omnibus speciebus, quas examinare potui, testaceo-fuscam, non vero atram inveni. Flores omnium flavi, stria dorsali in phyllis viridi.

Sect. I. Radix composita e bulbis 3 horizontalibus, nudis, neque tunica communi inclusis; ex his 2 hornotini et aphylli, tertius biennis vero folio unico cauleque florigero instructi sunt.

1. **G. stenopetala** (Reichenb. fl. exc. p. 107.) folio radicali solitario lineari basi apiceque attenuato plano argute carinato, floralibus 2 oppositis, *pedunculis glabris* simplicibus, *defloratis undique patentibus*, *bulbis 3 horizontalibus*, *hornotinis clavato-stipitatis*. 4. In agris. April. Mai. G. pratensis R. et S. syst. 7. p. 536., excl. var. γ. Ornithogalum stenopetalum Fries. nov. ed. 2. p. 87. secund. spec. ab ipso auctore. D. fl. 2. p. 541. O. luteum Hoffm. D. fl. 1. 159. et multor. auct. St. h. 12. O. pratense Wahlenb. suec. 1. p. 201. Modificatio floribus maioribus: G. Schreberi Reichenb. fl. exc. p. 107. secund. specim. ab ipso auctore mecum communicatum. Variat

β. *pratensis*, folio florali inferiore spathaeformi, basi ovata concava pedunculos infra ambiente, pedunculis defloratis secundis, bulbis hornotinis ovatis basi latioribus: G. pratensis Koch. Reg. bot. Ztg. 1834. p. 552. G. pratensis γ. R. et S. syst. veg. 7. p. 536. Ornithogalum stenopetalum γ. D. fl. 2. p. 542. O. pratense Pers., nostra var. β. cum O. stenopetalo combinata. G.

Sect. II. Radix composita est e bulbis 2 erectis, tunica communi inclusis, inter quos caulis prodit. Bulbus alter fibris radicalibus instructus est, alter accessorius, anno insequente florens, iis caret.

2. **G. arvensis** (Schult. syst. veg. 7. 547.) *foliis* radicalibus binis linearibus canaliculatis obtuse carinatis recurvis, caulinis nullis, *floralibus 2 oppositis*, *pedunculis* ramosis corymbosis *villosis*, *phyllis perigonii lanceolatis acutis*, *bulbo subrotundo*. 4. In agris et locis cultis. Mart. April. Ornithogalum arvense Pers. in Ust. ann. 5. p. 8. t. 1. D. fl. 2. p. 543. O. minimum Roth. tent. 2. 1. p. 394. St. h. 12. O. villosum MBieb. taur. cauc. 1. 274.

3. **G. bohemica** (Schult. syst. veg. 7. 549.) *foliis* radicalibus binis filiformibus canaliculatis, *caulinis alternis* lanceolatis acuminatis vel apice elongato filiformi terminatis, flore terminali plerumque solitario, *phyllis perigonii oblongis antice latioribus rotundato-obtusis* basi caule superne foliisque margine pubescentibus, *ovario obcordato*, lateribus concavis, bulbo subrotundo. 4. In rupestribus subhumidis, (Böhmen, Mähren, Schlesien.) Mart. April. Ornithogalum bohemicum Zauschner. D. fl. 2. p. 544. St. h. 23. Variat glabrum, pilis paucis in margine foliorum supremorum. G.

4. **G. saxatilis** (Koch. apud Schult. syst. veget. 7. p. 550.) *foliis* radicalibus binis filiformibus canaliculatis, *caulinis alternis* lanceolatis acuminatis vel apice elongato filiformi terminatis, flore terminali plerumque solitario, *phyllis perigonii oblongo-lanceolatis* obtusis basi caule margineque foliorum villosis, *ovario oblongo-obovato* subretuso, lateribus convexiusculis, bulbo subrotundo. 4. In rupestribus subhumidis, (Rheinpfalz bei Creuznach, Callstadt, am Donnersberg; Thüringen an der Wartburg bei Eisennach, Seeberg bei Gotha, bei Halle, am Harze, in d. Schweiz.) Mart., caeteris praecocius. Ornithagalum bohemicum β. saxatile D. fl. 2. p. 545. O.

bohemicum Gaud. helv. 2. p. 507. O. fistulosum Wallr. sched. p. 141. G. arvensis subuniflora Reichenb. fl. excurs. p. 108. — G. arvensis occurrit, quamvis raro, scapo unifloro, quae varietas autem a G. saxatili facile distinguitur scapo glabro, nudo, ad basin pedunculi foliis floralibus 2 oppositis obsesso, foliis caulinis praeterea nullis, pedunculo triplo-quadruplove longiore, perigonii phyllis lineari-lanceolatis acutis et ovario profundius emarginato.

5. **G. Liottardi** (Schult. syst. veg. 7. p. 545.) *foliis radicalibus* solitariis binisve *fistulosis* glabris semiteretibus basi canaliculatis, *floralibus oppositis*, maiore spathaceo convoluto basi ovato, *pedunculis* 1-5 simplicibus umbellatis *villosis*, *phyllis perigonii elliptico-lanceolatis obtusis*, *bulbo subrotundo*. 4. In pascuis alpium, (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnthen.) Mai. Jun. Ornithogalum Liottardi Sternberg. in Denkschr. d. bot. Ges. z. Regensb. 2. p. 56. O. fistulosum Ram. ap. DC. fl. fr. 3. p. 215., excl. syn. O. bohemici. Variat pedunculis glabris.

6. **G. spathacea** (Schult. syst. veg. 7. p. 541.) foliis radicalibus 2 erectis filiformibus semiteretibus supra planis vel leviter canaliculatis, *florali solitario lanceolato spathaceo* convoluto ab umbella pedunculata 2-5 flora remoto, pedunculis partialibus simplicibus glabris, *perigonii phyllis oblongo-lanceolatis obtusis*, *bulbo ovato*. 4. In nemoribus humidis, (von Westph. durch Hannov., Oldenb., Holst., Mecklenb., bis Pommern; bei dem Dorfe Lösnitz unweit Leipzig.) April Mai. Ornithogalum spathaceum Hayn. in Ust. Annal. 15. p. 11. t. 1. D. fl. 2. p. 546. O. Haynii Roth. in Röm. arch. 1. 3. p. 42. St. h. 27. O. minimum β. Wahlenb. fl. suec. p. 202. G.

7. **G. minima** (Schult. syst. veg. 7. p. 539.) folio radicali solitario erecto lineari supra subtusque plano vel subcanaliculato, *florali solitario spathaceo* lanceolato basi pedunculum communem umbellae 2-5 florae pedunculatae includente, pedunculis partialibus simplicibus ramosisve glabris, *perigonii phyllis lineari-lanceolatis acuminatis*, *bulbo ovato*. 4. In nemoribus, dumetis, pratis sylvaticis; in alpes adscendens, (stw. d. d. Geb., in d. Alpen häufiger.) April. Mai. Ornithogalum minimum L. sp. 440. O. Sternbergii Hopp. bot. Ztg. 1807. p. 339. St. h. 23. O. gracile Hagen. chlor. bor. p. 122.

Sect. III. Radix e bulbo solido, erecto, caulem basi ambiente, folium solitarium agente, formata. Bulbus accessorius nullus.

8. **G. lutea** (Schult. syst. veg. 7. p. 538.) *folio radicali* solitario erecto *lineari-lanceolato* abrupte acuminato *plano* argute carinato, *floralibus* 2 *suboppositis*, *pedunculis* partialibus simplicibus umbellatis *glabris*, *perigonii* phyllis oblongis obtusis, antheris oblongis, *bulbo ovato solitario*. 4. In nemoribus et pratis sylvaticis, in alpes adscendens, (stw. dch. d. Geb.) April. Mai. Ornithogalum luteum β. L. sp. 439. D. fl. 2. p. 548. O. luteum β. sylvaticum Willd. sp. 2. 114. O. sylvaticum Pers. in Ust. n. Annal. 5. p. 7. t. 1. f. 1. O. Personii Hopp. bot. Ztg. 1807. p. 137. St. h. 27.

9. **G. pusilla** (Schult. syst. veg. 7. p. 543.) *folio radicali* solitario erecto *anguste lineari attenuato-acuto* canaliculato, *floralibus* 2 *suboppositis*, inferiore maiore convoluto spathaceo, umbella sessili 2-6 flora, *pedunculis partialibus simplicibus umbellatis glabris*, *perigonii phyllis lanceolatis obtusis*, antheris subrotundis, *bulbo ovato solitario*. 4. In locis sylvaticis lapidosis, (Böhm., Oestr., Türkenschanze bei Wien.) Mart. April. Ornithogalum pusillum Schmidt. boh. n. 339. D. fl. 2. p. 549. Reichenb. icon. 2. f. 228. 229., optima, sed varietatem graciliorem refert. Specimina bohemica nondum vidi, hungarica autem et sibirica exactissime congruunt cum icone citata et certissime a G. lutea longe diversa sunt. Specimina quae circa Vindobonum legit cl. Dolliner. multo robustiora sunt quam hungarica, et usque ad novem flores gerunt. — G. Clusiana Tausch. et Ornithogalum tunicatum Presl. non differunt. G.

11. SCILLA (L. gen. n. 419.) Perigonium 6 phyllum, patens vel subcampanulatum. Nectar. o. Stam. imae basi phyllorum perigonii adnatae;

antherae incumbentes. Stylus indivisus; stigma obtusum. Sem. rotundata. Pedunculi non articulati. Spatha o. N. ab E. gen. 4. 11. — Semina in Scilla autumnali atra sunt, in S. bifolia et S. amoena autem testacea et pallida, ut in Gagea. Scillae genus ab Ornithogalo colore florum magis, quam characteribus, differt.

1. **S. amoena** (L. sp. 443.) bulbo plurifolio, foliis erectis lato-linearibus planiusculis apice subcucullato-obtusis, scapo angulato, pedunculis erectis, *bracteis brevibus truncatis* dentatisve. 4. In pratis et nemorosis, (auf Wiesen an der Donau bei Wien nach Jacquin u. im Gehölze bei Wallbeck am Harze, Hampe, als wirklich wild angegeben, ausserdem in Grasgärten wohl bloss verwildert.) April. Mai. D. fl. 2. p. 553. Jacq. a. t. 218. Flores caerulei.

2. **S. bifolia** (L. sp. 443.) bulbo bifolio, *foliis* patentibus recurvatisve *lanceolato-linearibus* canaliculatis in apicem teretem convolutis, scapo tereti, *pedunculis erectis, bracteis nullis.* 4. In sylvis petrosis frondosis, ad rivulorum ripas; in subalpina adscendens, (südl. u. westl. Schweiz, Elsass u. v. da durch d. Rheingebiet bis z. Unterrheine, d. Maingeb. bis Würzburg, d. Moselgeb. u. durch Würtemb. u. Bayern bis Oestreich; sodann im südl. Tyrol, in Krain, Mähren, Böhm., Schles., Erzgeb.) Mart. April. Jacq. a. t. 117. D. fl. 2. p. 553. Flores caerulei.

3. **S. italica** (L. sp. 442.) bulbo multifolio, foliis linearibus, racemo conico, *bracteis geminis, altera pedicellum aequante*, perigonio patente. 4. In arvis et locis incultis, (in der Gegend v. Bern, Trachsel; bei Kleinlaufenberg in Oberbaden, Alex. Braun,) qui litteris mecum communicatis me certiorem fecit, Scillam italicam in loco designato crescere neque S. vernam ibidem provenire. April. Mai. S. verna Koch. syn. ed. 1. p. 714. Flores caerulei.

4. **S. autumnalis** (L. sp. 443.) bulbo plurifolio, *foliis anguste linearibus hysteranthiis*, racemo subcorymboso deflorato elongato, *pedunculis adscendentibus*, bracteis nullis. 4. In collibus calcareis et vineis, (im Elsass bei Orschwyhr, im Kästelwald bei Colmar; im östr. Litt. u. bei Fiume.) Aug. Sept. D. fl. 2. p. 554. Anthericum autumnale Scop. carn. 2. p. 247. Engl. bot. t. 78. Flores caerulei. G.

Scilla patula DC., in floram helveticam recepta, in Helvetia sponte non provenit.

12. ÁLLIUM (L. gen. n. 409.) Perigon. 6 phyllum, campanulatum vel patens. Nectarium o. Stam. magis minusve basi phyllorum perigonii adhaerentia et basi sua in membranam connata. Antherae incumbentes. Stylus indivisus; stigma obtusum. Sem. angulata. Spatha 1-2 phylla, umbellam ante anthesin includens. — Allii genus naturalissimum in plura non divellerim. Notae generum, quae ex Allii genere confecerunt et proposuerunt auctores, valde ambiguae sunt. Spathae monophyllae et bi-triphyllae earumque longitudo species similes non separant; stamina tricuspidata per ea, quae basi utrinque unidentata et ea, quae inferne cum angulo dilatata sunt, in simplicia transeunt, omniumque specierum stamina basi plus minusve connata apparent plus minusve phyllis adhaerent.

Sect. I. Anguinum Don. Radix rhizomatosa, cui bulbi impositi sunt. Caulis foliis alternis vestitus *). Stam. simplicia.

1. **A. Victorialis** (L. sp. 424.) caule ad medium foliato tereti superne angulato, *foliis breviter petiolatis lanceolatis ellipticisve* planis, spatha univalvi persistente, umbella capsulifera globosa, staminibus edentulis perigo-

*) Omnes Allii species mihi notae caulem foliatum sensu stricto non habent, omnesque caule aphyllo praeditae sunt; sed foliorum vaginae in multis adeo elongantur, ut caulem a basi ad medium foliatum aemulent.

nium superantibus. 4. In locis rupestribus alpium et montium altiorum, (dch. d. g. Alpenk., d. Vogesen u. Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 517. Jacq. a. t. 216. A. plantagineum Lam. dict. 1. 65. Flores albi in viridem vergentes, siccati ochroleuci.

Sect. II. Molium Don. Radix bulbosa. Folia dilatata vel lato-linearia plana, omnia radicalia. Caulis nudus. Stamina imo perigonio inserta, simplicia.

2. **A. ursinum** (L. sp. 431.) caule aphyllo obtuse triangulari, *foliis longe petiolatis elliptico-lanceolatis,* spatha univalvi bi-trifida persistente, umbella capsulifera fastigiata laxa, staminibus edentulis perigonio brevioribus. 4. In sylvis umbrosis humidis, ad rivulos montanos, (stw. dch. d. Geb.) April. Mai. D. fl. 1. p. 516. St. h. 41. Flores nivei.

3. **A. multibulbosum** (Jacq. fl. austr. v. 1. p. 9. t. 10.) caule aphyllo tereti, *foliis* radicalibus sessilibus *lato-lanceolatis* acuminatis planis *margine glabris, spatha univalvi* 2-3 *loba* persistente, umbella capsulifera convexa, *staminibus edentulis* basi lato-connatis perigonium dimidium superantibus, bulbo depresso-globoso. 4. In agris montanis, (bei Wien, Jacq. u. zw. Beuel u. Schwarz-Rheindorf in d. Gegend v. Bonn auf d. rechten Rheinufer, Trev.) Mai. D. fl. 2. p. 518. A. nigrum Red. lil. 2. t. 102. Koch. syn. ed. 1. p. 715. — Sub nomine Allii nigri cl. Bertol. in fl. ital. v. 4. p. 61., aliam plantam mihi ignotam describit; quum insuper Linnaei descriptio Allii nigri cum nostra planta non bene conveniat, nomen A. multibulbosi anteposui. Flores albidi, stria phyllorum dorsali virente, ovarium atro-viride. G.

4. **A. roseum** (L. spec. ed. 1. 296. syst. nat. ed. 12. v. 2. p. 238.) caule tereti aphyllo, *foliis* radicalibus lato-linearibus acuminatis *planis* carinatis apice involutis *margine denticulato-scabris, spatha univalvi* 2-4 *loba* persistente, umbella convexa, *staminibus edentulis* perigonio brevioribus, bulbo subrotundo. 4. In vineis, agris et collibus herbidis reg. calid., (Istrien auf d. Insel St. Andrea; um Fiume u. auf d. Inseln.) April. Mai. D. fl. 2. p. 519. A. illyricum Jacq. ic. rar. t. 365. Flores in Allii genere magni, pulchre rosei. Occurrit umbella tota e floribus capsuliferis compo sita et

β. bulbiferum, umbella bulbifera, floribus paucioribus intermixtis: A. roseum *β.* DC. fl. fr. 3. 221. Bertolon. amoen. ital. p. 63. A. carneum Bert. rar. plant. dec. 1. p. 7. A. ambiguum Sibth. et Sm. fl. graec. pr. 1. p. 227. A. Tenorii Spreng. syst. veg. 2. p. 35. J.

5. **A. subhirsutum** (L. sp. 424.) caule tereti aphyllo, *foliis* radicalibus lato-linearibus acuminatis *planis* carinatis *margine villoso-ciliatis glabrisve, spatha univalvi ovata integra* umbella duplo breviore, umbella fastigiata, *staminibus edentulis* perigonio dimidio brevioribus, bulbo subrotundo. 4. In collibus herbidis inter virgulta reg. calid., (auf d. Insel Osero, Lossino.) Apr. Mai. A. trifoliatum Cyrill. pl. rar. fasc. 2. p. 11. t. 3. Flores albi. — Cl. Reichenbach nomen A. subhirsuti contra sententiam omnium auctorum in A. subvillosum Salzmanni, ob Clusii figuram, a Linnaeo citatam quae A. subvillosum referre videtur, transtulit. J.

6. **A. Chamaemoly** (L. sp. 433.) *caule subterraneo* brevissimo, foliis radicalibus linearibus acuminatis planis carinatis margine hirsuto-ciliatis, spatha univalvi umbella breviore, umbella pauciflora, *radiis fructiferis recurvatis,* staminibus edentulis perigonio dimidio brevioribus, bulbo subrotundo. 4. In locis sterilibus et arenosis maritimis, (bei Veruda in Südistrien u. Insel Osero u. Lossino.) Januar. Flores albi. J.

Sect. III. Rhizirideum Don. Radix e rhizomate horizontali constans, quod bulbos plantae gerit. Caulis ad latus fasciculi foliorum positus est et cum hoc fasciculo basi vaginis communibus inclusus. Stamina simplicia.

7. **A. fallax** (Don. monogr. all. p. 61.) *caule* nudo superne acute *angulato,* foliis linearibus scapum latitudine subaequantibus planis subtus obsolete nervosis ecarinatis, spatha bi-trifida, umbella subrotunda capsulifera, *filamentis edentulis perigonium superantibus, bulbo rhizomati transversali ad-*

nato tunicis integris tecto. 4. In rupibus calcareis montium et reg. subalpinarum, (südl. Tyr., v. d. Schweiz längs d. Alpenk. bis Oestreich; in Mähr.; Böhm.; Schles.; Thüringen; Hessen; Baireuther Geb.; bei Berlin.) Jul. Aug. Schult. syst. veg. 7. 2. p. 1072. var. *α.* et *β.* A. angulosum Jacq. a. t. 423. A. angulosum *α.* minus Trev. all. spec. p. 9. A. acutangulum *β.* montanum et *γ.* calcareum D. fl. 2. p. 521. A. senescens W. et Grab. fl. sil. 1. 313., Schmidt. boh. et A. montanum Schmidt. A. angulosum *β.* petraeum DC. fl. fr. 3. p. 222. Gaud. helv. 2. 493. *β.* calcareum Wallr. sched. p. 134. *γ.* serotinum Gaud. helv. 1. c. — Flores rosei. Folia 1-2‴ lata, siccata pellucida, nervis validioribus et debilioribus perducta, intermedio vero non crassiore. — A. senescens, e flora nostra delendum, nam planta sibirica est, foliis 5-6‴ latis, scapo triplo quadruplove latioribus, intense glaucis et scapo acute ancipite ab A. fallace prorsus diversa.

8. **A. acutangulum** (Schrad. sem. hort. Gött. 1808.) caule superne acute *angulato*, foliis planis linearibus scapum latitudine subaequantibus subtus quinquenerviis et nervo medio prominulo acute carinatis, spatha bi-trifida umbella duplo breviore, umbella subfastigiata capsulifera, *staminibus perigonium aequantibus edentulis, bulbo rhizomati transversali adnato* tunicis integris tecto. 4. In pratis udis, (stw. durch d. Gebiet.) Jun.-Aug. A. acutangulum Willd. en. suppl. p. 16. A. angulosum Pollich. pal. 1. 329. et auctor. plurim. A. angulosum *β.* maius Trev. all. spec. p. 10. Flores rosei. Folia vix 2 lineas lata, siccata pellucida, nervis validioribus debilioribusque perducta, nervo medio crassiore; in specie antecedente non crassior est.

Sect. IV. Scórodon. Radix bulbosa. Caulis inferne vel ad medium usque foliis vestitus. Folia non fistulosa. Stam. simplicia vel alterne basi dente brevi obtuso instructa, imo perigonio inserta.

a. Stamina alterne latiora, sed basi non dentata.

9. **A. moschatum** (L. sp. 427.) caule tereti inferne foliato, *foliis* setaceo-subulatis *teretibus* sulcatis anguste et *profunde canaliculatis* margine ciliolato-scabris, spatha bivalvi mucronata, umbella laxa capsulifera, *staminibus perigonio* tertia parte *brevioribus, omnibus simplicibus*, tunicis bulbi apice denique reticulato-fibrosis. 4. In collibus siccis rupestribus reg. calid., (bei Fiume, Noć.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 5. f. 615. A. setaceum W. et Kit. pl. rar. hung. t. 68. Flores albidi, stria dorsali purpurea, vel toti rubelli et, secundum Kitaib., odorem turionum pini, non vero moschi spirantes. J.

10. **A. saxatile** (M. Bieberst. taur. cauc. 1. p. 264.) caule tereti basi foliato, *foliis* lineari-subulatis *teretibus* sulcatis anguste et *profunde canaliculatis* margine glabris, spatha bivalvi longe mucronata, umbella convexa capsulifera, *staminibus perigonio duplo fere longioribus, omnibus simplicibus*, tunicis bulbi integris. 4. In rupium fissuris, (vom Monte Spaccato an am ganzen südl. Abhange des Kalkgebirges bis Opschina, Tommas.) Sept. Flores albi vel dilutissime rubelli, stria dorsali saturatiore. G.

11. **A. ochroleucum** (Waldst. et Kit. plant. rar. hung. 2. p. 204. t. 186.) caule tereti basi foliato, *foliis* linearibus *planis* subtus nervis 2-3 magis prominulis acute carinatis, siccatis multinerviis, nervis 2-3 validioribus, *vaginis apice transversim truncatis*, spatha *bivalvi pedunculis breviore*, umbella subglobosa capsulifera, *staminibus* perigonio denique duplo longioribus, omnibus *simplicibus*, tunicis bulbi apice irregulariter fissis. 4. In locis rupestribus reg. australiorum, (bei Cilli in Steyermark, bei Laibach u. auf d. Monte Nanas.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 520., excl. loco natali. Reichenb. ic. 5. f. 659. A. ericetorum Thor. lond. 125. A. ambiguum DC. fl. fr. 3. 220. A. appendiculatum Ramond. Flores ochroleuci vel albidi. G.

12. **A. suaveolens** (Jacq. collect. 2. p. 305. ic. rar. 2. t. 364.) caule tereti basi foliato, *foliis* linearibus *planis subcanaliculatis* subtus acute carinatis, siccatis multinerviis, nervis 2-3 validioribus, *vaginis apice oblique truncatis, spatha bivalvi pedunculis breviore*, umbella subglobosa capsulifera, *staminibus* perigonio sesquilongioribus, omnibus *simplicibus*, tunicis

bulbi apice irregulariter fissis. 4. In pratis uliginosis, paludosis, (Unteröstreich, Valle die Vestino in Tyrol, Zermatten im Wallis; Erdinger Moos bei Freising u. wahrscheinlich noch weiter gegen München hinauf, Dr. Einsele; im Riede bei Memmingen in Schwaben u. bei Dachau in Oberbaiern.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 519. Perig. purpurascens.

b. Stamina basi utrinque dente brevi obtuso instructa, umbella capsulifera.

13. **A. strictum** (Schrad. hort. Gött. tab. 1.) caule tereti basi foliato, foliis linearibus supra canaliculatis apicem versus planis subtus subsemiteretibus glabris obsolete nervosis, spatha bivalvi, umbella subglobosa capsulifera, *staminibus alterne basi utrinque unidentatis, dentibus filamento multo brevioribus, tunicis bulbi denique totis reticulato-fibrosis.* 4. In rupestribus, (Böhmen um Kugelbad bei Prag, Presl.; Beilsteine zwischen Albungen u. d. Meissner im Hessischen, Meyer. chlor. Hann.; Krain im Nicolaithale d. Wallis, Gaud.) Jul. D. fl. 2. p. 523., excl. omnib. locis natal., praeter bohemicum. A. reticulatum Presl. cech. p. 73. 1819. A. volhynicum Bess. cat. hort. crem. A. suaveolens Gaud. helv. 2. p. 491. non Schrad. Flores dilute purpurei.

c. Stamina basi utrinque dente brevi obtuso instructa, umbella bulbifera.

14. **A. sativum** (L. sp. 425.) caule tereti ad medium foliato, *foliis* lato-linearibus *planis* subcanaliculatis, spatha univalvi longissime rostrata caduca, umbella bulbifera, *staminibus alterne basi* utrinque *unidentatis*, dentibus filamento multo brevioribus, *bulbo aggregato, bulbillis ovato-oblongis* membrana involutis. 4. Colitur in usum culinarium sub nomine Knoblauch. Jul. Aug. A. sativum *α.* D. fl. 2. p. 526. Flores sordide albi. Caulis ante anthesin in annulum contortus ut in subsequente. Colit.

15. **A. Ophioscórodon** (Don. monogr. all. p. 5.) caule tereti ad medium foliato, *foliis* lato-linearibus *planis*, spatha univalvi longissime rostrata caduca, umbella bulbifera, *staminibus alterne basi utrinque unidentatis*, dentibus filamento multo brevioribus, *bulbo aggregato, bulbillis subrotundo-ovatis* membrana involutis. 4. Colitur in usum culinarium sub nomine Rockenbolle, Rocambole Gallor. Jul. Aug. Videtur varietas antecedentis. A. Ophioscorodon Link. ad A. controversum Schrad. pertinet, bulbo simplici diversum. Colit.

Sect. V. Porrum. Tournef. Radix bulbosa. Caulis inferne vel ad medium foliis vestitus. Stam. alterne latiora, tricuspidata, cuspide intermedia antherifera, lateralibus filiformibus plerumque tortis.

16. **A. Porrum** (L. sp. 423.) caule tereti ad medium foliato e centro bulbi simplicis egrediente, *foliis planis, umbella capsulifera* globosa, perigonii phyllis carina scabris, filamentis perigonio paulo longioribus, 3 interioribus tricuspidatis, *cuspide intermedia antherifera filamento ipso duplo breviore* (·) et 4. In usum culinarium ubique colitur et in reg. calid. hinc inde quasi sponte ad hortos et in vineis provenit. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 523. Flores purpurascentes. Folia nunc margine glabra, nunc ciliata ut in sequentibus duobus, etiam filamenta in his omnibus plus minusve ciliato-denticulata sunt, praecipue basi.

17. **A. Ampelóprasum** (L. sp. 423.) caule tereti ad medium foliato, bulbo laterali solido sobolifero, *foliis planis, umbella capsulifera* globosa, perigonio externe scabro, filamentis perigonio paulo longioribus, 3 interioribus tricuspidatis, *cuspide intermedia antherifera filamentum ipsum aequante.* 4. In agris, (bisher in d. Gegend v. Basel bei Wiesa, Crenzach u. Neudorf, nach Hagenbach; im Littorale, nach Host.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 524. Bulbum nondum vidi; diagnosin caeterum secund. specimen Schleicherianum, quod absque dubio cultum fuit, confeci. Flores purpurascentes.

18. **A. rotundum** (L. sp. 423.) caule tereti ad medium foliato, bulbo e bulbillis numerosis tunica inclusis formato, foliis planis, *umbella capsulifera* subglobosa, pedunculis lateralibus multo brevioribus, perigonii phyllis dorso scabris, *antheris inclusis* perigonium non aequantibus, *filamentis* tribus inte-

rioribus *tricuspidatis*, cuspide intermedia antherifera filamento ipso triplo breviore. 4. In agris inter segetes, (Rheingebiet von Basel bis Bingen u. weiter hinab bis jenseits der Ahr, Maingebiet bis Würzburg, Thüringen, Unteröstr., Böhm., Mähr., Brandenb., bei Frankf. a. d. O., Preussen.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 525. A. Ampeloprasum WKit. t. 82.

19. **A. sphaerocephalum** (L. sp. 426.) caule ad medium foliato, *foliis semiteretibus* supra profunde canaliculatis fistulosis, *umbella capsulifera* globosa denique subconica, perigonii phyllis carina laevi, antheris exsertis, filamentis tribus interioribus tricuspidatis, *cuspide intermedia antherifera filamento ipso duplo breviore*. 4. In agris inter segetes, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 551. A. veronense Pollin. pl. nov. p. 9. Flores purpurei. Folia saepe, sed non semper, basin versus intus cava. Forma, quae saepe occurrit, pedunculis interioribus elongatis, secund. cl. Bertolonium, est Allium descendens L. sp. 427.

20. **A. vineale** (L. sp. 428.) caule ad medium foliato, foliis teretibus supra anguste canaliculatis intus cavis, *umbella bulbifera, staminibus perigonio longioribus*, 3 interioribus *tricuspidatis*, cuspide intermedia antherifera filamento ipso longiore. 4. In agris et cultis. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 550. A. arenarium L. fl. suec. sec. Fries. nov. ed. 2. p. 84. Flores purpurei. Var.

β. capsuliferum, umbella capsulifera, bulbillis destituta: A. descendens Koch. syn. ed. 1., non Linn.

21. **A. Scorodóprasum** (L. sp. 425., excl. varietate *β.*) caule ad medium foliato recto, foliis planis margine scabris, *umbella bulbifera, staminibus perigonio brevioribus*, alternis *tricuspidatis*, cuspide intermedia antherifera filamento ipso duplo breviore. 4. In pratis, (stw. dch. d. Geb.; in d. Schweiz nur bei Basel.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 527. A. arenarium Smith. brit. 356. et plurim. auctor. Rupp. jen. t. 2. f. 2. Flores atropurpurei. Inter A. Scorodoprasum et arenarium auctorum hucusque veram differentiam invenire non potui.

Sect. VI. Codonóprasum. Radix bulbosa. Caulis ad medium foliis vestitus. Stam. omnia simplicia, supra basin phyllorum perigonii inserta. Spatha bivalvis, valvula altera longe cornuta.

22. **A. oleraceum** (L. sp. 429.) caule tereti ad medium foliato, foliis linearibus canaliculatis apicem versus planis subtus multistriatis, spatha bivalvi persistente, *valvula altera longissime rostrata, umbella bulbifera, staminibus edentulis perigonium subaequantibus*, perigonii phyllis obtusis. 4. In agris et locis cultis. Jun. Jul. Flores albido-virentes vel dilute sordide rubelli, stria dorsali viridi vel purpurascente. Occurrit:

α. angustifolium, folia lineam vel sesquilineam lata ideoque magis canaliculata: A. oleraceum Koch. syn. ed. 1. A. oleraceum *α.* D. fl. 2. p. 529.

β. latifolium, folia tres lineas lata, ideoque planiora: A. carinatum Pollich. palat. p. 327. A. oleraceum *β.* D. fl. 2. p. 529. A. oleraceum *β.* complanatum Fries. novit. ed. 2. p. 85. Haller de Allio p. 51. n. 24. t. 2 f. dextra. — Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus Haller de All. p. 49. t. 1. f. dextra, mihi nunc dubium est.

23. **A. carinatum** (L. sp. 426.) caule tereti ad medium foliato, foliis linearibus canaliculatis apicem versus planis striis 3-5 prominulis spatha bivalvi persistente, *valvula altera longissime rostrata*, umbella bulbifera vel capsulifera, *staminibus edentulis perigonio denique duplo longioribus*, perigonii phyllis oblongo-obovatis apice valde concavis truncato-obtusis subemarginatis. 4. In collibus dumetosis, etiam in cultis, (sehr zerstreut; ich besitze die Pflanze aus d. Schweiz, d. südl. Tyrol, von Frankf. a. d. O.; nach v. Schlecht. bei Berlin.) Jun. Jul. A. carinatum Fries. nov. ed. 2. p. 86. D. fl. 2. p. 528. A. violaceum Willd. en. suppl. p. 17. A. flexum WK. pl. rar. hung. t. 278. Koch. syn. ed. 1. p. 720. A. flexuosum Host. fl. a. 1.

p. 422. Flores rosei, siccati violacei. Folia subtus fere laevia, obsolete obtuse striata, at nec sulcata, neque carinata sunt. Variat:

β. capsuliferum, bulbillis in umbella laxa nullis: A. montanum Sibth. et Sm. fl. graec. prodr. 1. p. 225. A. pulchellum Don. monogr. p. 46., A. paniculatum Reichenb. ic. 5. f. 604. Redout. lil. 5. t. 252.

24. **A. flavum** (L. sp. 428.) caule tereti ad medium foliato, *foliis* linearibus pulposis (in viva planta) *laevissimis* subtus convexis supra saepe leviter canaliculatis *margine obtusis*, spatha bivalvi persistente, *valvula altera longe rostrata*, umbella capsulifera, *staminibus edentulis perigonio denique duplo longioribus*, perigonii phyllis truncatis retusisve. 4. In collibus asperis herbidis, (südl. Tyrol, Unteröstreich, Mähren.) Jul. Aug. Jacq. a. t. 141. St. h. 34. D. fl. 2. p. 532., excl. variet. *β.* Flores pulchre flavi. Folia semper depressa sunt et saepe leviter canaliculata, sed nunquam teretia vel fistulosa. G.

25. **A. pallens** (L. sp. 427.) caule tereti ad medium foliato, *foliis* linearibus *gramineis intus cavis basi leviter canaliculatis superne planis subtus angulato-sulcatis*, spatha bivalvi persistente, *valvula altera longissime rostrata, umbella capsulifera, staminibus edentulis perigonio brevioribus*, perigonii phyllis rotundato-obtusis vel subretusis. 4. In collibus apricis, (Insel Losino bei Istrien.) Jul. Aug. A. paniculatum Koch. syn. ed. 1. p. 720. Flores pallidi vel virentes nervo dorsali viridi vel ferrugineo-viridi. Spathae valvis inferne lanceolatis sensim in acumen elongatum attenuatis potissimum differt ab A. oleraceo, quod spathas ovatas subito in acumen contractas habet. J.

26. **A. paniculatum** (L. sp. 428.) caule tereti ad medium foliato, *foliis anguste linearibus semiteretibus canaliculatis farctis* (Bertoloni,) spatha bivalvi persistente, valvula altera longissime rostrata, umbella capsulifera, *staminibus edentulis perigonio brevioribus, phyllis perigonii acutiusculis*. 4. In collibus apricis, (Istrien u. Insel Brioni nach Bertolon.) Jun. Jul. Flores dilute rosei, dimidio fere minores, quam in Allio pallente. Cl. Bertolon. folia describit subtus striata, cl. Treviranus autem subtus laevia. Planta in horto nostro periit. J.

Sect. VII. Schoenoprasum. Radix bulbosa. Folia perfecte fistulosa, teretia vel semiteretia. Spatha brevis, bivalvis.

27. **A. Schoenóprasum** (L. sp. 432.) scapo nudo vel basi paucifoliato, *foliis* linearibus subulatis *aequaliter teretibus* vel tereti-compressis *perfecte fistulosis*, spatha bivali umbellam subaequante, umbella capsulifera subglobosa, perigonii phyllis lanceolatis acutis, *staminibus* perigonio brevioribus *edentulis*. 4. In locis humidis et ad fluviorum ripas, (sehr häufig am Moselufer, auch am Bodensee u. Oberrheine u. wieder am Ufer des Rheines unterhalb der Einmündung d. Mosel; in d. Schweiz hin u. wieder, am Ufer der Elbe.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 635. Schk. t. 91. Flores dilute purpurascentes. Variat:

β. alpinum, maius, perigonii phyllis latioribus et maioribus, magis attenuatis: A. Schoenoprasum *β.* alpinum Gaud. helv. 2. 486. A. foliosum Clarion. ap. DC. fl. fr. 3. p. 725. — Allium sibiricum Willd. in flora altaica cum hac varietate coniungitur et ne ut varietas quidem ab hac separatur. Quam sub hoc nomine in hortis et herbariis vidi plantam, ea omnino ad varietatem *β.* pertinet; hanc vero hucusque notis constantibus a varietate *α.* distinguere non potui. Varietas alpina, in Alpibus, Carpatis et Sudetis frequens, cum fluviis descendit.

28. **A. Ascalonicum** (L. sp. 429.) caule aequali basi foliato, *foliis subulatis aequaliter teretibus perfecte fistulosis*, spatha bivalvi umbella capsulifera vel bulbifera breviore, *staminibus* perigonium denique paulum superantibus alternis *basi utrinque breviter unidentatis*. 4. Colitur in usum culinarium; in vineis prope Fiume spontaneum factum. Raro floret. D. fl. 2. p. 551. Flores albi. Colit.

29. **A. Cepa** (L. sp. 431.) *caule* basi foliato *infra medium ventricoso-inflato*, foliis perfecte fistulosis teretibus ventricosis, umbella capsulifera globosa, *staminibus* perigonio longioribus *alternis basi utrinque breviter unidentatis*. 4. Colitur ubique. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 534. Flores albidi. Colit.

30. **A. fistulosum** (L. sp. 432.) *caule* basi foliato *in medio inflato*, foliis perfecte fistulosis teretibus ventricosis, umbella capsulifera globosa, *staminibus edentulis* perigonium superantibus. 4. Colitur in usum culinarium. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 534. A. altaicum Pall. it. 2. 737. Flores albidi. Colit.

Trib. III. *HEMEROCALLIDEAE*. R. Brown. prod. fl. nov. holl. 295. Perigonium monophyllum, divisum. Capsulae loculi oligospermi. Sem. figura varia, (in nostris) testa atra.

13. HEMEROCALLIS (L. gen. 433.) Perigonium infundibuliforme, tubo monophyllo, cylindrico, limbo sexpartito. Stamina in basi corollae inserta, subulata, declinata. Sem. globosa.

1. **H. flava** (L. sp. 462.) *perigonii* laciniis planis *nervosis aveniis*. 4. In locis paludosis, umbrosis, (im untern Wallis; in Krain; bei München in d. Nähe d. Hirschau.) Jun. D. fl. 2. p. 568. Schk. t. 98. St. h. 7. Flores flavi.

2. **H. fulva** (L. sp. 462.) *perigonii* laciniis *nervosis venosisque*, interioribus margine undulatis. 4. In pratis et locis saxosis graminosis, (im untern Wallis u. in der Gegend von Aelen, im C. Zürich, auf nackten Felsen bei Salzburg.) Jul. Aug. Dod. pempt. 204. Flores fulvi.

14. ENDÝMION (Dumortier. florul. belgic. p. 140. 1827.) Perigonium campanulatum, sexpartitum, phyllis basi connatis. Stam recta, infra medium phyllorum inserta, adnato-decurrentia. Sem. subglobosa. — Agraphis N. ab E. gen. 4. 12.

1. **E. nutans** (Dumort. l. c.) foliis lato-linearibus, racemo nutante, floribus campanulato-cylindricis; laciniis apice recurvatis, bracteis geminis. 4. In nemoribus umbrosis, (bei Coesfeld in Westphalen an einer Stelle in d. kleinen Haine hinter dem Bauland; Kürenzig unweit Julich, Löhr; in den Niederlanden ausser d. Gebiete unserer Flor. nicht selten.) Mai. Hyacinthus non scriptus L. sp. 453. Scilla nutans Sm. engl. bot. t. 377. D. fl. 2. p. 554. Agraphis nutans Link. Handb. 1. p. 166. (1829.) G.

15. MÚSCARI (Tournefort.) Perigon. globoso-ovatum vel cylindricum, ore constrictum; limbo brevissimo, 6 dentato. N. ab E. gen. 4. 9.

1. **M. comosum** (Mill. dict. n. 2.) *floribus* angulato-cylindricis, *inferioribus remotis horizontaliter patentibus*, superioribus longius pedicellatis erectis approximatis comosis neutris, foliis linearibus canaliculatis. 4. In agris et vineis, (stw. dch. d. Geb. nördl. bis Quedlinburg.) Mai. Jun. D. fl. 2. 566. Hyacinthus comosus L. sp. 455. Jacq. a. t. 126. Flores fuscescentes basi apiceque olivacei, superiores cum pedicellis et apice caulis amethystini.

2. **M. racemosum** (Mill. dict. n. 3.) *floribus* ovatis *nutantibus confertis*, supremis erectis neutris, *foliis* linearibus canaliculatis arcuato-*recurvatis* flaccidis. 4. In agris et vineis, (stw. dch. d. Geb.) April. Mai. D. fl. 2. 567. Hyacinthus racemosus L. sp. 455. Jacq. a. t. 167. Flores saturate caerulei, pruinosi, dentes apice albi.

3. **M. botryoides** (Mill. dict. n. 1.) *floribus* subgloboso-ovatis *nutantibus denique mediocriter remotis*, supremis erectis neutris, *foliis* lanceolato-linearibus canaliculatis basin versus attenuatis *erectis*. 4. In agris et vineis, (Steyerm., westl. Schweiz, Elsass, Oberbaden, Würtemberg, bei München, bei Mainz, Lüttich, Coesfeld in Westph., Werthheim, Würzburg, Arnstadt u. Halle in Thüringen.) April. Mai. D. fl. 2. p. 567. Hyacinthus botryoides L. sp. 455. St. h. 7. Flores saturate caerulei.

Trib. IV. *ABAMEAE.* Perigon. hexaphyllum. Sem. testa laxa basi apiceque appendiculata.

16. NARTHÉCIUM (Moehring. in ephem. nat. curior. 1742. p. 389. t. 5. f. 1.) Perig. 6 phyllum. Nectar. o. Filamenta barbata. Styl. indivisus, stigma trigonum. Sem. basi apiceque appendice filiformi. N. ab E. gen. 4. 1.

1. **N. ossifragum** (Huds. angl. 145.) foliis radicalibus lineari-ensiformibus, capsula acuta perigonium persistens paulum superante. 4. In turfosis et paludosis spongiosis Germ. septentrion., (Aachen, dch. Westphalen, Ostfriesland, Lüneburg bis nach Holstein.) Jul. Aug. D. fl. 2. 559. Fl. dan. t. 42. N. anthericoides Hoppe. Anthericum ossifragum L. sp. 446. Abama ossifraga DC. fl. fr. 3. 171.

Ord. CXXVIII. COLCHICACEAE. DC. fl. fr. 3. p. 192.

Perigonium sexfidum vel hexaphyllum. Stam. 6, receptaculo vel perigonio inserta; antherae extrorsae. Ovarium liberum, 1, monostylum vel 3, singulis stylo vel stigmate terminatis et basi plus minusve cohaerentibus, pluriovulatis, ovulis angulo centrali loculorum affixis. Fructus introrsum dehiscens, nunc e folliculis 3 disiunctis unilocularibus compositus, nunc folliculis coadunatis capsulam 3 valvem valvularumque marginibus introrsum flexis 3 locularem exhibens, cuius loculi sub maturitate denique ab ipsis invicem secedunt.

1. BULBOCÓDIUM (L. gen. n. 407.) Perigonium 6 phyllum, infundibuliforme; ungues elongati, in tubum conniventes et ad faucem dentibus lateralibus connexi. Stam. apici unguium inserta. Ovar. 1; styl. apice trifidus. Capsulae loculi denique apice secedentes et introrsum dehiscentes. N. ab E. gen. 6. 8.

1. **B. vernum** (L. sp. 422.) 4. In pratis reg. calidar., (in d. Schweiz bloss bei Branson, la Barme u. Montorge im untern Wallis.) Mart. April. N. ab E. l. c. „Flores e violaceo dilute purpurei" Gaud. Planta habitu Colchici. H.

2. CÓLCHICUM (L. gen. n. 457.) Perigon. infundibuliforme, tubo elongato. Stam. apici tubi inserta. Ovar. 1, styli 3. Capsula inflata, loculis denique secedentibus et apice introrsum dehiscentibus. N. ab E. gen. 6. 7.

1. **C. autumnale** (L. sp. 485.) perigonii limbo tubo multo breviore, laciniis undulato-nervosis lanceolatis, exterioribus obovato-lanceolatis, staminibus alterne altius insertis, bulbo plurifloro, *foliis* hysteranthiis *lato-lanceolatis versus basin apicemque attenuatis* strictis. 4. In pratis humidiusculis, (überall, aber nördl. nur bis z. 52. Grad, Meyer. chlor. Hannov.) Aug.-Oct. St. h. 3. Flores carnei. Folia cum fructu sequente vere proveniunt. Styli initio longitudine staminum, postremo multo longiora sunt, et tunc oritur C. patens Schultz. bot. Ztg. 9. 1. p. 132. Flores, autumno inundationibus retenti, vere cum foliis prodeunt, sed plerumque minores sunt genitalibus imperfectis: C. vernale Hoffm. D. fl. ed. 2. 1. p. 174.

2. **C. alpinum** (DC. fl. fr. 3. p. 195.) perigonii limbo tubo multo breviore, laciniis undulato-nervosis lanceolatis, staminibus aequaliter insertis (Gay.), bulbo unifloro, *foliis* hysteranthiis *lineari-lanceolatis obtusis basin versus attenuatis.* 4. In pratis vallium alpinarum, (auf d. Alpenk. zwischen d. Wallis u. Piemont nicht selten.) Jul. Aug. floret et paulo serius eodem anno folia cum fructu profert. C. montanum All. ped. 1. p. 117. sec. cl. Bertolon. C. autumnale γ. Bertol. fl. ital. 4. p. 272. Dimidio minus antecedente, antherae breviores. Flores carnei. H.

3. **C. arenarium** (Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. 2. p. 195. t. 179.) perigonii limbo tubo multo breviore, *laciniis* lanceolato-linearibus *recto-nervosis,* bulbo 1-3 floro, foliis hysteranthiis lanceolato-linearibus basi apiceque attenuatis canaliculatis. 4. In collibus incultis, (Gegend um Fasana in Südistrien, Tommasini.) Sept. Oct. Flores quam in C. autumnali triplo minores saturatius tincti, nervi recti, non undulati. J.

3. VERÁTRUM (L. gen. n. 1144.) Perigon. 6 phyllum. Antherae transverse in valvulas 2, patellam referentes, dehiscentes. Caps. 3, inferne connatae, introrsum dehiscentes, polyspermae. Semina apice plano-compressa vel alata. Capsulae maturae saepe prorsus seiunctae. Flores abortu polygami. N. ab E. gen. 2. 10.

1. **V. nigrum** (L. sp. 1479.) racemis paniculatis tomentosis, *perigonii laciniis* ellipticis integerrimis patentissimis *pedicellos aequantibus,* bracteis pedicello brevioribus, foliis inferioribus lato-ellipticis glabris. 4. In montosis sylvaticis, (Oestreich, Steyermark, Krain, Görz, südl. Tyrol, auf d. Monte Generoso im C. Tessin.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 626. Jacq. a. t. 336. Flores atropurpurei.

2. **V. album** (L. sp. 1479.) racemis paniculatis pubescentibus, *perigonii laciniis* oblongo-lanceolatis denticulatis patentibus *pedicello multo longioribus,* bracteis pedicello longioribus, *foliis* ellipticis vel elliptico-lanceolatis subtus pubescentibus. 4. In pratis subalpinis et alpinis, (dch. d. g. Alpenk. u. auf den Mähr., Böhm. u. Schles. Gebirgen; auch in Würtemb. an mehrern Stellen.) Jul. Aug. V. album *α.* D. fl. 2. p. 625. V. album B. albicans Gaud. helv. 6. p. 311. Flores intus albidi, extus virides. Variat:

β. lobelianum, flores dilute virides: V. lobelianum Bernhard. in Trommsdorf. Journ. v. 16. p. 206. Schrad. n. Journ. 2. p. 341. V. album *β.* D. fl. 2. p. 625. V. album A. Gaud. helv. 6. p. 311. Vaginae foliorum transversim truncatae, et saepe etiam ultra insertionem folii paulum protractae, vel oblique in folium transeuntes notam constantem haud praebent.

4. TOFIELDIA (Huds. angl. 157.) Perigonium 6 phyllum. Antherae rimis 2 longitudinalibus dehiscentes. Styli subulati. Caps. 3, ultra medium connatae, introrsum apice dehiscentes, polyspermae. Sem. oblonga, teretia. N. ab E. gen. 2. 11.

1. **T. calyculata** (Wahlenberg. helv. p. 68.) pedicellis bibracteatis, *bractea* altera oblonga basin pedicelli fulcrante, *altera calyciformi triloba flori approximata,* foliis multinerviis attenuato-acutissimis. 4. In pratis paludosis montium, reg. subalpinarum et alpium, etiam in planitiebus, (durch d. g. Alpenk. u. in Schwaben u. Bayern auf dem rechten Donauufer bis Oestr.; sodann in Mähr., Böhm., Schles., bei Frankf. a. d. O., Berlin u. Halle.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 622. St. h. 78. n. 6. T. palustris Hopp. et Sternb. Denkschr. 1815. p. 153. T. alpina Smith. linn. trans. v. 12. p. 241. Anthericum calyculatum var. *α.* L. suec. 107. A. Pseudoasphodelus Jacq. en. stirp. vind. p. 233. Scheuchzeria Pseudoasphodelus Scop. carn. 1. p. 263. Narthecium iridifolium Vill. delph. 2. 225. Heriteria anthericoides Schrank. baier. fl. 1. p. 629. Helonias borealis Willd. sp. 2. 274. Hebelia allemannica et collina Gmel. bad. 2. 117. 118. t. 1. Flores flavidi, spica elongato-cylindrica vel oblonga, vel etiam globosa. Haec ultima in solo turfaceo macro inque montibus altis occurrit: T. palustris *γ.* capitata Hopp. T. glacialis Gaud. 2. p. 596. St. h. 78. 7. Ludit insuper floribus remotis, var. sparsiflora Sonder; et pedicellis inferioribus elongatis 2-5 floris: var. ramosa Hoppe.

2. **T. borealis** (Wahlenberg. fl. lapp. p. 89. 1812.) *pedicellis apice nudis* ad basin unibracteatis, bractea triloba, foliis subtrinerviis, nervis remotis. 4. In locis uliginosis summarum alpium ad nivem perennem. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 623. St. h. 78. 8. T. alpina Hopp. et Sternb. Denkschr. 1815. p. 152. T. palustris Huds. angl. ed. 2. v. 1. p. 175. Smith. engl. fl. 2. p. 198. Anthericum calyculatum *β.* L. fl. suec. p. 108. — Nomen Hudsonii

omnino prius est, sed nomina Tofieldiae palustris et T. alpinae adeo confuderunt, ut istorum nullum anteponerem.

Ord. CXXIX. JUNCACEAE. Bartling. ord. nat. p. 37. Junceae R. Brown. prodr. 237. DC. fl. fr. 3. p. 192.

Perigon. inferum, scariosum, hexaphyllum, phyllis glumaeformibus, calycem hexasepalum constituentibus. Stam. 6, rarius 3, perigonii laciniis opposita; filamenta subulata, stricta; antherae 2loculares. *Ovarium* 1. Styl. 1; stigmata 3, filiformia, pilosa. Capsula polysperma, trivalvis, valvulis medio septiferis et placentiferis, vel trisperma, valvulis septo destitutis et semen unicum basi gerentibus. Embryo subcylindricus; albumen carnosum. — Flores corymbosi, corymbo saepe in capitulum contracto; in J. trifido ad ramum unicum et saepe ad florem unicum reducto. Corymbum Juncacearum et Cyperacearum nomine Anthelae salutamus. Unus quisque ramus anthelae ramulusque basi bracteis 2 instructus est, quarum exterior maior, in apicem foliaceum vel subulatum abiens, involucrum vocatur, saltem ea, quae basin ramorum inferiorum occupat; altera minor, interior, exteriori opposita, basin rami ramulique instar tubuli involvens ochrea audit; bracteae oppositae videntur, sed re vera non sunt, altera enim, et quidem interior, paulo altius inserta est.

1. JUNCUS (L. gen. n. 437., excl. spec.) Perigon. 6 phyllum, phyllis glumaceis, herbaceo-scariosis. Stam. 6, rarius 3. Caps. valvulis medio septigeris. Sem. numerosa. N. ab E. gen. 2. 6.

Sect. I. Culmi steriles subulati fertilesque enodes, basi vaginis foliiferis aphyllisve inclusi. Folia perfecta vel ad mucronem reducta. Sem. appendiculata, testa utrinque in saccum relaxata. — Culmi steriles subulati, acuminati, simplicissimi. Anthela e floribus solitariis corymbulisve composita, diffusa vel conglobata, re vera terminalis est, sed, ob folium florale inferius erectum culmique continuationem referens, saepe lateralis apparet.

1. **J. maritimus** (Lam. dict. 3. 264.) *culmo nudo, foliis* radicalibus *teretibus pungentibus* enodibus, anthela decomposita erecta, perigonii phyllis lanceolatis, exterioribus acutis, interioribus obtusis integris, *capsula* elliptica mucronata *perigonium aequante.* ♃. In humidis et paludosis ad littus maris, (am Adriatischen Meere; an d. Küste v. Mecklenb. u. Holst., auf d. Inseln Ostfrieslands.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 572. St. h. 71. G.

2. **J. acutus** (L. sp. 463. var. *α.*) *culmo nudo, foliis* radicalibus *teretibus pungentibus* enodibus, anthela supradecomposita conglobata, phyllis perigonii exterioribus lanceolatis obtusiusculis carinatis, interioribus ovatis obtusissimis profunde emarginatis, *capsula* subrotundo-ovata acuminata *perigonio duplo longiore.* ♃. In coenosis humidis ad littus maris adriatici. Mai. Jun. D. fl. 2. p. 571. Engl. bot. 1614. St. h. 71. G.

3. **J. Jacquini** (L. mant. 63.) culmo nudo superne unifolio, vaginis radicalibus mucronatis, *capitulo terminali* 4-8 *floro pedunculato a folio involucrali remoto,* phyllis perigonii lanceolatis acutis capsula emarginata dimidio brevioribus, *filamentis vix dimidiam antheram aequantibus, radice repente.* ♃. In locis humidis alpium altiorum, (dch. d. g. Alpenk.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 592. Jacq. a. t. 221.

Sect. II. Culmi steriles subulati, fertilesque basi vaginis aphyllis vel etiam mucronatis praediti. Testa seminis nucleo conformis, (sem. non appendiculata.) — Anthela lateralis vel potius pseudolateralis; nam involucri folium inferius culmo simile est culmumque continuat ita, ut anthela e latere culmi ipsius erupta videatur. Caetera ut sectionis antecedentis.

4. **J. conglomeratus** (L. sp. 464.) *culmo nudo* subtiliter striato medulla continua farcto, vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita* conferta, perigonii phyllis lanceolatis acutissimis, stylo subnullo, *capsula*

obovata retusa styli basi, mamillae elevatae insidente, terminata. 4. In paludosis et locis humidis, (dch. d. g. Geb., aber doch nicht überall.) Mai. Jun. mense prius quam J. effusus D. fl. 2. p. 572. Leers. t. 13. f. 1. St. h. 71. Variat panicula effusa, Hopp. decad. — Vaginae testaceae et flores triandri, ut in sequente, quocum tamen in statu vivo confundi nequit.

5. **J. effusus** (L. sp. 464.) *culmo nudo* laevissimo exsiccato subtiliter striato medulla continua farcto, vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita* conferta, perigonii phyllis lanceolatis acutissimis, stylo subnullo, *capsula obovata impresso-retusa styli basi abbreviata, foveolae insidente,* terminata. 4. In locis humidis ubique. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 573. Leers. t. 13. f. 2. Variat panicula conglomerata.

6. **J. diffusus** (Hopp. decad. gram. n. 155.) *culmo nudo subtiliter striato* medulla continua farcto, vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita* conferta, perigonii phyllis lanceolatis acutissimis, stylo manifesto, *capsula obovata obtusa mucronata.* 4. In fossis, (bei Regensburg, in Brandenburg, Oldesloe in Holst., Schnepfenthal in Thüringen u. bei Appenzell in d. Schweiz u. wahrscheinlich noch an andern Orten.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 576. St. h. 77. Habitu J. glauci, vaginae etiam atropurpureae, sed caulis gramineo-viridis, non glaucus, subtilius striatus et medulla continua farctus est; a J. conglomerato et J. effuso differt colore vaginarum, floribus castaneo-fuscis, hexandris et stylo manifesto.

7. **J. glaucus** (Ehrhart. Beitr. 6. p. 83.) *culmo nudo* profunde striato *medulla loculoso-interrupta praedito,* vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita conferta,* perigonii phyllis lanceolatis acutissimis, stylo manifesto, capsula oblongo-elliptica obtusa mucronata. 4. In locis humidis. Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 575. St. h. 71. J. inflexus Leers. herb. p. 87. t. 13. f. 3. et multor. auct. et ut videtur, etiam Linnaei. J. effusus Pollich. pal. 1. 345. J. tenax Poir. dict. suppl. 3. 54. Flores hexandri. Vaginae atropurpureae.

8. **J. paniculatus** (Hopp. decad. gram. n. 156.) *culmo nudo* profunde striato *medulla loculoso-interrupta praedito,* vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita laxa, ramis exterioribus prolifero-elongatis,* floribus remotis, perigonii phyllis lanceolatis acutissimis, stylo manifesto, capsula oblongo-elliptica obtusa mucronata. 4. Ad litus maris Adriatici. Jul. Aug. J. paniculatus Schult. syst. veg. 7. 183. D. fl. 2. p. 575. St. h. 77. Anthela pallida, etiam capsulae pallidae sunt, hae rarius fuscae; culmus, ut in J. glauco, striatus et certissime medulla loculosa praeditus, attamen paniculae forma et colore sine difficultate distinguitur; fortasse in viva planta plures characteres inveniantur. G.

9. **J. balticus** (Willdenow. berl. Mag. 1809. p. 298.) *culmo nudo laevissimo siccato obsolete striato* medulla continua farcto, vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali decomposita,* perigonii phyllis ovato-lanceolatis mucronatis, inferioribus obtusiusculis, stylo manifesto, *capsula elliptica* obtusa mucronata. 4. In arenosis maritimis humidiusculis maris septentrionalis et baltici. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 576. St. h. 77. J. helodes Link. en. hort. berol. 1. 305. J. glaucus *β.* littoralis Wahlenb. suec. p. 209. Culmi laete virides, non glauci, et capsulae duplo maiores, quam in J. glauco. Vaginae testaceo-fuscae. G.

10. **J. arcticus** (Willd. spec. 2. 206.) *culmo nudo* laevissimo siccato obsolete striato *stricte erecto,* vaginis radicalibus aphyllis, *anthela laterali* capitata *subseptemflora,* perigonii phyllis muticis, exterioribus lanceolatis acutis, interioribus ovatis obtusiusculis, *stylo manifesto,* capsula ovali obtusa mucronata. 4. In solo micaceo vallium alpinarum editissimarum rarissimus, (am Breuil, am Abhange des Matterhornes, u. über Saas, am See Mat-Mor unten am Berge Moro im Wallis; auf dem Schlehern u. Doronthal im südl. Tyrol.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 577. St. h. 71. J. acuminatus Balb. in Roem. arch. 3. p. 129. J. effusus *β.* L. sp. 464. Culmi pedales crassi.

11. **J. filiformis** (L. sp. 1. 465.) *culmo nudo filiformi nutante* laevi

siccato subtiliter striato, vaginis radicalibus aphyllis, *anthela lateralı subseptemflora*, phyllis perigonii lanceolatis acutis, *stylo subnullo*, capsula subrotunda obtusissima breviter mucronata. 4. In pratis paludosis alpium, reg. subalpinarum et montium altiorum, inque planitiebus Germ. septentrionalis, rarius G. mediae. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 578. St. h. 36. Culmus pedalis, non multo crassior filo. Variat:

β. foliatus, vaginis radicalibus foliiferis, folio brevi canaliculato.

Sect. III. Culmi steriles nulli, loco eorum fasciculi foliorum steriles. Flores capitati vel in apice culmi solitarii. Sem. appendiculata.

12. **J. stygius** (L. sp. 467.) *culmo* 1-2 *folio*, foliis setaceis subcompressis supra canaliculatis, *capitulo terminali subsolitario trifloro binisve superpositis*, perigonii phyllis acutis capsula oblonga acuta dimidio fere brevioribus, floribus hexandris, *filamentis anthera multo longioribus*, *radice fibrosa*. 4 vel ⊙? In locis paludosis spongiosis alpium altiorum, (auf den Alpen bei Seck im Algau, Frölich; Einsiedeln in d. Schweiz, Hegetschw.; Niederungen bei Boebing u. Rothenbuch in Oberbayern, Ohmüller.) Jul. Aug. Locus natalis Alpis Seiseralpe in Tyroli australi per errorem in M. et K. flor. germanicam et editionem 1. synopsis irrepsit. D. fl. 2. p. 591. St. h. 71. J. supino haud absimilis.

13. **J. castaneus** (Smith. brit. 1. p. 383.) culmo bifolio, foliis radicalibus subulatis supra planiusculis, *capitulo terminali solitario*, *binis ternisve*, perigonii phyllis lanceolatis acutis capsula oblonga obtusa brevioribus, *filamentis anthera duplo longioribus*, *radice stolonifera*. 4. In pratis et glareosis humidis alpium altissimarum, (Graubünd., Tyrol, Salzb., Steyerm., Kärnthen.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 592. St. h. 71. J. triceps Rostk. junc. n. 43.

14. **J. triglumis** (L. sp. 467.) *culmo nudo*, foliis radicalibus subulatis teretiusculis basi canaliculatis, *capitulo terminali erecto subtrifloro*, phyllis perigonii obtusiusculis capsula oblonga obtusa mucronata brevioribus, filamentis anthera multoties longioribus, *radice fibrosa*. 4 vel ⊙? In locis uliginosis spongiosis alpium, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 593. St. h. 28.

15. **J. trifidus** (L. sp. 465.) *culmo* nudo filiformi 1-3 *floro*, basi vaginato, vagina suprema foliifera, *folio brevissimo* culmo multo breviore subulato canaliculato, *foliis involucralibus terminalibus* 2-3 *alternis elongatis setaceis*, ligula biaurita ciliato-lacera, perigonio capsulam aequante, valvulis capsulae ovatis, radice repente. 4. In rupium fissuris, praecipue iuxta cataractas et rivulos alpium altissimarum, (dch. d. g. Alpenk. u. a. d. Sudeten u. höhern Mähr. Gebirgen.) Jul. Aug. D. fl. 2. 579. cum sequente confusus. St. h. 71. Fl. dan. t. 107. Stolones foliis longioribus instructae sunt.

16. **J. Hostii** (Tausch. bot. Ztg. 17. 2. 518.) *culmo* nudo filiformi 1-3 *floro* basi vaginato, vagina suprema vel 2 supremis foliiferis, *folio elongato culmum dimidium superante* setaceo canaliculato, *foliis involucralibus terminalibus* 2-3 *alternis elongatis setaceis*, ligula biaurita ciliato-lacera, perigonio capsulam subaequante, valvulis capsulae ovato-oblongis, radice repente. 4. In rupium fissuris alpium, ut antecedens, sed alpium calcarearum, (Tyrol, Salzb., Steyerm., Oestreich.) Jul. Aug. J. monanthos Jacq. en. stirp. vindob. p. 61. et 216. t. 4. f. 1., specimen uniflorum. Host. gram. 3. t. 85. St. h. 71.

Sect. IV. Culmi steriles nulli, eorum loco fasciculi foliorum steriles. Flores in capitulo terminali solitario, vel in capitulis binis altero alteri superpositis, vel in capitulis paniculatis. Sem. non appendiculata.

17. **J. triandrus** (Gouan. herbar., secund. specimina sicca a cl. Salzmann. prope Monspel. lecta et sub hoc nomine mecum communicata,) culmo nudo, foliis radicalibus setaceo-subulatis canaliculatis, capitulo terminali solitario binisve, altero pedunculato, *bractea inferiore capituli fructiferi patente vel e basi arcuata adscendente*, perigonii phyllis exterioribus ovato-lanceolatis acuminato-cuspidatis capsula ovata obtusa longioribus. ⊙. In

locis subhumidis, (Promontore in Südistrien und auf Lossino, Tommasin.) Apr. Mai. DeCand. fl. fr. 5. p. 307. sub Junco ericetorum. Juncus foliatus minimus Joh. Bauh. hist. 2. p. 523. icon; planta depicta in Gallia australi lecta fuit. — Simillimus subsequenti, sed humilior, pollicaris, sesquipollicaris, rarius tripollicaris et bracteis patentibus primo adspectu dignoscendus; fructifer saepe totus rufus evadit. J. capitatus non raro altitudinem 5-6 pollicum attingit et bractea inferior, etiam in fructu, semper stricte erecta permanet. J.

18. **J. capitatus** (Weigel. obs. bot. p. 30. 1772.) culmo nudo, foliis radicalibus setaceo subulatis canaliculatis, *capitulo terminali* solitario vel binis ternisve secundo tertioque pedunculatis, *bractea inferiore semper stricte erecta*, perigonii phyllis exterioribus ovato-lanceolatis *acuminato-cuspidatis capsula* ovata obtusa *longioribus*. ⊙. In pascuis et agris arenosis humidis, (von Basel dch. d. Rheinfläche bis nach d. Niederlanden, u. d. mittlere u. nördl. D., aber nicht in Oestreich u. Oberbayern u. v. da südlicher; in d. Schweiz sehr selten.) Jun.-Aug. D. fl. 2. 548. St. h. 13. J. ericetorum Pollich. palat. 1. p. 351. 1776. J. gracilis Roth. tent. 2. 1. p. 402. Flores semper triandros vidi.

19. **J. obtusiflorus** (Ehrhart. Beitr. 6. p. 83.) culmo bi-trifolio vaginis *foliisque teretibus*, his loculoso-fistulosis, *anthela terminali decomposita* divaricata, ramulis lateralibus refractis, *perigonii phyllis aequalibus rotundato-obtusis* capsulam ovatam acutam subaequantibus. 4. In fossis et stagnis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. D. fl. 2. 583. St. h. 77. J. bifolius Hopp. Taschenb. 1810. J. retroflexus Rafn. dan. 1. 485. J. divergens Koch. et Ziz. cat. pl. palat. p. 19. J. Nesii Heller. fl. wirceb. suppl. p. 27.

20. **J. sylvaticus** (Reichard. fl. moeno-francof. 2. p. 181. 1778.) culmo bi-trifolio vaginis *foliisque tereti-compressis*, foliis loculoso-fistulosis, dissepimentis externe conspicuis *articulis glabris vel exsiccatis subtilissime striatis*, *anthela terminali decomposita divaricata*, *phyllis perigonii acuminatis aristatis*, *interioribus longioribus apice recurvis*, omnibus capsula ovata acuminato-rostrata brevioribus. 4. In fossis et locis paludosis. Jul. Aug. J. acutiflorus Ehrh. Beitr. 6. p. 86. D. fl. 2. p. 588. J. articulatus γ. L. sp. 1. 465. J. subnodulosus Schrank. baier. fl. 1. 616. Var. capitulis spadiceis nigricantibusve atque

β. *macrocephalus*, capitula duplo maiora minus numerosa, etiam flores maiores, capsula longitudine perigonii: J. acutiflorus β. D. fl. 2. p. 589. J. brevirostris Nees. ab E. compend. fl. g. ed. 1. 884. acutiflorus β. multiflorus Weih. gräs. n. 92.

γ. *pallescens:* J. acutiflorus γ. Meyer. syn. junc. p. 25. forma in umbra sylvarum enata.

21. **J. lamprocarpus** (Ehrh. calam. n. 126.) culmo bi-trifolio vaginis *foliisque tereti-compressis*, foliis loculoso-fistulosis, dissepimentis externe conspicuis *articulis glabris vel exsiccatis subtilissime striatis*, *anthela terminali decomposita* patente vel divaricata, *perigonii phyllis aequilongis rectis apice mucronulatis*, exterioribus acutis, interioribus obtusis, omnibus capsula ovato-lanceolata mucronata brevioribus. 4. In fossis et locis humidis. Jul. Aug. D. fl. 2. p. 587. St. h. 71. J. aquaticus Roth. tent. 2. 403. J. adscendens Host. gram. 3. t. 87. J. articulatus α. β. L. sp. 465. Variat capitulis pallidioribus nigricantibusve atque

β. *fluitans*, culmo in rivulis elongato fluitante: J. lamprocarpus ε. Meyer. syn. junc. p. 24. Haec var., quum aqua defluxit, procumbit et radicat: J. lamprocarpus γ. Meyer. l. c.

22. **J. atratus** (Krocker. siles. n. 539. 1787.) culmo 2-3 folio vaginis *foliisque tereti compressis*, foliis loculoso-fistulosis subnodulosis *articulis siccatis profunde striatis*, *anthela terminali decomposita* patente, *phyllis perigonii acuminato-aristatis*, *interioribus longioribus* apice subrecurvatis capsulam ovatam acuminato-rostratam subaequantibus. 4. In fossis et paludibus,

(Schlesien, Sachsen u. wahrscheinlich noch an andern Orten, aber übersehen.) Jul. Aug. J. melananthos Reichenb. fl. exc. p. 96. J. heptangulus Petermann. sec. Reichenb. Culmus 2-3 pedalis, adscendens, folia robustiora et crassiora, quam in J. sylvatico, laetius viridia, subtiliter striata. Flores nitidi, atri, fere duplo maiores. Wimmer. fl. v. Schles. p. 386.

23. **J. alpinus** (Vill. delph. 2. p. 233.) culmo bifolio vaginis dorso angulo acuto notatis foliis loculoso-fistulosis, *anthela terminali composita* erecta, *perigonii phyllis* aequilongis rotundato-obtusis capsula ovato-oblonga mucronata brevioribus, *exterioribus sub apice mucronulatis.* 4. In locis humidis et fossis alpium, reg. subalpinarum montiumque altiorum; nec non in planitiebus German. septentr., rarius in Germ. media. Jul. Aug. J. fusco-ater Schreb. ap. Schw. et Kört. fl. Erlang. p. 149. D. fl. 2. p. 586. St. h. 71. J. ustulatus Hopp. Anleit. p. 30. cum ic. Hartman. scand. ed. 2. p. 94. J. nodulosus Wahlenb. ups. p. 114. J. geniculatus Schrank. baier. fl. 1. p. 613. J. alpestris Hartm. scand. ed. 1. p. 141. forma vulgaris, et J. rariflorus Hartm. l. c. floribus pallidis. Phyllis perigonii exterioribus sub apice mucronulatis haec species ab affinibus optime distinguitur.

24. **J. supinus** (Moench. enum. pl. hass. n. 296. t. 5. 1777.) culmo filiformi, *foliis subsetaceis supra anguste canaliculatis* subtus convexis, ramis *anthelae terminalis* elongatis subsimplicibus, capitulis remotis, *floribus triandris*, perigonii phyllis lanceolatis *capsula* oblongo-*obtusa* mucronata brevioribus, exterioribus acuminatis, interioribus obtusis, *filamentis antherarum aequantibus.* 4. In locis humidis; var. *β.* in locis coenosis; *γ.* in aqua natans. Jul. Aug. J. uliginosus *α.* Mey. monogr. p. 29. D. fl. 2. 589. J. bulbosus L. sp. ed. 1. p. 327. J. setifolius Ehrh. Beitr. 6. p. 83. J. subverticillatus Wulf. in Jacq. collect. 3. 51. J. fasciculatus Schrank. baier. fl. 1. p. 616. J. verticillatus Pers. syn. 1. 384. J. capitatus Schk. t. 98. Variat capitulis fasciculo foliorum comosis et nudis floribus hexandris, atque

β. repens, culmis decumbentibus radicantibus. Schk. l. c. J. uliginosus Roth. tent. 2. 1. p. 405. St. h. 13.

γ. fluitans, culmis elongatis fluitantibus. Lam. dict. 3. p. 271.

δ. nigritellus, capsulis brevioribus apice impressis: J. nigritellus Koch. syn. ed. 1., St. h. 78., non Engl. bot. Formis intermediis in statum normalem abit.

Sect. V. Culmi steriles nulli, eorum loco fasciculi foliorum. Flores solitarii, remoti, vel corymbulosi et paniculam terminalem formantes. Sem. non appendiculata.

25. **J. squarrosus** (L. sp. 465.) *culmo* subangulato *nudo* basi foliorum vaginis incluso, *foliis linearibus canaliculatis* patentibus rigidis, anthela terminali composita ramis corymbosis, perigonii phyllis ovato-lanceolatis acutis vel obtusiusculis capsulam obovatam obtusam mucronatam aequantibus, *filamentis anthera quadruplo brevioribus.* 4. In ericetis et pratis turfosis, (in d. Schweiz sehr selten; in d. übrigen Alpenk. gar nicht, auch nicht in Oestreich u. südlicher; aber häufig auf den Vogesen, d. Schwarzwalde und auch auf Niederungen dch. d. mittl. u. nördl. D.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 580. St. h. 36. J. Sprengelii Willd. prodr. n. 394.

26. **J. compressus** (Jacq. en. stirp. vind. p. 60. et 235.) *culmo* compresso *in medio unifolio*, *foliis radicalibus caulinoque linearibus canaliculatis*, *anthela terminali composita*, ramis erectis, ramulis corymbosis, *perigonii phyllis* ovato-oblongis obtusissimis *capsula* subglobosa fere dimidio brevioribus, stylo ovario *dimidio breviore.* 4. In pascuis humidis ad vias pratorum. Jul. Aug. J. bulbosus L. sp. ed. 2. 466. secund. Smith. engl. fl. 2. p. 165. Pollich. palat. et multorum auctorum. St. h. 36. — J. bulbosum L. cl. Mey. in chlor. Hannov. ad sequentem ducit.

27. **J. Gerardi** (Lois. notic. p. 60. 1810.) *culmo* subtereti *in medio unifolio*, *foliis* radicalibus caulinoque *linearibus canaliculatis*, *anthela terminali composita*, ramis erectis, ramulis corymbosis, *perigonii phyllis* ovato-oblongis obtusissimis *capsulam* oblongo-ovalem subtrigonam *fere aequantibus*, stylo

ovarium aequante. 4. Ad littora maris et ad salinas, (zeigt vielleicht überall einen Salzboden an; er findet sich auch an einigen Orten, wo keine eigentlichen Salzquellen in der Nähe sind.) Jul. Aug. J. Gerardi Lois. fl. gall. ed. 2. p. 360. cum bona diagnosi. J. bottnicus Wahlenberg. fl. lapp. p. 82. t. 6. D. fl. 2. p. 581. St. h. 71. J. consanguineus Koch. et Ziz. cat. pl. pal. p. 8. et 19. J. coenosus Bichen. in trans. linn. soc. 12. 309. J. bulbosus β. Wahlenb. fl. suec. p. 215. G.

28. **J. tenuis** (Willd. sp. 2. 214.) *culmo* teretiusculo *nudo* basi foliorum vaginis incluso, *foliis linearibus canaliculatis* erectis, anthela terminali composita conferta, ramis cymosis patentibus, *perigonii phyllis* lanceolatis attenuato-acutis trinerviis capsula ovato-oblonga paulo longioribus, *filamentis anthera longioribus.* 4. Ad vias, in versuris et sylvarum locis denudatis, (bei Dickenreishausen in der Gegend von Memmingen in Oberschwaben in grosser Menge, Köberlin.; Oldesloë in Holstein, u. auf einer Elbinsel bei Hamburg, Sonder; Waldwege in der Winterlitt bei Hessencassel, Pfeiffer; bei Kloster Roh in der Illergegend, Lechler.) Jun. Jul. St. h. 71. G.

29. **J. Tenageia** (Ehrh. Beitr. 4. 148.) *culmo uni-bifolio,* foliis setaceis basi canaliculatis, *anthelae ramis* elongatis bifidis *patulis, floribus solitariis remotis,* perigonii phyllis ovato-lanceolatis acutis mucronatis *capsula subrotunda* obtusissima paulo longioribus vel ipsam aequantibus. ⊙. In arenosis humidis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jun. Jul. St. h. 10. J. Vaillantii Thuill. par. 1. 177. J. gracilis Lej. spa. 166. Variat, ut J. bulfonius, phyllis perigonii tertia parte longioribus, quam capsula, quod vero non in omnibus floribus reperitur; hic est: J. Tenageia β. Mey. monog. p. 42. D. fl. 2. 583, a quo J. sphaerocarpus, ut nunc mihi persuasum habeo, tanquam species diversus est.

30. **J. sphaerocarpus** (Nees ab Esenb. conf. Funk in regensb. bot. Ztg. 1818. p. 321.) *culmo* 1-2 *folio,* foliis setaceis basi canaliculatis, *ramis anthelae* elongatis bifidis *erectis, floribus solitariis remotis,* phyllis perigonii oblongo-lanceolatis acuminatis mucronatis *capsula subrotunda obtusa conspicue longioribus.* ⊙. In locis humidis, (auf der Röhn in Franken, Heller; Umgegend von Wien, Welwitsch.) Jun. Jul. G.

31. **J. bufonius** (L. sp. 466.) *culmo foliato,* foliis setaceis basi canaliculatis, *ramis anthelae* elongatis bifidis *erectis, floribus solitariis remotis,* perigonii phyllis lanceolatis acuminatis *capsula oblonga* obtusa longioribus. ⊙. In locis humidis ubique. Jul. Aug. St. h. 36. Variat:

β. *fasciculatus,* caule humiliore, robustiore, floribus binis ternisve fasciculatis: J. bufonius δ. Schult. s. veg. 7. 1. p. 226. J. mutabilis Sav. pis. 364. J. hybridus Brot. lusit. 1. 513. Haec varietas in planitie Rhenana occurrit, (zwischen Mainz und Worms.)

Juncum pygmaeum praeterii, quum cl. Noltius eum in Dania, (in ducatu Slesvico,) non vero in Holsatia detexerit.

2. LÚZULA (DeCandolle fl. fr. 3. p. 158.) Caps. 1 locularis, trivalvis, valvulis septo destitutis, trisperma, caetera ut Juncí. N. ab E. gen. 2. 7.

Sect. I. Semina apice appendicula magna cristaeformi.

1. **L. flavescens** (Gaud. fl. helv. 2. p. 564.) *anthela* umbellata simplici, *ramis* patentibus *plerumque unifloris,* floriferis fructiferisque erectis, appendicula seminis falcata, foliis radicalibus linearibus, *radice stolonifera.* 4. In sylvis subalpinis, (Schweiz, Tyrol, Salzburg, Steyerm., Kärnthen.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 595. St. h. 77. L. Hostii Desv. Journ. 1. 140. L. pubescens bot. Ztg. 1. 446. Juncus flavescens Host. gram. 3. t. 94.

2. **L. Forsteri** (DeCand. synops. fl. gall. p. 150.) *anthela* corymbosa simplici compositave, *ramis floriferis fructiferisque erectis, floribus solitariis,* appendicula seminis recta obtusa, *foliis* radicalibus *linearibus* radice caespitosa. 4. In sylvis montanis et subalpinis, (Schweiz, Vogesen, Oberbaden, Bergabhänge im Nahethale bei Sobernheim u. im Moselthale bei

Coblenz, baier. Alpen.) Jun. Jul. Luciola Forsteri Smith. engl. fl. 2. 178. St. h. 77. Juncus Forsteri Smith. brit. 1395.

3. **L. pilosa** (Willd. en. h. berol. 1. 393.) anthela corymbosa simplici, *ramis* subtrifloris erectis, superioribus *post anthesin refractis*, *floribus solitariis*, appendicula seminis falcata *foliis* radicalibus *lanceolatis*. 4. In sylvis. April. Mai. L. pilosa St. h. 77. L. vernalis DC. fl. fr. n. 3. p. 160. D. fl. 2. p. 594. Juncus vernalis Ehrh. Beitr. 6. 137. J. luzulinus Vill. delph. 235. J. Luzula Krock. sil. n. 556. J. pilosus a. L. sp. 468. Specimina L. pilosae ramis unifloris a L. Forsteri appendicula seminis falcata certo distinguuntur.

Sect. II. Semina non appendiculata, vel parva tantum et vix observabili appendicula in apice instructa.

4. **L. maxima** (DeCand. fl. franc. 3. p. 160.) *anthela supradecomposita* divaricata *involucrum superante*, pedunculis apice trifloris, perigonii phyllis mucronatis capsulam subaequantibus, filamentis brevissimis, *foliis* lanceolato-linearibus *margine pilosis*. 4. In sylvis montanis, in alpes adscendens, (im südl. u. mittlern Geb. u. bis zum Harze.) Mai. Jun. D. fl. 2. p. 596. St. h. 36. L. sylvatica Gaud. helv. 2. p. 568. Juncus maximus Ehrh. Beitr. 6. 139. J. latifolius Wulf. in Jacq. collect. p. 59. J. sylvaticus Smith. brit. 385. J. nemorosus *β*. Pollich. palat. 1. p. 352. J. pilosus *δ*. L. sp. 468. J. montanus Lam. dict. 3. p. 273.

5. **L. glabrata** (Hopp. gram. decas 4. n. 38.) *anthela supradecomposita* involucrum superante, ramis inferioribus nutantibus, *pedunculis unifloris*, perigonii phyllis capsulam subaequantibus mucronatis, filamentis anthera sexies brevioribus, stylo longitudine ovarii, *foliis* lanceolatis *glabris*. 4. In pascuis alpinis solo calcareo, (Salzburg, Tyrol, Steyerm., Oestr.) Jun. Jul. L. spadicea *γ*. D. fl. 2. p. 598. Juncus glabratus Hopp. ap. St. h. 28. J. intermedius Host. gram. 3. pag. 65. t. 99. G.

6. **L. spadicea** (DeCand. fl. fr. 3. p. 159.) *anthela supradecomposita* involucrum superante patente, *pedunculis superne flexuosis subquadrifloris*, perigonii phyllis capsulam subaequantibus mucronatis, filamentis anthera quadruplo brevioribus, stylo longitudine ovarii, *foliis* linearibus vel lanceolato-linearibus *basi barbatis*. 4. In pascuis alpium et reg. subalpinarum, (durch d. g. Alpenk. u. auf d. Vogesen, d. Schwarzwalde u. d. Sudeten.) Jun. Jul. L. spadicea *α*. D. fl. 2. p. 597. Juncus spadiceus All. ped. 2. p. 216. St. h. 28.

Luzula parviflora Desv. Wahlenb. fl. suec. p. 217., excl. syn. Host., Juncus pilosus *β*. L. sp. 468., J. parviflorus Ehrh. Beitr. 6. p. 139. differt foliis latioribus, pilis ad basin nullis vel paucis, praecipue autem tam a Luzula spadicea, quam a L. glabrata filamentis antheram dimidiam aequantibus, et stylo brevi, ovario sub anthesi duplo breviore.

7. **L. albida** (DeCand. fl. fr. 3. p. 159.) *anthela supradecomposita* patente *involucrum non attingente*, pedunculis plerumque quadrifloris, perigonii phyllis acutis capsula longioribus, *antheris subsessilibus*, *foliis* linearibus *margine pilosis*. 4. In sylvis, praecipue montanis, in alpes adscendens. Jun. Jul. D. fl. 2. p. 598. St. h. 36. Juncus albidus Hoffm. D. fl. ed. 1. p. 126. J. angustifolius Wulf. in Jacq. collect. 3. p. 56. J. luzuloides Lam. dict. 3. 272. J. pilosus *ε*. L. sp. 467. J. nemorosus *α*. Pollich. palat. 1. p. 352. Flores albidi. Variat:

β. rubella Hopp. decad. gram. n. 68. Flores in carneum vel cupreum vergentes, L. albida b. cuprina Rochel. banat.

8. **L. nivea** (DeCand. fl. fr. 3. p. 158.) *anthela decomposita* patente *involucrum non attingente*, floribus fasciculatis, perigonii phyllis acutis muticis capsula longioribus, *filamentis longitudine antherarum*, *foliis* linearibus *margine pilosis*. 4. In alpium convallibus, (Schweiz und Tyrol, Salzb., Matajur in Görz, Tommas.) Jun. Jul. D. fl. 2. p. 599. St. h. 36. Juncus niveus L. sp. 468. Flores albi.

9. **L. lutea** (DeCand. fl. fr. 3. p. 159.) *anthela decomposita* involucrum superante, *corymbulis* confertis *denique subspicato-conglobatis*, perigonii phyllis mucronatis capsulam aequantibus, filamentis anthera dimidio brevioribus, *foliis* lanceolato-linearibus *glaberrimis*. 4. In pascuis alpinis, (Schweiz; südl. Tyrol, auf vielen Alpen, Facch.) Jul. Aug. D. fl. 2. p. 600. St. h. 77. Juncus luteus All. ped. 2. p. 216. J. campestris ε. L. sp. 469. Flores flavi.

Sect. III. Semina basi appendice conica.

10. **L. campestris** (DeCand. fl. fr. 3. p. 161., excl. varietatibus.) *spicis* ovatis *umbellatis* sessilibus pedunculatisque, his denique subcernuis, phyllis acuminatis capsula subrotunda obtusa mucronata longioribus, *anthera deflorata filamentum ter superante*, foliis margine pilosis denique glabris. 4. In pascuis, ericetis, locis incultis. Mart.-Mai. St. h. 77. n. 5. L. campestris D. fl. 2. p. 601. var. α. Juncus campestris L. sp. 468. var. α. J. nemorosus Host. gram. 3. t. 97.

11. **L. multiflora** (Lejeun. fl. de spa. 1. p. 169.) *spicis* ovatis *umbellatis* sessilibus pedunculatisque, pedunculis strictis, perigonii phyllis acuminatis mucronatis capsula subrotunda obtusa mucronata longioribus, *anthera deflorata filamentum bis superante*, foliis margine pilosis denique glabris. 4. In sylvis, ericetis montanis. Mai. Jun. St. h. 77. n. 7. L. erecta Desv. Journ. 1. 156. L. campestris var. β. D. fl. 2. p. 601. L. campestris β. nemorósa Meyer. monogr. p. 17. L. intermedia Spenn. frib. 1. 177. Juncus multiflorus Ehrh. calam. n. 127. J. erectus Pers. syn. 386. J. intermedius Thuill. par. 178. Spicae spadiceae, pedunculatae; in varietate

β. *congesta*, breviter pedunculatae sessilesque, in capitulum spadiceum vel luteo-fuscum lobatum congestae: L. campestris γ. Meyer. monogr. p. 18. D. fl. 2. p. 602. var. ε. L. congesta Lej. spa. 168. Juncus congestus Thuill. par. 1. 179. Variat porro

γ. *nigricans*, spicis pedunculatis sessilibusque atro-fuscis, foliis basi tantum pilosis et saepe totis glabris: L. nigricans Desv. Journ. 1. 158. L. campestris δ. alpina Meyer. monogr. p. 18., δ. nigricans D. fl. 2. p. 602. L. nigricans DC. fl. fr. suppl. p. 306. Hopp. ap. St. h. 77. n. 8. Juncus sudeticus Willd. spec. 2. 221. Host. gram. 4. t. 99. Haec in jugis alpium et montium altiorum.

δ. *nivalis*, floribus in capitulum densum lobatum atrofuscum congestis: L. campestris γ. nivalis Wahlenb. fl. suec. p. 218. L. alpina Hoppe ap. St. h. 77. n. 6.

ε. *pallescens*, omnia varietatis α., sed spicae multo dilutiore colore tinctae: L. pallescens Hoppe ap. St. h. 77. n. 9. — Ab hac evidenter differt L. campestris β. pallescens Wahlenb. fl. suec. p. 218. Fries. herbar. norm. fasc. 6. n. 67. L. pallescens Besser. en. pl. volh. p. 15. n. 430., secund. specimina ab ipso auctore accepta, spicis triplo-quadruplove minoribus et multo copiosioribus, quae vero in ditione florae nostrae nondum lecta est. — Varietates Luzulae multiflorae in locis earum natalibus accuratius investigandae sunt.

12. **L. spicata** (DeCand. fl. fr. 3. p. 161.) *spica oblonga lobata nutante*, perigonii phyllis acuminatis mucronatis capsula subrotundo-ovata mucronata longioribus, foliis canaliculatis basi pilosis, filamentis anthera dimidio brevioribus. 4. In pascuis alpium (dch. d. g. Alpenk. u. in d. Sudet.) Jun.-Aug. D. fl. 2. p. 602. Juncus spicatus L. sp. 469. St. h. 28., non bona. In summis alpibus spicae in capitulum subrotundum saepe conglobatae:

β. *conglomerata*, L. conglomerata Mielichhof. — In Luzula pediformi, quae in ditione florae nostrae nondum detecta est, filamenta brevissima, antheris multoties breviora sunt et stylus ovarium aequans, qui in L. spicata brevior est.

Ord. CXXX. CYPERACEAE. Juss. gen. p. 26.

Flores glumacei, hermaphroditi vel diclini, in spicas dispositi, spicularum nomine, per analogiam graminearum, designatas. *Gluma*, (quae eadem squama nuncupatur et e bractea exteriore formata est,) *univalvis;* vel (e bracteis 2 orta) bivalvis, valvula interiore (in Cypero) rachi adnata, (aut (in Carice) in urceolum transformata. Perigonium in setas, (setas hypogynas R. Brown.,) 6, plures, vel (in Eriophoro) copiosas, rarius abortu pauciores partitum, aut obliteratum. Stam. 3, in perigonio sexsetoso setis opposita; *antherae apice integrae. Ovarium liberum.* Stylus 1. Stigmata 2-3. Nux triangularis vel compressa, nuda vel setis perigonii persistentibus cincta, vel (in Carice) urceolo aucto persistenti, utriculum spurium exhibenti, inclusa, una cum perigonio vel utriculo decidua. Embryo minimus in basi albuminis farinacei. — Cyperacearum folia graminea, vaginae integrae, e petiolo, in vaginam connato, formatae insident; non raro quoque prorsus deficiunt, vel ad mucronem apici vaginae impositum reducta apparent. Superficie vaginae interior membrana laevigata obducta est, orta e stipulis, petiolo, scilicet vaginae, intus adnatis, ut in Polygono Persicaria aliisque, quae membrana non raro ultra marginem vaginae prominet, ligulamque in basi folii constituit. Anthela bracteaeque ad ramorum ramulorumque basin ut in Juncaceis formatae sunt; bractea interior in tubulum quoque convoluta est et ochream exhibet.

Trib. I. *CYPEREAE.* Flores hermaphroditi; glumae distichae.

1. CYPÉRUS (L. gen. n. 66.) Spicula disticha. Glumae carinatae, numerosae, univalves, omnes floriferae, vel 2-3 infimarum minores et vacuae. Setae squamulaeve nullae. — In pluribus speciebus valvula interior glumae adest, sed rachi adnata, quam alatam reddit; in aliis speciebus autem haec valvula vix observabilis est. Cyperus et Picreus N. ab E. gen. 9. 1. 2.

1. **C. flavescens** (L. sp. 68.) anthela composita, capitulis subrotundis pedunculatis sessilibusque, spiculis lanceolatis compresso-planis, glumis oblongo-ovatis dense imbricatis, *stigmatibus* 2, nucula subrotundo-obovata compressa, involucro subtriphyllo umbella longiore, *radice fibrosa.* ☉. In pascuis humidis, locis udis et paludosis. Jul. Aug. D. fl. 1. 421. St. h. 52. Picreus flavescens Reichenb. fl. exc. p. 72. Glumae flavescentes plaga dorsali lata viridi ante apicem evanescente, non striatae.

2. **C. fuscus** (L. sp. 69.) anthela subdecomposita, capitulis subrotundis pedunculatis sessilibusque in apice ramorum longiorum geminis ternisve, spiculis linearibus compressso-planis, glumis oblongo-ovatis denique patulis et remotiusculis, *stigmatibus* 3, nucula elliptica utrinque attenuata argute triquetra, involucro subtriphyllo umbella longiore, *radice fibrosa.* ☉. In iisdem locis cum priori, sed minus vulgaris. Jul. Aug. D. fl. 1. 421. St. h. 52. Glumae atrofuscae, stria dorsali lata, viridi, in apicem excurrente. Variat:

β. virescens; glumae fuscescentes carina viridi, vel pallidae stria fusca juxta carinam viridem: C. virescens Hoffm. D. fl. 1. 21. Cyperus glaber St. h. 52. nec Linn. Stylus ex mea observatione semper trifidus. — C. glaber L. sec. Bertol. idem cum C. picto Tenor. est; a. C. fusco et virente differt: culmo bipedali; spiculis lanceolatis turgidulis, glumis latere spadiceorufis, exquisite nervosis.

3. **C. esculentus** (L. sp. 67.) anthela decomposita, spicis pedunculatis sessilibusque in ramis longioribus apice ternis quinisve, lateralibus pedun-

culatis patentibus, intermedia sessili, spiculis linearibus compresso-turgidulis remotiusculis, glumis ovatis obtusis dorso striatis, stigmatibus 3, involucro longissimo, *radice stolonifera, tuberibus filipendulis* transverse zonatis. 4. Colitur in reg. australibus. Jul. Aug. D. fl. 1. 422. St. h. 52. Spiculae pallidae. In speciminibus macrioribus rami terminantur spicula solitaria. Colit.

4. **C. badius** (Desfont. atlant. 1. t. 7. f. 2.) *anthela decomposita, spicis* pedunculatis sessilibusque *in ramis longioribus apice ternis quaternisque,* ramulis *lateralibus angulo subrecto egredientibus,* spiculis lanceolato-linearibus compressis, glumis ovatis obtusis dorso striatis, stigmatibus tribus, nucula oblongo-obovata acute triquetra, involucro longissimo, *radice repente.* 4. In locis paludosis, (an d. Bädern v. Burscheid bei Aachen; im Schleidener Thal der Eifel, nach Fingerh.) Jul. Aug. St. h. 78. C. thermalis Dumortier. florul. belg. p. 145. C. longus *β.* Bertolon. fl. ital. 1. p. 270. Simillimus quidem est Cypero tenuifloro Rottb., qui in hortis botanicis colitur et cum iconibus Rottboellii et Jacquinii exacte congruit, tamen hic differre videtur spiculis remotis, neque dense congestis; varietatem saltem valde memorabilem sistit. — A Cypero longo autem C. badius satis differt ramis anthelae et foliis; rami maiores anthelae apice non umbellati sunt, ut in illo, nec radios elongatos erectos gerunt, sed radii laterales ramorum angulo subrecto divergunt. Folia dimidio angustiora sunt. G.

5. **C. longus** (L. sp. 67.) *anthela decomposita, ramis longioribus apice umbellatis, pedunculis umbellularum erectis* inaequalibus elongatis brevibusque, spiculis linearibus acutis plano-compressis, glumis ovatis obtusis dorso striatis, stigmatibus 3, nucula oblongo-obovata acute triquetra, involucro longissimo, *radice repente.* 4. In fossis et pratis humidis, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, Lindau am Bodensee, u. dch. d. Littorale bis Istrien. Baden bei Wien.) Jul. Aug. D. fl. 1. 423. St. h. 52. Glumae rufo-fuscae, margine pallidiores, carina viridi.

6. **C. Monti** (L. fil. suppl. 102.) *anthela decomposita,* spicis pedunculatis subsessilibusque in ramis longioribus apice ternatis quaternatisque, spiculis fere rectangule patentibus elongato-lanceolatis compresso-turgidis, glumis ovatis obtusis dorso striatis, *stigmatibus* 2, nucula obovata compressa marginibus rotundatis, involucro longissimo, *radice repente.* 4. In paludosis et fossis, (südl. Schweiz, Südtyrol u. dch. d. Littorale.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 423. St. h. 52. C. serotinus Rottböll. descr. et ic. 1. p. 31. Picreus Monti Reichenb. fl. exc. p. 72.

7. **C. glomeratus** (L. sp. 68.) *anthela decomposita, spicis densissime conglomeratis globosis ovalibusque* sessilibus pedunculatisque in ramis longioribus apice ternatis, spiculis linearibus acutis compressis, glumis linearibus, stigmatibus 3, nucula oblonga triquetra, involucro longissimo, *radice repente.* 4. Ad littora maris adriatici, (bei Monfalcone; bei Grätz in Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 52. C. australis Schrad. germ. 1. p. 116. D. fl. 1. p. 424. G.

Cyperus pannonicus per errorem inter plantas germanicas enumeratur, in Austria enim et Moravia non provenit; b. Jacquinus sua specimina ex Hungaria habuit, conf. fl. austr. 5. p. 29., atque Cl. Rohrer. et Meyer. in flora moravica de eo mentionem non faciunt.

2. SCHOENUS (L. gen. n. 65.) Spicula disticha. Glumae 6-9, univalves, 3-6 infimae minores, vacuae. Setae hypogynae 1-5 vel o. — Spiculis obscurius distichis et glumis 2-4 tantum fertilibus habituque toto a Cypero differt; at Sch. mucronatus rectius ad Cyperi genus transfertur. — Schoenus et Streblidia N. ab E. gen. 9. 16. 17.

1. **S. mucronatus** (L. sp. 63.) culmo tereti nudo, capitulo terminali hemisphaerico, *involucro* 3-6 *phyllo patentissimo,* foliis linearibus planis subcanaliculatis. 4. In littore maris, (bei Aquileja, Sieber!) Jun. Jul. D. fl. 1. 450. St. h. 40. Mariscus mucronatus Presl. cyp. et gram. sic. 12., a Marisci genere differt spiculis multifloris, glumis infimis 1-2 maioribus, nec minoribus. G.

2. **S. nigricans** (L. sp. 64.) culmo tereti nudo, *capitulo spiculis* 5-10 *composito terminali*, *involucri foliolo exteriore oblique adscendente*, setis hypogynis subnullis, foliis subulatis culmum dimidium aequantibus. 4. In pratis turfosis, (stw. im nördl. Deutschland v. Holst. bis Pommern u. Berlin, im mittlern bei Jena, im südl. v. Oestreich durch Baiern, Würtemb., in die Flächen der Schweiz u. von da durch die Rheinfläche bis nach d. Niederl., sodann im Litt., Krain u. südl. Tyrol.) Mai. Jun. D. fl. 1. 461. St. h. 40. — Setam hypogynam unicam saepe inveni. — Spiculae atrofuscae.

3. **S. ferrugineus** (L. sp. 64.) culmo tereti nudo, *capitulo e spiculis* 2-3 *composito in culmi apice laterali*, *involucri foliolo exteriore stricto erecto*, setis hypogynis 3-5, foliis subulatis culmo multo brevioribus. 4. In pratis turfosis, (Schweiz, südl. Tyrol, Kärnthen, Oberbaden, Würtemberg, Oberschwaben u. Oberbaiern, Mecklenburg, Pommern, Thüringen, in Oestreich an d. Ungarischen Grenze.) Mai. Jun. D. fl. 1. 451. St. h. 40. Streblidia ferruginea Link. hort. 1. 276. — Spiculae atrofuscae.

Trib. II. *SCIRPEAE.* Flores hermaphroditi; glumae undique imbricatae.

3. CLADIUM (Patrick. Brown. jam. 114.) Spicula undique imbricata. Glumae univalves subsex, tres infimae minores, vacuae. Setae hypogynae nullae. Nux cortice crustaceo fragili instructa. Styl. filiformis, secedens. N. ab E. gen. 9. 18.

1. **C. Mariscus** (Rob. Brown. pr. fl. nov. holl. ed. germ. 1. p. 92.) anthela decomposita terminali pluribusque lateralibus, spiculis capitato-glomeratis, culmo tereti laevi folioso, foliorum marginibus carinaque asperis. 4. In fossis, paludibus et aquis stagnantibus, (südl. Tyrol, Schweiz hin u. wieder, Elsass bei Strasb., Oberschwaben bei Memmingen, Oberbaiern, Alpenstädt unweit Erfurt, Rheinfläche bei Waghäusel zw. Schwetzingen u. Carlsruh, Laacher See bei Coblenz, Flor. v. Spa; bei Göttingen, Berlin, in Mecklenb. u. Holst., nirgends gemein.) Jul. Aug. C. germanicum Schrad. fl. germ. p. 75. D. fl. 1. 360. St. h. 44. Schoenus Mariscus L. sp. 62.

4. RHYNCHÓSPORA (Vahl. en. 2. p. 229.) Spiculae undique imbricatae, pauciflorae. Glumae univalves, 2-3 fertiles, inferiores 3-4 minores, vacuae. Setae hypogynae inclusae. Basis styli persistens, compresso-conica, indurata, cum nuce articulata. N. ab E. gen. 9. 15.

1. **R. alba** (Vahl. en. 2. 236.) *spiculis* subcorymboso-conglomeratis, *fasciculis involucrum subaequantibus*, setis hypogynis 10 longitudine nucis, radice fibrosa. 4. In paludosis turfosis et pascuis udis sterilibus. Jul. Aug. Schoenus albus L. sp. 65. D. fl. 1. 448. St. h. 40. Spiculae sub anthesi albae.

2. **R. fusca** (Roem. et Schult. 2. 88.) *spiculis* capitato-conglomeratis, *fasciculis involucro multoties brevioribus*, setis hypogynis 3 nuce duplo longioribus, radice repente. 4. In pratis turfosis, (stw. dch. d. Geb. seltner als R. alba.) Jun. Jul. Schoenus fuscus L. sp. 1664. D. fl. 1. 449. St. h. 40. Spiculae sub anthesi fuscae.

5. HELEÓCHARIS (Rob. Brown. pr. fl. n. holl. 1. p. 80.) spiculae undique imbricatae. Glumae univalves, inferiores maiores; infimae 1-2 steriles. Setae hypogynae inclusae. Stylus basi dilatatus cum ovario articulatus. Nux basi styli persistente indurata coronata. Eleocharis et Scirpidium N. ab E. gen. 9. 11. et 13.

1. **H. palustris** (R. Brown. l. c. p. 80. in annot.) spicula terminali solitaria oblonga, glumis acutiusculis, *infima non maiore basin dimidiam spiculae amplexante*, stigmatibus 2, *nuce* obovata compressa *laevi* marginibus rotundato-obtusa, basi styli remanente ovata, culmo tereti subcompresso, rhizomate repente. 4. In paludibus, fossis, ad lacuum ripas, in pratis udis.

Jun.-Aug. Scirpus palustris L. sp. 70. D. fl. 1. 425. St. h. 9. — In aqua nascens culmi bi-tripedales fere crassitie pennae anserinae et glumae rufo-fuscae sunt; extra aquam culmi 3-6 pollicares tantum et crassitie pennae columbinae, glumaeque spadiceae, laxius imbricatae, occurrunt; ad posteriorem Scirpus varius Schreb. in Schweigg. et Kört. fl. Erlang. p. 11. pertinet. Nuces brunneae.

2. **H. uniglumis** (Link. Jahrb. d. Gewsk. 1. 3. 77.) spicula terminali solitaria oblonga, glumis acutiusculis, *infima* non maiore subrotunda basin spiculae *penitus amplexante*, stigmatibus 2, *nuce* obovata compressa *laevi* marginibus rotundato-obtusa, *basi remanente styli ovata*, culmo tereti, rhizomate repente. 4. In paludosis et locis humidis. Jun.-Aug. Scirpus uniglumis D. fl. 1. 426. Reichenb. ic. 2. f. 319. St. h. 78. S. tenuis Schreb. in Schweigg. et Kört. fl. Erlang. p. 12. S. intermedius Thuill. fl. par. 11., non Poiret. Nuces dilute brunneae.

3. **H. multicaulis** (Smith. brit. 1. 48. Scirpus multicaulis.) spicula terminali solitaria oblonga, glumis rotundato-obtusis, infima non maiore subrotunda basin spiculae penitus amplexante, stigmatibus 3, *nuce* oblongo-obovata *acute triquetra laevi*, culmo tereti, radice fibrosa. 4. In locis turfoso-paludosis, (bisher bloss in Westphalen bei Bentheim, Gronau, u. häufiger bei Dinslaken u. zw. Rheina u. Burgsteinfurt, sodann im Holst.) Jun.-Aug. Engl. bot. t. 1187. St. h. 78. Nuces atro-fuscae, quae in antecedentibus brunneae. Florum infimorum spiculae unus alterve saepe viviparus. G.

4. **H. ovata** (R. Brown. l. c.) spicula terminali solitaria subrotunda vel lato-ovata, glumis lato-ovatis rotundato-obtusis, *infima non maiore basin dimidiam spiculae amplexante*, stigmatibus 2, *nuce* obovata compressa *laevi* marginibus acutis, *basi remanente styli triangulari aeque lata ac longa*, culmo tereti sicco subtiliter striato, radice fibrosa. ⊙. Ad margines aquarum stagnantium et in locis hyeme inundatis. Jun. Jul. Scirpus ovatus Roth. tent. 2. 2. p. 562. D. fl. 1. 428. St. h. 10. S. capitatus Schreb. spic. p. 60. S. compressus Moench. meth. 349. S. multicaulis Gmel. bad. 1. p. 96. S. annuus Thuill. 1. 22. S. turgidus Pers. syn. 1. 66. Eleogenus ovatus N. ab E. in linn. 9. p. 294. — Nuces pallidae, stylopodio compresso triangulari coronatae; in S. capitato americano nuces nigrae et stylopodio depresso medio mucronulato instructae sunt; sed S. ovatus noster im America boreali quoque sponte provenit.

5. **H. atropurpurea** (Eleocharis atropurpurea Kunth. en. v. 3. p. 151.) spicula terminali solitaria ovata, glumis oblongo-ovatis rotundato-obtusis, infima non maiore basin dimidiam spiculae amplexante, stigmatibus 2, *nuce* obovata *compressa laevi* marginibus acutis, *basi remanente styli orbiculari depressa subpatelliformi*, culmo tereti sicco profunde striato, radice fibrosa. ⊙. In locis sabulosis humidis, (am Genfersee zwischen Lausanne u. Morges an einem Orte Pierettes genannt.) Jul. Aug. Scirpus atropurpureus Retz. obs. 5. p. 14. secund. cl. Gay. S. Lereschii Thomas. pl. exsicc. Nuces maturae atrae. H.

6. **H. carniolica** (Koch. D. fl. suppl. inedit.) spicula terminali solitaria oblonga, glumis oblongo-ovatis obtusis, *infima* non maiore *basin spiculae penitus amplexante*, stigmatibus 2, *nuce* obovata compressa *laevi* marginibus acutis, *basi remanente styli lanceolata latitudine sua triplo longiore*, culmo (sicco) striato, radice fibrosa. ⊙. In pratis inundatis, (um Adelsberg in Krain, Dolliner.) Jul. Aug. Planta habitu Heleocharidis acicularis, sed maior et nucibus laevibus statim dignoscenda, spiculae quoque latiores et breviores sunt. Nuces viridi-fuscae. Florum infimorum unus alterve nonnunquam viviparus. G.

7. **H. acicularis** (R. Brown. l. c.) spicula terminali solitaria ovata, glumis ovatis obtusis, infima non maiore, stigmatibus 3, *nuce* oblonga *subtiliter multicostata*, culmo sulcato-tetragono, radice repente. ⊙. In paludosis et ad marginem aquarum stagnantium. Jun.-Aug. Scirpus acicularis L.

sp. 71. D. fl. 1. 428. St. h. 10. Scirpidium aciculare N. ab Esenb. in linn. 9. 293. Limnochloa acicularis Reichenb. fl. exc. p. 78. Annua est, licet radix repens sit. Setae hypogynae nunc adsunt, nunc deficiunt.

6. SCIRPUS (L. gen. n. 67.) Spiculae undique imbricatae, glumae univalves, inferiores maiores; infimae 1-2 steriles. Setae hypogynae subsex vel nullae. Stylus cum ovario non articulatus, basi simplici deciduus. — Scirpus, Malacochaete, Isolepis, Holoschoenus, Dichostylis, Blysmus, Baeotryon et Eleogiton N. ab E. gen. 9. n. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14.

Sect. I. Spicula terminalis solitaria in culmo ramisve culmi, sed rami non in anthelam congesti sunt.

1. **S. caespitosus** (L. sp. 71.) culmo tereti basi vaginato, *vagina suprema in folium breve terminata*, spicula terminali solitaria ovata, glumis obtusis, *infima* maiore spiculam subaequante eamque amplectente mucronata, *mucrone crassiusculo subfoliaceo*, stigmatibus 3, nuce trigona laevi, *setis nuce longioribus*. 4. In turfosis subalpinis et alpinis, inque planitiebus alpes comitantibus atque in ericetis turfosis G. septentrion., (Schweiz u. dch. d. g. Alpenk., Vogesen, Schwarzwald, Odenwald; auf allen Torfgründen v. Bodensee dch. Oberbayern bis Salzburg, Böhmerwald, Sudeten, Sachsen und Thüringen sparsam, häufiger v. d. Niederlanden dch. Westphalen und das nördl. Preussen.) Mai. Jun. D. fl. 1. 429. St. h. 10. Limnochloa caespitosa Reichenb. fl. exc. 79.

2. **S. alpinus** Schleicher. (Gaud. fl. helv. 1. p. 108.) culmo tereti basi vaginato, *vagina suprema folio brevi terminata*, spicula terminali solitaria ovata, glumis obtusis, infima breviore spiculam basi sua semiamplexante mucronata mucrone brevissimo crassiusculo, stigmatibus 3, *nuce* trigona laevi *setis destituta*. 4. In locis udis summarum alpium, (bei Zermatten in der Schweiz.) Jul. Aug. H.

3. **S. pauciflorus** (Lightfoot. fl. scot. p. 1078.) caule tereti, basi vaginato, *vaginis aphyllis*, spicula terminali solitaria ovata, *glumis* obtusis *muticis* infima maiore spiculam amplectente, nervo ante apicem evanescente, stigmatibus 3, nuce trigona laevi, *setis nuce paulo brevioribus*. 4. In locis turfosis, pascuis udis, ad ripas. Jun. Jul. S. Baeothryon Ehrh. phyt. 31. Linn. fil. suppl. 103. D. fl. 1. 430. St. h. 10. S. Halleri Vill. delph. 2. 188. S. caespitosus Pollich. pal. 1. p. 39. Limnochloa Baeothryon Rchb. fl. exc. 78. — S. campestris Roth. cat. bot. 1. 5. specimina minora comprehendit.

4. **S. parvulus** (Roem. et Sch. 1. 124. 1817.) culmo tereti intus transverse septato, *vaginis tenuissime membranaceis aphyllis*, *spicula* terminali *solitaria* ovato-oblonga, *glumis* obtusis *muticis*, stigmatibus 3, nuce trigona laevi, setis nuce longioribus. 4. In humidis, (am süssen (weniger salzhaltigen) u. am salzigen See im Mansfeldischen, bei Monfalcone im Littor. u. nach d. chloris Hannov. auf Elbinseln bei Voitze im Lauenb.) Jul. Aug. D. fl. 1. 431. St. h. 85. S. nanus Spr. pug. 1. 4., non Poir. S. humilis Wallr. sched. p. 27. (1822.) Limnochloa parvula Rchb. fl. exc. p. 78. Radix stolones capillares, apice gemmam lanceolatam tuberiformem gerentes, agit, conf. v. Schlechtend. in Flora v. Thuring. h. 22. G.

5. **S. fluitans** (L. sp. 71.) culmo prostrato vel fluitante ramoso folioso basi radicante, *spiculis in pedunculorum axillarium apice solitariis*, stigmatibus 2, nuce compressa margine acuto, setis destituta. 4. In paludibus et aquis stagnantibus, (von den Niederlanden dch. Westph., Hannov., Oldenb., Holst. bis Mecklenb.) Jul.-Sept. D. fl. 1. 432. St. h. 85. Fl. dan. t. 1082. S. stolonifer Roth. in Ust. n. ann. 4. 36. Dichostylis fluitans Rchb. fl. exc. p. 75. Isolepis fluitans Brown. prodr. 221. Eleogiton fluitans Link. en. h. ber. 1. 284. G.

Sect. II. Anthela spurie lateralis, dum involucri folium maius erigitur et culmi continuationem refert. Spiculae 2-plures, in fasciculum solitarium aggregatae; vel plurimae in

ramis paniculae solitariae, vel in apice ramorum fasciculato-aggregatae. Folia involucri et, si adsunt, culmi semiteretia vel triquetro-canaliculata.

* Glumae apice integrae, mucronatae.

6. **S. setaceus** (L. sp. 72.) *culmo tereti, spiculis solitariis geminis ternisve* spurie lateralibus, involucri folio culmo multoties breviore erecto denique subreflexo, glumis obtusis mucronatis, stigmatibus 3, *nuce* compressa *longitudinaliter costata,* setis o. ⊙. (sec. Whlnbg. 4.) In locis humidis, ad ripas. Jul. Aug. D. fl. 1. 440. St. h. 10. Isolepis setacea R. Br. prodr. fl. n. holl. 1. 78., variat radice longe repente. — Simillimus Scirpus Savii Sebast. et Maur. fl. rom. prod. p. 22., S. filiformis Sav. fl. pis. 1. 46., S. leptaleus Koch. in syll. s. reg. b. ratisb. 1. p. 8., in Littorali austriaco quaerendus, differt: involucro spicula plerumque non longiori et nuculis laevibus, sub lente subtilissime punctulatis.

7. **S. supinus** (L. sp. 73.) *culmo tereti, spiculis in fasciculum aggregatis sessilibus* spurie lateralibus, involucri folio erecto culmum subaequante, glumis obtusis mucronulatis, stigmatibus 3, *nuce* trigona *transverse rugosa,* setis o. ⊙. In locis udis ad ripas, (selten u. zerstreut; auf der Rheinfläche bei Dachsland im Badischen; bei Mannheim; in Unteröstreich; zw. Aschersleben u. Magdeburg; bei Berlin; in der Schweiz am Genfersee.) Jul. Aug. D. fl. 1. 439. Schrad. germ. 1. t. 1. St. h. 85. Isolepis supina R. Br. pr. fl. n. holl. p. 77. Setam unam alteramve minutam saepe vidi.

8. **S. mucronatus** (L. sp. 73.) *culmo triquetro,* spiculis in fasciculum aggregatis sessilibus spurie lateralibus, involucri folio maiore erecto denique horizontaliter refracto, glumis obtusis mucronatis, stigmatibus 3, *nuce* trigona *transverse rugosa,* setis hypogynis retrorsum aculeolatis. 4. In aquis stagnantibus, (Littorale, Krain u. Kärnthen, Steyerm., im Würtemb. bei Canstadt nur an einer Stelle; im Badischen auf einer nassen Wiese bei Baden; am Cosbacher Weiher bei Erlangen; Schweiz am Bodensee, im C. Wallis u. Tessin.) Jul. Aug. D. fl. 1. 436. St. h. 36. S. glomeratus Scop. carn. 1. p. 47. Host. a. 1. 59.

** Glumae apice cum mucrone emarginatae.

9. **S. lacustris** (L. sp. 72.) *culmo tereti, anthela composita* spurie lateralibus, involucri folio maiori erecto, spiculis fasciculato-aggregatis, fasciculis pedunculatis sessilibusque, *glumis laevibus* fimbriatis cum mucrone emarginatis, stigmatibus 3, nuce trigona laevi, setis hypogynis retrorsum aculeolatis. 4. In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Jun. Jun. D. fl. 1. 433. St. h. 36. Antherarum apiculus breviter barbulatus. Variat culmo glauco. — Varietas *β.* minor bodamica, culmo subtrigono, Gaud. fl. helv. 1. 113., mihi ignota, sec. Cl. Custor. a S. trigono Roth. (S. Duvalli) non differt, nisi stigmate plerumque tripartito et rarius bipartito.

10. **S. Tabernaemontani** (Gmel. bad. 1. p. 101. 1806.) *culmo tereti, anthela composita* spurie laterali, involucri folio maiore erecto, spiculis fasciculato-aggregatis, fasciculis pedunculatis sessilibusque, *glumis punctato-scabris* fimbriatis cum mucrone emarginatis, stigmatibus 2, nuce subtrigono-convexa laevi, setis hypogynis retrorsum aculeolatis. 4. In iisdem cum antecedente locis. Jun. Jul. D. fl. 1. 434. Tabernaem. Kräuterb. p. 366., Juncus n. 5. sylvaticus ob culmos in icone teretes omnino ad hanc, in planitie Rheni vulgatissimam plantam nec ad S. triquetrum pertinet, ut Cl. Nolt. contendit. S. glaucus Engl. bot. t. 2321. Nux minor, quam in S. lacustri, angulo dorsali obtusissimo. Var. culmo laetius virente, Custor. ap. Gaud. helv. 6. 339. Antherae non semper plane imberbes. Tota fortasse species nil est nisi varietas S. lacustris.

11. **S. Duvalii** (Hoppe ap. Sturm. h. 36.) *culmo inferne tereti medio trigono, angulis obtusis, faciebus 2 convexiusculis, tertia plana, anthela composita* spurie laterali, involucri folio maiori erecto, spiculis fasciculato-aggregatis, fasciculis pedunculatis sessilibusque, *glumis laevibus* fimbriatis cum mucrone emarginatis, stigmatibus 2, nuce laevi dorso convexa, setis hypogynis retrorsum aculeolatis. 4. Ad littora lacuum fluviorumque, (in

Holst. an der Elbe und Eider, bei Regensburg, aber in neuerer Zeit nicht wieder aufgefunden; in d. Schweiz am Bodensee; am Rheine im Oberbad.) Jun. Jul. S. Duvalii D. fl. 1. 435. Roth. enum. 1. p. 162. S. trigonus Nolt. nov. 1. p. 9. Koch. syn. ed. 1. p. 741. S. carinatus Smith. engl. bot. 28. t. 2983. Heleogiton trigonum Reichenb. fl. exc. 77. Diff. a S. lacustri culmo humiliore, obtuse trigono, hinc plano, antheris apice imberbibus, stigmatibus 2 et nuce minori dorso convexa; a S. Tabernaemontani culmi forma et glumis ferrugineis, nec fusco-purpureis, laevibus, nec punctato-scabris; cum caeteris confundi nequit.

12. **S. littoralis** (Schrader. germ. t. 5. f. 7.) *culmo triquetro*, anthela composita spurie laterali, involucri folio maiori erecto, *spiculis solitariis* pedunculatis sessilibusque, glumis margine integerrimis subdenticulatis apice cum mucrone emarginatis, stigmatibus 2, nuce laevi dorso convexa, *setis hypogynis penicillato-plumosis, pilis erectis* articulatis. 4. Ad aquas stagnantes in littore maris adriatici, (bei Duino u. Monfalcone.) Jun. Jul. D. fl. 1. 436. St. h. 85. S. mucronatus Scop. carn. 1. p. 45. Malacochaete littoralis N. ab E. in linn. 9. 292. G.

13. **S. triqueter** (L. mant. 105.) *culmo triquetro*, anthela composita spurie laterali, involucri folio maiore erecto, spiculis ovatis *fasciculato-aggregatis, fasciculis pedunculatis sessilibusque*, glumis margine fimbriatis cum mucrone emarginatis, lobulis obtusis, stigmatibus 2, *nuce laevi* dorso convexa, setis hypogynis retrorsum aculeolatis. 4. Ad ripas inque fossis et aquis stagnantibus, (stw. in d. Schweiz, v. da am Rheine bis nach Westph.; in d. Gebiete d. Donau v. Unterbayern bis Oestreich; an der Elbe u. Eider in Holst.) Jul. Aug. D. fl. 1. 436. St. h. 36. Roth. enum. 1. p. 164. S. trigonus Roth. neue Beitr. 1. p. 90. S. mucronatus Pollich. palat. 1. 44. Host. gr. 3. t. 66. Heleogiton triquetrum Reichenb. fl. exc. 77. — Var.:

β. glumis purpureo-fuscis punctato-scabris: S. Hoppii Weih. regensb. bot. Ztg. 10. 1. 118.

γ. pallidus, glumis albido-virentibus, nervo-viridi, punctulis oblongis: S. Lejeunii Weih. ibid. p. 116.

14. **S. Rothii** (Hoppe in St. h. 36. 1814.) *culmo triquetro*, anthela conglomerata spurie laterali, involucri folio maiori erecto, *spiculis omnibus sessilibus* ovato-oblongis, glumis margine fimbriatis cum mucrone emarginatis, lobulis acutis, stigmatibus 2, nuce *laevi* dorso convexa, setis hypogynis nuce duplo triplove brevioribus. 4. Ad ripas, (a. d. Leesum bei Vegesak u. am Ausflusse d. Weser, an d. Elbe im Holst. u. bei Hamburg, Rheininseln im Breisgau; Schweiz sehr selten.) Jul. Aug. Scirp. Rothii Roth. enum. 1. p. 165. S. mucronatus Roth. tent. fl. germ. v. 2. p. 1. p. 50. S. pungens Vahl. en. 2. p. 255. 1827. Koch. syn. ed. 1. p. 742. D. fl. 1. 437. S. triqueter Roth. n. Beitr. 1. 91. S. triqueter *β.* Smith. engl. fl. 1. 60. S. tenuifolius DC. fl. fr. 5. p. 300. — Culmus multo tenuior, quam S. triquetri, vaginae culmi foliis longis terminatae, antherarum apiculus subulatus denticulato-ciliatus, qui in S. triquetro brevis et imberbis. Est sec. Nolt. S. pungens Vahl. fide herbarii eius.

Sect. III. Anthela spurie lateralis, e capitulis globosis densissime compactis composita. Holoschoenus Link.

15. **S. Holoschoenus** (L. sp. 72.) culmo tereti, anthela spurie laterali, involucri folio maiore erecto elongato, *capitulis densissime compactis globosis* sessilibus pedunculatisque, pedunculis simplicibus vel compositis, glumis truncatis mucronatis, stigmatibus 3, nuce glabra, setis o, foliis semiteretibus canaliculatis. 4. In humidis ad ripas, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, bei Grätz in Steyerm., Littorale, im Flussgebiete der Elbe in Böhmen u. bei Barby, der Oder in Schlesien u. bei Frankf., bei Werder hinter Potsdam.) Jul. Aug. D. fl. 1. 441. Isolepis Holoschoenus R. et S. syst. veg. 2. 115. Variat:

α. vulgaris, culmo elatiore, 2-3 pedali, anthela composita: S. Holo-

schoenus L. l. c. Sturm. h. 36. Holoschoenus vulgaris Link. h. reg. ber. 1. 203. H. Linnaei Reichenb. fl. exc. p. 76.

β. australis, culmo humiliore, tenuiore, capitulis minutis, pisum subaequantibus, uno solitario sessili paucisque pedunculatis: S. australis L. syst. veg. p. 85. S. romanus *β.* L. sp. 72. Holoschoenus exserens et H. filiformis Reichenb. fl. exc. 1. 76.

γ. romanus, culmo humiliore, capitulo maiore, magnitudine avellanae, solitario, vel uno duobusve pedicellatis minoribus fulto: S. romanus L. sp. 72. St. h. 36. Holoschoenus australis Reichenb. fl. exc. p. 76. Cl. Link. et Bertolon., post reiteratas observationes, in loco natali institutas, omnes has formas nunc in unam speciem coniungunt.

Sect. IV. Anthela terminalis composita. Folia culmi et involucri graminea.

16. **S. maritimus** (L. sp. 74.) culmo triquetro folioso, anthela composita, spiculis fasciculatis pedunculatis sessilibusque, *involucro planifolio, glumis* apice mucronatis *bifidisque, lacinulis acutis* denticulatis, stigmatibus 3, setis hypogynis retrorsum hispidis. 4. Ad littora maris, ad ripas et fossas. Jul. Aug. D. fl. 1. 443. St. h. 13. var. *α.* spiculis pedunculatis sessilibusque, et

β. compactus, spiculis omnibus sessilibus glomeratis: Scirpus compactus Krock. siles. t. 15. S. tuberosus Desf. atl. 1. p. 50. (radix adulta in omni specie semper tuberoso-nodosa.)

γ. macrostachys, spiculis circiter pollicaribus: S. maritimus *β.* Bertol. fl. ital. 1. p. 299. S. macrostachys Willd. en. h. berol. 1. p. 79., Scheuchz. agr. t. 9. f. 7. 8., (am Elbufer bei Hamburg, Sonder; Fiume, Noé.)

17. **S. sylvaticus** (L. sp. 75.) culmo triquetro folioso, *anthela corymbosa supradecomposita, spiculis fasciculatis,* fasciculis pedicellatis sessilibusque, *involucro planifolio* glumis obtusis mucronulatis, stigmatibus 3, setis hypogynis rectis retrorsum hispidis. 4. In pratis humidis praecipue sylvaticis, ad ripas, fossas. Jun. Jul. D. fl. 1. 444. St. h. 36.

18. **S. radicans** (Schkuhr. in Ust. ann. 4. 48.) culmo triquetro folioso, *anthela corymbosa supradecomposita, spiculis omnibus pedicellatis, involucro planifolio,* glumis obtusis muticis, stigmatibus 3, setis hypogynis contortis laevibus. 4. In pratis paludosis locis hyeme inundatis, ad margines limosos paludum, inque arenosis humidis, (von Westph. an durch Holstein, Pommern u. Preussen bis Königsberg, sodann durch Schlesien, Sachsen u. Böhm. bis Oestr.; Steyerm.; auf einer Stelle bei Zweibrücken in d. Rheinpfalz, Trier.) Jul. Aug. D. fl. 1. 445. Sturm. h. 36. — Culmi semper plures ex uno puncto, quorum steriles post anthesin elongati 2-3 pedales et longiores fiunt atque arcuato-deflexi radicant; spiculae longiores et acutiores, quam in S. sylvatico. G.

19. **S. Michelianus** (L. sp. 76.) culmo triquetro folioso, *capitulo terminali subrotundo lobato, involucro planifolio,* glumis lanceolatis in mucronem patulum attenuatis, stigmatibus 2, setis hypogynis nullis. ☉. In locis humidis et ad fluviorum ripas, (Littorale, Steyerm., Mähren, Schlesien selten; an d. Elbe bei Wittenberg.) Jul. Aug. D. fl. 1. 446. Host. gram. 3. t. 69. St. h. 85. Isolepis Micheliana R. et S. syst. 2. 114. Dichostylis Micheliana N. ab E. in linn. 9. 289. G.

Sect. V. Spiculae in spicam terminalem dispositae, distichae, approximatae, solitariae. Blysmus Panz.

20. **S. compressus** (Pers. syn. 1. 66.) culmo obsolete trigono, *spica disticha,* spiculis 6-8 floris, foliis subtus carinatis, *setis retrorsum aculeatis.* 4. In pratis et pascuis humidis. Jul. Aug. D. fl. 1. 446. St. h. 85. S. Caricis Retz. prodr. 16. S. caricinus Schrad. 1. 132. Schoenus compressus L. sp. 65. Leers. herb. t. 1. f. 1. Carex uliginosa L. sp. 1381. Blysmus compressus Panz. in Link. hort. 1. 278.

21. **S. rufus** (Schrad. 1. p. 133. t. 1. f. 3.) culmo tereti, *spica disticha,* spiculis 2-5 floris, foliis ecarinatis, *setis erecto-puberulis vel o.* 4. Ad littora

maris et in pratis subsalsis, (in Holst. sowohl am Deutschen als Baltischen Meere nicht selten; Hannov.; Mecklenburg; auf salzhaltigen Wiesen bei Selbelang in der Gegend von Berlin; am Kölmersee bei Halle.) Jun. Jul. D. fl. 1. 447. St. h. 85. Schoenus rufus Huds. fl. angl. p. 15. Scirpus bifolius Wallr. sched. p. 27. Blysmus rufus Link. hort. 1. 278. G.

7. FIMBRÍSTYLIS (Vahl. en. 2. p. 285.) Spiculae undique imbricatae. Glumae univalves: inferiores maiores; infimae 1-2 steriles. Setae hypogynae subsex, vel o. Stylus compressus, sub basi paulum dilatata cum ovario articulatus, superne ciliatus. — A Scirpo differt stylo compresso, ciliato, cum ovario articulato. — N. ab E. gen. 9. 8.

1. **F. dichótoma** (Vahl. en. 2. p. 287.) culmo subtrigono folioso, foliis planis culmum subaequantibus, *umbella e spiculis numerosis composita*, spiculis ovato-oblongis pedunculatis solitariis, centralibus sessilibus, glumis mucronatis, stigmatibus 2, nuce longitudinaliter costata sulcis transverse rugulosis. ⊙. In locis udis, (südl. Tyrol u. wohl auch im C. Tessin; diese Standorte sind noch nicht gesichert und deswegen noch weitere Untersuchungen anzustellen.) Jun.-Aug. St. h. 85. Scirpus dichotomus L. sp. 74. Rottb. gram. 13. f. 1. S. bisumbellatus Forsk. fl. aegypt. 1. p. 15. S. annuus Host. gr. austr. 3. t. 63.

2. **F. annua** (Roem. et Schult. 2. 95.) culmo subtrigono folioso, foliis planis culmo brevioribus, *umbella subsimplici*, *spiculis subquinque* ovatis, centrali sessili, glumis mucronatis, stigmatibus 2, nuce longitudinaliter costata sulcis transverse rugulosis. ⊙. In humidis, (südl. Tyrol zwischen Botzen u. Meran, Link in d. regensb. bot. Ztg. 1827. p. 219.; im C. Tessin, Hegetschw. u. Heer. fl. d. Schw. p. 50.) Jul. Aug. St. h. 85. Scirpus annuus All. ped. 2. p. 277. t. 88. f. 5. D. fl. 1. 442.

8. ERIÓPHORUM (L. gen. n. 68.) Spiculae undique imbricatae. Glumae univalves persistentes. Setae hypogynae glumis denique multo longiores, nucem lana longissima involventes. N. ab E. gen. 9. 10.

Sect. I. Trichophorum Pers. Setae hypogynae 4-6, anthesi peracta in lanam crispuloflexuosam elongatae.

1. **E. alpinum** (L. sp. 77.) *culmo* triquetro *scabro*, *spicula solitaria* oblonga. 4. In locis turfosis alpium et reg. subalpinarum sicut planitierum, tam his conterminarum, quam Germ. maxime septentrionalis, (dch. d. ganze Alpenk.; auf Niederungen v. Oberschwaben u. Oberbayern; auf d. Böhmerwald, d. Sudeten, Schneekoppe im Thüringer Wald, Brocken u. stw. auf d. Flächen von Hannover bis Pommern.) Apr. Mai. D. fl. 1. 452. St. h. 10. — Florescentiae tempore Scirpo caespitoso valde simile, a quo statim culmo triquetro scabro dignoscitur.

Sect. II. Eriophorum Pers. Setae hypogynae numerosae, anthesi peracta in lanam rectam elongatae.

* Spicula solitaria.

2. **E. vaginatum** (L. sp. 76.) *culmo glabro* superne trigono, *foliis margine scabris*, *spicula solitaria* oblongo-ovata, radice fibrosa. 4. In paludibus turfosis planitierum et montium; in regionem inferiorem alpium adscendens. Apr. Mai. D. fl. 1. 453. St. h. 10. E. caespitosum Host. gr. 1. t. 39. In caespitibus magnis et densis crescit.

3. **E. Scheuchzeri** (Hopp. Taschenb. 1800. p. 104.) *culmo* tereti *glabro*, *foliis glabris*, *spicula solitaria* subglobosa, radice stolonifera. 4. In turfosis alpium editiorum, (in d. Schweiz und von da durch d. g. Alpenk. d. hohen Alpen.) Jun. Jul. D. fl. 1. 454. St. h. 10. E. capitatum Host. gr. t. 38. (1801.) Culmo ex uno puncto perpauci, molles.

** Spiculae plures.

4. **E. latifolium** (Hopp. Taschenb. 1800.) culmo subtrigono, *foliis planis* apice triquetris, spiculis plurimis, *pedunculis scabris*. 4. In pratis humidis planitierum et montium humiliorum. Apr. Mai. D. fl. 1. 454. St. h. 10.

E. pubescens Smith. engl. fl. 1. 68., excl. syn. Poit. et Turp. E. polystachyum β. L. suec. p. 17. Vaill. par. t. 16. f. 2.

5. **E. angustifolium** (Roth. tent. 1. 24.) culmo teretiusculo, foliis linearibus canaliculatis apice triquetris, spiculis pluribus, *pedunculis laevibus*. 4. In paludibus et pratis turfosis, in subalpina adscendens. Apr. Mai. D. fl. 1. 455. St. h. 10. E. polystachyum α. L. fl. suec. p. 17. Occurrit:

α. *vulgare*, foliis ad 2 lineas latis et spicis pedunculatis: E. angustifolium β. laxum M. et K. D. fl. 1. p. 456.; vel spicis subsessilibus: E. angustifolium α. congestum D. fl. 1. p. 456. E. polystachyum β. Vaillantii Dub. bot. gall. p. 487. E. Vaillantii Poit. et Turp. fl. par. t. 52. DC. fl. fr. 5. p. 487.; atque lana quadruplo longiore quam spicula: E. angustifolium Smith. engl. fl. 1. p. 69. E. Vaillantii Koch. Taschenb. p. 532., quod secund. diagnosin Smithii et specimen anglicum proposueram, sed copia speciminum a Dn. Sonder benevole mihi transmissa me docuit, longitudinem lanae notam fallacem esse.

β. *elatius*, culmus altior, folia ad 3 lineas lata: E. angustifolium β. longifolium Hopp. decas. gram. 1. n. 9. E. polystachyum Smith. engl. flor. 1. 67., sed cum E. latifolio Hopp. et Schrad. confusum.

γ. *minus*, dodrantale, folia caulina fere ad apicem triquetrum reducta basi tantum limbo brevi canaliculato. Folia cito marcescunt, quia apex in omnibus varietatibus cito marcescit: E. angustifolium γ. alpinum Gaud. l. c. E. gracile Smith. engl. fl. 1. p. 69., non Koch. Non solum in alpibus, sed etiam in paludibus sylvaticis frigidis planitierum haec varietas occurrit. Omnes hae varietates formis intermediis confluunt.

6. **E. gracile** (Koch. ap. Roth. catalect. 2. p. 259.) culmo obsolete trigono, *foliis triquetris*, spiculis pluribus, *pedunculis tomentoso-scabris*. 4. In paludibus spongiosis turfosis. Mai. Jun. Praecedentibus serius. D. fl. 1. 457. E. triquetrum Hopp. Taschenb. 1800. St. h. 10. E. polystachyum γ. L. fl. suec. p. 17. sec. Wahlenb.

Trib. III. *CARICEAE*. Flores diclini.

9. ELŸNA (Schrader. flor. germ. 1. p. 155.) Spiculae biflorae, bractea fultae atque tectae. Gluma univalvis, valvulae margines basi connati. Setae hypogynae o. Flos spicularum inferior femineus. Ovarium stylo 1, stigmatibus 3. Nux trigona, basi persistente styli breviter mucronata. Flos superior masculus, breviter pedicellatus. Stam. 3. — N. ab E. gen. 9. 19.

1. **E. spicata** (Schrader. l. c.) 4. In summis alpibus, (Schwz., Tyrol, Kärnthen, Salzb., Steyerm., Görz.) Jun. Jul. D. fl. 1. 457. St. h. 26. Carex myosuroides Vill. delph. 2. p. 149. t. 6. C. Bellardi All. ped. 2. p. 264. t. 92. f. 2. C. Dufourii Lapeyr. abr. suppl. 140. Kobresia scirpina Willd. sp. 4. p. 205.

10. KOBRESIA (Willd. sp. 4. p. 205.) Spiculae uniflorae vel uniflorae cum rudimento secundi floris pedicellati; infimae in spica primaria quandoque biflorae, flore inferiore femineo, superiore masculo. Spiculae fem. Gluma univalvis, bractea (squama) tecta, ovario 1, stylo 1, stigmatibus 3. Pedicellus ad basin ovarii, rudimentum secundi floris, nodulum glumaceum, vel glumam cassam vel rarius, (in basi spicae primariae,) genitalibus masculis instructam gerens, et spiculam androgynam constituens. Spiculae masc. ex bracteae univalvi, genitalia mascula includente, (ut in floribus masculis Caricum,) constructae. Gluma o. Stam. 3; pedicello brevi insidentia. N. ab E. gen. 9. 20.

1. **K. caricina** (Willd. sp. 4. 206.) 4. In summis alpibus ad moles glaciales, (in d. Schweiz am Gletscher der Aar u. d. Rhone, Gemmi, auf d. Alpen v. Tyrol, Kärnthen u. Steyermark. Aug. Gaud. helv. 1. p. 138. St. h. 78. Elyna caricina D. fl. 1. p. 158. Schoenus monoicus Engl. bot.

v. 20. t. 1410. Carex mirabilis Host. a. 2. p. 674. — Carex hybrida Schk. plane aliam plantam refert.

11. CAREX (L. gen. n. 1046.) Flores unisexuales. Spiculae 2-multiflorae. Gluma univalvis. Fem. Ovar. 1, involucro proprio lagenaeformi inclusum. Styl. 1. Stigmata 2 vel 3. Fructus utriculum spurium, ex involucro persistente et aucto formatum, nucem includentem, exhibet. — Involucrum proprium respondet bracteae interiori ramulorum plantarum Cyperacearum hermaphroditarum, sicut gluma univalvis spicarum Caricum bracteae exteriori affinis est. Carex et Vignea N. ab E. gen. 9. 21. 22.

Sect. I. Psyllophorae Lois. fl. gall. ed. 2. v. 2. p. 282. Spicula solitaria in apice culmi. Arista ad fructus basin nulla*).

a. Stigmata 2; spiculae dioicae.

1. **C. dioica** (L. sp. 1379.) *spicula terminali solitaria dioica*, stigmatibus binis, fructibus erectiusculis ovatis multinerviis superne margine scabris, *foliis culmisque glabris*, radice stolonifera. 4. In pratis spongiosis paludosis frigidis planitierum; in reg. subalpinas adscendens, (stw. dch. d. Geb.) April. Mai. St. h. 69. C. Linnaeana Host. gram. t. 77. Occurrit spicula androgyna: C. dioica isogyna Fries. nov. mant. 3. p. 135. C. Metteniana C. B. Lehmann. — C. parallela Laestad. Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 214. diversam a Carica dioica speciem constituit.

2. **C. Davalliana** (Smith. brit. 3. 964.) *spicula terminali solitaria dioica*, fructibus recurvato-patentibus oblongo-lanceolatis subtiliter multinerviis superne margine scabriusculis, *foliis margine culmisque scabris*, radice fibrosa. 4. In pratis turfosis, sphagno repletis. April. Mai. St. h. 50. C. dioica Host. gram. t. 41. Variat raro spica inferne mascula, superne feminea et quidem in radice masculae plantae: S. Sieberiana Opitz. C. spicata Spreng. fl. halens. ed. 1. p. 258., secund. herbarium cl. auctoris et locum natalem „unter dem Tannenberge bei Gutenberg." conf. v. Schlechtend. in regensburg. bot. Ztg. v. 23. p. 322.

b. Stigmata 2; spiculae androgynae.

3. **C. pulicaris** (L. sp. 1380.) *spicula terminali solitaria androgyna superne mascula*, stigmatibus 2, *fructibus remotis oblongis utrinque attenuatis* enerviis reflexis, *glumis deciduis*, foliis setaceis. 4. In pratis pascuisque udis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 2. et 53. C. psyllophora L. suppl. 413.

4. **C. capitata** (L. sp. 1379.) *spicula terminali* solitaria androgyna *superne mascula* subrotundo-ovata, stigmatibus 2, *fructibus* dense confertis ovatis acuminatis *plano-compressis* laevissimis enerviis dorso convexiusculis *gluma* persistente *longioribus*. 4. In pratis vilioribus paludosis spongiosis planitierum et alpium, (Oberbayern am Wurmsee, Rothenbuch, im Deininger Moos b. München; Oberschwaben bei Grönebach und Nesselwang; Tyrol auf d. Seiseralpe.) Mai. St. h. 50. G.

c. Stigmata 3.

5. **C. obtusata** (Liljeblad vet. ac. handl. 1792. p. 69. t. 4.) *spicula terminali* solitaria lineari androgyna, *superne mascula*, stigmatibus 3, *fructibus gluma longioribus ovatis ellipticisve* turgidis nitidis *in rostrum* teres laeve apice album diaphanumque *bifidum acuminatis*, foliis linearibus planis. 4. In locis arenosis, (an einem Waldhügel bei Bienitz 2 Stunden von Leipzig von mir zuerst wiedergefunden, Kunze auf dem Zettelchen der mitgetheilten Pflanze.) Der Standort bei Halle wieder aufzusuchen, vergl. v. Schlechtend. in regensb. bot. Ztg. v. 23. p. 322. April. Mai. C. spicata Schk. caric. t. D. f. 15. St. h. 61. G.

---

*) Figura spicularum in toto genere e fructiferis descripta est.

6. **C. rupestris** (Allion. ped. 2. p. 264. f. 93. t. 2.) *spicula terminali* solitaria lineari androgyna *superne mascula*, stigmatibus 3 *fructibus obovatis rostro truncato brevissime rostratis* compresso-triquetris *gluma* persistente *brevioribus imbricatis*, foliis linearibus planis. 4. In alpibus altissimis ad rupes herbidas, (a. d. A. v. Wallis, a. dem Schlehern in Südtyrol; Glockner; Judenburger A. in Steyerm.; Manhardt in Görz; a. d. rothen Berge im Gesenke in Schles.) Jul. Aug. St. h. 61, fructum ustilagine corruptum refert. C. petraea Schk. t. kkk. f. 139 et C. rupestris t. nnnn. f. 200., copia iconis Allionii. Spicula fusca.

7. **C. pauciflora** (Lightf. flor. scot. 2. p. 543. t. 6. f. 2.) *spicula terminali solitaria androgyna subquadriflora*, flore masculo terminali subsolitario, stigmatibus 3, fructibus lanceolato-subulatis teretibus reflexis, squamis femineis caducis. 4. In pratis turfosis spongiosis planitierum, montium alpiumque, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. St. h. 61. C. patula Huds. angl. 402. C. leucoglochin L. suppl. 402. Spicula pallida.

Sect. II. Orthocerates. Spicula terminalis, solitaria. Arista ad nucis basin anteriorem filiformi-subulata, e ramulo abortivo orta.

8. **C. microglochin** (Wahlenberg. act. holm. 1803. p. 140.) *spicula terminali solitaria androgyna subduodecimflora*, floribus masculis subsenis terminalibus, stigmatibus tribus, *fructibus* lanceolato-subulatis compresso-teretibus reflexis, *arista basilari recta utriculum superante*. 4. In paludibus spongiosis, (auf d. Walliser Alpen; bei Aufkirchen gegen d. Staarenberger See in Oberbayern, auf d. Deininger Moos bei München. Rothenbuch an der Ammer, Südtyrol.) Mai., in Alpibus Jul. Aug. St. h. 61. Spicula dilute fusca.

Sect. III. Cyperoideae. Spiculae in capitulum subrotundum lobatumve, basi involucro 2-3 phyllo elongato cinctum, conglobatae. Plantae Cyperum referentes.

a. Stigmata 2. Spiculae basi masculae.

9. **C. cyperoides** (L. syst. veget. 703.) spiculis androgynis inferne masculis *in capitulum globosum involucro subtriphyllo elongato cinctum* conglobatis, stigmatibus 2, fructibus lanceolatis longissime rostratis bicuspidatis, radice fibrosa. 4. Ad margines lacuum et paludum, (Steyerm., Oestreich, Böhm., Mähr., Sachs., Franken, Baden, Oberschwaben.) Aug. Sept. St. h. 55. C. bohemica Schreb. gram. 2. t. 28. Schelhammeria capitata Moench. suppl. 119. Capitulum viride. G.

b. Stigmata 3. Spiculae apice masculae.

10. **C. baldensis** (L. sp. 1380.) *spiculis* androgynis superne masculis plerumque 3 *aggregatis in capitulum lobatum basi involucro diphyllo horizontaliter patente cinctum*, stigm. 3, fructibus cylindrico-oblongis obtusis brevissime rostratis. 4. In montosis ad ripas torrentium et in glareosis convallium subalpinarum et alpinarum, (Oberbayern am linken Ufer der Loisach v. Garnisch an u. weiter oben an d. Naidach, Dr. Einsele; südl. Tyrol weit verbreitet, Facchin.; Schweiz in der Egina, Zehnden Gombs, Lagger. Mai. Jun. St. h. 47. Capitulum album.

Sect. IV. Vigneae. Spiculae androgynae in spicam continuam vel interruptam dispositae, bractea fultae, quarum infima saepe in folium florale abit, quod, rarius tamen, etiam in sequentibus fit. Spicae in nonnullis speciebus paniculatae. — Vigneae genus, species dissimiles complectens, e solo stigmatum numero, natura non consentiente, constructum, haud admisi, nomen autem sectioni naturalissimae servavi. Quis est, qui Phyteumata et Polygona, stigmatibus duobus tribusve instructa, in plura genera divellat.

a. Stigmata 3. Spiculae superne masculae.

11. **C. gynomane** (Bertolon. rar. ital. pl. decas. 2. 1806.) *spiculis* androgynis 2-4 *superne masculis remotis laxifloris*, inferiore saepius pedunculata, bracteis foliaceis inferiore culmum superante, stigmatibus 3, fructibus remotis ellipticis rostratis binerviis, rostro apice membranaceo integro aut breviter bilobo. 4. In montosis et ad vias, (Istrien u. auf d. Inseln.) April. Mai. C. Linkii Schk. t. bbb. f. 118. 1808. St. h. 61. C. tuberosa Degl. in Lois. fl. gall. ed. 1. v. 2. p. 629. C. distachya Desf. fl. atl. 2. p. 336., secundum

Lois. fl. gall. ed. 2. v. 2. p. 284., sed diagnosis Fontanesii non quadrat. Spiculae pallidae. J.

12. **C. curvula** (Allion. ped. 2. p. 294. t. 92. f. 3.) *spiculis* androgynis superne masculis adpressis in *capitulum oblongum densissime aggregatis, stigmatibus* 3, fructibus oblongis triquetris in rostrum apice membranaceum bilobum sub apice margine scabrum attenuatis, radice fibrosa dense caespitosa. 4. In locis herbidis alpium, (Schweiz u. dch. Tyrol, Salzb., Kärnthen nach Steyerm.) Jul. Aug. St. h. 47., fructus, ustilagine corruptus, depictus est.

b. Stigmata 2; *spiculae superne masculae.*

* Radix stolones subterraneos elongatos agens.

13. **C. incurva** (Lightfoot. flor. scot. 544. t. 24. f. 1.) spiculis androgynis superne masculis in capitulum subrotundo-ovatum aggregatis, stigmatibus 2, *fructibus inflatis* gibbo-convexis acuminato-rostratis, *rostro laevi apice oblique truncato, culmo laevi* incurvo *folia aequante,* radice stolonibus elongatis repente. 4. In solo micaceo alpium graniticarum altissimarum, (a. d. höchsten Alpen d. Schweiz u. auf d. Schlehern im Südtyrol.) Jul. Aug. St. h. 47. C. juncifolia All. ped. 2. p. 264. t. 92. f. 4. Gaud. helv. 6. p. 39.

14. **C. chordorrhiza** (Ehrhart. in Linn. suppl. 414.) spiculis androgynis superne masculis in capitulum ovatum aggregatis, stigmatibus 2, fructibus ovatis nervoso-striatis in *rostrum margine laeve apice scariosum breviter bilobum acuminatis, culmo laevi* basi ramoso *foliis multo longiore,* radice stolonibus elongatis repente. 4. In paludibus profundis aquosis, (im nördl. D. von Ostfriesland dch. Holst., Lüneb. bis Ostpreussen, in Oberbayern, in Oberschwaben, Schlesien am See in der Heuscheuer, bei Kaiserslautern in der Rheinpfalz; in der Schweiz im C. Waadt u. Zürich.) Mai. Jun. St. h. 55. C. funiformis Clairv. man. 287.

15. **C. stenophylla** (Wahlenb. act. holm. 1803. p. 142.) spiculis androgynis superne masculis in capitulum ovatum oblongumve aggregatis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis dorso convexis 9-11 *nerviis* in rostrum *apice albido-membranaceum dorso emarginatum* margine serrulato-scabrum acuminatis, glumis acutis, culmo laevi apice scabriusculo, radice stolonibus elongatis. 4. In collibus herbidis, pratis, (Holst., nach Nolte; bei Prag in Böhmen, Gödinger Wald in Mähren, häufiger in Unteröstreich, auf der Schweinstratte bei Grätz, bei Cilli.) April. St. h. 47. C. juncifolia Host. syn. p. 504., Schk. caric. p. 26. t. G. f. 32., non Allion. C. glomerata Host. gram. t. 44. G.

16. **C. divisa** (Hudson fl. angl. ed. 1. p. 348.) spica composita ovata vel oblonga, spiculis oblongis confertis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus lato-ovatis* dorso convexis 3-11 *nerviis* in rostrum profunde et acute bifidum margine serrulato-scabrum acuminatis, *glumis fructum aequantibus,* culmo apice scabriusculo, *radice stolonibus elongatis repente.* 4. In pratis et locis humidis, (Steyermark, Unteröstreich, Littorale, Istrien.) Mai. Jun. St. h. 55. Schk. caric. t. R. et Vv. f. 61. C. schoenoides Host. gram. t. 4. C. austriaca Schk. caric. t. Qqq. f. 157. — Modificatio fructibus latioribus subrotundo-ovatis est: C. schoenoides K. Syn. ed. 1. p. 750. G.

17. **C. disticha** (Huds. fl. angl. 403.) *spica decomposita* oblonga densa vel inferne interrupta, *spiculis supremis et inferioribus femineis, intermediis masculis,* stigmatibus 2, *fructibus* ovatis plano-convexis 9-11 *nerviis margine angusto* serrulato-scabro cinctis in rostrum bidentatum acuminatis gluma longioribus, glumis acutis nervo ante apicem evanescente, culmo angulis scabro, *radice stolonifera.* 4. In pratis fertilibus humidiusculis. Mai. Jun. C. intermedia Good. act. soc. linn. 2. p. 154. St. h. 55. C. spicata Pollich. pal. 2. p. 562. C. arenaria Leers. herb. t. 14. f. 2. Ludit spiculis intermediis et superioribus masculis.

18. **C. arenaria** (L. sp. 1381.) *spica decomposita* oblonga vel subovata densa vel inferne interrupta, spiculis *superioribus masculis*, inferioribus femineis intermediis apice masculis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis plano-convexis, 7-9 *nerviis* a medio *ala dilatata* serrulato-scabra in rostrum bifidum adscendente cinctis, glumis acuminatis fructum aequantibus, culmo superne angulis scabro, radice stolonibus elongatis repente. 4. In locis arenosis German. septentrionalis et ad littora maris, (von Ostfriesland bis Preussen am Meeresstrande, landeinwärts bis Magdeburg u. Osnabrück; am Adriatisch. Meere.) Mai. Jun. St. h. 2. et 69. G.

** Radix fibrosa densum foliorum culmorumque caespitem agens, stolones autem nullos vel brevissimos.

19. **C. foetida** (Allion. fl. ped. 2. p. 265.) *spiculis* androgynis superne masculis *in capitulum subrotundo-ovatum aggregatis*, stigmatibus 2, fructibus *erectis* ovatis obsolete nervosis in rostrum *elongatum apice bifidum margine* serrulato-scabrum *acuminatis*, *culmo a basi angulis scabro*, radice breviter stolonifera. 4. In locis graminosis humidis summarum alpium, (Schweiz nicht sehr selten, in D. nur am Salendferner im südl. Tyrol.) Jul. Aug. St. h. 47.

20. **C. microstyla** (Gay. in Gaud. fl. helv. 6. p. 37.) spica composita ovata vel oblonga, *spiculis* numerosis oblongis acutis *plerumque dense congestis* superne masculis, vel masculis femineisque inmixtis, stigmatibus 2, *fructibus erectis* ovatis compressis *enerviis* glumam aequantibus *a medio sensim in rostrum attenuatis*, *rostro* margine subscabro *apice latere interiore integro* dorso fisso, culmo superne scabro, radice caespitosa brevesque stolones agente. 4. In alpibus altissimis (Berner und Walliser Alpen auch auf den Salzburger v. Mielichhofer entdeckt.) Jun.-Aug. C. lobata Schleicher, non All.

21. **C. vulpina** (L. sp. 1382.) *spica* decomposita *ovato-oblongo* densa vel elongata interrupta, spiculis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus squarroso-patentibus* ovatis *plano-convexis* in rostrum bifidum margine dense serrulato-scabrum acuminatis 5-7 *nerviis*, *glumis* mucronatis *fructu breviori-bus*, culmo angulis scaberrimo, *radice fibrosa*. 4. In paludosis ad fossas, rivos. Mai. Jun. St. h. 57. Variat:

β. nemorosa; glumis praeter striam dorsalem viridem albidis margine pallide brunneis: C. nemorosa Willd. sp. 4. 232. et Rebentisch, non Lumnitzer. Oritur in umbra sylvarum; bracteae elongatae et spica interrupta in C. vulpina vulgari non minus occurrunt, quam in varietate nemorosa. St. h. 57.

22. **C. muricata** (L. sp. 1382., sec. Smith. et Wahlenb.) *spica* composita *oblonga* densa vel basi interrupta, spiculis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus squarrosis*, inferioribus fere horizontaliter patentibus lanceolato-ovatis *plano convexis* in rostrum margine dense serrulato-scabrum acuminatis *enerviis* vel obsolete nervosis, glumis mucronatis fructu brevioribus, culmo angulis superne scabro, *radice* dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In pratis, ad vias, in sylvis. Mai. Jun. C. canescens Leers. herb. t. 14. f. 3. Pollich. pal. 2. 571. C. spicata Huds. angl. 405. C. contigua Hopp. ap. St. h. 61. Variat:

β. virens, glumis pallidioribus, spica saepe magis elongata et interrupta, fructibus viridibus saepeque paulo maioribus; in nemorosis et vepretis: C. nemorosa Lumnitzer poson. p. 418. C. virens Lam. dict. 3. p. 384. C. muricata var. loliacea Weih. in litt. C. loliacea Schreb. spicil. fl. lips. p. 64. C. muricata Hopp. ap. St. h. 61. C. divulsa Gaud. hev. 6. p. 47., non Good. Characterem vere distinguentem inter hanc varietatem et plantam vulgarem reperire non potui. Modificatio, rarius quidem occurrens, habet bracteam foliaceam, spicam superantem. Haec est C. virens Lam. proprie sic dicta.

23. **C. divulsa** (Good. tr. of. linn. soc. v. 2. p. 160.) *spica* composita *elongata,* spiculis apice masculis, superioribus approximatis, caeteris remotis,

infimis saepe compositis, infima longius remota plerumque pedicellata, stigmatibus 2, *fructibus erecto-patulis ovatis* plano-convexis in rostrum margine scabriusculum acuminatis enerviis vel obsolete nervosis, glumis mucronatis fructu brevioribus, *culmo gracili subnutante* superne scabro, rhizomate dense caespitoso stolonibus destituto. 4. In sylvis et nemoribus, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 57. O. F. Lang. Flora od. reg. bot. Ztg. v. 26. p. 146. Glumae albae stria dorsali viridi.

24. **C. guestphalica** (v. Bönninghausen in cat. sem. hort. monast. 1829.) *spica* composita *elongata,* spiculis apice masculis, superioribus approximatis, inferioribus remotis quandoque compositis, infima longius remota plerumque pedicellata, stigmatibus 2, *fructibus erecto-patulis subrotundo-ovatis* antice convexis in rostrum margine scabriusculum acuminatis enerviis vel obsolete nervosis, glumis mucronatis fructu brevioribus, *culmo gracillimo tenui denique arcuatim ad terram deflexo*, rhizomate dense caespitoso stolonibus destituto. 4. In uliginosis, (Westphalen v. Bönninghausen in brieflichen Mittheilungen.) Mai. Jun. C. guestphalica. O. F. Lang. Flora v. 26. p. 147. Num haec planta bona species sit, an varietas gracillima Caricis divulsae, propagatio ex seminibus docebit. G.

25. **C. teretiuscula** (Goodenough. tr. of. linn. soc. v. 2. 163. t. 19. f. 3.) *spica* composita vel *decomposita dense aggregata*, spiculis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *gibbo-convexis* nitidis *enerviis laevibus* dorso basi substriatis in rostrum bidentatum margine serrulatum scabrum attenuatis, glumis fructum subaequantibus, *culmo* superne scabro triquetro *faciebus convexiusculis, rhizomate obliquo subrepente.* 4. In pratis paludosis. Mai. Jun. St. h. 50. C. diandra Roth. tent. 1. 396. C. paniculata *β.* Pollich. pal. 2. p. 573. C. paniculata *β.* teretiuscula Wahlenberg. suec. p. 589. C. teretiuscula *β.* cylindrica Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 248. Variat:

β. maior, duplo saepe altior, radice magis caespitosa, spica crassiore magisque composita: C. teretiuscula *α.* Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 248. C. Ehrhartiana Hoppe. Haec etiam in Germania occurrit ulteriusque inquirenda est.

26. **C. paniculata** (L. sp. 1383.) *spicis paniculatis*, spiculis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *gibbo-convexis enerviis laevibus* dorso basi substriatis in rostrum bidentatum margine serrulato-scabrum acuminatis, glumis fructum subaequantibus, *culmo* superne scaberrimo triquetro *faciebus planis, radice fibrosa dense caespitosa.* 4. In locis paludosis spongiosis. Mai. Jun. St. h. 50. Haec, secundum synonyma et patriam, vera est Carex paniculata Linnaei.

27. **C. paradoxa** (Willd. act. acad. berol. 1794. p. 39. t. 1. f. 1.) *spicis paniculatis,* spiculis superne masculis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *gibbo-convexis* dorso anticeque *nervoso-striatis* in rostrum bidentatum margine serrulato-scabrum acuminatis, glumis fructum aequantibus, culmo superne scaberrimo triquetro, faciebus convexiusculis, radice fibrosa dense caespitosa. 4. In pratis turfosis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 50. C. paniculata Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 247., sec. specimina, ab ipso auct. accepta. C. paniculata Wahlenb. suec. p. 588. „Capita radicis semper fibris e nervis foliorum emortuorum ortis, tecta, quae in Carice teretiuscula et paniculata deficiunt.

e. Stigmata 2. *Spiculae basi masculae,* in spica simplici alternae, rarius (in C. axillari et Boenninghausiana) inferiores 2-3 aggregatae.

* Radix stolones elongatos agens.

28. **C. Schreberi** (Schrank. baier. flor. 1. p. 278. 1789.) spica composita, *spiculis* subquinis alternis *confertis rectis* ovato-oblongis inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus erectis glumam aequantibus oblongo-ovatis* plano-convexis *a basi fere margine serrulato-ciliatis in rostrum bifidum acuminatis, radice stolonibus elongatis repente.* 4. In arenosis, ad vias, (stw. durch

d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 61. C. praecox Schreb. spicil. p. 63. Spiculae spadiceae.

29. **C. brizoides** (L. sp. 1381.) spica composita subdisticha, *spiculis* subquinis alternis *approximatis curvatis* oblongo-lanceolatis *omnibus androgynis* inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus erectis glumam aequantibus lanceolatis* plano-convexis laevibus rostrato-attenuatis margine *a basi serrulato-ciliatis, rostro bifido, radice stolonibus elongatis repente.* 4. In nemoribus humidiusculis et graminosis, umbrosis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 50. Spiculae albidae.

30. **C. Ohmülleriana** (O. F. Lang. Flora od. regensb. bot. Ztg. v. 26. p. 240.) spica composita superne subdisticha, *spiculis* 8-12, *superioribus* 4-6 *masculis* approximatis lanceolatis denique saepe curvatis, inferioribus 2-4 remotis oblongo-obovatis basi masculis, infima bractea foliacea fulta, stigmatibus 2, fructibus erectis gluma sesquilongioribus lanceolatis in rostrum bifidum acuminatis plano-convexis *marginatis margine fere a basi serrulato-ciliatis, radice stolonibus elongatis* repente. 4. In pratis humidis, (bei Rothenbuch in Oberbayern von Pfarrer Ohmüller entdeckt.) Mai. Jun. Carici Boenninghausianae valde similis, sed spiculae inferiores non compositae, fructus evidentius marginati et rhizoma stoloniforme ad genicula folia culmosque agente satis diversa. G.

** Radix caespitem densum foliorum culmorumque agens, sed stolonibus plane destituta, vel brevibus tantum praedita.

31. **C. Boenninghausiana** (Weih. regensb. bot. Ztg. 9. 2. p. 743.) spica composita apice subdisticha, *spiculis* 8-12 alternis basi masculis, *superioribus lanceolatis approximatis basi apiceque vel totis masculis denique curvatis, inferioribus remotis* oblongo-lanceolatis *compositis,* infima bractea foliacea fulta, stigmatibus 2, *fructibus* erectis *glumam aequantibus* ovato-lanceolatis in rostrum bifidum acuminatis plano-convexis *margine fere a basi serrulato-scabris,* radice dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In pratis paludosis, (zwischen Halle u. Diessen in Westphalen, neben der Ammer bei Rothenbuch in Oberbayern.) Jun. Jul. St. h. 55. C. Boenninghauseniana Kunth. en. v. 3. p. 404. C. axillaris Fries. novit. mant. alt. p. 57., non Goodenough. G.

32. **C. remota** (L. sp. 1383.) spica composita, *spiculis* alternis inferne masculis, *inferioribus* 3-4 *remotis bractea culmum superante fultis,* omnibus simplicibus vel rarius infima composita, stigmatibus 2, fructibus erectis plano-compressis ovatis in rostrum bidentatum serrulato-scabrum acuminatis glumam superantibus, *culmo gracili debili arcuatim nutante,* radice dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In locis humidis umbrosis. Mai. Jun. St. h. 50.

33. **C. axillaris** (Goodenough. trans. of. linn. soc. vol. 2. p. 151. t. 19. f. 1.) spica composita, *spiculis* alternis inferne masculis, *inferioribus remotis compositis, infima bractea stricta culmum superante fulta,* stigmatibus 2, fructibus erectis plano-compressis ovatis in rostrum bidentatum serrulato-scabrum acuminatis glumam superantibus, *culmo stricte erecto,* radice dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In pratis paludosis, (bei Möllen im Lauenburgischen, von Rostkovius mitgetheilt, bei Driburg in Westphalen von Weihe gesammelt, in dem Herbar. v. Sonder.) Mai. Jun. St. h. 55. G.

34. **C. stellulata** (Goodenough. tr. of. linn. soc. v. 2. p. 144.) spica composita, spiculis sub 4 remotiusculis inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus squarroso-patentibus* plano-convexis ovatis *in rostrum bidentatum serrulato-scabrum acuminatis* subtiliter nervoso-striatis, bracteis spicula brevioribus, culmo laevi, radice fibrosa caespitosa. 4. In pratis humidis. Mai. Jun. St. h. 50. C. muricata Pollich. palat. 2. p. 565. C. echinata Murr. prodr. p. 76., nomen caeterum prioritate gaudens. Variat:

β. grypus, spiculis 3, magis approximatis, intensius brunneis rostroque fructuum saepe incurvato: C. grypus Schk. caric. t. Hhh. f. 193. K. syn. ed. 1. p. 753. Haec in summis alpibus; habitum fere C. lagopinae refert.

Formis intermediis in vulgarem plantam abit, talem exhibet: C. grypus St. h. 57. Conf. C. grypos O. F. Lang. Flora od. regensb. bot. Ztg. v. 26. p. 242. An prope Thun crestat certe non conscat, Thomas. eam cum C. Gaudiniana commiscuit.

35. **C. leporina** (L. sp. 1381.) spica composita, spiculis subsenis alternis approximatis subrotundo-ellipticis inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus erectis* plano-convexis ovatis in rostrum bidentatum acuminatis *nervoso-striatis margineque alato* serrulato-scabro in rostri apicem excurrente *cinctis*, radice caespitosa. 4. In pascuis, pratis, ad vias. Jun. Jul. St. h. 47. C. ovalis Good. tr. of. linn. soc. v. 2. 148. C. leporina Leers. herb. t. 14. f. 6. et omn. auct. ante Good. Haec certissime est C. leporina Linn., in flora suec. et sp. plant. proposita, ut indubitanter e descriptione elucet, sed excludentum est syn. e fl. lapp., ubi sub carice „spicis ternis sessilibus confertis androgynis" C. lagopina Wahlenberg. descripta continetur. Glumae griseo-fuscae, variant autem in umbra sylvarum:

β. argyroglochin, glumis albidis vel pallidis stria dorsali, ut in specie ipsa, virente: C. argyroglochin Hornem. fl. dan. t. 1710. St. h. 55. (In Holstein u. Lüneburg; in der Rheinpfalz v. mir selbst an einer Stelle und später v. F. W. Schultz an vielen Orten gefunden, im Taunus und wahrscheinlich noch anderwärts.) Praeter colorem glumarum nullam differentiam reperio.

36. **C. elongata** (L. sp. 1383.) spica composita, spiculis alternis approximatis cylindricis inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus patentibus lanceolatis* compressis dorso convexiusculis antice posticeque *nervoso-multistriatis in rostrum subintegrum* margine scabriusculum *attenuatis* gluma ovata longioribus subrecurvis, radice densum caespitem agente. 4. In pratis paludosis. Mai. Jun. St. h. 50. C. multiculmis Ehrh. calam. n. 88. Variat in montibus altioribus spiculis brevioribus. Haec est C. Gebhardi Willd. „fructibus oblongis nervosis attenuatis" Schk. caric. t. Hhhh. f. 192., quam sub hoc nomine Thomas. mecum communicavit. Verum Schk. ipse, conf. caric. 2. p. 22. n. 58., repetita observatione confitetur, eam a C. elongata diversam non esse.

37. **C. lagopina** (Wahlenberg. act. holm. 1802. p. 145.) spica composita, *spiculis tribus* subrotundo-ellipticis alternis *confertis* inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus erectis ovatis plano-convexis laevibus in rostrum integrum* margine glabrum *acuminatis* gluma paulo longioribus, *culmo laevi*, radice breviter stolonifera. 4. In summis alpibus graniticis locis graminosis humidis, (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. St. h. 47. C. leporina Herbar. Linnaei. Good. transact. of. linn. soc. v. 2. p. 148. in adnot. Smith. engl. fl. v. 4. p. 83. in adnot. Willd. sp. 4. p. 229. Schk. t. Fff. 129. C. Lachenalii Schk. t. Y. 79. C. approximata Hopp. cent., nomen antiquius quidem, sed ab auctore ipso sepositum. C. bipartita All. ped. 2. p. 265. sec. cl. Gay.

38. **C. Heleonastes** (Ehrhart. in Linn. suppl. 414.) spica composita, *spiculis* 3-4 subrotundis *approximatis* inferne masculis, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *compresso-triquetris laevibus in rostrum breve integrum* margine glabriusculum *acuminatis* gluma paulo longioribus, *culmo scabro*. 4. In pascuis paludosis turfosis, (hinter Ursprung bei Salzburg; Oberbayern, Oberschwaben, Cant. Bern.) Mai. St. h. 57.

39. **C. canescens** (L. sp. 1383.) spica composita, *spiculis* 5-6 ovato-oblongis *remotiusculis* inferne masculis, terminali basi longe attenuata, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *subtiliter-striatis* compressis dorso convexiusculis *in rostrum breve emarginatum postice non fissum* margine scabriusculum *acuminatis* gluma longioribus, radice caespitosa brevesque stolones agente. 4. In pratis humidis ad fossas, stagna. Mai. Jun. St. h. 50. C. cinerea Pollich. palat. 2. p. 571. C. curta Good. l. c. p. 145. C. elongata Leers. t. 14. f. 7. — C. canescens Pollich., quae per errorem sub C. elongata allegatur, est C. muricata et C. muricata ejusdem est C. stellulata. C. elon-

gata Pollich. est vera Linnaeana species. — Glumae albidae vel dilute testaceae et margine albidae.

40. **C. Persoonii** (Sieber. herbar. fl. austr. n. 282.) spica composita, *spiculis* 5-8, superioribus *plerumque dense approximatis* inferioribus remotis, omnibus ovatis inferne masculis, superiore basi brevissime angustata, stigmatibus 2, *fructibus* ovatis *subtiliter striatis* dorso convexiusculis *in rostrum breve postice per totam longitudinem fissum* margine serrulato-scabrum *acuminatis* gluma longioribus, radice caespitosa brevesque stolones agente. 4. In locis humidis uliginosis alpium. Jun. Jul. C. Persoonii O. F. Lang. Flora od. regensb. bot. Ztg. v. 25. p. 748. C. canescens β. brunnescens Koch. syn. ed. 1. p. 753. C. Gebhardi Hoppe caric. fl. 30., non Willd., nec Schk. C. Gebhardi St. h. 50. C. canescens β. alpicola Wahlenberg. suec. p. 595. Glumae brunneae.

41. **C. loliacea** (L. sp. 1382.) spica composita, spiculis subquatuor remotiusculis inferne masculis, fructiferis subrotundis, stigmatibus 2, *fructibus* ellipticis obtusis *crostratis ore integerrimis nervosis*, culmo laevi apice scabro, radice breviter stolonifera. 4. In pratis turfosis siccioribus inter frutices, (im Bourtanger Moore eine Stunde von Rhede im Kreis Meppen in Westphalen, Meyer. chlor. Hannov. p. 580.) Mai. St. h. 69. Spiculae pallidae. G.

Sect. V. **Legitimae.** Spica terminalis mascula, laterales femineae; rarius terminalis apice feminea, vel mascularum plures.

§. 1. Stigmata 2.

A. Fructus in rostrum marginatum, antice planum, terminati.

42. **C. mucronata** (Allion. fl. ped. 2. p. 268.) spica mascula solitaria lanceolata, femineis 1-4 approximatis dimidio brevioribus elliptico-subrotundis sessilibus, vaginis amplectentibus, infima in apicem setaceum terminata, stigmatibus 2, *fructibus* oblongis in rostrum marginatum bifidum antice planum attenuatis *pubescentibus margine ciliato-scabris* gluma acuta longioribus, *foliis setaceis canaliculatis*. 4. In pascuis petrosis alpium et reg. subalpinarum, (Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark, Salzburg, bayerische Alpen.) Jul. Aug., in subalpinis praecocius. St. h. 50.

43. **C. Gaudiniana** (Guthnick. in bot. Ztg. vol. 15. p. 241.) spica terminali lineari apice vel basi apiceque feminea rarius tota mascula *lateralibus* 2-3 *femineis conspicue brevioribus approximatis* sessilibus, bracteis membranaceis vagina destitutis, stigmatibus 2, *fructibus* glabris *e basi ovata in rostrum* latere anteriore planum margine serrulato-scabrum *apice bidentatum sensim attenuatis*, culmo superne obtusangulo, *foliis* anguste linearibus profunde canaliculatis, *apice plano-compressis* marginibusque scabriusculis. 4. In pratis uliginosis turfosis, (Hengster, eine grosse torfige Strecke bei Seligenstadt, Fl. d. Wett.; C. Bern bei Thun; Vorarlberg bei Bregenz; Tyrol bei Kitzbichel.) Jun. Jul. St. h. 69. Valde similis sequenti sed humilior et culmo, foliorum apice fructuumque forma certo diversa.

44. **C. microstachya** (Ehrh. Beitr. 2. p. 72.) spica terminali mascula vel apice feminea, *lateralibus* 2-3 *femineis conspicue brevioribus approximatis* sessilibus, bracteis membranaceis vagina destitutis, stigmatibus 2, *fructibus* glabris ovatis *in rostrum* latere anteriore planum margine glabrum vel obsolete denticulatum *apice breviter bidentatum acuminatis*, culmo superne acute triquetro, foliis anguste linearibus profunde canaliculatis apice argute triquetris marginibus scabris. 4. In pratis uliginosis turfosis, (Ostfriesland, bei Aurich, Schlutap in Holstein, Stettin in Pommern, zwischen der Schindel- und Giesemühle bei Wohlau in Schlesien.) Jun. St. h. 55. Planta valde gracilis, spicis tenuibus. G.

B. Fructus erostrati, vel rostro brevissimo terete, truncato, oblique abscisso aut bidentato terminati.

a. Bracteae non vaginantes vel brevissime vaginantes. Fructus glabri.

45. **C. stricta** (Goodenough. tr. of. linn. soc. v. 2. 196. t. 21. f. 9.) *spicis masculis* 1-2 femineis 2-3 erectis elongato-cylindricis sessilibus vel

inferioribus pedunculatis, bracteis basi utrinque auriculatis vagina destitutis, infima foliacea, stigmatibus 2, *fructibus* ellipticis *planis nervosis* glabris brevissime rostratis rostello terete integro, *foliorum vaginis omnibus margine reticulato-fissis,* culmo stricte erecto acute angulato scabro, radice dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In paludibus spongiosis, caespites maximos, densissimos formans, (zerstreut dch. d. Geb.) Apr. Mai. St. h. 50. Fructus maturi mox decidunt. Cl. Gayus hanc speciem ad Caricem caespitosam Linnaei fl. suec. p. 333. referre, existimat, cl. Friesius vero eandem in Carice Drejeri invenit. Cum autem hac de re botanici, etiam praestantissimi, nunquam consensuri sint, melius duxi, nomina eligere, quae quisque statim intelligat. Quid sit Carex stricta Good., omnibus botanicis notum nec ullo modo dubium est.

46. **C. Drejeri** (O. F. Lang. in Flora v. 25. p. 548.) spicis masculis 1-2 rarius 3 erectis oblongo-cylindricis breviter pedunculatis, suprema plerumque sessili, bracteis basi amplexantibus fere vaginaeformibus, utrinque auriculatis, infima foliacea, stigmatibus 2, *fructibus* ellipticis compressis *antice posticeque convexiusculis* punctulis minutissimis subtiliter scabris enerviis brevissime rostratis rostello tereti integro, *vaginis foliorum inferioribus reticulato-fissis,* culmo subflaccido acute angulato scabro, radice dense caespitosa stolonibus destituta. 4. In pratis udis paludosis, (bei Hamburg, Hannover, Leipzig.) April. Carice vulgari praecocius. C. pacifica Drejer. fl. exc. hafn. p. 292. C. caespitosa Linn. fl. suec. p. 332., ex sententia cl. Friesii. G.

47. **C. vulgaris** (Fries. novit. fl. suec. mant. 3. p. 153., C. caespitosa auctor.) *spica mascula solitaria* rarius gemina, femineis 2-3 rarius 4 erectis oblongo-cylindricis sessilibus, infima rarius pedunculata, bracteis basi brevissime auriculatis vagina destitutis, *infima* foliacea *culmo breviore* rarius eundem aequante, stigmatibus 2, *fructibus* glabris ellipticis *antice planis dorso convexiusculis multinerviisque* brevissime rostratis rostello terete integro, *vaginis non reticulato-fissis,* culmo stricte erecto acute angulato angulis scabro, radice laxe caespitosa stolonifera. 4. In pratis udis, pascuis sylvaticis humidis ubique. April. Mai. C. acuta *α.* nigra L. sp. 1388. C. caespitosa Good. trans. of. linn. soc. v. 2. p. 195. t. 21 f. 8. Koch. syn. ed. 1. p. 755. St. h. 50. et auctorum omnium usque ad nostra tempora. C. Goodenowii Gay. in Flora v. 23. p. 214. Forma humilior refert Caricem stoloniferam Hoppe ap. Sturm. h. 69. — Nomen Caricis vulgaris, licet serius inditum, anteposui, quum planta nostra absque dubio Carex nigra verna vulgaris Linnaei sit et facile in herbario Linnaeano alia affinis species, scilicet C. Drejeri, sub nomine Caricis caespitosae, deposita inveniri possit. Goodenowius illam a Carice vulgari, ut ab omnibus botanicis ad Drejerum usque factum est, non distinxit. Specimina Caricis caespitosae in herbario Linnaei asservata in eum finem denuo investiganda censeo.

48. **C. acuta** (L. sp. pl. 1388. var. *β.*) spicis masculis 2-3, femineis 3-4 elongato-cylindricis *florigeris nutantibus,* infima longius breviusve pedunculata, bracteis foliaceis basi utrinque brevissime auriculatis vagina destitutis, *infima culmum superante,* stigmatibus 2, *fructibus* glabris ellipticis compressis *subinflatis antice posticeque convexiusculis obsolete nervosis* breviter tenueque rostratis, rostello terete integro, *vaginis foliorum non reticulato-fissis,* culmo erecto acute angulato angulis scabro, radice stolonifera. 4. In paludosis ad fossas, ripas. Mai. St. h. 57. C. acuta *β.* ruffa L. sp. 1388. C. gracilis Curt. lond. t. 62. Fructus maturi prius decidunt, quam Caricis vulgaris.

49. **C. rigida** (Goodenough. tr. of. linn. soc. v. 2. 193. t. 22. f. 10.) *spica mascula solitaria,* femineis 3 erectis cylindricis sessilibus infima pedunculata, bracteis basi biauriculatis vagina destitutis, infima foliacea, stigmatibus 2, *fructibus* glabris ellipticis lenticulari-compressis subtrigonis *laevibus brevissime rostratis, rostello terete indiviso, foliis recurvis* vaginis foliorum integris, culmo acutangulo scabro, radice stolonibus elongatis repente. 4. In locis lapidosis paludosis montium altiorum, (auf d. Brocken, besonders am südl. Abhange; d. Riesengeb., Gesenke u. d. Schneeberg d. Grf. Glatz.)

Jun.-Aug. C. saxatilis Willd. sp. 4. 275., non L., St. h. 69. — C. saxatilis Linn. eadem planta est ac C. pulla Good. secund. specimina „in herbario Solandri, qui eam e Lapponia reportavit" Hartm. in litt. — Suecica specimina C. saxatilis Wahlenbergii et anglica C. rigidae Goodenovii cum nostra specie perfecte congruunt. Botanici suecici caeterum nuper dubia moverunt, num C. saxatilis L. in nostra planta, an in C. pulla quaerenda sit. G.

b. Bracteae vaginantes.

50. **C. bicolor** (All. ped. 2. p. 267.) *spicis pedunculatis, 3 in apice culmi confertis saepiusque quarta remota longius pedunculata bracteaque foliacea vaginante fulta,* terminali basi mascula, subsequentibus femineis, stigmatibus 2, *fructibus* glabris obovatis obtusis *erostratis* ore annuliformi integerrimis, glumis ovatis obtusis. 4. In alpibus graniticis editissimis, locis glareosis humidis, (Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 47. C. androgyna Balb. misc. p. 42.

§. 2. Stigmata 3, spica terminalis mascula, vel androgyna, floribus scilicet inferioribus masculis.

A. Fructus erostrati, vel rostro terete truncato oblique abscisso aut bidentato terminati.

a. Bracteae non vaginantes vel brevissime vaginantes. Fructus glabri.

51. **C. Buxbaumii** (Wahlenberg. act. holm. 1803. p. 164.) *spica terminali androgyna obovata inferne mascula,* femineis sub 3, infima breviter pedunculata remotiore bractea foliacea basi biauriculata vel brevissime vaginante fulta, stigmatibus 3, fructibus glabris ellipticis triquetris obtusis brevissime rostratis, rostello terete minute bidentato, glumis cuspidatis, *foliorum vaginis reticulato-fissis.* 4. In pratis uliginosis, (Schweiz nur bei Orbe im C. Bern; Baden bei Kirchzarten; Wetterau; bei Meppen in Westph.; bei Trittau in Holst.; Brieselang bei Berlin; bei Niesky in der Lausitz; Dolau bei Halle; Schlesien, Böhmen u. Mähren an mehreren O.; Franken bei Dechsendorf, fl. erlang.; Dachauer Moos in Oberbayern; Salzburg.) April. Mai. St. h. 61. C. polygama Schk. t. Gg. f. 76. C. subulata Schumach. saell. 1. p. 270.

52. **C. Vahlii** (Schkuhr caric. 1. 87. 2. 46. t. Gg. f. 44. et t. Ppp. f. 154.) *spicis 3 dense congestis breviter pedunculatis subrotundis, terminali androgyna basi mascula caeteris femineis,* bracteis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, infima anguste foliacea, stigmatibus 3, fructibus glabris ellipticis dorso convexis obtuse carinatis *trigonis* rostello brevi tereti minute bidentato terminatis, vaginis foliorum integris, *culmo laevi.* 4. In summis alpibus, (auf d. Albula u. im Val Bevers in d. Schweiz.) Jul. Aug. C. alpina Wahlenb. act. holm. 1803. p. 160. H.

53. **C. nigra** (Allion. ped. 4. p. 267.) *spicis 3 vel 4 dense aggregatis sessilibus vel breviter pedunculatis ovatis, terminali androgyna basi mascula,* caeteris femineis, bracteis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, infima anguste foliacea, stigmatibus 3, fructibus glabris obovatis *compressis dorso obtuse carinatis* rostello brevissimo terete minute bidentato terminatis, foliorum vaginis integris, *culmo laevi.* 4. In locis graminosis siccis alpium, (Schweiz, Tyrol, Kärnth., Steyerm.) Jul. Aug. St. h. 47. C. atrata γ. nigra Gaud. helv. 6. p. 65. C. parviflora Host. fl. a. 2. p. 586. Fructus violaceo-atri, margine virides.

54. **C. aterrima** (Hopp. caricolog. german. p. 51.) *spicis 3-5 confertis, omnibus oblongo-cylindricis erectis, terminali androgyna basi mascula,* femineis pedunculatis, infima longius pedunculata, bracteis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, infima foliacea, stigmatibus 3, *fructibus glabris* subrotundo-ovatis *compressis dorso obtuse carinatis* rostello brevi terete minute bidentato terminatis, foliorum vaginis integris, *culmo scabro.* 4. In locis graminosis udis alpium altissimarum, (Schweiz, Tyrol, Kärnth., Salzb., Steyermark.) Aug. St. h. 49. C. atrata β. dubia Gaud. fl. helv. 6. p. 65. Fructus violaceo-atri margine et basi virides, glumis atris latiores. Plerum-

que bractea sterilis foliacea sub spicis in superiore culmi parte, qualem in antecedente nondum vidi.

55. **C. atrata** (L. sp. 1386.) *spicis* 3-5 *confertis, terminali ovata androgyna basi mascula, femineis* oblongis pedunculatis *denique pendulis,* infima longius pedunculata, bracteis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, infima foliacea, stigmatibus 3, fructibus glabris subrotundo-ovatis *compressis dorso obtuse carinatis* rostello brevi minute bidentato terminatis, foliorum vaginis integris, *culmo laevi.* 4. In locis petrosis glareosis siccis alpium, (dch. d. g. Alpenk. und im Riesengeb. und Gesenke in Schles.) Jun.-Aug. St. h. 47. C. atrata *α.* varia Gaud. helv. 6. p. 62. Fructus virides, gluma atro-violacea latiores, siccati lutescentes.

56. **C. irrigua** (Smith. secund. Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 255.) spica mascula solitaria, *femineis* 2-3 subapproximatis cernuis pendulisve *longe tenuiterque pedunculatis* ovatis densifloris, bracteis anguste foliaceis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus subrotundo-ovalibus obtusis lenticulari-compressis glabris enerviis* vel obsolete nervosis rostello minuto terete truncato apiculatis glabris, *foliis* linearibus *planis* laevibus margine apicem versus scabris, radice stolonifera. 4. In paludosis spongiosis alpium editissimarum, (Salzb.; Kärnth.; Tyrol, Sudet., Schweiz.) Jul. St. h. 53. C. limosa *γ.* irrigua Wahlenberg. lapp. t. 15. f. 2. Simillima sequenti, sed spicis brevioribus et foliis planis latis facile distinguitur. Spica terminalis quandoque apice feminea, quod etiam in sequente observatur. „Differt a C. limosa spica mascula plerumque dimidio breviore, femineis itidem brevioribus 2-3, in C. limosa 1-2, nunquam 3, fructibus antice posticeque obsolete 2-3 nerviis vel plane enerviis, in C. limosa semper multinerviis, foliis planis, quae in C. limosa canaliculata sunt.“ O. F. Lang in sched.

57. **C. limosa** (L. sp. 1386.) spica mascula solitaria, *femineis* 1-2 subapproximatis cernuis pendulisve *longe tenuiterque pedunculatis* oblongis densifloris, bracteis anguste foliaceis basi biauriculatis vel breviter vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus subrotundo-ovalibus obtusis lenticulari-compressis glabris multinerviis* rostello minuto terete truncato apiculatis glabris, *foliis* anguste linearibus *complicato-canaliculatis* margine a basi fere scabris, radice stolonifera. 4. In locis uliginosis et paludibus muscosis. Mai. Jun. St. h. 53. Fructus perfecte maturi, lineis longitudinalibus notati sunt, quas in speciminibus siccis antecedentis speciei non reperio. Longitudo glumarum variat ut in antecedente.

58. **C. supina** (Wahlenb. act. holm. 1803. p. 158.) spica mascula solitaria lineari-lanceolata, *femineis* 1-2 *approximatis* dimidio brevioribus *subrotundis sessilibus,* bracteis membranaceis amplexicaulibus, inferiore cuspidata, stigmatibus 3, *fructibus subgloboso-ellipticis triquetris nitidis glaberrimis* in rostrum apice scariosum bilobumque acuminatis, radice stolonifera. 4. In collibus apricis, (Holst.; Hannov.; Pommern bei Stettin, bei Halle; Magdeb., Berlin; in Pommern, Böhmen, Mähr., Unteröstr.; Rheinfläche bei Mannheim u. Mainz.) April. Mai. St. h. 48. C. campestris Host. gr. 4. t. 88. G.

b. Bracteae non vaginantes vel brevissime vaginantes; fructus pubescentes vel tomentosi.

59. **C. pilulifera** (L. sp. 1385.) spica mascula solitaria, femineis subtribus approximatis subrotundis sessilibus, *bractea inferiore* lineari-subulata *non vaginante tota foliacea* erecto-patula, stigmatibus 3, *fructibus* subgloboso-ovatis trigonis breviter rostratis ore subemarginatis *pubescentibus,* glumis nervo excurrente mucronulatis, culmis fructiferis reclinatis, radice fibrosa. 4. In sylvaticis. April. Mai. St. h. 50. C. decumbens Ehrh. calam. 70. C. filiformis Pollich. palat. 2. p. 581. Fl. dan. t. 1048.

60. **C. tomentosa** (L. mant. 123.) spica mascula solitaria, femineis 1-2 subsessilibus cylindricis obtusis, *bractea inferiore* foliacea brevissime vaginante *horizontaliter patente,* stigmatibus 3, *fructibus* subgloboso-obovatis

trigonis breviter rostratis ore subemarginatis *hirto-tomentosis*, glumis acutis nervo in apicem excurrente, culmis stricte erectis, radice stolonifera. 4. In locis humidis, pascuis, pratis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 53. C. sphaerocarpa Ehrh. cal. 89. Vaginae foliorum purpureae. Spicis femineis compositis et spicis femineis omnibus superne masculis legi; ad posteriorem C. thuringiaca Schk. pertinere videtur, non Willd., quae secund. Kunth. en. 3. 459. progenies monstrosa Caricis glaucae est, spicis femineis subsessilibus subrotundis. Specimina Caricis Grassmannianae Rabenh., quae hucusque vidi, a Carice tomentosa distinguere non potui.

61. **C. montana** (L. fl. suec. ed. 2. p. 328.) spica mascula solitaria, femineis 1-2 dense approximatis ovatis, *bracteis totis membranaceis* amplexicaulibus aristatis vel apice foliaceo instructis, stigmatibus 3, *fructibus* oblongo-obovatis trigonis breviter rostratis ore emarginatis *hirto-pubescentibus*, glumis obtusis retusisve mucronatis, *radice fibrosa dense caespitosa*. 4. In sylvis et dumetis umbrosis. April. Mai. St. h. 2. et 69. C. collina Willd. sp. 4. 260. Glumae atrospadiceae; vaginae foliorum purpureae. Variat foliis pubescentibus: C. montana *β.* procerior Gaud. helv. 6. p. 76.

62. **C. ericetorum** (Pollich. hist. pl. palat. elect. 2. p. 580.) spica mascula solitaria, femineis 1-2 approximatis ovatis, bracteis membranaceis amplexicaulibus acutis aristatisve, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis brevissime rostratis ore truncatis *pubescentibus, glumis obovatis breviter ciliatis obtusissimis nervo ante apicem evanescente*, radice stolonifera. 4. In locis arenosis siccissimis, (in d. Schweiz bei St. Gallen u. Zürich; in D. stw. in allen Provinzen.) Apr. Mai. St. h. 57. C. ciliata Willd. act. ac. berol. 1794. C. montana Leers. herb. t. 16. f. 6. — Variat:

β. membranacea, glumis magis oblongis: C. membranacea Hoppe ap. St. h. 61. Haec, fortasse cum forma vulgari, in alpium editissimarum graniticarum locis apricis sterilibus, (auf d. A. d. Schweiz an vielen Orten; auf d. Pasterze am Grossglockner in Kärnthen.) Jul. Aug. St. h. 61. C. approximata All. ped. 2. p. 267., non Willd. nec Hopp.; nomen ambiguum.

63. **C. praecox** (Jacq. fl. austr. 5. p. 23. t. 446.) spica mascula solitaria, femineis 1-3 approximatis oblongo-ovatis, infima saepe pedunculata, bracteis margine membranaceis amplexicaulibus vel infima vaginante, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis breviter rostratis ore subemarginatis *pubescentibus*, glumis nervo excurrente mucronulatis, culmis erectis, *radice stolonifera*. 4. In collibus incultis, pratis siccis, ad vias. Mart. April. St. h. 69. C. montana Pollich. palat. 2. p. 578. C. filiformis Leers. herb. t. 16. f. 5. C. stolonifera Ehrh. cal. 99. Modificatio culmis altioribus in locis umbrosis nascens: C. umbrosa Host. gr. 1. t. 69. „radix repens" Host. Modificatio glumis emarginatis longe mucronatis est: C. mollis Host. gr. 4. t. 82., saltem planta, quam sub hoc nomine hucusque accepi. Modificatio culmo supra primam spicam infracto est: C. reflexa Hopp. caric. p. 65.; an etiam C. refracta Roth. tent. v. 2. p. 2. p. 431., ab Hoppio citata? descriptio non in omnibus partibus convenit.

64. **C. polyrrhiza** (Wallroth sched. p. 492.) spica mascula solitaria, femineis 1-3 approximatis oblongo-ovatis sessilibus infima subpedunculata, *bracteis margine membranaceis* amplexicaulibus, *infima vaginante*, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis breviter rostratis ore subemarginatis *pubescentibus*, glumis nervo excurrente mucronulatis, culmis erectis, *radice fibrosa dense caespitosa*. 4. In sylvis, (stw. im südl. und mittl. Geb.) Mai. C. umbrosa Hopp. ap. St. h. 57. Gaud. helv. 6. p. 80. C. longifolia Host. gr. 4. t. 85., (non Rob. Brown.) K. syn. ed. 1. p. 759. C. umbrosa Host. radicem repentem habet.

c. Bracteae vaginantes; fructus pubescentes.

65. **C. humilis** (Leysser. fl. hal. p. 175. n. 845. 1761.) spica mascula solitaria pedunculata, *femineis* 2-3 *remotis subtrifloris*, omnibus peduncu-

latis, *pedunculis bractea membranacea vaginante aphylla inclusis*, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis brevissime rostratis ore truncatis apice *pubescentibus*, foliis canaliculatis culmum superantibus, radice fibrosa caespitosa. 4. In collibus et montibus apricis solo calcareo, (stw. dch. d. Geb., wo Kalkboden sich vorfindet.) Mart. April. St. h. 2. et 69. C. clandestina Good. act. soc. linn. 2. p. 167. C. prostrata All. ped. 2. p. 267.

66. **C. gynobasis** (Vill. delph. 2. p. 206.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 subquinquefloris, *superioribus approximatis, infima subradicali longissime pedunculata*, bracteis inferioribus vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis triquetris brevissime rostratis ore subemarginatis nervosis *subtiliter pubescentibus*, radice fibrosa caespitosa. 4. In collibus graminosis, (südl. Schweiz, C. Wallis, Waadt, südl. Tyrol, Steyerm., im Littorale u. Unteröstr.) Mart. April. St. h. 47. C. alpestris All. ped. 2. p. 270. C. diversiflora Host. gr. 1. t. 70. Spicae pallidae.

67. **C. digitata** (L. sp. 1383.) spica mascula solitaria sessili, *femineis* subternis *linearibus remotiusculis pedunculatis*, fructibus laxifloris, pedunculis *bractea membranacea vaginante* oblique truncata inclusis, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis brevissime rostratis ore subemarginatis *pubescentibus glumam aequantibus*, radice fibrosa caespitosa. 4. In sylvis umbrosis. April. Mai. St. h. 61. Culmi florigeri in hac et sequente foliis minutis instructi, radicalibus carent, sed folia fasciculorum sterilium longa et latiuscula sunt.

68. **C. ornithopoda** (Willd. sp. 4. p. 255.) spica mascula solitaria sessili, *femineis* subternis *linearibus confertis pedunculatis*, fructiferis laxifloris, pedunculis *bractea membranacea vaginante* oblique truncata inclusis, stigmatibus 3, *fructibus* obovatis trigonis brevissime rostratis ore subemarginatis *pubescentibus gluma longioribus*, radice fibrosa caespitosa. 4. In sylvis umbrosis, praecedente rarior. April. Mai. St. h. 61.

d. Bracteae vaginantes; fructus glabri.

69. **C. alba** (Scopol. carn. 2. p. 216.) spica mascula solitaria pedunculata, femineis 2 pedunculatis *subquinquefloris*, *bracteis vaginantibus membranaceis aphyllis* dorso stria herbacea notatis, stigmatibus 3, *fructibus globoso-ovatis* striatis breviter rostratis *glabris* rostro terete apice membranaceo oblique truncato, foliis anguste linearibus, radice stolonifera. 4. In sylvis montanis et subalpinis inque planitiebus Alpes comitantibus, (von d. Jura an dch. d. g. Alpenk. u. dch. Oberbaden, Würtemberg u. Oberschwaben, Oberbayern bis Oestreich, nördlich bis an d. Donau.) Apr. Mai. St. h. 53. C. nemorosa Schrank. bayer. fl. 1. p. 291.

70. **C. nitida** (Host. gram. austr. 1. p. 53. t. 71.) spica mascula solitaria, femineis 2 oblongis densifloris, *inferiore exserte pedunculata* sub 12 flora, *superiore subsessili*, bracteis vaginantibus, inferiore foliaceo-mucronata, stigmatibus 3, *fructibus globoso-ovatis* striatis breviter rostratis *glabris*, rostro terete apice *albido-membranaceo bilobo*, foliis linearibus, radice stolonifera. 4. In collibus apricis sterilibus, (Unteröstreich bei Wien; Istrien; Krain bei Monfalcone; Steyerm.; südl. Tyrol; C. Wallis u. Waadt.) April. Mai. St. h. 47. C. verna Schk. caric. p. 89. n. 74. t. 1. f. 46. et t. Ppp. 156.

71. **C. pilosa** (Scopol. carn. 2. p. 226.) spica mascula solitaria pedunculata, femineis 2-3 remotis erectis exserte pedunculatis laxifloris, bracteis vaginantibus foliaceis, stigmatibus 3, *fructibus subgloboso-obovatis trigonis glaberrimis* striatis rostratis, rostro terete apice membranaceo oblique truncato, *culmis* laevissimis striatis *subaphyllis, foliis fasciculorum* sterilium culmos superantibus lato-linearibus *piloso-ciliatis*. 4. In sylvis montanis, (in d. Schweiz an mehreren Orten, doch selten; Oberbayern, Oberbaden; Krain, Kärnthen, Steyermark; in Unteröstreich, Mähren, Schlesien; zw. Förste u. Dorste im Fürstenthum Göttingen.) Apr. Mai. St. h. 55.

72. **C. panicea** (L. sp. 1387.) spica mascula solitaria pedunculata *semper erecta*, femineis plerumque 2 remotis erectis *laxifloris*, infima exserte pedun-

culata, *bracteis foliaceis* vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus subgloboso-ovatis* breviter rostratis glabris, *rostro terete truncato*, culmis laevibus basi foliosis, foliis linearibus glabris margine scabris, radice stolonifera. 4. In pratis et locis humidis. Mai. Jun. St. h. 50. Variat:

β. microcarpa, fructibus dimidio minoribus: C. panicea microcarpa Sonder. in litt.

73. **C. vaginata** (Tausch. bot. Ztg. 1821. p. 557.) spica mascula solitaria pedunculata *sub anthesi rectangule refracta*, femineis 2-3 remotis erectis exserte pedunculatis *laxifloris*, bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus subgloboso-ovatis trigonis glaberrimis* rostratis *rostro terete oblique truncato* emarginato, *culmis* laevissimis striatis *basi foliosis*, foliis lato-linearibus glabris apice margine scabris, radice stolonifera. 4. In locis aqua fontana irroratis reg. subalpinar., (Riesengebirg am Brunnenberge im Aupagrunde u. in d. Kesselgrube im Gesenke; auf d. Brocken am Brockenhause.) Jun. Jul. St. h. 61. C. phaeostachya Smith. engl. fl. 4. p. 99. C. salina Don. herb. brit. 216., non Wahlenb. C. tetanica Rchb. fl. exc. p. 63., non Schk. C. subspathacea Wormskiold. in fl. dan. t. 1530. Culmus rectangule refractus est ad spicam, quae flores explicat, explicatione peracta ad sequentem spicam eadem ratione refractus apparet, post anthesin autem totus erectus est. G.

74. **C. glauca** (Scop. fl. carniol. v. 2. p. 223.) spicis masculis *subbinis*, femineis 2-3 remotis *cylindricis densifloris longe pedunculatis denique pendulis*, bracteis foliaceis, infimis breviter vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus ellipticis obtusis rostelloque brevissimo subemarginato apiculatis compresso-convexis scabriusculis enerviis*, culmo laevi, foliis margine scabris, radice stolonifera. 4. In pascuis et sylvarum locis denudatis humidis, solo argillaceo; in Alpes adscendens. April. Mai. St. h. 53. C. recurva Huds. angl. 413. C. flacca Schreb. spic. app. n. 969. C. pendula Schreb. spic. p. 62. Forma spicis erectis brevius pedunculatis, glumis fructum superantibus: C. erythrostachys Hoppe; forma, nervo glumarum intermedio in mucronem herbaceum longitudinem totius glumae vel dimidiae attingentem, producta: C. acuminata Willd. sp. 4. p. 300., Schk. car. 2. t. Cccc. fig. 184., C. cuspidata Host. gram. 1. p. 71. t. 97.

75. **C. clavaeformis** (Hopp. ap. Sturm. h. 61.) spicis masculis *subbinis*, femineis 2-3 remotis *clavatis apice latioribus elongato-pedunculatis pendulis*, bracteis foliaceis, infimis breviter vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus elliptico-oblongis obtusis rostello brevissimo subemarginato apiculatis compresso-convexis scabriusculis enerviis*, culmo laevi, foliis margine scabris, radice stolonifera. 4. In Carniol., Carinthiae et Helvet. alpibus. Aug. Amic. Hoppius hanc speciem cum C. Mielichhoferi, (ferruginea Scop.,) et cum C. frigida comparat, ab his vero fructus fabrica longe recedit; mihi videtur proxima esse C. glaucae, a qua differt spicis clavatis, longius pedunculatis fructibusque magis oblongis.

76. **C. maxima** (Scopol. carn. 2. p. 229. 1772.) *spica mascula* solitaria *femineisque arcuatis denique pendulis*, femineis plerumque 4 distantibus cylindraceis elongatis densifloris superioribus incluse inferiore exserte pedunculatis, bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus* ellipticis *triquetris breviter rostratis* glabris, *rostro trigono* emarginato, culmo triquetro superne scabriusculo, foliis lanceolato-linearibus, radice caespitosa fibrosa. 4. In locis humidis sylvarum, (stw. in der Alpenkette; Vogesen, Schwarzwald, Oestreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, im südl. Theil von Hannover, Harz; bei Erlangen in Franken, Winningen an d. Mosel; Westphalen; Fiume.) Jun. St. h. 55. C. agastachys Ehrh. phytoph. n. 19. C. pendula Good. tr. of linn. soc. v. 2. p. 168.

77. **C. strigosa** (Hudson. fl. angl. 411.) spica mascula solitaria, *femineis* plerumque 4 distantibus cernuis *gracilibus laxifloris*, inferioribus exserte pedunculatis, bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus oblongo-lanceolatis nervosis trigonis attenuatis* ore oblique truncatis, radice stolonifera. 4. In locis sylvarum humidis, ad rivulos et fontes, (Westphalen;

Hannover; Holstein; bei Heidelberg; in d. nördl. Schweiz bei Basel u. Schaffhausen.) Mai. C. leptostachys Ehrh. phytoph. n. 48. St. h. 55. Planta viridis, glumae albae, stria dorsali viridi.

78. **C. pallescens** (L. sp. 1386.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 approximatis cernuis oblongo-ovatis densifloris exserte pedunculatis, bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus* elliptico-oblongis obtusis *erostratis* utrinque convexis subcompressis obsolete nervosis glabris ore minuto truncato, *foliis vaginisque inferioribus pilosis*, radice fibrosa caespitosa. 4. In pratis, pascuis humidis, sylvis caeduis. Mai. St. h. 53.

79. **C. capillaris** (L. sp. 1386.) spica mascula solitaria, *femineis* 2-3 longe pedunculatis cernuis *laxe* 5-10 *floris*, superioribus 2 oppositis masculam superantibus, tertia saepe remota, *bracteis* vaginantibus *foliaceis*, stigmatibus 3, *fructibus* ellipticis turgidis trigonis *basi apiceque attenuatis* glabris, rostro terete oblique truncato, foliis planis, radice fibrosa. 4. In locis petrosis graminosis humidis alpium; in subalpina descendens, (dch. d. g. Alpenk. u. auf d. Sudeten.) Jun. Jul. St. h. 53.

80. **C. ustulata** (Wahlenberg. act. holm. 1830. p. 156.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 subapproximatis pedunculatis pendulis ovatis densifloris, bracteis vaginantibus, vagina infima in mucronem foliaceum spica breviorem terminata, stigmatibus 3, *fructibus plano-compressis ovalibus glabris in rostrum teres apice bilobum abrupte acuminatis*, foliis planis margine apicem versus scabris, *radice fibrosa*. 4. In locis uliginosis alpium editissimarum, (Wocheiner Alpen in Krain; Margaritzen in Oberkärnthen, nach Hopp. caricolog.; Oestreich, Steyermark, Host.) Aug. St. h. 53. Schk. caric. 2. p. 73. C. atro-fusca Schk. caric. 1. p. 106. t. Y. n. 82. C. atro-fusca Hoppe gram.-cent. 1. n. 78. C. limosa Scop. carn. 2. p. 222. Glumae atrofuscae; fructus, ubi a glumis non teguntur, eodem colore tincti vel toti atro-fusci, margine tamen semper dilutiores viridesve. Auctoritate Hoppi et Hostii hanc speciem recepi, specimen enim in ditione florae nostrae collectum nondum vidi; de novo in alpibus nostris quaerenda est. Magnam omnino similitudinem habet cum Caricibus fuliginosa, frigida et atrata, tamen proprius inspecta facile distinguitur. Fructus ipsius ovati sunt apice abrupte in rostrum breve contracti, fructus Caricis fuliginosae et C. frigidae lanceolati sunt et sensim in rostrum longum attenuati. Carex ustulata proxime ad C. atratam figura fructus accedit, sed et hac bractea infima longe vaginata statim dignoscitur. G.

B. Fructus rostrati; rostrum marginatum, dorso convexiusculum, antice planum, apice bifidum, dentibus porrectis rarius subintegrum. Spica mascula solitaria quandoque apice feminea; rarius spicae masculae binae.

81. **C. fuliginosa** (Schkuhr. caric. 1. p. 91. t. Cc. n. 47.) *spicis omnibus pedunculatis subapproximatis, terminali androgyna basi mascula* clavata, femineis 2-3 oblongis densifloris, inferioribus denique pendulis, bracteis vaginantibus foliaceis, stigmatibus 3, *fructibus lanceolatis* glabris in rostrum marginatum serrulato-ciliatum bidentatum antice planum *attenuatis*, radice fibrosa caespitosa. 4. In locis glareosis graminosis alpium editissimarum, (Salzburg, Kärnthen, Tyrol, Steyerm., Krain, Oberöstreich.) Jul. Aug. C. fuliginosa Sternb. et Hopp. Denkschr. d. regensb. bot. Ges. 1815. p. 159. t. 3. St. h. 47. C. frigida Wahlenb. act. holm. 1803. p. 154., fl. carpat. p. 298. Host. gram. 4. p. 50. t. 90. Rostrum apice albido-marginatum icon Schkuhrii bene exprimit.

82. **C. frigida** (Allion. fl. ped. v. 2. p. 270.) spica mascula terminali lanceolata rarius apice feminea, femineis plerumque 4 oblongis *densifloris, suprema sessili, infima remota longissime pedunculata pendula*, bracteis vaginantibus foliaceis, stigmatibus 3, fructibus *lanceolatis glabris in rostrum marginatum serrulato-ciliatum* antice planum bidentatum *attenuatis*, radice stolonifera. 4. In locis petrosis humidis et ad torrentes alpium, (Vogesen, Schweiz, Tyrol, Salzb., Kärnth., Steyerm., auf d. Feldberge in Oberbaden, Sudet.) Jul. Aug. St. h. 53. C. fuliginosa Wahlenb. carp. p. 299. sub

C. frigida. C. geniculata Host. gr. t. 94. et C. fuliginosa Host. gr. t. 93. spicae atrofuscae „fuliginosae“ ut in antecedente, sed fructus cum nostro viridi-marginati sunt et nervus medius glumarum saepe viridis apparet, rostrum autem in apice non albido-marginatum est; in illa, C. fuliginosa, fructus toti fuliginosi sunt et orificium rostri apice linea albida cinctum est.

83. **C. sempervirens** (Villars. delph. 2. p. 214.) *spicis* oblongo-lanceolatis, mascula terminali solitaria, femineis plerumque 3 *sublaxifloris, inferioribus exserte pedunculatis erectis,* bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus ovato-lanceolatis in rostrum* marginatum *serrulato-ciliatum* antice planum *apice scarioso-bilobum acuminatis* dorso apicem versus hispidulis, foliis anguste linearibus erectis, fasciculorum sterilium elongatis, *culmorum florentium brevibus multoque minoribus,* culmo obtusiuscule angulato glabro, radice fibrosa *dense caespitosa.* 4. In alpium montiumque altiorum, alpes comitantium, locis gramineis siccioribus vulgaris, in convalles et planities vicinas descendens, (dch. d. g. Alpenk.) Jun.-Aug. C. sempervirens Dub. bot. gall. p. 494. C. sempervirens Vill. ob „folia longa flexibilia, certe nostram hic descriptam plantam, nec C. rigidam exhibet. C. ferruginea Schk. caric. 1. p. 92. t. M. f. 48. St. h. 53. DC. fl. fr. 3. p. 123. C. varia Host. gr. 1. t. 80. Variat fructibus glabris et margine tantum ciliatis atque

β. in superficie pilis brevibus adspersis: C. erecta DC. fl. fr. 3. p. 120. secund. Dub. bot. gall. p. 495.

84 **C. hispidula** (Gaud. fl. helv. v. 6. p. 88.) spicis oblongo-lanceolatis, mascula solitaria, femineis plerumque 2 erectis, *infima incluse rarius exserte pedunculata,* bracteis foliaceis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus ovatis marginatis serrulato-ciliatis in rostrum breviusculum* antice planum *cuspidibus* 2 *terminatum acuminatis,* dorso pubescentibus, foliis linearibus *culmeis et fasciculorum sterilium aequilongis* culmo dimidia brevioribus, culmo acute triquetro scabro, *radice stolonifera.* 4. In rupium fissuris alpium altissimarum, (Schweiz, im Wallis an dem Matterhorn über Zermatten und am Räfel über dem Bagnesthal.) Jul. Aug. C. fimbriata Schk. 2. n. 75. t. Uuu. f. 165. H.

85. **C. firma** (Host. synops. fl. austr. p. 509.) spica mascula solitaria, femineis plerumque 2 erectis densifloris ellipticis, superiore approximata subsessili, inferiore remota exserte pedunculata, bracteis vaginantibus acumine foliaceo spicam subaequante, stigmatibus 3, fructibus oblongo-lanceolatis glabris in *rostrum* marginatum serrulato-ciliatum antice planum *apice truncato-bilobum* acuminatis, *foliis lanceolato-linearibus trifariam patentibus rigidis.* 4. In locis petrosis humidis alpium, in subalpina descendens, (dch. d. g. Alpenk.; in d. Mähr. Karpat.) Jun. Aug. St. h. 57.

86. **C. ferruginea** (Scopol. carniol. 2. 245.) spica mascula solitaria, femineis duabus tribusve distantibus linearibus *sublaxifloris, omnibus exserte pedunculatis,* fructiferis nutantibus, bracteis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus* elliptico-oblongis trigonis in *rostrum* marginatum *serrulato-scabrum antice planum* apice breviter bidentatum *acuminatis,* foliis linearibus erectis, radice stolonifera. 4. In locis humentibus et uliginosis alpium, in subalpina descendens; (dch. d. g. Alpenk.) Jun. Jul. C. Mielichhoferi Schk. caric. Mmmm. f. 198. St. h. 53. C. Scopolii Gaud. helv. 6. p. 118. Variat:

α. fructibus glabris margine apicem versus scabris, et

β. fructibus margine evidentius ciliatis et in superficie apicem versus pilis brevibus, quemadmodum in C. sempervirente observantur, inspersis: C. spadicea DC. fl. fr. p. 120., (ob spiculas pendulas, excluso tamen synonymo Schkuhrii ad C. sempervirentem pertinente.)

γ. fructibus brevioribus et latioribus in superficie glabris vel puberulis: C. Scopolii *β.* Gaud. helv. 6. p. 110. S. Scopoliana Willd. sp. 4. 292.? Cl. Kunth formae vulgari adnumerat. Varietas parum notabilis, plurimae enim species fructibus latioribus angustioribusve, et longioribus et brevioribus variant.

87. **C. tenuis** (Host. gram. 4. t. 92.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 distantibus linearibus sublaxifloris, *omnibus exserte pedunculatis*, fructiferis nutantibus, bracteis vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus lanceolato-oblongis* in rostrum marginatum antice planum apice breviter bidentatum *attenuatis trigonis superficie margineque glabris, foliis setaceo-linearibus*, radice dense caespitosa simulque breviter stolonifera. 4. In locis petrosis humidis regionis inferalpinae, (stw. dch. d. g. Alpenkette, auf d. höchsten Gebirgen von Mähren.) Jun. Jul. C. brachystachys Schk. caric. tab. P. f. 58. St. h. 53.; nomen C. brachystachyos Schrank., ipso monente, e specimine imperfecto ortum duxit et plane incongruum est, hinc Hostianum anteposui.

88. **C. depauperata** (Goodenough. trans. of linn. soc. 2. p. 181.) spica mascula solitaria, *femineis* plerumque tribus remotis exserte pedunculatis erectis 3-6 *floris*, bracteis vaginantibus foliaceis spica multo longioribus culmum subaequantibus, stigmatibus tribus, *fructibus* elliptico-obovatis trigonis turgidis glabris in rostrum lineare elongatum margine serrulato-scabrum antice planum apice scariosum bilobum subito contractis *multinerviis nervis circiter triginta prominulis*, radice (secundum cl. Smith.) fibrosa. 4. In sylvis et inter vepreta, (südlich Istrien zwischen Pola u. Stignano Tommasin. Kästelwald bei Colmar, Kampmann.) Mai. Jun. C. ventricosa Curt. lond. fasc. 6. t. 68. C. triflora Schk. car. 94. t. M. f. 50. G.

89. **C. Michelii** (Host. synops. 507.) spica mascula solitaria, femineis 1-2 remotis ellipticis incluso-vel inferiore exserte pedunculatis erectis 6-12 floris, *bracteis vaginantibus spicam subaequantibus culmo multo brevioribus*, stigmatibus 3, *fructibus obovatis ventricoso-trigonis glabris in rostrum lineare elongatum* margine serrulato-scabrum antice planum *apice acute bifidum subito acuminatis* obsolete nervosis, radice stolonifera. 4. In montosis sylvaticis, (Mähren, Böhmen, Unteröstr., Littorale, Unterkärnthen, Südtyrol.) Mai. St. h. 55. Spicae pallidae. G.

90. **C. hordeistichos** (Vill. delph. 2. p. 221. t. 6.) *spicis masculis* 2, femineis 3 erectis ovatis densifloris, infima exserte pedunculata, *bracteis vaginantibus erectis foliaceis foliisque radicalibus culmo multo longioribus*, stigmatibus 3, fructibus ellipticis trigonis laevibus glabris in rostrum acute bifidum marginatum margine serrulato-scabrum antice planum acuminatis, culmo laevi. 4. In uliginosis ad fossas, (Unteröstreich u. Mähren, Istrien, Rheinpfalz zwischen Alzei u. Wörstadt.) April. C. hordeiformis Wahlenb. in act. holm. 1803. 152. Willd. sp. 4. 310. Schk. car. t. Ddd. f. 121., copia iconis malae a Villarsio datae, C. secalina Wahlenb. l. c. 151. Willd. sp. 4. 309. Schk. car. t. S. f. 65. Specimina gallica et germanica exacte conveniunt unamque tantum speciem constituunt. G.

91. **C. flava** (L. sp. 1384.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 subapproximatis subrotundo-ovatis, superioribus subsessilibus, infima plerumque incluse pedunculata, *bracteis foliaceis breviter vaginantibus denique patentissimis vel refractis*, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis inflatis nervosis glabris in *rostrum recurvatum*, antice planum margine *serrulato-scabrum* bidentatum acuminatis, culmo glabro, radice dense caespitosa fibrosa. 4. In locis paludosis, pratis humidis. Mai. St. h. 57. Variat secund. b. Gaud.

β. polystachya, spicis femineis 5-6: C. flava *β.* Gaud. helv. 6. p. 97. C. foliosa Gaud. agr. helv. 2. p. 191. C. uetliaca Sut. helv. 2. p. 251.

Carex lepidocarpa Tausch. pl. select. St. h. 69. notis claris a Carice flava distinguere non potui, fructus minores sunt et nostrum paulo brevius.

92. **C. Oederi** (Ehrhart. calam. n. 79.) spica mascula solitaria, femineis 2-3 approximatis subrotundo-ovatis, superioribus subsessilibus, infima incluse pedunculata, *bracteis foliaceis denique patentissimis vel refractis breviter vaginantibus vel infima remota et elongato-vaginata*, stigmatibus 3, fructibus subrotundis inflatis nervosis glabris in *rostrum rectum* antice planum margine *serrulato-scabrum* bidentatum acuminatis, culmo glabro, radice fibrosa

caespitosa. 4. In paludosis, ad margines lacuum, in fossis exsiccatis. Mai-Jul. St. h. 57. C. flava γ. et δ. Willd. sp. 4. 269.

93. **C. fulva** (Goodenough. tr. of linn. soc. v. 2. 177.) spica mascula solitaria, *femineis* 2, *infima remota* exserte pedunculata, *vel* 3 *superioribus duabus approximatis*, omnibus erectis ovato-oblongis densifloris, *bracteis longe vaginantibus, infima foliacea spicam masculam attingente vel superante*, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis subinflatis utrinque convexis nervosis glabris in rostrum bifidum rectum antice planum margine serrulato-scabrum acuminatis *patentibus, infimis saepe horizontaliter expansis, glumis acutis*, ligula oppositifolia ovata brevi truncata, culmo scabro, radice caespitosa, breviterque stolonifera. 4. In pratis humidis. Mai. Jun. St. h. 57. C. biformis α. sterilis Schultz. regb. bot. Ztg. v. 2. A. p. 55.

94. **C. Hornschuchiana** (Hopp. in regensb. bot. Ztg. v. 7. p. 599. 1824.) spica mascula solitaria, femineis plerumque 3 erectis ovato-oblongis densifloris, *infima longe remota* exserte pedunculata, *bracteis longe vaginantibus, infima anguste foliacea spicam superante*, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis subinflatis utrinque convexis nervosis glabris in rostrum bifidum antice planum margine serrulato-scabrum acuminatis *adscendentibus, glumis acutis*, culmo glabro vel apice scabriusculo, ligula oppositifolia ovata brevi truncata, radice caespitosa breviterque stolonifera. 4. In pratis humidis. Mai. Jun. St. h. 57. C. speirostachya Smith. engl. fl. 4. pag. 98. C. distans Fl. dan. t. 1049. C. binervis Wahlenb. fl. suec. p. 598. C. biformis β. fertilis Schultz. reg. bot. Ztg. C. Hosteana DC. cat. h. monsp. p. 88.? cl. auctor Caricem distantem Host. t. 77. citat, quam nunc conferre nequeo.

95. **C. distans** (L. sp. 1387.) spica mascula solitaria, femineis plerumque 3 erectis ovato-oblongis densifloris, omnibus longe remotis, infima exserte pedunculata, bracteis longe vaginantibus, infimis foliaceis spicam superantibus, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis trigonis subinflatis antice planiusculis in rostrum bifidum rectum margine serrulato-scabrum acuminatis glabris *nervosis, nervis lateralibus paulo magis prominulis, glumis ovatis obtusis mucrone scabro terminatis*, culmo glabro, ligula oppositifolia oblonga, radice caespitosa. 4. In pratis et pascuis humidis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. St. h. 53. Ligula oppositifolia elongata obtusa. Dentes rostri fructus latere interiore spinulis minutis obsiti, qua nota Carex distans a Carice fulva et C. Hornschuchiana optime distinguitur.

96. **C. binervis** (Smith. trans. of linn. soc. v. 5. 268.) spica mascula solitaria, femineis plerumque 3 erectis remotis densifloris, infima remotiore exserte pedunculata, bracteis vaginantibus, infimis foliaceis spicam superantibus, stigmatibus 3, *fructibus* trigonis *nervis* 2 *validis prominentibus* perductis *caeterum obsolete nervosis* in rostrum bifidum rectum serrulato-scabrum antice planum acuminatis glabris, *glumis ovatis obtusis mucrone scabro terminatis*, culmo laevi, ligula oppositifolia oblonga, radice caespitosa. 4. In ericetis siccioribus, (Westphalen zwischen Bentheim u. Nordhorn, v. Bönningh.; Holst., Nolte.) Mai. Jun. St. h. 55. Fructus purpureo-maculati, nervis 2 viridibus. Ligula ut in antecedente.

97. **C. extensa** (Goodenough. tr. of linn. soc. v. 2. 175. t. 21. f. 7.) *spica* mascula solitaria, femineis 2-4 oblongo-ovalibus subrotundisve densifloris, *superioribus sessilibus subcongestis, infima remotiuscula incluse pedunculata, bracteis longissimis culmo longioribus denique recurvato-patentissimis*, infima breviter vaginante, stigmatibus 3, fructibus ovatis utrinque convexis nervosis glabris in *rostrum* breve bidentatum *margine glabrum* acuminatis, glumis obtusis mucronulatis, culmo laevissimo, foliis anguste linearibus canaliculatis, radice caespitosa. 4. In locis humidis maritimis, (Ostfriesland, Lüneburg, Holstein, Meklenburg, Oestreich, Littorale, Schlesien? Mähren?) Jun. St. h. 57. C. nervosa Desf. fl. atl. 2. p. 337. G.

98. **C. punctata** (Gaud. agr. helv. 2 p. 152.) spica mascula solitaria, femineis plerumque 3 remotis erectis densifloris, *infima exserte pedunculata*, bracteis vaginantibus foliaceis elongatis, infima culmum subaequante vel

superante, stigmatibus 3, *fructibus ovatis* utrinque convexis obsolete nervosis in *rostrum breviter bidentatum margine glabrum* acuminatis, glumis acuminatis mucrone scabro terminatis, culmo laevissimo, *foliis anguste linearibus* planis, *ligula oppositifolia oblonga.* 4. In collibus graminosis, (bei Salzburg; im Cant. Tessin.) April. Mai. St. h. 61. Utriculi dilute virides, nitidi, e tela cellulosa subtilissime reticulata confecti, quo sub vitris acrioribus minutissime punctulati apparent.

99. **C. laevigata** (Smith. trans. of linn. soc. 5. 272.) spica mascula solitaria, rarius 2, femineis 3-4 remotis erectis cylindricis densifloris exserte pedunculatis, infima longe remota subpendula, bracteis foliaceis elongato-vaginatis, stigmatibus 3, fructibus ovatis utrinque convexis nervosis in *rostrum* margine scabriusculum *cuspidato-bifidum* antice planum acuminatis, *glumis* lanceolatis *attenuato-acuminatis* mucronatis, culmo laevi, *foliis lato-linearibus, ligula oppositifolia oblonga.* 4. In pratis humidis umbrosis, (im Geb. d. Flora v. Spaa bei Eupen, Malmedy u. Spaa; Veen bei Aachen; in Holstein bei Clausdorf in der Gegend von Kiel; Schweiz?) Mai. Jun. St. h. 55. C. biligularis DeC. cat. hort. monsp. 88. C. patula Schk. caric. 1. p. 115. t. Bbb. f. 116. Fructus subtiliter fusco-punctulati. Spicae dilute virides.

100. **C. sylvatica** (Huds. fl. angl. ed. 1. p. 353. 1762.) spica mascula solitaria, *femineis* 4 remotis *longe pedunculatis* pendulis linearibus *laxifloris,* bracteis foliaceis elongato-vaginantibus, stigmatibus 3, *fructibus ellipticis trigonis glabris laevissimis in rostrum lineare* marginatum *bifidum margine glabrum acuminatis*, culmo laevi, *foliis lato-linearibus,* ligula oppositifolia subnulla. 4. In sylvis. Jun. C. Drymeia Ehrh. in Linn. fil. suppl. 414. St. h. 55. C. vesicaria *β.* L. sp. 1389. C. patula Scopol. carn. 2. 226. t. 59. C. capillaris Leers. herb. t. 15. f. 2. Spicae pallidae.

C. Fructus rostrati, rostrum teres vel compressum, marginatum, bicuspidatum, cuspidibus patulis. Spicae masculae plerumque plures.

a. Bracteae non, vel breviter vaginantes. Fructus glabri.

101. **C. Pseudo-Cyperus** (L. sp. 1387.) spica mascula solitaria, femineis 4-6 longe pedunculatis pendulis cylindricis densifloris, bracteis foliaceis, inferioribus breviter rarius longius vaginantibus, stigmatibus 3, fructibus ovato-lanceolatis in rostrum bicuspidatum attenuatis nervosis glabris, *glumis lineari-subulatis scabris, culmo acutangulo angulis scabro.* 4 In paludosis sylvaticis, (stw. dch. d. Gebiet.) Jun. St. h. 57. Spicae pallide virides.

102. **C. ampullacea** (Good. tr. of linn. soc. v. 2. 207.) spicis masculis 1-3, femineis 2-3 remotis cylindricis breviter pedunculatis erectis densifloris, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus patentissimis subglobosis inflatis glabris dorso subseptemnerviis,* rostro lineari compresso bicuspidato, *culmo obtusangulo laevi.* 4 In locis paludosis, ad piscinas et ripas. Mai. Jun. St. h. 2 et 57. C. obtusangula Ehrh. calam. n. 50. C. vesicaria Huds ang. 413. Roth. tent. 2. 2. p. 466. C. vesicaria *β.* L. sp. 1389. Folia glaucescentia, spicae flavescentes.

103. **C. vesicaria** (L. sp. 1388.) spicis masculis 1-3, femineis 2-3 remotis oblongo-cylindricis sessilibus vel breviter pedunculatis erectis densifloris, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus oblique patentibus ovato-conicis inflatis* in rostrum compressum bicuspidatum attenuatis *glabris dorso subseptemnerviis, culmo acutangulo angulis scabro.* 4 In iisdem cum anteced. locis. Mai. Jun. St. h. 69. C. inflata Huds. angl. 412. Roth. tent. 2. 2. p. 466. C. vesicaria *α.* L. sp. l. c. Folia laete viridia. Spicae viridi-albidae Occurrit raro spica terminali androgyna, Prott.

104. **C. paludosa** (Goodenough. trans. of linn. soc. v. 2. 202.) spicis masculis 2-3, glumis inferioribus obtusis, spicis femineis 2-3 cylindricis erectis densifloris sessilibus pedunculatisve, glumis acuminatis cuspidatisve, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis vel oblongo-ovatis *compressis* subtrigonis *nervosis* in rostrum breve bidentatum acuminatis *glabris, culmo acutangulo angulis scabro.* 4. Cum antecedentibus. Mai. St. h. 53.

C. acuta Curt. lond. fasc. 4. t. 61. C. acutiformis Ehrh. calam. n. 30. Vaginae saepe margine reticulato fissae sunt quemadmodum in C. stricta, quod jam observavit Gaudin in fl. helv. 6. p. 131. Variat fructibus ovatis et

β. fructibus oblongo-ovatis. Haec, si glumae spicarum feminearum simul longa cuspide terminatae sunt est: C. Kochiana DC. cat. hort. monsp. 89. St. h. 69. C. spadicea Roth. tent. 2. 2. p. 461. — Spica terminalis in varietate α. et β. caeteris spicis crassior, ante anthesin trigona.

105. **C. riparia** (Curt. fl. lond. fasc. 4. t. 60.) spicis masculis 3-5, glumis cuspidatis, femineis 3-4 cylindricis erectis densifloris sessilibus pedunculatisve, glumis cuspidatis, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus ovato-conicis margine rotundatis utrinque convexis tenuiter multinervosis* in rostrum breve acute bidentatum transeuntibus *glabris, culmo acutangulo angulis scabro.* 4. Ad fossas fluviorum et piscinarum ripas. Mai. Jun. St. h. 69. C. crassa Ehrh. calam. n. 59. Omnium maxima.

106. **C. nutans** (Host. gram. v. 1. t. 83.) spicis masculis 1-2, femineis 3-4 cylindricis ovatisve erectis sessilibus vel inferioribus pedunculatis densifloris, glumis cuspidatis, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus ovato-conicis* margine rotundatis utrinque convexis *subtiliter impresso-striatis* in rostrum breve bicuspidatum attenuatis *glabris, culmo laevi* vel apice scabriusculo. 4. In umbrosis humidis, (im Laaer Wäldchen bei Wien; höhere Bergwälder bei Sulzbach nach Schwarzbach zu und bei Cilli in Steyerm.) April. Mai. St. h. 61. G.

b. Bracteae non vaginantes vel infima breviter vaginans. Fructus hirti.

107. **C. evoluta** (Hartm. scand. fl. ed. 1. p. 40.) spicis masculis 2-3, femineis 3 remotis cylindricis erectis densifloris sessilibus vel infima pedunculata, glumis cuspidatis, bracteis foliaceis evaginatis, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis turgidis *hirto-pubescentibus* in rostrum breve bicuspidatum transeuntibus, culmo acutangulo angulis scabro, *foliis planis culmo latioribus.* 4. Ad ripas, (bisher bloss am Ufer d. Donau im Steinhäule bei Ulm, v. H. v. Martens entdeckt.) Mai? St. h. 69. C. Kochiana Schübler et Martens fl. würtemb. p. 601., excl. syn. Roth. G.

108. **C. filiformis** (L. sp. 1385.) spicis masculis 1-2, femineis 2-3 remotis oblongis ovatisve erectis densifloris sessilibus, vel infima pedunculata, glumis mucronatis cuspidatisve, bracteis foliaceis, infima saepe breviter vaginante, stigmatibus 3, *fructibus* oblongo-ovatis turgidis *hirto-pubescentibus* in rostrum breve bicuspidatum transeuntibus, culmo obtusangulo laevi vel apice scabriusculo, *foliis canaliculatis culmo vix latioribus.* 4. In aquis stagnantibus et in paludibus profundis. Mai. Jun. St. h. 53. C. splendida Willd. prodr. n. 103. t. 1. f. 3. C. lasiocarpa Ehrh. gram. n. 19.

c. Bracteae longe vaginantes. Fructus hirti.

109. **C. hirta** (L. sp. 1389.) spicis masculis 2, femineis 2-3 erectis oblongo-cylindricis, inferiore pedunculata, suprema subsessili, glumis aristatis, bracteis foliaceis, infima longe vaginante, stigmatibus 3, *fructibus* ovatis in rostrum bicuspidatum acuminatis *hirtis,* culmo laevi, *foliis vaginisque pilosis.* 4. In locis arenosis humidis et siccis. Mai. Jun. St. h. 55. Spicae pallidae.

Ord. CXXXI. GRAMINEAE. Juss. gen. p. 28.

Flores (Flosculi Linn.) *glumacei,* hermphroditi vel unisexuales, in spiculas uni-multifloras dispositi. Gluma infima vacua, bivalvis, valvis distichis, rarius univalvis vel deficiens, gluma proprie dicta, Linnaeo gluma calycina audit. Glumae sequentes bivalves vel potius 3 valves, valvulis, paleis, 2 interioribus in unam margine connatis, glumellam, corollam Linnaeo, constituunt, et squamulas 2-3, cum valvulis 3 glumellae alternantes, perigonium interius significantes cum genitalibus includunt, floremque formant. Stam. 3, squamulis alterna, rarius 6, vel abortu 2, 1, hypogyna. Antherae basi apiceque

emarginatae. Ovar. liberum; styli 2 vel 1, stigmatibus 2*). Caryopsis semen nudum referens. *Albumen farinaceum. Embryo extra albumen ad huius basin situs.* Caulis, culmus dictus, nodis, folia gerentibus, instructus. *Foliorum basis,* (petiolus,) *in vaginam antice fissam convoluta,* apice ad basin folii membranulam, ligulam, e stipula intrapetiolari, cum superficie interiori vaginae connata, (ut in Potamogetone pectinato) ortum ducentem, edit.

Trib. I. *OLYREAE.* Nees. ab Esenb. *Flores monoici;* masculi femineis dissimiles.

1. ZEA (L. gen. n. 1042.) Monoica. Flores masculi terminales, racemoso-paniculati. Spicula biflora, flore utroque sessili. Gluma 2 valvis; glumella 2 paleacea. Flores feminei in spicas axillares vaginis involutas, dispositi. Spicula biflora, flore altero neutro. Gluma 2 valvis; glumella 2 paleacea, valvis paleisque carnoso-membranaceis, transverse oblongis, convolutis. Stylus longissimus, stigma subtiliter ciliatum. Caryopsides subrotundo-reniformes, in series 8, per paria approximatas dispositae, axi carnoso insertae. N. ab E. gen. 14. 19. 20.

1. **Z. Mays** (L. sp. 1378.) ☉. Ex America australi allata, in usum oeconomicum colitur. Floret aestate. N. ab E. l. c. icon. Mays Zea Gärtn. fruct. 1. p. 6. t. 1. Colit.

Trib. II. *ANDROPOGONEAE.* Kunth. enum. 1. p. 470. *Spiculae a dorso compressae,* 1 *florae cum rudimento floris inferioris* paleaceo vel cum flore inferiore masculo. Valva inferior maior. Styli longi; stigmate aspergilliformi, sub apice floris emergente. — Spiculae *ad articulos* spicae vel paniculae, maturitate plerumque fragilis et geniculis secedentis, *geminae,* altera sessili, altera pedicellata; *terminales ternae, lateralibus pedicellatis, intermedia sessili.*

2. ERIÁNTHUS (Richard. in Palis. de Beauv. agr. p. 14.) Spiculae omnes hermaphroditae; caetera ut Andropoginis.

1. **E. Ravennae** (Pal. d. Beauv. agr. 14.) panicula ramosissima, foliis carinatis, valvis spiculae sessilis glabris, spiculae pedicellatae basi pilosis, pilis spiculam cingentibus eamque aequantibus. 4. In arenosis humidis reg. austr., (auf der Insel Cherso, Sansego.) Jul. Andropogon Ravennae L. sp. 1481. Saccharum Ravennae L. syts. veg. p. 88. D. fl. 1. p. 537. Reichenb. ic. 11. f. 1505. J.

3. ANDROPÓGON (L. gen. 1145.) spiculae lineares, ad articulos geminae; altera sessili, hermaphrodita, altera pedicellata mascula; terminales 3, intermedia sessili; omnes 1 florae, cum rudimento floris inferioris unipaleaceo, rarius (in extraneis) cum flore inferiore masculo, bipaleaceo. Gluma 2 valvis; valva inferior dorso planiuscula, ecarinata; superior dorso carinata. Paleae hyalinae, 3, intermedia, (palea inferior floris hermaphroditi,) aristata. Styli elongati, stigmata aspergilliformia, sub apice spiculae emergentia. — In Androp. Gryllo spiculae 3 terminales tantum adsunt, laterales deficiunt.

Sect. I. Dactylopogon. Spicae digitatae vel racemosim dispositae, spiculis lateralibus et terminalibns obsitae. Andropogon N. ab E. gen. 14. 3.

---

*) Stigmata optimos praebent characteres in difficili hoc ordine; sunt
1. filiformia, quae ex apice floris emergunt et stylo elongato, superne, vel etiam a basi, pilis brevibus undique et laxe adsperso, formantur;
2. aspergilliformia: formantur stylo elongato, superne pilis longioribus densius congestis undique obsito, atque sub apice vel e medio floris utrinque emergunt;
3. plumosa: in basi floris egrediuntur, vel ibidem inclusa occultantur, stylo brevi vel ovario ipso insident et saepe ex pilis distichis vel unifariam ad latus superius directis composita sunt.

1. **A. Ischaemum** (L. sp. 1483.) *spicis* 5-10 *digitato*-congestis, glumis striatis, valva inferiore spiculae hermaphroditae a basi ad medium fere pilosa, spiculae masculae glabra rachi pedicellisque pilosis. 4. In siccis apricis, praecipue solo calcareo, (im südl. u. mittlern Gebiete., nördlich bis Quedlinburg). Jul. Aug. D. fl. 1. p. 639. St. h. 52. A. angustifolius Sm. prodr. fl. graec. v. 1. p. 47.

2. **A. pubescens** (Visiani regensb. bot. Ztg. 1829. 1. Erg. bl. p. 3.) *spicis in apice pedunculorum geminis*, pedunculis elongatis folio glabro vaginatis paniculatis, *valva inferiore spicularum pilosa*, superiore glabra vel apice parce pilosa, arista spiculae hermaphroditae spicula ipsa sextuplo longiore, rachi pedicellisque pilosis. 4. In pratis siccis et collibus, (Insel Sansego, Lossino, Tommasini.) Aug. Sept. J.

3. **A. distachyus** (L. sp. 1481.) spicis terminalibus geminatis, *spiculis glabris*, culmo simplici erecto. 4. In collibus asperis, apricis, (Istrien u. a. d. benachbarten Inseln.) Jul. D. fl. 1. p. 640. St. h. 52. Pollinia distachyos Spreng. syst. 1. 288. Specimen e loco memorato nondum vidi. J.

Sect. II. Chrysopogon. Rami paniculae verticillati. Spiculae terminales 3, laterales nullae. Chrysopogon N. ab E. gen. 14. 1.

4. **A. Gryllus** (L. sp. 1480.) paniculae ramis simplicibus, *spiculis* 3 *terminalibus*, *lateralibus nullis*, pedicellis basi barbatis. 4. In collibus et pratis siccis reg. calid., (Istrien, Litt., südl. Tyrol; C. Tessin.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 541. St. h. 52. Chrysopogon Gryllus. Trin. fund. 188.

4. HETEROPÓGON (Persoon. syn. 2. p. 533.) Spiculae ad articulos geminae, terminales 3; sessilium inferiores herbaceae et masculae, superiores cartilagineae et femineae staminibusa bortientibus; pedicellatae omnes masculae. Caetera ut Andropoginis.

1. **H. Allionii** (Roem. et Schult. syst. 2. 835.) spiculis masculis glabris 4. In locis rupestribus reg. calid., (bei Botzen im südl. Tyrol; C. Tessin.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 544. H. glaber Pers. l. c. Andropogon Allionii DC. fl. fr. 3. 97. A. contortum All. ped. t. 91. f. 4., non Linn.

5. SORGHUM (Persoon. syn. 1. p. 101.) Spiculae ovatae vel oblongo-ovatae, valvis apice tridentatis; caetera ut Andropoginis. N. ab E. gen. 14. 2.

1. **S. halepense** (Pers. l. c.) panicula patente, spiculis, hermaphroditis oblongo-lanceolatis, masculis lanceolatis pedicello spiculam dimidiam subaequanti insidentibus, radice stolonifera. 4. In vineis et collibus sterilibus, (östr. Litt., Istrien, südl. Tyrol.) Jun. Jul. Andropogon halepensis Sibth. fl. graec. 1. t. 68. D. fl. 1. 542. St. h. 52. A. avenaceus Humb. et Kunth. nov. gen. 1. 189. A. arundinaceum Scop. carn. 2. p. 274. Holcus avenaceus L. sp. 1485. Trachypogon avenaceus Nees ab E. in Mart. brasil. 2. 354. G.

2. **S. saccharatum** (Pers. syn. 1. 101.) ramis paniculae ad medium fere nudis, florentibus patentissimis, fructiferis erectis, spiculis hermaphroditis obovato-ellipticis, masculis lanceolatis pedicello spicula quadruplo breviore insidentibus, radice fibrosa. ☉. Colitur in usum oeconomicum, (in den südlichsten Gegenden des Gebietes.) Jul. Aug. Holcus saccharatus L. sp. 1484. Colit.

3. **S. vulgare** (Pers. syn. 1. 101.) panicula ovato-oblonga conferta, spiculis hermaphroditis obovatis, masculis oblongo-lanceolatis brevissime pedicellatis, radice fibrosa. ☉. Colitur in usum oeconomicum, (in den südlichsten Gegenden des Gebietes.) Jul. Aug. Holcus Sorghum L. sp. 1484. Colit.

Trib. III. *PANICEAE* Kunth. en. 1. p. 40. *Spiculae a dorso compressae* et dorso convexae, antice planae vel planiusculae, 1 *florae vel uniflorae cum rudimento floris inferioris*, valvam tertiam referente. Gluma

bivalvis, *valva inferior minor, saepe minima, lateri plano vel planiusculo spiculae adpressa. Styli elongati, stigmata aspergilliformia* sub apice floris emergentia.

6. TRAGUS (Desfont. fl. atlant. 2. p. 386.) Spiculae dorso convexae, antice planae, a dorso compressae, 1 florae. Gluma bivalvis, valva inferior minuta, membranacea, lateri plano spiculae incumbens, nuda; superior coriacea, spinosa, glumellam membranaceam 2 paleaceam includens. N. ab E. gen. 13. 10.

1. **T. racemosus** (Desf. l. c.) ⊙. In arenosis reg. calid., (Wagram bei Wien, Istrien, Littoral., südl. Tyrol, Wallis.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 724. Cenchrus racemosus L. sp. 1487. Lappago racemosa Schreb. gen. pl. 1. n. 31. Willd. sp. 1. 484. St. h. 34.

7. PÁNICUM (L. gen. n. 76.) Spiculae dorso convexae, antice planae vel planiusculae, 1 florae cum flore inferiore unipaleaceo, neutro vel rarius masculo valvam tertiam referente. Gluma trivalvis, (valva tertia est palea inferior floris neutrius vel masculi memorati, cuius palea superior deficit.) Glumella cartilaginea vel coriacea. Involucrum nullum.

Sect. I. Digitaria Scopoli. Syntherisma Schrad. Spiculae in spicas simplices subdigitatas dispositae, binae, altera longius pedicellata. — Digitaria N. ab E. gen. 13. p. 7.

1. **P. sanguinale** (L. sp. 84.) *spicis* subquinis *digitatis* erecto-patulis, foliis vaginisque subpilosis, spiculis oblongo-lanceolatis, *palea flosculi neutrius glabra margine pubescente* in nervo laterali extimo *ciliis destituta.* ⊙. In locis cultis, ad vias arenosas. Jun. in autumn. D. fl. 1. p. 465. Digitaria sanguinalis Scop. carn. 1. p. 52. Reichenb. ic. 11. f. 1407. Paspalum sanguinale Lam. ill. n. 938. Dactylon sanguinale Vill. delph. 2. p. 59. Syntherisma vulgare Schrad. germ. 1. 161.

2. **P. ciliare** (Retzius obs. 4. 16.) *spicis* subquinis *digitatis* erecto-patulis, foliis vaginisque subpilosis, spiculis oblongo-lanceolatis, *palea flosculi neutrius glabra margine pubescente in nervo laterali extimo hispido-ciliatis.* ⊙. In arvis sabulosis, (C. Tessin, südl. Tyrol, Steyerm.; v. Basel auf d. Rheinfläche bis Mainz; Kärnthen, Böhm.; bei Stettin in Pommern.) Jul.-autum. D. fl. 1. p. 464. Digitaria ciliaris Koel. gram. 27. Paspalum ciliare DC. fl. fr. 5. p. 250. Syntherisma ciliare Schrad. germ. 160. t. 3. f. 7. N. ab E. l. c. ic.

3. **P. glabrum** (Gaudin. agrost. helv. 1. p. 22.) *spicis* plerumque ternis *digitatis*, foliis vaginisque glabris, *spiculis ellipticis pubescentibus in nervis glabris.* ⊙. In arvis et agris arenosis. Jul.-autumn. P. Ischaemum Schreb. in Schweigg. et Kört. fl. erlang. 1. 16. P. humifusum Kunth. gram. 1. 33. P. lineare Krock. siles. n. 98. P. sanguinale Pollich. palat. 1. p. 57. Digitaria filiformis Koel. gram. 26. Paspalum ambiguum DC. fl. fr. 3. p. 16. Syntherisma glabrum Schrad. germ. 165. t. 3. f. 7.

Sect. II. Echinochloa Beauv. Spiculae paniculatae, panicula e spicis unilateralibus compositis formata. Valvae in mucronem vel aristam scabram attenuatae. N. ab E. gen. 13. 8.

4. **P. Crus-Galli** (L. sp. 83.) *spicis* alternis oppositisque *compositis* linearibus, spiculis approximatis *aristatis*, rachi basi quinquangulari. ⊙. In agris et locis cultis subhumidis, ad fossas. Jul. Aug. D. fl. 1. 467. Echinochloa Crus-galli Beauv. agr. 53. Variat:

α. palea floris neutrius breviter aristata. Reichenb. ic. 11. 1411.

β. palea floris neutrius longe aristata. Reichenb. ic. 11. 1412.

Sect. III. Milium. Spiculae paniculatae. Panicula effusa vel glomerata, valvae in aristam brevem acuminatae vel muticae. Panicum N. ab E. gen. 13. 6.

5. **P. miliaceum** (L. sp. 86.) *panicula ampla*, effusa *cernua*, foliis lanceolatis vaginisque pilosis, valvis acuminato-mucronatis. ⊙. Ex Oriente allatum, in usum oeconomicum colitur. Floret aestate. N. ab E. l. c. ic. P. Milium Pers. syn. 1. 83. Colit.

6. **P. capillare** (L. sp. 86.) *panicula ampla*, patente, *ramis tenuissimis*

strictus, valvis acuminato-mucronatis, foliis vaginisque hirsutissimis. ⊙. In cultis circa Vindobonam nunc spontaneum factum, ex America boreali allatum. Floret aestate. G.

Sect. IV. Oplísmenus Pallis. Orthopogon Rob. Brown. Spiculae in fasciculos pauciflores vel spicas breves, rachi communi alternatim per intervalla insidentes, dispositae. Valva inferior longissime aristata. N. ab E. gen. 13. 10.

7. **P. undulatifolium** (Arduin. specim. 2. 14. t. 4.) *fasciculis sub* 10 *in spicam interruptam dispositis pauciflori*s, valvis glabris ciliatis aristatis, aristis glabris obtusis, rachi culmo vaginisque hirsutis pilis patentibus, foliis ovato-lanceolatis undulatis. ⊙. In sylvis umbrosis reg. calid., (Cant. Tessin; südl. Tyrol; östr. Litt. bei Aquileja.) Aug. Sept. D. fl. 1. p. 462. P. hirtellum Wulf. ap. Jacq. collect. 1. p. 263., (certissime, ut ex optima descriptione patet.) Allion. ped. 2. 240., non L. P. Burmanni M. Bieb. tauric. cauc. 3. p. 58. Oplismenus undulatifolius Kunth. en. 139., excl. syn. Host. Orthopogon undulatifolius Spreng. syst. 1. 306. Reichenb. ic. 11. f. 1409. — Panicum Burmanni Retz. obs. 3. 10., Orthopogon Burmanni R. Brown. prodr. 1. 194., Reichenb. ic. 11. f. 1410. fl. exc. p. 23., excl. synon. Wulfenii, in ditione florae nostrae non crescit.

8. SETÁRIA (Palis. de Beauv. agrost. p. 51.) Involucrum, e setis aristaeformibus compositum, pedicellorum basi subiectum; caetera ut Panici. — Involucro differt a Panico, ut Cynosurus a Festuca. N. ab E. gen. 13. 9.

1. **S. verticillata** (Beauv. agr. 51.) panicula spiciformi conferta basi saepe interrupta, *involucris* deorsum scabris, *denticulis setarum reversis*, paleis floris hermaphroditi laeviusculis. ⊙. In locis cultis, fluviorum glareis, (stw. d. d. Gebiet.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1463. Panicum verticillatum L. sp. 82. D. fl. 1. 468. Pennisetum verticillatum R. Br. prod. 1. 195.

2. **S. viridis** (Beauv. agr. 51.) panicula spiciformi cylindrica, involucris sursum scabris, *denticulis antrorsum directis*, *paleis floris hermaphroditi laeviusculis* paleam floris neutrius aequantibus. ⊙. In locis cultis, campis arenosis. Jul. Aug. Reichenb. ic 11. f. 1467. Panicum viride L. sp. 83. D. fl. 1. 469. P. bicolor Moench. meth. p. 206. — P. reclinatum Vill. delph. 2. p. 64. videtur forma vulgaris et P. viride ibid. forma pusilla huius speciei. Occurrit: minor saepe colore sordide purpureo suffusa: P. Weinmanni R. et S. syst. 2. 490; et maior: P. viride var. *β*. maius Gaud. helv. 1. 152.

3. **S. glauca** (Beauv. agr. 51.) panicula spiciformi cylindrica, involucris sursum scabris, *denticulis antrorsum directis*, *paleis floris hermaphroditi transverse rugosis* palea floris neutrius duplo longioribus. ⊙. In cultis et campis arenosis. Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1466. Panicum glaucum L. sp. 83. D. fl. 1. 470. P. flavescens Moench. meth. p. 206.

4. **S. italica** (Beauv. agr. 51.) *panicula* spiciformi *decomposita lobata*, involucellis sursum scabris, denticulis antrorsum directis, paleis floris hermaphroditi laeviusculis. ⊙. In cultis Europae australis et Indiae; (in d. Gegend v. Wien, Dolliner, Cant. Tessin, übrigens bloss cultivirt.) Jul. Aug. Planta iamdiu culta, nunc multis varietatibus in hortis exstat. Varietas involucris spicula paulo tantum longioribus et rachi pilis longis hirsuta est: P. germanicum Roth. germ. 1. p. 27; varietas involucris spicula brevioribus P. sibiricum hortorum.

Trib. IV. *PHALARIDEAE.* Kunth. en. 1. p. 18. *Spiculae a latere compressae*, 1 florae *cum rudimento* paleaceo secundi tertiique *floris inferioris*, vel cum flore masculo solitario binisve inferioribus. Stylus longus, stigmata filiformia vel subaspergilliformia, ex apice spiculae emergentia.

9. PHÁLARIS (L. gen. n. 74.) Gluma 2 valvis, valvis a latere carinato-compressis, subaequalibus, uniflora cum rudimento squamaeformi floris inferioris solitarii binorumve. Glumella floris perfecti 2 valvis, cartilaginea,

mutica, gluma brevior. Styli longi, stigmata erecta, filiformia. N. ab E. gen. 11. 15.

Sect. I. Phalarides Genuinae. Valvae dorso alatae. Spiculae in latere exteriore subconvexae, in posteriori subconcavae.

1. **P. canariensis** (L. sp. 79.) panicula spiciformi ovali, *valvis* acuminatis *margine uninerviis* dorso alatis, *ala integerrima*, floribus sterilibus duobus dimidium fertilis aequantibus, paleis huius adpresso-pilosis. ☉. In locis cultis, ad vias, (in Istrien, ausserdem hin und wieder verwildert.) Jul. Aug. D. fl. 1. 485. Reichenb. ic. 11. f. 1492. J.

2. **P. minor** (Retz. obs. 3. 8.) panicula spiciformi oblonga, *valvis* acuminato-mucronatis *margine uninerviis* dorso alatis, *ala eroso-denticulata*, flore sterili altero minimo, altero flore fertili dimidio breviore, *paleis* huius *adpresso-pilosis*, culmo basi aequali. ☉. Ad mare mediterraneum, (im Littorale zw. Fiume und Laurana Host.) Mai. Jun. P. aquatica Ait. kew. 1. 56. D. fl. 1. 485. Reichenb. ic. 11. 1493. J.

3. **P. aquatica** (L. sp. 79.) panicula spiciformi oblonga, *valvis* acuminato-mucronatis *margine uninerviis* dorso alatis, *ala eroso-denticulata*, flore sterili altero minimo, altero deficiente, *paleis* floris fertilis *glabris*, basi culmi tuberoso-incrassata. ♃. In locis humidis reg. calid., (bei Stramare in der Gegend von Triest, Tommas.) Mai. P. caerulescens Desfont. atl. 1. 56. P. bulbosa Presl. sic. 101., non Linn. P. variegata Spreng. neu. Entdeck. 2. 101. Denominationem Linnaeanam hujus speciei nuper in dubium vocarunt. Conf. hall. bot. Ztg. v. 1. p. 448. G.

4. **P. paradoxa** (L. sp. 1665.) panicula spiciformi cylindrica, ramulis 6 spiculas gerentibus, flore intermedio hermaphrodito, lateralibus neutris duplo quadruplove minoribus, anterioribus 4 ramulorum inferiorum cuneatis obtusissimis crenulatis, valvis floris fertilis longe acuminatis *margine trinerviis* in medio dorsi alatis, ala lanceolata dentiformi. ☉. In cultis, ad vias reg. calid., (Istrien, neue Aufschüttung bei Triest.) Mai. Jun. D. fl. 1. p. 486. Reichenb. ic. 11. f. 1491. G.

Sect. II. Baldingera Fl. wetterav. Valvae dorso non alatae. Spiculae compressae, utrinque convexae. N. ab E. gen. 11. 16.

5. **P. arundinacea** (L. sp. 80.) *panicula patente*, spiculis fasciculato-congestis, valvis apteris, flore hermaphrodito glabro, sterilibus pilosis. ♃. Ad ripas et in aquis stagnantibus. Jun. Jul. D. fl. 1. p. 487. N. ab E. l. c. ic. Variat:

β. picta foliis albo-striatis: P. arundinacea picta L. sp. 80.

10. HIERÓCHLOA (Gmelin. sibir. 1. p. 101.) Gluma bivalvis, 3 flora. Flores 2 inferiores masculi, triandri, palea superiore bicarinata; superior diander, palea superiore unicarinata. Glumella bipaleacea mutica vel ex apice vel e dorso breviter aristata. Styli longi. Stigmata subplumosa, ex apice spiculae emergentia. N. ab E. gen. 14. 5.

1. **H. odorata** (Wahlenberg. ups. p. 32.) panicula divaricata, *pedicellis glabris*, flore hermaphrodito mutico, masculis sub apice brevissime aristatis, radice repente. ♃. In pratis humidis, (von Oldenburg dch. d. nördl. D. bis Preussen; Schles., Böhm., Mähr.; bei München selten.) Mai. Jun. Hierochloa borealis R. et S. syst. 2. 513. D. fl. 1. 548. Holcus borealis Schrad. germ. 1. 252. St. h. 40. H. repens Host. fl. a. 1. 123. G.

2. **H. australis** (R. et Schult. s. 2. 514.) panicula divaricata, *pedicellis ad spicularum basin pilosis*, flore hermaphrodito mutico, masculo inferiore infra apicem brevissime aristato, arista recta, masculo superiore e dorsi medio aristam geniculatam exserente, radice repente. ♃. In sylvis umbrosis, (Mähr., Oestr., Steyerm., Kärnth., Salzb., Tyrol.; bei Regensb., Nürnberg; Mühlhausen in d. Schw.) Mart. April. D. fl. 1. 549. Holcus australis Schrad. germ. 1. 253. St. h. 4. H. odoratus Host. gr. t. 4. Schk. t. 344.

11. ANTHOXÁNTHUM (L. gen. n. 42.) Gluma bivalvis, triflora; flores 2 inferiores neutri, unipaleacei, dorso aristati; terminalis hermaphroditus, minor, bipaleaceus, muticus. Valva inferior dimidio brevior, superior flores superans. Stam. 2. Styli longi, stigmata filiformia, pilosa, ex apice spiculae egredientia. N. ab E. gen. 11. 17.

1. **A. odoratum** (L. sp. 40.) panicula spiciformi oblonga laxiuscula, valva inferiore spicula dimidio breviore acuta, palea florum sterilium adpresse pilosa rotundato-obtusa, valva interiore dimidio breviore. ♃. In pratis, sylvis. Mai. Jun. D. fl. 1. 362. St. h. 4.

12. IMPERÁTA (Cyrill. ic. pl. rar. 112. t. 11.) Gluma bivalvis, 1 flora cum flore inferiore neutro, 1 paleaceo. Valvae convexo-compressae, nervo medio carinatae, flore longiores. Palea inferior, (flos neuter unipaleaceus,) longior, glumam dimidiam aequans, secunda et tertia, (flos hermaphroditus 2 paleaceus,) dimidio breviores. Styli 2, longi, a basi ad medium connati, stigmata elongata, filiformia, pilosa, ex apice spiculae egredientia.

1. **I. cylindrica** (Palis. d. Beauv. agrost. 7. t. 5. f. 1.). ♃. In olivetis, vineis, (Istrien, und die Inseln.) Jul. Aug. D. fl. 536. Reichenb. ic. 11. f. 1504. Imperata arundinacea Cyrill. l. c. Lagurus cylindricus L. sp. 120. Saccharum cylindricum Lam. dict. 1. 588. J.

Trib. V. *ALOPECUROIDEAE. Spiculae a latere compressae,* 1 *florae,* vel 1 florae cum rudimento floris superioris, paniculatae vel in racemo simplici alternae. Valvae flores aequantes vel superantes. *Styli longi; stigmata elongata, filiformia,* pilosa, *ex apice spiculae egredientia.*

13. ALOPECÚRUS (L. gen. n. 78.) Gluma bivalvis, 1 flora. Glumella 1 paleacea, utriculiformis, altero margine fissa, dorso aristata. Styl. longus. Stigmata elongata, pilosa, ex apice spiculae emergentia. N. ab E. gen. 11. 12.

1. **A. pratensis** (L. sp. 88.) culmo erecto glabro, panicula spiciformi cylindrica obtusa, ramis paniculae 4-6 spiculas gerentibus, *valvis acutis infra medium connatis villoso-ciliatis, rhizomatibus obliquis brevibus vel breviter stoloniformibus.* ♃. In pratis fertilibus. Mai. Jun. D. fl. 1. 478. St. h. 8. Arista nunc inclusa, nunc exserta, etiam valvae variant virides et coloratae.

2. **A. nigricans** (Hornem. hort. hafn. 1. p. 68.) culmo erecto glabro, panicula spiciformi cylindrica obtusa, ramis paniculae spiculas 4-6 gerentibus, *valvis acutis infra medium connatis villoso-ciliatis, stolonibus longe repentibus.* ♃. In pratis, (um Hamburg.) Mai. Jun. Spiculae maturitate nigrae, in A. pratensi decoloratae vel rarius basi nigricantes. A. nigrescens Jacq. ecl. gram. 2. t. 13. A. repens MBieb. tauric.-cauc. v. 3. p. 54. A. ruthenicus Weinm. cat. dorpat. 1810. A. arundinaceus Poir. ap. Lam. dict. v. 8. p. 776. In locis siccis culmi humiliores et vagina suprema maxime ventricosa: A. ventricosus Pers. syn. 1. p. 80. G.

3. **A. agrestis** (L. sp. 89.) culmo erecto superne scabriusculo, panicula spiciformi cylindrica utrinque attenuata, ramis paniculae 1-2 spiculas gerentibus, *valvis ad medium usque connatis acuminatis* carina anguste alatis *brevissime ciliatis.* ☉. In agris, solo argillaceo. Jun. Jul. D. fl. 1. 23. Leers. herb. t. 5. f. 8.

4. **A. geniculatus** (L. sp. 89.) culmo e basi prostrata adscendente glabro, panicula spiciformi cylindrica, *spiculis ovato-oblongis, valvis obtusis* ciliatis *basi tantum connatis, palea sub medio aristata.* ☉. In fossis, paludibus, locis humidis. Mai-Aug. D. fl. 1. 480. Leers. t. 2. f. 7. Arista palea sua duplo fere longior.

5. **A. fulvus** (Smith. engl. bot. 21. t. 1467.) culmo e basi prostrata adscendente glabro, panicula spiciformi cylindrica, *spiculis ellipticis, valvis obtussi* ciliatis *basi tantum connatis, palea e medio aristata.* ☉. In iisdem cum

antecedente locis. Mai-Aug. A. paludosus Palis. de Beauv. ined. D. fl. 1. 481. A. geniculatus Pollich. palat. 1. 63. — Colore vaginarum caesio et antheris fulvis, quae in A. geniculato ochroleucae, et post pollinis emissionem fuscae sunt, statim dignoscitur. Arista glumam vix unquam superat. Icon in Engl. bot. non bona.

6. **A. utriculatus** (Persoon. syn. 1. 80.) culmis erectis adscendentibusque, spica ovata vel ovato-oblonga, pedunculis 1-2 spiculas gerentibus, *valvis* ad medium connatis sensimque dilatatis *ultra medium subito in acumen depressum contractis*, vagina foliorum suprema utriculose inflata. ⊙. In pratis fertilibus, (Triest; Steyerm.; Schlettstadt im Elsass; bei Zweibrücken in d. Rheinpfalz u. von da im Blies- u. Saarthale u. Moselthale bis Trier.) Mai. Jun. D. fl. 1. 482. Scheuchz. t. 2. f. 2. G.

14. CRYPSIS (Ait. hort. kew. ed. 1. v. 1. p. 48.) Gluma bivalvis, 1 flora, flore brevior. Valvae carinato-compressae, inferior brevior. Glumella bipaleacea, paleis lanceolatis, subaequalibus, superior unicarinata vel obsolete bicarinata. Stam. 2-3. Styli elongati, stigmata filiformia, pilosa, ex apice spiculae emergentia. N. ab E. gen. 11. 14.

1. **C. aculeata** (Aiton. kew. ed. 1. p. 48.) culmis ramosis subcompressis, *paniculis spiciformibus hemisphaericis involucro foliaceo immersis*, floribus diandris. ⊙. In palustribus, (Unteröstr., Litt.; zwischen Satschau u. Mautnitz in Mähren.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 474. St. h. 26. Anthoxanthum aculeatum L. suppl. 89. Schoenus aculeatus L. sp. 63. Phleum schoenoides Jacq. a. app. t. 7. Agrostis aculeata Scop. carn. 89. Heleochloa diandra Host. a. 1. 77. Palea superior 1 nervia, carinata. G.

2. **C. schoenoides** (Lam. ill. 1. 166. t. 42. f. 1.) culmis ramosis subcompressis, *paniculis spiciformibus ovali-oblongis basi vagina suprema inclusis*, floribus triandris. ⊙. In locis humidis, (östr. Litt.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 475. St. h. 26. Spartina phleoides Roth. neue Beitr. Phleum schoenoides L. sp. 88. Heleochloa schoenoides Host. a. p. 77. Palea superior binervia, ut in sequente. G.

3. **C. alopecuroides** (Schrad. germ. 1. 167.) culmis simplicibus teretiusculis, *paniculis spicatis* oblongo-cylindraceis *nudis*, floribus triandris. ⊙. In uliginosis, (an dem ausgetrockneten Rande des Teiches v. Doberdo zw. Duino u. Görz; Unteröstreich; bei Bisenz in Mähren.) Aug. Sept. D. fl. 1. 476. St. h. 26. Heleochloa alopecuroides Host. a. 1. 77. G.

15. PHLEUM (L. gen. n. 77.) Gluma bivalvis, 1 flora, glumellam superans, valvis subaequalibus carinato-compressis, apice truncatis vel acutis, aristatis submuticisve. Glumella bipaleacea, membranacea, aristata vel mutica. Rudimentum floris superioris pedicelliforme vel nullum. Styli mediocres, stigmata longissima, pilosa, ex apice spiculae emergentia.

Sect I. Achnodon Link. Palea inferior 5 nervia, truncata. N. ab E. gen. 13. 4.

1. **P. tenue** (Schrad. germ. 1. 191.) panicula spicata cylindracea, *spiculis* plano-compressis *ellipticis, valvis dorso semilunari-curvatis breviter mucronulatis glabris* subtilissime tuberculato-scabris. ⊙. In locis herbidis et ad vias, (überschwemmt gewesene Orte neben der Muhr bei Grätz in Steyerm.; in Istrien; Inseln St. Andrea bei Rovigno; Veglia u. Cherso.) Jun. D. fl. 1. 488. P. Bellardii Willd. en. 1. 85. Achnodon Bellardii Link. hort. 1. 65. N. ab E. l. c. ic. Achnodonton tenue et Bellardi Beauv. agr. 24. Phalaris bulbosa L. sp. 79. P. cylindrica DC. fl. fr. 3. 11. P. tenuis Host. gr. 2. t. 36. P. subulata Sav. fl. pis. 1. 57. P. sativa Pers. syn. 1. 78. G.

Sect. II. Chilochloa Beauv. Palea inferior 3 nervia, obtusa. Pedicellus ad basin paleae superioris, rudimentum floris secundi superioris referens. N. ab E. gen. 13. 3.

2. **P. arenarium** (L. sp. 88.) panicula spiciformi oblonga basi plerumque attenuata, *valvis lanceolatis* in aristam brevem *acuminatis* carina hispido-ci-

liatis, radice pluriculmi, *fasciculis foliorum sterilibus nullis.* ⊙. In arenosis maritimis, (v. Ostfriesland bis nach Mecklenb.; in Preussen; Seeküste am adriat. Meere; auch im Binnenlande a. d. Sande b. Mainz u. b. Aachen.) Jun. Jul. St. h. 29. Phalaris arenaria Willd. sp. 328. Chilochloa arenaria Beauv. agr. 37. G.

3. **P. Michelii** (All. ped. 2. p. 233.) panicula spiciformi cylindracea, *valvis lanceolatis* in aristam brevem *acuminatis* dorso hispido-ciliatis, *radice* culmis fertilibus *fasciculisque foliorum sterilibus caespitosa.* 4. In pascuis alpium, (d. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 1. 495. P. hirsutum Sut. helv. 1. 31. Phalaris alpina Haenk. in Jacq. coll. 2. 91. Chilochloa Michelii Rchb. ic. 11. f. 1489. — Phleum trigynum Host. gr. 4. t. 20., P. Hostii cat. hort. vind., Chilochloa cuspidata Beauv., Reichenb. ic. 11. f. 1490., vivum possideo, e seminibus, ex horto vindobonensi acceptis, enatum nullum autem verum discrimen inter hoc et P. Michelii invenire possum.

4. **P. Boehmeri** (Wibel. primit. flor. werth. p. 125. 1799.) panicula spiciformi cylindracea, *valvis lineari-oblongis oblique truncatis acuminato-mucronatis* compressis dorso hispido-ciliatis scabrisve, radice culmis fertilibus fasciculisque foliorum sterilibus caespitosa. 4. In collibus sterilibus, pratis siccis, (stw. d. d. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 1. 494. P. phalaroides Koel. gram. p. 52. 1802. P. glabrum Bernh. erf. p. 38. P. laeve MBieb. taur. cauc. 1. p. 46. Phalaris phleoides L. sp. 80. Chilochloa Böhmeri Beauv. agr. 37. N. ab E. l. c. ic.

5. **P. asperum** (Vill. delph. 2. 61. t. 2. f. 4.) panicula spiciformi cylindracea, *valvis cuneiformibus truncatis apice inflato-angulatis* mucronatis scabris. ⊙. In agris, vineis, collibus sterilibus (stw. d. d. mittl. u. nördl. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 1. 493. St. h. 26. P. viride All. ped. 2. p. 232. P. ventricosum Moench. meth. 177. P. paniculatum Huds. angl. 26. Phalaris aspera Retz. obs. 4. 14. Chilochloa aspera Beauv. agr. 37.

Sect. III. Phleum Beauv. Palea inferior trinervia, obtusa. Rudimentum floris secundi nullum. N. ab E. gen. 13. 2.

6. **P. pratense** (L. sp. 79.) panicula spiciformi cylindracea, *valvis oblongis transverse truncatis* in aristam subito acuminatis carina hispido-ciliatis, *aristis gluma* triplo *brevioribus*, vaginis cylindricis. 4. In pratis fertilibus; var. minor in locis siccis. Jun. Jul. D. fl. 1. p. 489. Leers. herb. t. 3. f. 1. P. Bertolonii DC. cat. h. monsp. 132., est, monente cl. Bertolon. in flor. ital. 1. 348., modificatio gluma paucioribus ciliis obsita, aristisque brevioribus. — In locis siccis panicula spiciformis brevior, planta humilior fit et culmus supra radicem magis bulboso-incrassatus apparet; hoc est P. nodosum L. sp. 88. P. bulbosum Host. gr. 4. t. 21. fl. a. 1. 81. Leers. l. c. f. 2.

7. **P. alpinum** (L. sp. 88.) panicula spiciformi cylindracea vel ovali, *valvis oblongis transverse truncatis* in aristam subito acuminatis carina hispido-ciliatis, *aristis glumam aequantibus* vel eadem vix dimidio brevioribus, vagina superiore inflata. 4. In pascuis alpinis et subalpinis, (d. d. g. Alpenk. und auf d. Sudeten u. Mähr. Karpaten.) Jun.-Aug. D. fl. 1. 490. St. h. 29. Variat spicis cylindricis elongatis brevibusque ovalibus; utraque varietas insuper occurrit aristis longe ciliatis ciliisque destitutis: posterior est P. commutatum Gaud. helv. 1. p. 166. P. Gerardi Panz. ap. St. h. 29. Praeter defectum ciliarum in aristis ne minimam quidem differentiam inter hoc et formam vulgarem reperio.

8. **P. echinatum** (Host. gr. 3. t. 11. fl. austr. 1. 81.) panicula spicata ovali, *spiculis* patentibus, *infimis deflexis*, *valvis ovato-oblongis transverse truncatis* in aristam subito acuminatis carina hispido-ciliatis, aristis gluma paulo longioribus. ⊙ (?) In pratis montanis, (Istrien, und die Inseln.) Mai. D. fl. 1. 491. P. felinum Sm. prod. 1. 42. Reichenb. ic. 11. f. 1486. J.

Phleum Gerardi in Helvetia non provenit, conf. Gaud. fl. helv. 1. p. 167. Secundum Floram styriacam in alpibus Styriacis, (im Sulzbacher Gebirge) crescere fertur, specimen vero his in locis lectum non vidi, qua de causa

plantam hanc saepius confusam omitto. Phleum capitatum Scop. carn. 1. p. 56. longe aliam designat plantam, quae in loco natali investiganda est.

16. CHAMAGRÓSTIS (Borkhausen. obercattisch. flora. Wibel. werth. p. 126.) Gluma bivalvis, valvae dorso rotundatae, ecarinatae, glumella longiores, muticae. Glumella bipaleacea, paleae non carinatae, muticae, piloso-ciliatae. Antherae a basi ad medium fissae, apice integrae. Styli mediocres; stigmata elongata, filiformia, pilosae, ex apice spicula emergentia. N. ab E. gen. 13. 5.

1. **C. minima** (Borkh. l. c.) ⊙. In campis arenosis, (stw. auf d. Rheinfläche v. Philippsburg bis Mainz; im Maingebiete bis Würzburg; in Holstein.) Mart. April. Sturmia minima Hopp. in St. h. 7. S. verna Pers. syn. 1. 76. Knappia agrostidea Smith. brit. 5. p. 1387. K. verna Trin. ic. 2. t. 17. Agrostis minima L. sp. 93. Mibora verna Beauv. agr. 29. D. fl. 1. p. 477. G.

Trib. VI. *CHLORIDEAE.* Kunth. en. 258. *Spiculae a latere compressae, 1 florae,* (in exoticis bi-multiflorae,) in spicas unilaterales dispositae, et quidem *lateri inferiori racheos spicarum insertae.* Valva inferior florem (in exoticis multifloris florem proximum) superans vel paulo tantum brevior. Styli mediocres vel longi, quandoque in unum connati; stigmata elongata, filiformia vel subaspergilliformia, pilosa.

17. CÝNODON (Richard. in Persoon. synops. 1. p. 85.) Gluma uniflora, bivalvis, patens, basi tantum florem amplectens. Glumella bipaleacea, gluma paulo longior, palea inferiore ovata, naviculari-compressa, superiorem linearem, dorso sulco exaratam, includens. Rudimentum secundi floris pedicelliforme, cum capitulo glumaceo vel nullo. Styli longi; stigmata subaspergilliformia, sub apice floris emergentia. N. ab E. gen. 11. 18.

1. **C. Dactylon** (Pers. syn. 1. 85.) spicis 3-5 digitatis, paleis glabris subciliatis, foliis subtus pilosis, stolonibus prostratis. ♃. In campis arenosis, ad vias, (stw. in der Schweiz u. v. da durch d. Rheingebiet bis Westph.; durch d. Maingebiet bis Würzb., Mosel bei Trier, Saar bei Saarlouis; im südlichen D.; in Steyerm., Mähren u. bei Berlin.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1404. Panicum Dactylon L. sp. 85. Digitaria stolonifera Schrad. germ. 1. 165. Paspalum umbellatum Lam. ill. 1. 176. Dactylon officinale Vill. delph. 2. 69.

18. SPARTÍNA (Schreb. in edit. gen. plant. 1. p. 43.) Gluma bivalvis, 1 flora. Valvae carinato-compressae, inferior brevior. Glumella bipaleacea, paleae membranaceae, muticae, inferior compresso-carinata, superior longior, navicularis, dorso binervis. Styli elongati, saepe inferne connati. Stigmata elongata, filiformia, ex apice spiculae egredientia. N. ab E. gen. 11. 19.

1. **S. stricta** (Roth. catalect. bot. 3. 9.) spicis 2-4 adpressis, spiculis pubescentibus laxe imbricatis erectis, foliis involutis. ♃. In locis paludosis ad litus maris adriatici, (bei Monfalcone, auf dem rechten Ufer des Isonzo gegen Aquileja u. Grado.) Aug. Sept. D. fl. 1. 460. N. ab E. l. c. icon. Limnetis pungens Rich. in Pers. syn. 1. 72. Dactylis stricta Ait. kew. 1. 104. Trachynotia stricta DC. fl. fr. 3. p. 74. G.

Trib. VII. *ORYZEAE.* Kunth. enum. p. 5. Spiculae a latere compressae. *Valvae nullae vel minimae.*

19. LEERSIA (Solander. ap. Swarz. fl. ind. occ. 1. 132.) Spiculae 1 florae. Gluma nulla. Glumella 2 paleacea, chartacea, paleae compresso-carinatae, muticae, subaequales, inferior multo latior. Styli mediocres, stigmata plumosa e latere spiculae egredientia. Caryopsis paleis inclusa. N. ab E. gen. 11. 2.

1. **L. oryzoides** (Swarz. l. c. in annotatione.) panicula patente, ramis

flexuosis, spiculis triandris semiovalibus ciliatis. 4. In fossis, ad ripas. Aug. Sept. D. fl. 1. p. 403. N. ab E. l. c. icon. Phalaris oryzoides L. sp. 81. Homalocenchrus oryzoides Pollich. palat. 1. p. 52. Ehrharta clandestina Wiggers. hols. p. 64. Asprella oryzoides Lam. ill. 167.

20. COLEANTHUS (Seidel. in Roem. et Schult. syst. veg. 2. 11.) Spiculae 1 florae. Gluma nulla. Glumella 2 paleacea, paleae membranaceae; inferior 1 nervia, carinata, acuminato-aristata; superior dimidio brevior, 2 nervia, bicarinata. Stam. 2. Styli breves; stigmata longa, filiformia, pilis brevibus adspersa. Caryopsis nuda, paleis longior et basi tantum ab iis tecta.

1. **C. subtilis** (Seidel. in R. et Sch. syst. 2. 276.) ⊙. In piscinis exsiccatis et ad ripas paludum Bohem., (die v. Tausch gelieferten Exempl. bei Wosseck ges.) Jul.-Sept. Schmidtia utriculosa Sternberg. bot. Ztg. 2. 1. cum ic. S. subtilis Tratt. austr. 1. 12. t. 451. D. fl. 1. p. 361.

Trib. VIII. *AGROSTIDEAE.* Kunth. en. p. 198. *Spiculae a latere magis minusve compressae, 1 florae,* vel 1 florae cum rudimento floris superioris. Lodiculae 2. *Styli nulli vel breves,* stigmata plumosa, ad basin spiculae emergentia. *Caryopsis paleis membranaceis tecta.*

21. POLYPÓGON (Desfontaines. fl. atlant. 1. p. 66.) Gluma 2 valvis, 1 flora, glumella longior, convexo-compressa. Valvae subaequales, ex apice obtuso subemarginato setaceo-aristatae. Glumella basi glabra, bipaleacea; palea inferiore sub apice saepe aristata. Styli subnulli; stigmata plumosa, ad latera spiculae emergentia. N. ab E. gen. 11. 5.

1. **P. monspeliensis** (Desf. l. c. p. 67.) panicula coarctata lobata, *valvis* oblongis hirto-scabris *ex apice breviter emarginato obtuse bilobo aristatis, arista valvam ter superante,* flore sub summo apice aristato, radice fibrosa. ⊙. In locis cultis et incultis humidis ad mare adriaticum, (Istrien; Littorale; auf dem Ramis einem Sandsteinfelsen in der Stadt Freiburg in der Schweiz.) Mai. Jun. D. fl. 1. 497. N. ab E. l. c. icon. Alopecurus monspeliensis L. sp. 89. A. paniceus Lam. fl. fr. 3. 560. A. aristatus Huds. angl. 28. Agrostis panicea Willd. spec. 1. 128. Phleum crinitum Schreb. gr. 1. t. 20. Santia plumosa Sav. in mem. soc. it. 8. 2. 479. — Alopecurus paniceus L. sp. 90. ad Polypogonem maritimum Willd. pertinere videtur.

2. **P. littoralis** (Smith. comp. fl. brit. 13.) panicula coarctata lobata, *valvis* lineari-lanceolatis scabriusculis *ex apice aristatis, arista* valvae inferioris *valvam ipsam aequante,* superioris breviore, flore sub apice aristato, radice repente. 4. In maritimis coenosis, (bisher im Nordwest der Insel Norderney, Mertens.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 499. Reichenb. ic. 11. f. 1417., non bona. Agrostis littoralis Smith. brit. 78. A. lutosa Poir. suppl. 1. 249. G.

22. AGROSTIS (L. gen. n. 80.) Gluma bivalvis, 1 flora, convexo-compressa, flore longior. Valvae acutae, inferior longior. Glumella bipaleacea, membranacea, basi pilorum fasciculis brevissimis fulta, aristata vel mutica, arista tenuissima; palea superiore quandoque deficiente. Rudimentum floris superioris nullum. Styli brevissimi. Stigmata plumosa ad basin spiculae emergentia. N. ab E. gen. 11. 3.

a. Vilfa Beauv. Folia omnia plana. Palea superior non deficiens.

1. **A. stolonifera** (L. sp. pl. 93 var. β.) panicula florifera oblongo-conica, ramis horizontaliter patentibus, ramulis ad latera ramorum et deorsum vergentibus, fructifera contracta, ramis pedicellisque scabris, *ligula oblonga, foliis omnibus lincaribus planis.* 4. In pratis, pascuis, sylvis, fluviorum glareis, ad vias. Jun. post solstitium et Jul. Meyer. chlor. hannov. 655. A. alba Schrad. germ. 1. p. 209. t. 2. f. 1. D. fl. 1. 508. A. capillaris Pollich. pal. 1. p. 69. Variat spiculis muticis et, raro tamen, aristatis.

Forma vulgaris, ubique occurrens, nunc paniculam habet virentem: A. alba Schrad. var. *α*. D. fl. 1. 510. var. *α*, L. sp. 93. A. stolonifera Host. gr. 4. t. 56.; nunc paniculam coloratam: A. alba *β*. D. fl. 1. 510. A. diffusa Host. gr. 4. t. 55. A. varia Host. gr. t. 57. figura sinistra. A. decumbens Haller. fil. in Gaud. agr. 1. 78. A. alba II. decumbens Gaud. fl. helv. 1. 188.

β. gigantea, eadem, sed maior et robustior, panicula valde multiflora: A. alba a. gigantea Meyer. l. c. A. gigantea Gaud. agr. 1. p. 81. A. alba *α*. maior Fl. helv. 1. 189. A. alba *γ*. D. fl. 1. 511. Si panicula huius varietatis latior diffusiorque apparet, spiculaeque plurimae aristatae sunt, oritur: A. alba *δ*. D. fl. 1. 511. A. gigantea Roth. tent. 1. 31. A. compressa Willd. in Ust. mag. 11. 39. A. varia Host. gr. 4. t. 57. figura dextra et A. sylvatica Host. gram. 4. t. 58., forma mutica. (A. decumbentem Host. gr. t. 54. cl. Meyer. l. c. ad hanc varietatem quoque trahit.)

γ. prorepens plerumque humilior, stolonibus longe lateque repens, panicula dense conferta, lobata et plerumque saturate colorata; in fluviorum glareis et arenosis hinc inde: A. alba b. stolonifera Meyer. l. c. Host. gr. a. 4. t. 56. Engl. bot. t. 1532. A. alba *β*. stolonifera Smith. engl. fl. 1. 93. (excl. synon. Linn., conf. Meyer. l. c.) — Haec forma, panicula dense conferta, in montibus altioribus et alpibus, (quandoque in planitiebus quoque occurrit) minor evadit et panicula valde colorata fit: A. pauciflora Schrad. germ. p. 205., (si palea inferior aristam rectam e superiore dorsi parte emittit.) A. patula Gaud. agr. p. 80. Reichenb. ic. 11. f. 1432. A. alba III. patula Gaud. helv. 1. 189.

δ. maritima, longe lateque repens, panicula compacta, foliis rigidis, glaucis: A. alba c. maritima Meyer. chlor. Hannov. p. 656. A. stolonifera L. iter scanic. p. 338. Fl. dan. t. 564. A. stolonifera *β*. L. sp. 92., excl. syn. Scheuchz., ad A. verticillatam Villars. spectante. A. maritima Lam. dict. 1. 61. Reichenb. ic. 11. f. 1436. DC. fl. fr. 3. p. 23. 5. p. 253., secund. specim. authenticum. Vilfa glaucescens Presl. gram. sicul. p. 23.

Occurrit in statu luxuriante vivipara: A. sylvatica Reichenb. ic. 11. f. 1434. Huds. angl. ed. 1. 28. L. sp. 1665.; atque in statu morboso, spiculis ustilagine corruptis: A. alba *ε*. pumila Kunth. en. 1. 219.

Ramulis ramorum paniculae fructiferae in spicas contractis, vel ramis cum ramulis omnibus in unicam spicam coarctatis jam e longinquo dignoscitur a subsequente A. vulgari, cujus panicula ramis ramulisque divaricatis in serum autumnum usque immutata permanet.

A. verticillata Vill. delph. 2. 74., in ditione florae nostrae nondum lecta, differt valvis totis puberulis ligulaque dimidio breviore, truncata et dentata.

2. **A. vulgaris** (Withering. arrang. p. 132.) panicula ambitu oblongo-ovata sub anthesi et postea patentissima, ramulis divaricatis undique vergentibus scabriusculis, *ligula brevi truncata, foliis omnibus linearibus planis.* 4. Habitat et floret cum antecedente. Spiculae muticae. A. vulgaris D. fl. 1. 505. Schrad. germ. t. 2. f. 3. A. stolonifera Pollich. pal. 1. p. 68. A. hispida Willd. sp. 1. 370. A. rubra *β*. Wahlenb. ups. p. 29. A. tenella Hoffm. D. fl. spiculis pallidis. Variat raro spiculis aristatis

β. stolonifera, stolonibus in locis arenosis elongatis repentibus: A. stolonifera *α*. L. sp. 93. sec. specimina Ehrhartiana, Upsaliae Linnaei tempore lecta, et sec. verba diagnoseos „ramulis divaricatis“ (conf. Meyer. chlor. Hannov. 657.)

Occurrit praeterea spiculis viviparis: Reichenb. ic. 11. f. 1429. A. sylvatica Pollich. palat. 1. 69.; et spiculis ustilagine corruptis: A. pumila L. mant. 31. Reichenb. ic. f. 1425. Culmi in morboso hoc statu multo humiliores permanent.

Agrostis rubra L., Sueciam borealem praecipue inhabitans, in ditione florae nostrae nondum reperta est. Secundum specimen ab ipso cl. Wah-

leubergio ad beatum Gaudinium missum, de quo culmum cum radice hic mihi benevole concessit et sec. alia specimina in Scandenavia collecta ab omnibus speciebus nostris satis differt. Habitu quodam stricto ramorum paniculae se prodit. Folia habet Agrostidis vulgaris, sed ligula oblonga et radix non stolonifera est paleaque superior semper deficit; est igitur Trichodii sectionis. Verum ab omnibus Trichodiis nostris differt foliis planis, radicalibus quidem angustioribus, tamen planis, quod etiam in statu sicco observari potest; insuper ab Agrostide rupestri ramis superne pedicellisque hispidulis, ab A. alpina spiculis conspicue minoribus aristaque paulum infra medium, nec ex basi paleae oriente, ab A. canina statura minore, panicula rariore, radice non stolonifera et habitu proprio. Conf. Fries. nov. fl. suec. mant. 2. p. 3. Wahlenbergius eam in fl. lapp. egregie descripsit, sed postea non recte cum Agrostide vulgari combinavit.

b. Trichodium Michaux. Folia radicalia complicato-setacea. Palea superior plerumque deficiens.

3. **A. canina** (L. sp. 92.) panicula diffusa ovata, ramis scabris sub anthesi divergentibus defloratis contractis, *palea* inferiore *sub medio dorsi aristata* apice crenulata, superiore nulla vel minima, *foliis radicalibus complicato-setaceis*, ligula oblonga. 4. In pratis et locis humidis. Jun.-Aug. D. fl. 1. 512. Reichenb. ic. 11. f. 1424. Trichodium caninum Schrad. germ. 1. 198. Agraulus caninus Beauv. agr. 5. t. 4. f. 7. Spiculae plerumque arista tortili geniculata, rarius breviore et recta instructae, quandoque vero plane muticae sunt. Varietas spiculis maioribus est Agrostis hybrida Gaud. agrost. 1. 66. Reichenb. ic. 11. f. 1424.; specimina parva semipedalia minus multiflora constituunt A. alpinam Leyss. fl. hal. n. 67. Roth. tent. 1. 31. et 2. 82. Occurrit insuper panicula pallida, spiculis viviparis et ustilagine corruptis.

4. **A. alpina** (Scopol. carn. 1. 60.) panicula patente, ramis pedicellisque scabris, *palea* inferiore *basi aristata* apice breviter bisetosa, superiore minima, *foliis radicalibus complicato-setaceis*, ligula oblonga. 4. In pratis et pascuis alpinis, (dch. d. g. Alpenk.; a. d. Belchen im Schwarzwalde; Janowitzer Gebirg in Mähren; Sudeten.) Jul. Aug. A. alpina Scop. l. c. „e basi promit aristam" D. fl. 1. 515. Reichenb. ic. 11. f. 1422. Willd. sp. 1. 368., secundum annotationem ex Scopolio sumtam, exclusis autem omnibus syn. praeter Scopolii et Scheuchzeri. A. festucoides Vill. delph. 2. 76. „arête insérée à la base de la corolle." A. alpina DC. fl. fr. 3. 20., sec. syn. Villarsii. A. rupestris Dub. bot. gall. 504. Bertoloni fl. it. 1. p. 398. Trichodium rupestre Schrad. germ. 201. Modificatio panicula laxiore est: A. filiformis Schleich. exs.; etiam Villarsii fl. delph. 2. 78. sec. Gaud. helv. 1. p. 180. Varietas flavicans est Avena aurata All. ped. 2. p. 255.

5. **A. rupestris** (All. ped. 2. p. 237., secund. specimen a Balbisio ad Schrad. missum.) panicula patente, *ramis pedicellisque glabris*, palea inferiore apice crenulata arista dorsali infra medium proveniente praedita, *foliis radicalibus complicato-setaceis*, ligula oblonga. 4. In pratis et pascuis alpinis, (dch. d. g. Alpenk.; a. d. Belchen im Schwarzwalde; im Gesenke d. Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 1. 514. Reichenb. ic. 11. f. 423. Willd. sp. 1. 368., secund. synonyma All. et Halleri. A. setacea Vill. delph. 2. 76. „arrête posée un peu plus bas que le milieu de la corolle." A. rupestris DC. fl. fr. 3. 21., sec. syn. All. et Villars. et descriptionem. A. alpina Dub. bot. gall. 504. Bertol. fl. it. 1. p. 308.

23. APÉRA (Adans. Beauv. agr. 31.) Valva inferior minor, caetera ut Agrostidis. Pedicellus, rudimentum floris secundi referens, ad basin valvae superioris situs. N. ab E. gen. 11. 4.

1. **A. Spica venti** (Beauv. l. c.) *panicula ampla*, flore sub apice aristato, arista recta vel subflexuosa paleam ter quaterve superante, *antheris linearioblongis*. ☉. Inter segetes in locis glareosis et arenosis incultis. Jun. Jul. Reichenb. ic. 11. 1421. Agrostis Spica venti L. sp. 91. D. fl. 1. 504.

Anemagrostis Spica venti Trin. fund. 129. — Agrostis purpurea Gaud. helv. 1. 185. ulterius observanda est.

2. **A. interrupta** (Beauv. agr. 31.) *panicula angusta* contracta, flore sub apice aristato, arista recta vel subflexuosa paleam ter quaterve superante, antheris *subrotundo-ovalibus*. ☉. In cultis et arenosis, (in Unteröstreich, Krain, im untern Wallis, in Hannover bei Salzderhelden im Fürst. Grubenhagen.) Jun. Jul. Reichenb. ic. 11. f. 1419. Agrostis interrupta L. sp. 92. D. fl. 1. 504. Vaill. par. t. 17. f. 4. — Trinius pro varietate antecedentis declarat.

24. LAGÚRUS (L. gen. n. 104.) Valvae subulatae, in aristam attenuatae. Palea inferior aristis 2 terminalibus rectis et tertia dorsali geniculata. Caetera ut Agrostidis. Pedicellus, rudimentum floris secundi referens, ad basin paleae superioris situs. N. ab E. gen. 13. 20.

1. **L. ovatus** (L. sp. 119.) ☉. In collibus vineis, (Steyerm., Abhänge an der Sane auf d. Wege v. Cilli nach Reichenburg; Istrien.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 634. Reichenb. ic. 11. f. 1415. G.

25. CALAMAGRÓSTIS (Roth. tent. flor. germ. 1. 33., 2. 87.) Paleae basi pilis fultae, diametrum transversalem paleae superantibus; caetera ut Agrostidis. In pluribus speciebus pedicellus pilosus, rudimentum floris secundi referens, ad basin paleae superioris exstat. E. ab E. gen. 11. 6.

Sect. I. Epigeios. Paleae membranaceae, pellucido-albae. Rudimentum secundi floris nullum.

1. **C. lanceolata** (Roth. tent. fl. germ. 1. 34.) panicula patente, valvis anguste lanceolatis acuminatis, pilis glumellam superantibus, *arista terminali recta* ex emarginatura *brevissima* egrediente eamque vix superante. ♃. In pratis humidis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1448. C. ramosa Host. gr. 4. t. 44. Arundo Calamagrostis L. sp. 121. D. fl. 1. 518. A. Leersii Oett. lusat. 17. In nemoribus occurrit panicula pallidiore: Calamagrostis Gaudiniana Reichenb. fl. exc. 27. ic. 11. f. 1447. Arundo canescens Wiggers. prim. fl. hols. p. 10., sec. Sonder.

2. **C. littorea** (DeCand. fl. fr. 5. p. 255.) panicula patente, valvis anguste lanceolatis in apicem subulatum compressum attenuatis, pilis glumellam superantibus, *arista terminali recta valvam dimidiam aequante vel superante*. ♃. In glareis fluviorum et ad ripas, (in d. Schweiz, v. da dch. Tyrol bis Oestreich, mit d. Flüssen in die Ebenen neben d. Alpenkette hinab; am Rheine bis Carlsruh, an d. Isar bis München, im Littorale bis an das Meer; sodann am Harze an d. Ufern d. Bode.) Jul. Aug. C. laxa Host. gr. 4. t. 43. Reichenb. fl. exc. p. 27. ic. 11. f. 1450. et C. littorea Reichenb. l. c. f. 1449. Arundo littorea Schrad. germ. 1. 212. t. 4. f. 2. D. fl. 1. 519. A. Pseudophragmites Hall. fil. in Roem. arch. 1. 2. 10. A. effusa Gmel. bad. 1. 262. A. glauca MBiebst. 1. 79.

3. **C. epigeios** (Roth. tent. fl. germ. 1. 34. 2. 1. 91.) *panicula* stricta patente *glomerato-lobata*, valvis lanceolatis in apicem subulatum compressum desinentibus, pilis glumella longioribus, *arista e medio dorsi recta*. ♃. In locis sylvaticis, campis arenosis, ad ripas. Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1453. Arundo epigeios L. sp. 120. D. fl. 1. 520. MB. taur. cauc. 2. p. 88. A. Calamagrostis MBieb. taur.-cauc. 1. p. 78. Modificatio spiculis, margine anguste tantum coloratis: Arundo intermedia Gmel. bad. 1. 266. Calamagrostis Huebneriana Reichenb. fl. exc. p. 27. ic. 11. f. 1451. Modificatio spiculis totis viridibus: C. glauca Reichenb. l. c. n. 155. ic. 11. f. 1451. excl. syn. fl. taur.-cauc.

4. **C. Halleriana** (DC. fl. fr. 5. p. 256.) *panicula patente, spiculis subaequaliter sparsis*, valvis lanceolatis acuminatis, pilis glumellam superantibus, *arista infra medium dorsi* egrediente *recta*. ♃. In sylvaticis humidis, (in d. Voralpen, dch. d. g. Alpenk.; Sudeten, Gesenke in Schles.; Erzgeb.; Unterharz; sodann v. Holstein dch. d. nördl. D.) Jul. Aug. C. Pseudo-

phragmites Rchb. fl. exc. p. 26., ic. 11. f. 1444. C. varia Host. gr. a. t. 47. C. Clarionis Lois. fl. gall. ed. 2. 1. 54. C. pulchella et C. nutans Saut. ap. Reichenb. fl. exc. p. 26. ic. 11. f. 1445. et 1446. Arundo Halleriana Gaud. helv. 1. 197. D. fl. 1. p. 521. A. Pseudophragmites Schrad. germ. 1. 213., non Haller. A. Calamagrostis Hall. fil. in Roem. arch. 1. c. A. Clarionis Lois. fl. gall. ed. 1. 719. Variat raro

β. mutica, spiculis muticis.

5. **C. tenella** (Host. gr. p. 29. t. 50., varietas aristata.) *panicula patente*, valvis lanceolatis acutis, *pilis glumella dimidio brevioribus*, *glumella mutica vel dorso aristata*, *arista recta*. ♃. In pascuis et sylvis alpinis, (stw. in der Alpenk. von d. Schweiz bis Oestr.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1438. Arundo tenella D. fl. 1. 521. Variat:

α. mutica, spiculis muticis: Arundo tenella Schrad. germ. 1. 220. t. 5. f. 1. Agrostis pilosa Schleich. Gaud. helv. 1. 155. Calamagrostis alpina Host. gr. t. 51.

β. aristata, spiculis aristatis: C. tenella Host. l. c. Arundo tenella *β.* D. fl. 1. 522. Arundo humilis R. et S. syst. 2. 510.

Sect. II. Deyeuxia Beauv. Rudimentum secundi floris in pedicello piloso, e basi palcae superioris egrediente, constans. N. ab E. gen. 11. 7.

6. **C. stricta** (Sprengel. syst. veg. 1. 253.) *panicula angusta* patente stricte erecta, valvis acutis, *pilis glumella brevioribus*, *arista infra medium dorsi recta*. ♃. In pratis humidis, (im nördl. D. von Holstein u. Lüneb. bis Berlin, Pommern u. Preussen; der Standort in d. Wetterau beruhet auf einer irrigen Bestimmung.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1439. Arundo stricta Timm. in Siemssen. meckl. Mag. 2. 236. D. fl. 1. 522. St. h. 29. A. neglecta Ehrh. Beitr. 6. 137. Deyeuxia neglecta Kunth. en. 1. 242. G.

7. **C. montana** (Host. gr. 4. t. 46.) panicula patente, valvis acuminatis, *pilis glumellam aequantibus* vel dimidio fere brevioribus, *arista dorsali geniculata valvas vix excedente*. ♃. In sylvis montanis et subalpinis, (stw. dch. d. Geb.) Jul. Aug. DC. fl. fr. 5. p. 254. Reichenb. ic. 11. f. 1443. Arundo montana Gaud. helv. 1. p. 200. A. varia Schrad. germ. 1. 216. D. fl. 1. 523. Deyeuxia varia Kunth. en. 242. — Calamagrostis sylvatica Host. gr. 4. t. 48. est varietas spiculis minoribus. Variat porro

β. acutiflora, elatior, valvis angustioribus longioribus, subulato-attenuatis: Reichenb. ic. 11. f. 1442.: Arundo acutiflora Schrad. germ. 1. 217. D. fl. 1. 524. Calamagrostis acutifl. DC. fl. fr. 5. 255. Deyeuxia acutifl. Kunth. en. 243. Rudimentum floris secundi, quod etiam in varietate *α.* quandoque desideratur, in varietate *β.* non semper deficit.

8. **C. sylvatica** (DC. fl. fr. 5. p. 253.) panicula patente, valvis acuminatis, *pilis glumella quadruplo brevioribus*, *arista dorsali geniculata valvas excedente*. ♃. In sylvaticis, (stw. in d. Geb.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1440. C. arundinacea Roth. tent. 2. 1. 89. C. pyramidalis Host. gr. 4. t. 49. Reichenb. ic. 11. f. 1441. Agrostis arundinacea L. sp. 91. Arundo sylvatica Schrad. germ. 1. 218. t. 4. f. 7. Deyeuxia sylvatica Kunth. en. 1. 243.

26. PSAMMA (Palis. de Beauv. agr. 143.) Valva inferior minor; caetera ut Calamagrostidis. N. ab E. gen. 11. 8. — Nomen Ammophilae jam anno 1798 Hymenopterorum generi impositum est a cl. Kirbyo.

1. **P. arenaria** (R. et S. syst. veg. v. 2. p. 845.) *panicula spiciformi* conferta *cylindrica* superne attenuata, *valvis* lineari lanceolatis *acutis*, pilis glumella triplo brevioribus, foliis involutis. ♃. In arenosis maritimis, et hinc inde in arenosis regionum interiorum, (an allen Seeküsten v. Norden, landeinwärts bis Wittenberg; sodann noch bei Dresden u. Darmstadt.) Jul. Aug. Reichenb. 11. f. 1454. Ammophila arenaria Link. hort. v. 1. p. 105. Koch. syn. ed. 1. p. 785. A. arundinacea Host. gr. t. 41. Arundo arenaria L. sp. 121. Calamagrostis arenaria Roth. tent. 1. 34. G.

2. **P. baltica** (R. et S. syst. veg. v. 2. p. 845.) *panicula spiciformi* conferta *lanceolata* acuta, *valvis* lanceolatis *in apicem subulatum attenuatis*, pilis glumella dimidio brevioribus, foliis involutis. 4. In arenosis maritimis, (von Bremen durch Holstein u. d. nördl. D. bis Preussen.) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1455. Arundo baltica Flügge in Schrad. fl. germ. 1. 223. t. 5. f. 3. Arista paleae inferioris plerumque dentes apicis non superat, rarius autem etiam occurrit arista dentibus paleae fere duplo longiore. G.

27. GASTRIDIUM (Beauv. agr. 21. t. 6. f. 6.) Valvae valde compressae, basi subgloboso-tumidae, glumella basi glabra; caetera ut Agrostidis. N. ab E. gen. 13. 1.

1. **G. lendigerum** (Gaud. helv. 1. 176.) ⊙. In agris et cultis reg. austr., (Gegend von Genf und in Istrien.) Jul. G. australe Beauv. l. c. Milium lendigerum L. sp. 91. St. h. 26. Agrostis australis L. mant. 1. 30. A. ventricosa Gouan. hort. monsp. 39. t. 1. f. 2. A. panicea Lam. ill. n. 811. Calamagrostis Schwabii Spreng. syst. 1. sec. Reichenb., qui specim. authent. examinavit. Variat:

β. muticum, Gaud. l. c. sec. specimen ab ipso auctore. Ab hac varietate autem Gastridium muticum Spreng. nov. prov. p. 20., G. scabrum Presl. cyp. et gram. sic., quod in ditione florae nostrae nondum repertum est, longe differt. H.

Trib. IX. *STIPACEAE.* Kunth. en. 175. *Spiculae convexae, a dorso paulum compressae, vel teretes,* 1 florae absque rudimento secundi floris. Valva inferior maior. Lodiculae 3, in Milio 2. *Styli nulli vel breves;* stigmata plumosa, e latere spiculae emergentia. *Caryopsis paleis induratis* cartilagineis vel chartaceis arcte *involuta.*

28. MILIUM (L. gen. n. 79., excl. spec.) Gluma bivalvis, 1 flora, utrinque convexa, vel a dorso subcompressa, flore longior. Glumella bipaleacea, denique cartilaginea, mutica, palea inferior ovata ventricoso-convexa. Lodiculae 2. N. ab E. gen. 13. 12.

1. **M. effusum** (L. sp. 90.) panicula patente, paleis acutis, culmo glabro, foliis lanceolato-linearibus. 4. In sylvis umbrosis. Mai.-Jul. D. fl. 1. 500. Leers. herb. t. 8. f. 2. Panicula viridis, rarius spiculae altero latere purpureae, (dieses am Aargletscher, Shuttleworth.) Variat porro:

β. elatius, bicubitale et altius: M. effusum *β.* Gaud. helv. 1. 176. M. confertum Mill. dict. n. 4. et L. sp. 90. Species Milleri „ubique in sylvis nascens" certissime modificationi cuidam M. effusi adnumeranda est; Linnaei autem composita est e planta Scheuchzeriana et e planta culta Royenii; Scheuchzeriana secund. Hallerum et Gaudin. nil nisi varietatem elatiorem M. effusi offert; Royenii vero omnino ad M. confertum Guss., M. scabrum R. et S., Belgiam et Europam australem inhabitans, pertinere videtur. In dit. fl. nostr. hoc ultimum nondum lectum fuit.

29. PIPTÁTHERUM (Beauv. agr. 18. t. 5. f. 10.) Palea inferior apice aristata; arista basi articulata, decidua. Lodiculae 3; caetera ut Milii. N. ab E. gen. 11. 11.

1. **P. paradoxum** (Beauv. agr. 18.) panicula patente, spiculis ovato-lanceolatis, *paleis pubescentibus*, foliis *planis*. 4. In sylvis reg. calid., (Krain, Istrien.) Mai. Jun. Milium paradoxum L. sp. 90. D. fl. 1. 501. Reichenb. ic. 11. 1460. Urachne virescens Trin. unifl. 173. G.

2. **P. multiflorum** (Beauv. agr. 18.) panicula patente, spiculis ovato-lanceolatis, *paleis glabris*, foliis planis. 4. In sylvaticis reg. calid., (südl. Tyrol u. Istrien, Insel Lossino.) Jun. Jul. Milium multiflorum Cav. demonst. 36. D. fl. 1. p. 501. Rchb. ic. 11. f. 1459. Agrostis miliacea L. sp. 91. Milium frutescens Sieb. herb. cret. Urachne parviflora Trin. unifl. 173. G.

30. STIPA (L. gen. n. 90.) Gluma bivalvis, 1 flora, flore longior, valvae acutae vel ex apice aristatae. Glumella bivalvis, denique cartilaginea; palea inferior cylindrico-convoluta, terminata arista torta, basi articulata, sed persistente. Lodicula 3. Caryopsis paleis cartilagineis arcte involuta. N. ab E. 11. 9.

1. **S. pennata** (L. sp. 145.) panicula basi inclusa, *aristis* longissimis genuflexis *plumosis* basi ad quartam longitudinis partem glabris, palea inferiore inferne lineis 5 sericeis notata. 4. In collibus aridis apricis, campis arenosis, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 1. 531. Schk. t. 16.

2. **S. capillata** (L. sp. 116.) panicula basi inclusa, *aristis longissimis* genuflexis *glabris,* palea inferiore inferne lineis 5 sericeis notata. 4. In collibus aridis apricis, (stw. durch d. Geb.) Paulo serius floret. D. fl. 153. St. h. 26.

3. **S. Aristella** (L. syst. nat. ed. 12. 3. 229.) panicula angusta contracta, *aristis* rectis *glabris flore duplo longioribus,* paleis undique adpresso-puberulis. 4. In locis asperis, (Istrien, Fiume, Noé!) Jul. Aug. Reichenb. ic. 11. f. 1461. J.

31. LASIAGRÓSTIS (Link. hort. 1. 91.) Gluma bivalvis, 1 flora, flore longior. Valvae acutae, inferior maior. Glumella bipaleacea, denique subcoriacea, palea inferior dorso pilis elongatis obsita, aristam sub apice emittens validam, genuflexam, non articulatam. Lodiculae 3. Caryopsis paleis arcte involuta. N. ab E. gen. 11. 10.

1. **L. Calamagrostis** (Link. l. c.) panicula patente, arista flore triplo longiore. 4. In rupestribus subalpinis, (südl. u. mittlere Schweiz, Tyrol, Krain, Calvarienberg bei Fuessen.) Jul. Aug. N. ab E. l. c. ic. Agrostis Calamagrostis L. sp. 92. Arundo speciosa Schrad. germ. 1. 219. Stipa Calamagrostis Wahlenb. helv. 25. Calamagrostis argentea DC. fl. fr. 3. 25. C. speciosa Host. gr. 4. t. 45.
Lasiagrostis variegata Meyer. chlor. Hannov. p. 651. mihi ignota est.

Trib. X. *ARUNDINACEAE.* Kunth. en. 1. 236. *Spiculae* 2-*multiflorae. Styli elongati.* Stigmata aspergilliformia in medio, vel supra medium floris emergentia.

32. PHRAGMÍTES (Trinius. fund. agrost. p. 134.) Gluma bivalvis, 3-7 flora; flos inferior masculus, nudus; sequentes hermaphroditi, pilis elongatis cincti. Glumella bipaleacea, mutica, palea inferior apice integra. Stylus longus, stigmata aspergilliformia. N. ab E. gen. 14. 6.

1. **P. communis** (Trin. l. c.) panicula effusa, spiculis 4-5 floris. 4. In stagnis, piscinis, ad ripas fluviorum et lacuum. Aug. Sept. D. fl. 1. 528. Arundo Phragmites L. sp. 120. Leers. herb. t. 7. f. 1.
Variat in locis arenosis sterilibus subhumidis spiculis 1-2 floris: Arundo Phragmites *β.* subuniflora DC. fl. fr. 5. 263. A. Pseudophragmites Lej. spa. 1. 43. Calamagrostis nigricans Merat. paris. ed. 2. 2. 33. In his locis saepe humilis est et longe lateque repit: Phragmites communis b. repens Meyer. chlor. Hannov. (Diese auf d. Insel Norderney und auf den grossen Sandfeldern d. Rheinfläche.) Variat porro:

β. flavescens, spiculae testaceae sunt, caeterum nulla nota differt a specie: Arundo Phragmites *β.* flavescens Custor. ap. Gaud. fl. hel. v. 6. p. 341. A. isiaca Sieber. sec. J. C. Schmidt in reg. bot. Ztg. 13. 2. p. 659. A. Plinii Mayer et Braun reg. bot. Ztg. v. 6. p. 177., non Turra.

33. ARUNDO (L. gen. n. 93., excl. spec.) Gluma bivalvis, 2-7 flora, convexo-compressa, flores subaequans. Glumella bipaleacea, apice trifida, laciniis mucronatis, intermedia in aristam setaceam, longiorem producta. Styli elongati; stigmata aspergilliformia.

1. **A. Donax** (L. sp. 120.) panicula oblonga ramosissima patula, spiculis subtrifloris, *palea inferiore apice bicuspidata* aristataque, pilis florum glu-

mam subaequantibus, *foliis lanceolatis* longe attenuatis. 4. In locis palustribus Istriae, Littoralis, Tyrolis calid.; ibidemque sicut in Helv. austr. colitur in usum oeconomicum. Octob. Host. gram. 4. t. 38. Scolochloa arundinacea D. fl. 1. 539. Donax arundinaceus Beauv. agr. 78.

2. **A. Pliniana** (Turra fl. ital. prodr. p. 63. 1780.) panicula ramosissima elongata anguste oblonga, spiculis 1-2 floris, *palea inferiore ex apice breviter bifido aristata*, pilis florum gluma brevioribus, *foliis lato-linearibus* longe attenuatis. 4. In ripis petrosis, (auf der Nordspitze der Insel Cherso, Noé.) Aug. Sept. A. Plinii Vitm. summ. 1. p. 228. A. collina Tenor. syllog. p. 52. A. mauritanica Desf. fl. atl. 1. p. 106. Spiculae dimidio minores quam A. Donacis. J.

34. AMPELODESMOS (Link. hort. reg. berol. v. 1. p. 136.) Gluma bivalvis, 3-5 flora; valvae flore proximo breviores. Flores lanceolati, compressi, carinati, hermaphroditi. Glumella bipaleacea; palea inferior basi in dorso pilis longiusculis obsita pilisque cincta, ex apice bifido breviter aristata, arista setacea, recta. Styli brevissimi, stigmata plumosa. — Genus conformatione styli et stigmatis Festucaceis adnumerandum, ob habitum Arundinaceis adiunxi.

1. **A. tenax** (Link. l. c.) panicula secunda nutante, foliis linearibus canaliculatis longe attenuatis acutissimis, ligula elongata, culmo farcto. 4. Ad littora maris, (auf dem Scoglio di Gerolamo ausserhalb des Hafens von Pola gegen Brioni zu v. Dr. Sendtner gefunden, Tommasini.) Mai. Jun. Arundo tenax Vahl. symb. 2. p. 25. A. mauritanica Poir. voy. 2. 105. A. festucoides Desf. atl. 1. 100. t. 34. A. Ampelodesmos Cyrillo neap. fasc. 2. p. 30. t. 12. Folia sicca convoluta et apice tenuissimo terminata. J.

Trib. XI. *SESLERIACEAE. Spiculae 2-multiflorae.* Gluma magna flores fere tegens. *Styli nulli vel brevissimi; stigmata filiformia, ex apice floris egredientia,* denticulata vel breviter pilosa.

35. ECHINARIA (Desf. atl. 2. 385.) Gluma bivalvis, 2-4 flora. Glumella bipaleacea, basi membranacea, palea inferior palmato-quinquefida, laciniis lanceolato-subulatis herbaceis rigidis, superior bifida. Styl. nullus, stigmata filiformia longissima, apice denticulata, ex apice floris egredientia. N. ab E. gen. 15. 7.

1. **E. capitata** (Desf. l. c.) ⊙. In locis herbidis Istriae. Mai. Jun. Cenchrus capitatus L. sp. 1488. Sesleria echinata Host. gr. 3. t. 8. N. ab E. l. c. icon. J.

36. SESLERIA (Arduin. specim. 2. p. 18.) Gluma bivalvis, 2-6 flora. Glumella bipaleacea, paleae membranaceae; inferior integra mucronata aristatave, vel apice 3-5 dentata, dentibus mucronatis aristatisve. Styli brevissimi vel nulli; stigmata filiformia, longissima, puberula, ex apice floris egredientia. N. ab E. gen. 13. 19.

Sect. I. Sesleriae genuinae. Racemus spiciformis, simplex vel compositus, undique spiculis tectus.

1. **S. tenuifolia** (Schrader. fl. germ. 1. 172. t. 6. f. 4.) Spica oblonga, spiculis plerumque trifloris, palea inferiore apice in setas 2-4 aristamque intermediam terminata, *setis aristaque* paleam *dimidiam non aequantibus,* foliis anguste linearibus obtusis vel breviter acutatis canaliculatis convolutisve, *vaginis denique in fila flexuoso-intertexta solutis,* radice caespitosa stoloniferaque. 4. In locis saxosis et rupestribus ad littus maris adriat., (Triest u. Fiume.) Mai. D. fl. 1. 625. S. juncifolia Suffren. in Host. gr. 4. t. 22. S. tenuifolia Host. a. 1. p. 138. Aira juncifolia Wulf. Folia speciminum horti nostri, in loco satis sicco et macro cultorum, canaliculata sunt et aperta et neutiquam convoluta. — Forma foliis crassioribus rigidis est: S. juncifolia Host. a. 4. p. 138. G.

2. **S. caerulea** (Arduin. spec. 2. 18. t. 6. f. 3-5.) spica ovali-oblonga subsecunda, spiculis 2-3 floris, palea inferiore apice in setas 2-4 aristamque intermediam terminata, *setis aristaque paleam dimidiam non aequantibus, foliis linearibus planis apice subito in mucronem scabrum contractis*, vaginis integris denique margine fissis, radice caespitosa, stolonibus nullis. 4. In locis rupestribus, siccis, praecipue solo calcareo; in alpes adscendens, (stw. im südl. u. mittlern Geb.; nördlich bis nach Mähren, Böhmen, Sachsen, Thüringen u. d. Harze.) Mart. April, in Alpibus serius. D. fl. 1. 626. Cynosurus caeruleus L. sp. 105. St. h. 6.

3. **S. elongata** (Host. gram. 2. 69. t. 97.) spica elongato-cylindrica, spiculis plerumque trifloris, palea inferiore apice in setas 2-4 aristamque intermediam terminata, *setis aristaque glumam dimidiam non aequantibus, foliis linearibus canaliculatis in acumen scaberrimum attenuatis*, vaginis integris denique margine fissis, radice caespitosa stoloniferaque. 4. In locis rupestribus, pratis siccis, (Krain, Littorale bei Triest, Fiume.) Aug. in autumnum, rarius vere. D. fl. 1. 624. Phleum autumnale Scop. carn. 1. 56. Aira alba Wulf. „Floret, licet rarius, vere, et haec forma est Sesleria elongata Visian.“ Tommasin. in litt. — Sesleria cylindrica DC. fl. fr. 5. 279., S. argentea Sav. bot. etrusc. 1. 68., S. nitida Tenor. fl. neap. 3. p. 57. t. 102. f. 1., in Dalmatia proveniens, a S. elongata differt: spica breviore oblonga, vel ovali, foliis apice subito in mucronem acutissimum contracta, mucrone carinaque foliorum glabris; margine autem folia scabra sunt. G.

4. **S. microcephala** (DC. fl. fr. 3. 76.) spica ovata, spiculis bifloris, palea inferiore 5 aristata, *arista* intermedia *paleam superante*, foliis anguste linearibus obtusiusculis. 4. In rupium fissuris et locis saxosis alpium altissimarum, (Oestr., Steyerm., Kärnthen, Salzb., Tyrol, Watzmann, bayer. Alp.) Jun. Jul. S. tenella Host. gr. 2. 71. t. 100. D. fl. 1. 628. Cynosurus microcephalus Hoffm. germ. ed. 2. 49. C. ovatus Hopp. ap. St. h. 6. G.

5. **S. sphaerocephala** (Arduin. spec. 2. 20. t. 7.) *spica globosa*, spiculis plerumque trifloris, *palea* inferiore apice emarginata *ex emarginatura breviter aristata*, foliis anguste linearibus obtusiusculis. 4. In rupibus alpium, (südl. Schweiz, Tyrol, Steyerm., Kärnthen, Salzburg.) Jul. Aug. D. fl. 1. 628. S. leucocephala DC. fl. 3. 76., varietas spicis albidis. Cynosurus sphaerocephalus Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 71. Jacq. ic. rar. t. 20., varietas albida et caerulea: spicae enim plerumque albidae sunt, variant autem, sed raro, caeruleae. St. h. 6. var. albida.

Sect. II. Oreochloa Link. Spica simplex, unilateralis, disticha.

6. **S. disticha** (Pers. syn. 1. 72.) *spica* ovata *disticha*, spiculis 3-6 floris, *palea* inferiore *mutica vel breviter aristata*, foliis filiformibus. 4. In rupibus summarum alpium, (südl. K. u. höchste Alpen von Graubünden, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen.) Jun. Jul. D. fl. 1. 627. Poa disticha Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 74. St. h. 6. P. seslerioides All. ped. 2. p. 246. t. 91. f. 1. Cynosurus distichus Hoffm. D. fl. ed. 2. 1. p. 49.

Trib. XII. *AVENACEAE.* Kunth. en. 1. p. 286. *Spiculae 2-multiflorae*, flore terminali saepe tabescente. *Gluma magna*, spiculam fere cingens. *Styli brevissimi vel nulli, stigmata* plumosa, *e basi floris utrinque egredientia.*

37. KOELERIA (Pers. syn. 1. 97.) Spiculae 2-multiflorae; flores hermaphroditi. Gluma compresso-carinata, bivalvis. Glumella bipaleacea, palea inferior ex apice integro bifidove mucronata vel aristata, arista setacea, recta. Styli brevissimi, stigmata plumosa, ad latera spiculae emergentia.

Sect. I. Airochloa. Palea inferior mutica vel breviter mucronata.

1. **K. cristata** (Pers. syn. 1. 97.) panicula spiciformi basi interrupta, spiculis 2-4 floris, *palea* inferiore acuminata *mutica vel mucronata, foliis*

planis, inferioribus *ciliatis*, *vaginis* foliorum emarcidis *indivisis*. 4. In collibus herbidis, pratis siccis. Jun. Jul. D. fl. 1. 580. St. h. 85. Aira cristata L. sp. 94. Poa cristata L. syst. nat. 2. 94. Leers. herb. t. 5. f. 6. Dactylis cristata MB. t. c. 1. 67. Festuca cristata Vill. delph. 2. 93. Airochloa cristata Link. hort. 1. 127. Variat foliis praeter cilia glabris et foliis vaginisque villosis. Ad formam vulgarem pertinet: Koeleria avenacea Tausch. pl. sel., qui fortasse varietatem γ. nostram pro specie primaria sumsit:

β. *gracilis*, foliis angustissimis, spica elongata, angusta, gracili: K. cristata γ. DC. fl. fr. 5. p. 269 β. D. fl. l. c.

γ. *maior*, culmo bipedali et altiore, panicula subsemipedali lobata, spiculis 4 lineas longis: K. cristata γ. DC. l. c. D. fl. l. c. Poa pyramidata Lam. ill. 1. p. 183.

2. **K. glauca** (DC. hort. monsp. 116.) panicula spiciformi basi interrupta spiculis 2-3 floris, *palea* interiore obtusiuscula *mutica vel mucronulo apici obtuso imposito* instructa, *foliis* planis *glabris*, *vaginis* foliorum emarcidis *indivisis*. 4. In campis arenosis, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. Reichenb. ic. 11. f. 1672. Poa 1672. Poa glauca Schk. cat. hort. Wittenb. 1799. p. 49. Aira glauca Schrad. germ. 256.

3. **K. valesiaca** (Gaud. agr. 1. 149.) panicula spiciformi dense conferta, spiculis 2-3 floris, palea inferiore acuminata mutica vel mucronata, foliis radicalibus convolutis glabris, *vaginis foliorum emarcidis denique in fila flexuoso-intertexta solutis*. 4. In collibus apricis Valesiae inferioris vulgaris. April. Mai. Aira valesiaca All. auct. p. 40. Variat:

β. *setacea*, palea inferiore dorso villoso ciliata: K. valesiaca Reichenb. ic. 11. f. 1671. K. setacea DC. hort. monsp. p. 118. K. setacea et K. tuberosa Pers. syn. 1. 97. Festuca splendens Pourret. act. toul. 3. Poa pectinata Lam. ill. 1. p. 183. — Ab hac varietate K. grandiflora Bertol. fl. ital. 1. 436., K. gracilis Guss. sic. prodr. 1. 121., K. splendens Presl. gram. sicul. p. 34., ad quam cl. Bertolonius Koeleriam setaceam DC. trahit, omnino diversa est. H.

Sect. II. Koeleria. (Koeleriae spuriae et festucaeformes DC. hort. monsp. 118.) Palea inferior ex apice integro vel bifido aristata. In K. hirsuta palea nunc ex apice integro, nunc ex fissura apicis bifidi aristam emittit.

4. **K. hirsuta** (Gaud. agr. 1. p. 150.) panicula spiciformi ovata vel ovato-oblonga, *spiculis* 2-3 floris *villosis*, floribus ex apice integro vel bifido aristatis, foliis anguste linearibus glabris, *culmo superne tomentoso*, radice fasciculis foliorum fertilibus sterilibusque caespitosa. 4. In rupibus et pascuis petrosis alpium editissimarum, (Schweiz a. d. Furca, am Rhonegletscher, i. Merzenbach Zehnden Gombs und auf dem Distelthurm in der Egina, Dr. Lagger; südl. Tyrol a. d. Schlehern, zwischen Rabbi u. Martel, Fedaia in Fassa, Timpeljoch im Oetzthale; im Passeyerthale bei Mös am Ortles.) Jul. Aug. D. fl. 1. 582. St. h. 85. Reichenb. ic. 11. f. 1673. Aira hirsuta Schleich. pl. exsicc. Festuca hirsuta DC. fl. fr. 3. 53. Airochloa hirsuta Link. hort. 1. 129.

5. **K. phleoides** (Persoon. 1. 97.) panicula spiciformi cylindracea, *spiculis* 4-5 floris *villosis*, floribus inferioribus sub apice aristatis, aristis florem superantibus setaceis mollibus, foliis lato-linearibus pilosis, *culmo glabro*, radice pluriculmi fasciculis sterilibus destituta. ☉. In cultis et ad vias, (Istrien, um Fiume u. auf d. Inseln.) Mai. Jun. D. fl. 1. 532. Festuca phleoides Vill. delph. 2. 95. t. 2. f. 7. Host. gr. 3. t. 21. Trisetum phleoides Trin. act. petrop. 1830. 1. 65. Bromus trivialis Sav. pis. 1. 124. Festuca cristata L. sp. 111. J.

38. LAMARCKIA (Moench. meth. 201.) Spiculae hermaphroditae neutris pluribus mixtae. Hermaphr. 1 florae cum rudimento secundi floris. Gluma bivalvis, valvae angustae, aristato-acuminatae, flores aequantes vel longiores. Flos inferior perfectus, stipite a valvis remotus; glumella bipaleacea, palea inferiore ex apice bifido aristata, arista recta. Ovarium glabrum. Stylus brevis. Stigmata elongata, breviter pilosa. Flos imperfectus

stipitatus, sub apice aristatus. Spiculae neutrae gluma bivalvis, formata ut floris hermaphroditi, 5-8 flora; flores unipaleacei, genitalibus nullis, palea ovata, rotundato-obtusa. N. ab E. gen. 14. 9.

1. **L. aurea** (Moench. l. c.) ☉. In locis saxosis herbidis Istriae, Host. Mai. Jun. D. fl. 1. 630. N. ab E. l. c. icon. Cynosurus aureus L. sp. 107. Chrysurus cynosuroides Pers. syn. 1. 80. Host. fl. a. 1. 70. C. aureus Beauv. agr. 123. — Genus Lamarckiae a Cynosuro tota florum fabrica longe distat. J.

39. AIRA (Linn. gen. n. 81., exclus. spec. plurimis.) Spiculae 2 florae, vel 2 florae cum rudimento pedicellato tertii floris, rarius triflorae. Flores hermaphroditi. Gluma compressa, bivalvis. Glumella bipaleacea; palea inferior in basi vel in medio dorsi aristata, arista medio inflexa vel subrecta. Styli brevissimi, stigmata plumosa ad basin floris progredientia.

Sect. I. Deschampsia Beauv. Arista paulum tantum inflexa et basi vix torta.

1. **A. caespitosa** (L. sp. 96.) *foliis planis supra scaberrimis*, panicula ampla lato-pyramidali, pedicellis scabris, arista setacea paleam plerumque aequante, *radice dense caespitosa.* ♃. In pratis fertilibus et sylvaticis subhumidis. Jun. Jul. Aira caespitosa D. fl. 1. 552. Leers. herb. t. 4. f. 8. Deschampsia caespitosa Beauv. agr. 91. Folia supra scaberrima. Variat 1. spiculis duplo maioribus, muticis, (ab amico Hopp. in Alpib. lecta,) 2. spiculis trifloris, flore tertio perfecto vel abortu ovarii masculo, (ab eodem ad moles glaciales Alpium altissim. Carinth. lecta,) 3. spiculis viviparis, (cl. Sauter., prope lacum bodamicum lectam, mecum communicavit.) In alpibus occurrit saturatissime colorata simulque humilior: quae eadem in demissiora loca quoque descendit ibidemque varietatem littoralem Gaud. helv. 1. 323. efficit; in siccioribus planta quoque humilior fit et folia denique involvuntur, haec est: Aira alpina Roth. tent. 2. 1. 98. non L., A. caespitosa *β.* Roth. en. 1. 252., B. Auctor l. c. habet „folia demum involuta", qua nota haec forma a varietate setifolia Bisch. satis differt.

β. pallida, valvis ochroleucis, dorso viridibus, paleis viridi-flavescentibus, apice albis: Aira altissima Lam. fl. fr. p. 581. Aira parviflora Thuill. par. ed. 2. 1. p. 38. Haec in locis umbrosis provenit. An h. l. sit Aira caespitosa a. fluviatilis Meyer. chlor. hannov. p. 639., ad quam cl. Auctor A. bottnicam Wahlenberg. trahit, dijudicare nequo. Vera autem A. bottnica ab A. caespitosa, me quidem iudice, satis differt bonamque exhibet speciem. Differt toto habitu, panicula angusta, stricte erecta nec ampla, diffusa et nutante; ramis multo minus compositis, spiculis 10-20 tantum, nec 50-60 gerentibus; spiculis duplo maioribus, valvis ratione longitudinis evidenter angustioribus, flore secundo longius pedicellato, pedicello tertii floris longitudinem floris secundi attingente, aristaque multo validiore, florem bis fere superante.

γ. setifolia, foliis omnibus ab initio setaceis convolutis, forma foliorum Festucae ovinae: A. caespitosa var. setifolia G. W. Bischoff in litt. (In dem seit mehreren Jahren vor dem Mannheimer Thor zu Heidelberg begonnenen Hafen, der aber noch wasserleer ist.)

2. **A. Wibeliana** (Sonder in litt.) *foliis planis supra scabriusculis*, panicula diffusa oblongo-pyramidali, pedicellis scabris, arista setacea paleam inferiorem aequante, *radice stolonifera.* ♃. In locis arenosis humidis vel lutosis ad ripas fluviorum, non in paludibus, (Ufer der Elbe bei Hamburg u. Altona.) Jun. Jul. A. paludosa Wib. werthh. pag. 118., qui plantam prope Altonaviam nec in ditione florae Werthhemensis legit, et qui eam nomine Airae paludosae Rothii salutavit; sed haec ultima, Scheuchzero desumpta, planta dubia est, quae probabiliter ad Airae caespitosae varietates pertinet. Descriptio Rothii ab Aira uliginosa Weihe longe recedit. G.

Sect. II. Avenella. Compend. fl. germ. ed. 2. 1. 1. p. 130. Arista evidentius inflexa et basi torta. Ab Avena differt haec sectio palea inferiore truncata, denticulata, nec bidentata vel bicuspidata.

3. **A. flexuosa** (L. sp. 96.) panicula patente nutante, floribus glumam

valde inaequalem vix superantibus, supra basin aristatis, *pedicello floris secundi flore ipso quadruplo breviore, foliis angustissimis subsetaceis tereti-filiformibus solidis, ligula breviuscula truncata.* 4. In sylvis et ericetis, etiam in siccissimis et sterilissimis. Jun.-Aug. Avena flexuosa D. fl. 1. 570. Leers. herb. t. 5. f. 1. Variat spiculis dilutiūs et saturatius coloratis. Varietas spiculis saturate tinctis et panicula minore contractiore est A. montana L. fl. suec. p. 24., sed primitus Linnaeus sub hac Airam bottnicam Wahlenb. intellexisse videtur.

4. **A. uliginosa** (Weih. ap. v. Boeninghausen prodr. fl. monaster. p. 25.) panicula patente erecta, floribus glumam aequalem vix superantibus supra basin aristatis, *pedicello floris secundi longitudine dimidii floris ipsius, foliis angustissimis planis vel complicatis, ligula oblonga attenuato-acuta.* 4. In locis inundatis et in uliginosis turfosis, (Westphalen u. Ostfriesland.) Aug. Sept. multo serius antecedente. Reichenb. ic. 2. f. 280. Aira paludosa Weih. deutsch. Gräser. A. flexuosa b. paludosa Meyer. chlor. hannov. 638. Differt ab antecedente foliis angustissimis quidem, sed planis vel complicatis, nec tereti-filiformibus et solidis, ligula longe attenuata, panicula erecta magis multiflora, spiculis duplo minoribus, glumae valvis obtusioribus fere aequalibus et flore secundo longius pedicellato. Conf. prod. fl. monast. l. c. G.

40. CORYNÉPHORUS (Beauv. agr. 90. t. 18. f. 2.) Palea inferior integra, arista dorsalis recta, medio articulata, superne clavata, ad geniculum barbata; caetera ut Airae.

1. **C. canescens** (Beauv. l. c.) panicula patente, conferta, floribus gluma brevioribus, foliis setaceis. 4. In campis arenosis sterilissimis. Jul. Aug. Aira canescens L. sp. 97. D. fl. 1. 554. Weingärtneria canescens Bernh. erf. 51. Schk. t. 12.

41. HOLCUS (L. gen. n. 1146., excl. spec. plurimis.) Gluma bivalvis, biflora; flos inferior hermaphroditus, muticus; superior masculus, arista dorsali recta, denique reflexa. Glumella bipaleacea, palea inferior apice integra. Styli brevissimi; stigmata plumosa, ad basin floris emergentia. N. ab E. gen. 14. 4.

1. **H. lanatus** (L. sp. 1485.) panicula patente, *arista* floris masculi recurvata *glumae inclusa*, radice fibrosa. 4. In pratis, pascuis, sylvis. Jun.-Aug. D. fl. 1. 550. Avena lanata Koel. gr. 303. Leers. t. 7. f. 6.

2. **H. mollis** (L. sp. 1485.) panicula patente, *arista* floris masculi geniculato-inflexa *glumam excedente*, radice repente. 4. In sylvis et dumetis. Jul. Aug. D. fl. 1. 551. Avena mollis Koel. gr. 300. Leers. t. 7. f. 7.

42. ARRHENÁTERUM (Beauv. agr. 55. t. 11. f. 5.) Gluma bivalvis, biflora; flos inferior masculus, dorso aristatus, arista geniculato-inflexa; flos superior hermaphroditus, muticus, vel sub apice breviter aristatus. Glumella bipaleacea. Styli o, stigmata plumosa, ad basin floris emergentia.

1. **A. elatius** (Mert. et Koch. D. fl. 1. 546.) foliis planis. 4. In pratis, pascuis, dumetis, ad sylvarum oras. Jun. Jul. A. avenaceum Beauv. l. c. Avena elatior L. sp. 117. Leers. t. 10. f. 4. Holcus avenaceus Scop. carn. 2. p. 276. Variat spiculis breviter aristatis et muticis, nodis culmi glabris villosisve, atque:

α. vulgare, culmo basi non tuberoso-tumido.

β. bulbosum, culmo basi in tubera 2-3 superimposita incrassato: A. elatius *β.* D. fl. 547. A. bulbosum Schlecht. berol. 85. Avena bulbosa Willd. nov. act. soc. berol. 2. 116. A. precatoria Thuill. par. ed. 2. 58. Holcus bulbosus Schrad. germ. 1. 248. Praeter radicem non differt a varietate *α*, tamen species peculiaris videtur.

43. AVENA (Linn. gen. n. 91.) Gluma bivalvis, 2-multiflora. Flores hermaphroditi. Glumella bipaleacea, palea inferiore apice bidentata vel biaristata quandoque bifida, laciniis irregulariter denticulatis, arista dorsali genuflexa, basi torta. Ovarium apice pilosum vel glabrum. Styli nulli; stigmata plumosa ad basin floris emergentia.

Sect. I. Avenae genuinae. Spiculae, saltem defloratae, pendulae. Valvae 5-9 nerviae. Ovarium apice pilosum. Radix annua; fasciculi foliorum steriles nulli.

1. **A. brevis** (Roth. Abhandl. 42., tent. 1. 40.) panicula secunda, glumis plerumque bifloris flores aequantibus, *valva superiore 7 nervia, floribus glabris vel superne setoso-pilosis oblongis obtusis* apice bifidis denticulatisque, axe glabro sub floribus fasciculato-piloso. ⊙. Inter segetes, (im Herzogth. Bremen seltner, häufiger im Herzogth. Verden, O. F. Lang; in Unteröstr.) Jul. Aug. D. fl. 1. 555. Host. gr. t. 42. G.

2. **A. hybrida** (Petermann ap. Reichenb. fl. sax. p. 17.) *panicula aequali* patente, glumis plerumque bifloris flores superantibus, valva *superiore* 9 *nervia, floribus glabris* lanceolatis apicem versus angustatis apice bifidis subdenticulatisque omnibus aristatis, *axe calloque florum setoso-hirsutis.* ⊙. Inter segetes, (Sachsen bei Rückmarsdorf und Dölzig, Peterm.; Schwarzb. Rudolst. um Singen, Tondern in Schleswig, Schönheit.) Jul. Aug.

3. **A. sativa** (L. sp. 118.) *panicula* patente *aequali*, glumis plerumque bifloris flores superantibus, *valva superiore* 9 *nervia, floribus glabris* lanceolatis apicem versus angustatis *apice bifidis denticulatisque*, superiore mutico, axe glabro ad basin floris infimi breviter fasciculato-piloso. ⊙. Colitur. Jul. Aug. D. fl. 1. p. 556. Host. gr. 2. t. 56. Variat floribus omnibus muticis paleisque in fructu maturo albidis nigrisve. Varietas spiculis subtrifloris, flore uno alterove aristato: A. trisperma Schübl. et Mart. fl. würtemb. p. 72. Colit.

4. **A. orientalis** (Schreb. spicil. 52.) *panicula secunda* contracta, glumis plerumque bifloris flores superantibus, *valva superiore* 9 *nervia, floribus glabris* lanceolatis apicem versus angustatis *apice bifidis denticulatisque*, superiore mutico, axe glabro ad basin floris infimi breviter fasciculato-piloso. ⊙. Colitur. Jul. Aug. D. fl. 1. 557. Host. gr. 3. t. 44. Colit.

5. **A. strigosa** (Schreb. spicil. 52.) panicula subsecunda, glumis plerumque bifloris flores aequantibus, *valva superiore* 7-9 *nervia, floribus glabris* lanceolatis apicem versus attenuatis dorso aristatis, arista geniculata, *apice bifidis laciniis aristatis*, aristis rectis, axe glabro ad basin floris superioris fasciculo pilorum brevi. ⊙. Colitur et occurrit hinc inde inter segetes quasi spontanea. Jul. Aug. D. fl. 1. 557. Host. gr. 2. t. 56. A. nervosa Lam. ill. n. 1115. Danthonia strigosa Beauv. agr. 160. Colit.

6. **A. nuda** (L. sp. 118.) panicula subsecunda, glumis plerumque trifloris, *valva superiore* 7-9 *nervia,* floribus glumam excedentibus lanceolatis *glabris a basi ad apicem valide nervosis*, apice cuspidato-bifidis, superiore mutico, axe glabro. ⊙. Colitur hinc inde. Jul. Aug. D. fl. 1. 558. Host. gr. 3. t. 43. Ab antecedentibus palea inferiore herbaceo-membranacea, nervis validis percurrentibus instructa, facile dignoscitur. Colit.

7. **A. sterilis** (L. sp. 118.) panicula secunda, glumis plerumque quadrifloris, *valva superiore* 9 *nervia, floribus* lanceolatis apice dentato-bifidis, *inferioribus* duobus dorso aristatis a basi fere ad medium *setoso-pilosis, superioribus* muticis *axeque glabris.* ⊙. Inter segetes, (Istrien u. Fiume.) Jul. Aug. D. fl. 1. 557. Jacq. ic. rar. t. 23. J.

8. **A. fatua** (L. sp. 118.) panicula aequali patente, glumis plerumque trifloris, *valva superiore* 9 *nervia, floribus* lanceolatis, *apice dentato-bifidis* dorso aristatis a basi ad medium *setoso-pilosis,* axe hirtuso. ⊙. Inter segetes. Jul. Aug. D. fl. 1. 559. Schreb. gr. 1. t. 15.

9. **A. hirsuta** (Roth. cat. 3. 19.) panicula secunda patula, glumis plerumque bifloris, *valva superiore* 9 *nervia, floribus* lanceolatis dorso aristatis a basi fere ad medium *setoso-pilosis apice bifidis, laciniis setaceis in aristam rectam excurrentibus,* axe hirsuto. ⊙. Inter segetes, in pratis, ad vias, (Fiume, Osero. u. d. Inseln um Istrien.) Jul. Aug. A. barbata Brot. lusit. 108. A. atherantha Presl. cyp. et gr. sicul p. 30. J.

Sect. II. Avenastrum. Spiculae non pendulae. Valvae 1-3 nerviae. Ovarium apice pilosum. Radix perennis, fasciculos foliorum steriles culmosque fertiles agens.

10. **A. planiculmis** (Schrad. fl. germ. 1. 381. t. 6. f. 2.) panicula elongata contracta, ramis geminis ternis quaternisve, longioribus spiculas 2-3 gerentibus, spiculis subsexfloris, valvis trinerviis, ovario apice axeque piloso, foliis glabris margine scabris, culmeis lanceolato-linearibus, *vaginis ancipitibus plano-compressis.* 4. In locis subalpinis scaturiginosis, (in Schlesien auf d. Schneeberg der Grafsch. Glatz; im Gesenke; auf Waldwiesen am rechten Ufer der Drau bei Marburg in Steyerm.) Jul. Aug. D. fl. 1. 567. G.

11. **A. pubescens** (L. sp. 1665.) panicula aequali racemosa, ramis spiculam solitariam, longioribus vero spiculas 2 gerentibus, inferioribus subquinis, spiculis 2-3 floris, *flore inferiore in medio dorsi aristato apicem versus argenteo-scarioso, valvis uninerviis* apice albo-scariosis, superiore spiculam aequante vel paulo breviore, *ovario apice* axeque *piloso, pilis ad basin floris secundi florem dimidium fere aequantibus, foliis* linearibus planis *pagina utraque vaginisque inferioribus villosis.* 4. In pratis. Mai. Jun. D. fl. 1. 568. Leers. herb. t. 9. f. 2.

12. **A. amethystina** (Clarion. ap. DC. in fl. fr. v. 5. p. 260.) panicula aequali racemosa, ramis spiculam solitariam, longioribus vero spiculas 2 gerentibus, inferioribus subquinis, spiculis subifloris, *flore inferiore triente supra basin aristato a medio ad apicem argenteo-scarioso, valvis trinerviis* a basi ad tertiam longitudinis partem coloratis, superiore spiculam superante, ovario apice axeque pilosis, *pilis ad basin floris secundi fere dimidiam floris attingentibus,* foliis linearibus planis pagina utraque vaginisque inferioribus villosis. 4. In montosis, (am Monte Baldo bei St. Giacomo im südl. Tyrol.) Mai. Valvae fere duplo maiores quam in Avena pubescente, a basi ad tertiam longitudinis partem violaceae, superior 8 lineas longa. Palea superior angulis glabra, non ciliata. G.

13. **A. alpina** (Smith. engl. fl. 1. 165.) panicula contracta racemosa, *ramis geminis* spiculam solitariam, longioribus rarius binas gerentibus, *spiculis sub 8 floris, floribus dorso supra medium aristatis,* valva superiore trinervia, axe piloso pilis articulorum superioribus callo triplo longioribus, ovario apice piloso, *foliis* linearibus *supra scaberrimis,* vaginis teretibus. 4. In alpibus Carniolicis, (in d. Wochein.) Jul. Aug. Avena alpina Reichenb. ic. 12. f. 1703. A. praeusta Reichenb. fl. exc. 140. add. 5. — Panicula habitu Avenae planiculmis, characteribus A. pratensis, a qua differt spiculis maioribus ramis paniculae superioribus geminis, et arista altius inserta. G.

14. **A. pratensis** (L. sp. 119.) panicula contracta racemosa, *ramis* inferioribus geminis, *superioribus solitariis,* omnibus spiculam solitariam, vel longioribus infimorum spiculas binas gerentibus, *spiculis* 4-5 *floris, floribus dorso in medio aristatis,* valva superiore trinervia, axe piloso, pilis articulorum superioribus callo triplo longioribus, ovario apice piloso, *foliis* linearibus *supra scaberrimis,* vaginis teretibus. 4. In pratis siccis, collibus lapidosis incultis, ad sylvarum oras, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 1. 569. Leers. herb. t. 9. f. 1. Specimina maxima in humo pingui sylvarum enata, spiculis 6-8 floris: A. bromoides D. fl. 1. p. 570., K. syn. ed. 1. p. 795. — Avena bromoides L. (non M. et K.) a Domino Sonder in Gallia australi observata et collecta, Avenae pratensi quidem valde similis, sed certo specie distincta. Differt spiculis semper 6-8 floris, pube axis brevissima et pilis in apice articulorum axis vix callum superantibus. Haec in Littorali austriaco quaerenda.

15. **A. versicolor** (Vill. delph. 2. 142. t. 4. f. 5.) panicula subovata racemosa, ramis geminis spiculam solitariam binasve gerentibus, spiculis 5 floris, floribus in medio dorsi aristatis, valva superiore trinervia, axe piloso, pilis articulorum callo triplo longioribus, *ovario apice piloso, foliis* linearibus *supra laeviusculis.* 4. In pascuis alpium editiorum, (Schweiz u. dch. d. g. Alpenk. bis Steyermark.) Jul. Aug. St. h. 26. A. Scheuchzeri All. ped. 2. p. 255. D. fl. 1. 570.

16. **A. sempervirens** (Vill. delph. 2. 140. t. 5. sec. Bertol. fl. ital. v. 1. p. 698.) panicula diffusa, ramis inferioribus ternis quaternisve, *longioribus*

spiculas 2-5 *gerentibus*, spiculis 3-4 floris, floribus 2 inferioribus in medio dorsi aristatis, superioribus 1-2 imperfectis muticis, *palea inferiore punctulis minutissimis scabra opaca a basi* 3-5 *nervia*, valva superiore trinervia, *ovario apice* axeque *piloso*, *foliis* radicalibus complicatis rigidis supra scabris, *ligula culmeorum oblonga glabra*. ♃. In declivibus saxosis alpium, (Oestr., Steyermk., Krain, bayer. Alpen.) Jul. Aug. A. sempervirens Host. fl. a. 1. p. 124., Allion. auct. p. 45., (sec. Bertolon.) Reichenb. ic. v. 11. f. 1701. In K. et M. D. fl. auctoritate B. Lapeyrousii cum aliis commixta. Vaginae foliorum infimorum saepe pilis brevibus patentibus vel reflexis hirtae. Num ad hanc nostram Avenam sempervirentem planta Villarsii pertineat, vel ad aliam affinium specierum, ex descriptione Villarsii erui nequit. Nostra planta ab affinibus Avena fallaci, A. sempervirente DC. et A. sedinensi DC. ligula oblonga glabra statim distinguitur. Rami inferiores paniculae in speciminibus macrioribus solitarii geminive, ut in sequentibus aliisque.

G.

17. **A. striata** (Lam. dict. v. 1. p. 332.) panicula diffusa, *ramis inferioribus ternis quaternisve*, *longioribus spiculas* 2-3 *gerentibus*, spiculis 3-4 floris, floribus omnibus inferioribus duobus in medio dorsi aristatis, superioribus 1-2 imperfectis, *palea inferiore laevi nitida obsolete nervosa apice vero* punctulis minutissimis scabrida *evidenterque* 5 *nervia*, valva superiore trinervia, ovario apice axeque pilosis, foliis radicalibus complicatis rigidis supra scabris, *ligula culmeorum brevi dense ciliata*. ♃. In rupium fissuris, (allenthalben auf d. Insel Lossino v. Dr. Sendtner entdeckt, Tommasini.) Mai. A. fallax Tenor. syllog. p. 51. n. 6. Bertol. fl. ital. v. 1. p. 700. et sec. specimen siculum a cl. Tineo ad Deckerum datum. A. fallax R. et S.? hoc sub nomine Avenam sempervirentem DC. comprehendunt, speciem ab A. striata Lam. ex mea opinione diversam. Folia radicalia et caulina inferiora ad basin in apice vaginae externe pube brevi densa induta „pubescentes à l'entrée de leur gaine" Lam. l. c. — Avena striata facile dignoscitur ab antecedente ligula, palea inferiore basi laevi nitida et floribus omnibus, etiam superioribus, qui imperfecti sunt, aristatis.

Specimen speciei, memoratis duabus simillimae, ab amico Mertensio accepi, quod D. Clarion in alpibus Delphinatus legerat. Hoc mihi referre videtur Avenam sempervirentem DC. et plantam Carnicam, quam cl. Bertol. in flor. ital. v. 1. p. 700. sub Avena fallaci descripsit. Ligula brevis est ciliata, et ad exortum vaginae altero latere fasciculo pilorum longiusculorum praedita, qua nota ab A. sempervirente illico distinguitur; ab A. striata Lam. autem differt palea inferiore conspicue longiore, a basi scabrida opaca, et a basi evidenter quinquenervia pilisque floris secundi dimidium florem aequantibus. — Aliam simillimam plantam in Pyrenaeis lectam Dn. Salzmann mecum communicavit sub nomine Avenae sedinensis. Spiculas habet Avenae sempervirentis, sed ligula brevis et ciliata et folia planiora. Dubius, ut ulterius in loco natali inquirantur, duas hic memoratas plantas propono, nam ex paucis et partim incompletis speciminibus nil clari eruere potueram.

J.

Sect. III. Ventenata Koel. gram. 273. Flos inferior ex apice, non ex dorso, aristatus. Valvae 7-9 nerviae. Ovarium glabrum.

18. **A. tenuis** (Moench. meth. 195.) panicula aequali, spiculis plerumque trifloris, valvis 7-9 nerviis, *flore inferiore apice in aristam acuminato dorso non aristato*, sequentibus apice cuspidato-biaristatis dorsoque arista geniculato-inflexa instructis, radice fibrosa. ☉. In collibus et montibus apricis sterilibus, (in d. Gebirgen d. Rheinpfalz, v. Neustadt an d. Haardt u. Zweibrücken an u. dch. d. Geb. der Nahe u. Mosel u. bis nach d. Niederlanden; im Maingebiete bis Würzburg u. dch. Hessen bis Göttingen, sodann im Littorale, in Unteröstreich u. Mähren.) Jun. D. fl. 1. 560. A. dubia Leers. t. 9. f. 3. A. triaristata Vill. delph. 2. 148. t. 4. A. striata Lam. ill. 1. p. 200. A. fertilis All. auct. 45. Ventenata bromoides et avenacea Koel. gram. 273. 274. Bromus triflorus Pollich. palat. p. 119. Holcus biaristatus Wiggers. hols. p. 72. Trisetum tenue R. et S. syst. 2. 657.

G.

Sect. IV. Trisetum Persoon. Arista e medio floris vel supra medium prodiens. Valvae 1-3 nerviae. Folia linearia, plana. Ovarium glabrum, (excepta A. alpestri.) — Persoonius Triseto, saltem quod species mihi cognitas attinet, per erorem aristam dorsalem non contortam tribuit.

19. **A. flavescens** (L. sp. 118.) *panicula diffusa aequali,* ramis longioribus spiculas 5-8 gerentibus, spiculis trifloris, valva superiore trinervia oblongo-lanceolata supra medium acuminata, *ovario glabro, axe piloso, pilis flore multo brevioribus,* palea inferiore breviter setaceo-bicuspidata, culmis simplicibus, foliis planis. 4. In pratis. Jun. Jul. D. fl. 1. 562. Leers. herb. t. 10. f. 5. Trisetum flavescens Beauv. agr. 88. T. pratense Pers. syn. 1. 97. T. splendens Presl. gr. sicul. p. 30. Variat spiculis duplo maioribus: Avena flavescens *β.* maior. Schrad. germ. 378.; atque spiculis variegatis, valvis nempe striaque in floribus obscure violaceis: Avena flavescens *γ.* variegata Gaud. helv. 1. 337.; haec varietas non solum in Alpibus, sed etiam in planitiebus, quamvis rarius, occurrit.

20. **A. alpestris** (Host. gr. 3. 27. t. 39.) *panicula diffusa aequali,* ramis longioribus spiculas 3-6 gerentibus, spiculis 3 floris, *valva superiore 3 nervia lanceolata a medio sensim attenuata, ovario apice pubescente,* axe piloso pilis flore multo brevioribus, palea inferiore apice breviter setaceo-bicuspidata, culmis simplicibus, *foliis planis vaginisque pilosis.* 4. In pascuis Alpium, (Oestreich u. Steyermark.) Jul. Aug. D. fl. 1. 563. St. h. 85. A. sesquitertia Host. syn. 60. Trisetum alpestre Beauv. agr. 88. — Avenae flavescenti simillima est sed differt culmo humiliore, valva superiore iam a medio apicem versus attenuata, quae in A. flavescente a basi sensim et supra medium usque latior fit et inde in acumen angustatur; porro aristis paulo validioribus et ovario apice puberulo. Ob hanc ultimam notam propius accedit ad sect. 1. et 2. G.

21. **A. distichophylla** (Vill. delph. 2. 144. t. 4. f. 4.) panicula diffusa aequali, ramis longioribus 3-4 spiculas gerentibus, spiculis plerumque trifloris, *valva utraque 3 nervia, ovario glabro, axe piloso, pilis ad basin floris inferioris florem dimidium aequantibus,* palea inferiore setaceo-bicuspidata, culmis basi decumbentibus radicantibus ramosissimis, foliis planis. 4. In alpibus editioribus in locis declivibus siccis inque torrentium glareis, (südl. Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.) Jul. Aug. D. fl. 1. 563. A. brevifolia Host. gr. 3. t. 40. St. h. 26. Trisetum distichophyllum Beauv. agr. 88.

22. **A. argentea** (Willd. enum. p. 125.) panicula diffusa aequali, ramis longioribus 4-8 spiculas gerentibus, spiculis plerumque trifloris, *valva superiore ad basin 3 nervia, ovario glabro, axe piloso, pilis ad basin floris inferioris tertiam floris partem aequantibus,* palea inferiore setaceo-bicuspidata, culmis basi decumbentibus radicantibus ramosissimis, foliis planis. 4. In rupibus et glareosis alpium, (Schweiz, Salzburg, Tyrol, Kärnthen, Steyermark.) Jul. Aug. A. distichophyllae varietas Koch. syn. ed. 1. p. 797. A. distichophylla Host. gr. 2. t. 53. Schrad. germ. 1. 380. St. h. 26. Culmi tenuiores altioresque atque spiculae minores, quam in antecedente, a qua hanc nunc separo.

23. **A. subspicata** (Clairvill. man. 17.) *panicula spiciformi ovata vel cylindrica et sublobata conferta,* spiculis subtrifloris, valva superiore trinervia, *ovario glabro, axe piloso,* pilis flore multo brevioribus, palea inferiore apice bifida, laciniis lanceolatis mucronatis, culmis subsimplicibus, foliis planis. 4. In summis alpibus ad moles glaciales, (Schweiz, Tyrol, Salzburg, Steyermark, Kärnthen.) Jul. Aug. Aira spicata L. sp. 2. 95. A. subspicata L. syst. nat. 2. 91. Avena airoides Koel. gr. 298. D. fl. 1. 566. Avena subspicata Gaud. helv. 1. 339. St. h. 86. Rchb. ic. 11. 1691. Trisetum airoides Roem. et Schult. syst. 2. 668. Koeleria subspicata Rchb. fl. exc. p. 49.

24. **A. Cavanillesii** (Koch. suppl. zur D. fl. ined.) panicula spiciformi conferta, spiculis bifloris, *valva superiore obsolete trinervia, ovario glabro, axe piloso, pilis florem subaequantibus, floribus* supra medium dorsi aristatis

apice bisetosis, setis flore dimidio longioribus, culmo apice foliis vaginisque pubescentibus. ⊙. In locis incultis, ad vias, (bisher bloss um Montorge bei Sitten u. um St. Leonhard im Wallis.) April. Avena Loefflingiana Cav. ic. 1. t. 45. f. 1. Gaud. helv. 1. 340. Trisetum Cavanillesii Trin. in act. petrop. 1830. 1. 63. H.

Sect. V. Caryophyllea. Arista infra medium floris egrediens. Valvae 1-3 nerviae. Ovarium glabrum. Folia convoluto-setacea. — Ab Aira haec sectio differt palea inferiore apice bicuspidata, nec truncata et denticulata.

25. **A. caryophyllea** (Wigg. primit. fl. hols. p. 10.) *panicula patente trichotoma, spiculis bifloris in ramulorum apice subcongestis*, pedicellis saepe spicula brevioribus, gluma floribus longiore, palea inferiore apice bicuspidata in flore utroque sub medio dorsi aristata vel rarius in flore inferiore mutica, *foliis setaceis*. ⊙. In campis arenosis, ericetis, sylvarum oris. Jun. Jul. D. fl. 1. 572. Aira caryophyllea L. sp. 97. Reichenb. ic. 11. 1676.

26. **A. capillaris** (Mertens et Koch. D. fl. 1. 573.) *panicula divaricata trichotoma, spiculis bifloris aequaliter sparsis, pedicellis elongatis* plerisque spicula multo longioribus, gluma floribus longiore, palea inferiore apice bicuspidata, floris inferioris dorso mutica, superioris infra medium dorsi aristata vel ambarum aristatis, *foliis setaceis*. ⊙. In pascuis sterilibus, (südl. Tyrol, Fiume, Istrien u. auf Veglia.) Mai. Aira capillaris Host. gr. 4. t. 35. Avena capillaris D. fl. 1. 573. Variat rarius flore utroque aristato, tamen, me iudicante, paniculae fabrica ab antecedente satis differt. G.

27. **A. praecox** (Beauv. agr. 89.) *panicula oblonga spiciformi-conferta*, spiculis bifloris, gluma floribus longiore, palea inferiore apice bicuspidata, floris utriusque sub medio dorsi aristata, *foliis setaceis*. ⊙. In ericetis et campis sterilibus, paulum humidis, (stw. dch. d. Geb.) April. Mai. D. fl. 1. 573. Aira praecox L. sp. 97. Reichenb. ic. 11. f. 1675. A. pusilla Wigg. hols. p. 9. Trisetum praecox Dumort. florul. belgic. p. 154. Panicula semper in formam ovalem vel oblongam contracta a prioribus facile dignoscitur.

44. DANTHONIA (DC. flor. franc. 3. p. 32.) Gluma bivalvis, 2-multiflora, ampla, ventricoso-convexa, saepe flores aequans vel superans. Glumella bipaleacea; inferior concava, apice bifida, inter lacinias aristam inferne complanatam et spiraliter tortam emittens. Ovarium glabrum; styli breves; stigmata plumosa, e latere floris egredientia.

1. **D. provincialis** (DC. fl. fr. 3. 33.) racemo subsimplici, glumis 4-6 floris flores superantibus, palea inferiore apice bicuspidata, vaginis apice barbatis. ♃. In pratis montanis, (Krain, Littorale, südl. Tyrol.) Jun. St. h. 86. D. alpina Vest. bot. Ztg. 4. 1. 145. D. fl. 1. 677. D. calycina Reichenb. ic. 12. 1714. Avena calycina Vill. delph. 2. 148. A. stricta Host. a. 1. 127. A. spicata *β*. Willd. sp. 1. 453. G.

45. TRIÓDIA (Rob. Brown. prod. fl. nov. holl. 1. 182.) Gluma bivalvis, 3-5 flora, ampla, ventricoso-convexa, flores amplectens. Glumella bipaleacea, palea inferior apice bifida, interjecta arista recta. Ovarium glabrum; styl. breves; stigmata plumosa ad basin floris emergentia.

1. **T. decumbens** (Beauv.) panicula racemosa, ramis simplicibus spiculam solitariam vel inferioribus spiculas 2-3 gerentibus, spiculis oblongo-ovatis 3-5 floris, foliis planis vaginisque pilosis, culmis decumbentibus sub anthesi adscendentibus. ♃. In pratis, pascuis, ericetis, sylvarum locis denudatis. Jun. Jul. D. fl. 1. 675. St. h. 86. Festuca decumbens L. sp. 110. Leers. t. 7. f. 5. Poa decumbens Scop. carn. 1. 69. Sieglingia decumbens Bernh. erf. 44. Melica rigida Wib. werth. 117. Danthonia decumbens DC. fl. fr. 3. 33.

46. MÉLICA (L. gen. n. 82.) Gluma bivalvis, ampla, convexa, membranacea, 1-2 flora cum flore neutro, unum pluresve tales imperfectos inclu-

dente. Flos infimus vel duo infimi perfecti, neutri dissimiles. Glumella bipaleacea, denique cartilaginea, mutica. Styli mediocres, stigmata versus basin floris emergentia.

1. **M. ciliata** (L. sp. 97.) panicula spiciformi aequali, palea inferiore ad marginem *a basi usque ad apicem dense ciliato-villosa, flore neutro oblongo.* 4. In locis asperis, saxosis, (stw. im südl. u. mittlern Geb. u. bis an d. nördl. Grenze von Thüringen.) Mai. Jun. D. fl. 1. 575. Reichenb. ic. 11. 1575.

2. **M. Bauhini** (Allion. auct. p. 43.) panicula laxa subsecunda, palea inferiore ante marginem *a basi ultra medium ciliato-pilosa, flore neutro turbinato* basi attenuato. 4. In locis asperis maritimis, (Istrien, Dolliner!) Jun. M. pyramidata Desf. atl. 1. 72. Reichenb. ic. 11. 1578. J.

3. **M. uniflora** (Retzius obs. 1. 10.) panicula laxa secunda, ramis patulis, inferioribus plerumque spiculas duas gerentibus, spiculis erectis ovatis, *floribus imberbibus, unico perfecto*, foliis planis, ligula oppositifolia acuminata subherbacea. 4. In sylvis umbrosis. Jun. Jul. D. fl. 1. 577. Reichenb. ic. 11. f. 1576. M. Lobelii Vill. delph. 2. p. 89. t. 3. M. nutans Pollich. palat. 1. p. 79.

4. **M. nutans** (L. sp. 98.) panicula in racemum simplicem secundum laxum contracta, spiculis pendulis ovatis, *floribus imberbibus, duobus perfectis,* foliis planis, ligula brevissima truncata. 4. In sylvis umbrosis. Mai. Jun. D. fl. 1. 577. Leers. t. 3. f. 4. M. montana Huds. angl. 37.

Trib. XIII. *FESTUCACEAE.* Kunth. en. 321. *Spiculae 2-multiflorae,* flore terminali saepe tabescente, *pedicellatae. Glumae valvulae flore proximo breviores.* Styli brevissimi vel nulli, *stigmata e basi floris utrinque egredientia.*

47. BRIZA (L. gen. n. 84.) Gluma bivalvis, 3-multiflora. Flores mutici, in spiculam disticham dense imbricati, bipaleacei, palea inferiore ovata, obtusa, inflato-ventricosa, basi articulato-cordata. Ovarium glabrum, styli breves, stigmata plumosa, ad latera floris emergentia. — In Briza minore valvae flore proximo omnino longiores sunt, sed istum non supereminent, si eas adprimas.

1. **B. maxima** (L. sp. 103.) panicula apice nutante, *spiculis* ovatis 9-17 *floris, ligula elongata* lanceolata acuta. ☉. In graminosis, (Istrien u. bei Fiume.) Mai. Jun. D. fl. 1. 623. Host. gr. 2. t. 30. J.

2. **B. media** (L. sp. 103.) panicula erecta patente, spiculis subcordato-ovatis 5-9 floris, *ligula brevissima truncata.* 4. In pratis. Jun. Jul. D. fl. 1. 622. St. h. 2.

3. **B. minor** (L. sp. 102.) panicula erecta diffusa, *spiculis* triangularibus 6-7 *floris, ligula elongata* lanceolata acuta. ☉. In arvis, (Istrien; Cant. Waadt bei Vevay.) Mai. Jun. D. fl. 1. 622. Host. gr. 2. t. 28. H.

48. ERAGRÓSTIS (Beauv. agrost. 71.) Gluma bivalvis, 2-multiflora; valvae flore proximo breviores, deciduae. Flores ovati vel lanceolati, dorso carinato-compressi, margine interiore ventricosi. Gluma bipaleacea, palea inferiore decidua, superiore cum axe persistente. Ovarium glabrum. Styli breves; stigmata plumosa, ad basin floris egredientia. Axis non articulatim secedens.

1. **E. megastachya** (Link. hort. berol. 1. 187.) *panicula ramis solitariis* geminisve, *spiculis lineari-oblongis* 15-20 floris, floribus in apice obtuso subemarginato breviter mucronatis nervo laterali valido praeditis, vaginis glabris ore barbatis, radice fibrosa. ☉. In arvis arenosis, (stw. am Genfersee; a. d. Rheinfläche, im Elsass, in Baden, bei Carlsruh, zw. Schwetzingen u. Mannheim; Blankenbg. am östl. Harze; bei Regensb.; im südl. Tyrol u.

Littorale.) Jul. Aug. E. maior Host. fl. a. 1. 135. gr. 4. t. 24. Poa megastachya Koel. gram. 181. D. fl. 1. 597. Briza Eragrostis L. sp. 108.

2. **E. poaeoides** (Beauv. agr. 71.) *paniculae ramis solitariis* geminisve, *spiculis lanceolato-linearibus* 8-20 floris, floribus obtusis nervo laterali valido praeditis, vaginis ore barbatis, radice fibrosa. ⊙. In cultis et campis arenosis, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littorale, Steyerm., Unteröstr.; zerstreut auf d. Rheinfläche bis Westphalen; in Franken; Blankenburg am östl. Harze; bei Dresden; bei Breslau; in Böhmen.) Jul. Aug. E. minor Host. a. 1. 135. E. poaeformis Link. hort. 1. 188. Poa Eragrostis L. sp. 100. Host. gr. 2. t. 69. D. fl. 1. 596. — Denticuli glanduliformes in margine foliorum in hac et antecedente occurrunt, quod in D. fl. l. c. emendandum. Cl. Bertol. in fl. ital. 1. p. 552. hanc speciem cum antecedente in unam coniungit.

3. **E. pilosa** (Beauv. agr. 71.) *paniculae ramis infimis semiverticillatis quaternis quinisve*, spiculis linearibus 5-12 floris, floribus acutiusculis nervo laterali debili praeditis, vaginis ore barbatis, radice fibrosa. ⊙. In locis cultis, campis arenosis et ad vias, (Istrien; Steyerm.; südl. Tyrol; südl. Schweiz; sodann bei Basel, Colmar, Bruchsal u. bei Halle.) Jul. Aug. Poa pilosa L. sp. 100. D. fl. 1. 595. Host. gr. 2. t. 68.

49. POA (L. gen. n. 83., excl. speciebus.) Gluma bivalvis, 2-multiflora; valvae flore proximo breviores. Flores ovati vel lanceolati, dorso carinato-compressi, cum articulo axeos, denique articulatim secedentis, decidui. Glumella bipaleacea. Ovarium glabrum; styli breves vel nulli; stigmata plumosa, ad basin floris egredientia.

Sect. I. Catapodium Link. hort. berol. 1. 44. Spiculae pedicello brevissimo crasso insidentes, in spicam simplicem unilateralem vel in paniculam, e spicis simplicibus unilateralibus formatam, dispositae. Rachis spicarum compressa, flexuosa, rigida. Glumae et paleae coriaceae.

1. **P. loliacea** (Hudson. angl. 43.) *spica rigida unilaterali disticha* angusta simplici vel basi ramosa, spiculis brevissime pedicellatis approximatis ovatis acutiusculis 5-7 floris, floribus obtusis, radice fibrosa. ⊙. In maritimis, (Fiume u. auf d. Insel Veglia, Sansego, Insel Brioni bei Istr., Tommas.) Mai. Jun. D. fl. 1. 592. Triticum loliaceum Smith. brit. 1. 159. T. unilaterale Vill. delph. 2. 165. Host. gr. 3. 21. T. Rottboella DC. fl. fr. 3. 86. Brachypodium loliaceum R. et S. syst. 2. 746. Catapodium loliaceum Link. hort. 1. 45. Reichenb. ic. 11. f. 1370. Festuca rottboellioides Kunth. en. 1. 395. J.

2. **P. dura** (Scop. carn. 1. p. 70.) *panicula ovata unilaterali conferta rigida e spicis brevibus spiculas* 3-6 *gerentibus composita*, spiculis brevissime pedicellatis oblongis 5 floris, palea inferiore lineari-oblonga nervosa obtusa vel emarginata plerumque breviter mucronata, radice fibrosa. ⊙. In pascuis et ad vias, (südl. Mähr.; Unteröstr.; südl. Wallis, stw. im Elsass, in d. Rheinpfalz bei Oggersheim, Alzei, Creuznach u. bis an d. Mosel; Arnstatt in Thüringen; Erfurt u. bei Quedlinburg u. Anleben im Regierungsbezirke Magdeburg.) Mai. Jun. D. fl. 1. 592. Cynosurus durus L. sp. 105. Pollich. pal. 1. p. 98. t. 1. f. 1. Eleusine dura Lam. ill. n. 1127. Sclerochloa dura Beauv. agr. 98. Festuca dura Vill. delph. 2. 94. Sesleria dura Kunth. en. 1. 323. — B. Gaudinus stigmata ex flosculorum apice exserta describit; ego ea e latere versus basin florum non aliter emersa observavi, quam in ceteris Poae speciebus fieri solet.

Sect. II. Poae genuinae. Spiculae pedicellatae, in paniculam sparsim dispositae. Flores liberi vel pilis lanatis crispis cohaerentes, obtusiusculi, acuti vel acuminati.

A. Radix fibrosa, stolones nulli.

a. Rami paniculae solitarii vel gemini. Flores praeter lanam, eos quandoque constringentem, glabri.

3. **P. annua** (L. sp. 99.) *paniculae* subsecundae divaricatae *ramis glabris solitariis vel geminis* denique deflexis, spiculis oblongo-ovatis 3-7 floris,

floribus glabris vel in carina margineque linea pubescente e pube brevi molli composita praeditis, ligulis superioribus oblongis, culmis compressis interdum decumbentibus basi radicante et stoloniformi, radice fibrosa. ☉. In cultis, incultis, plateis, circa domos ubique. Floret per totum annum, nisi gelu omnia rigeant. D. fl. 1. p. 598. Reichenb. ic. 11. f. 1621. Lineae pubescentes in carina et in margine utroque ultra medium paleae adscendunt et quandoque inter dorsalem et marginales alia tenuis stria pubescens posita est. Variat in Alpibus

β. varia, spiculis eximie variegatis: P. annua II. varia Gaud. helv. 1. 243. P. supina Schrad. germ. 1. 289. Host. gr. t. 27. P. variegata Hall. fil. in Schleich. cat. Haec in alpibus.

b. Rami paniculae solitarii vel gemini. Flores praeter lanam, eos quandoque constringentem, in nervo dorsali et utrinque in nervo marginali linea dense sericeo-pubescente instructi.

4. **P. laxa** (Haencke sudet. 118.) *panicula* oblonga contracta apice cernua, *ramis filiformibus geminis solitariisve glabris, spiculis* ovatis *plerumque trifloris, floribus* ovato-lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus plerumque *liberis*, foliis anguste linearibus attenuato-acutis, *ligulis omnibus oblongis acutis*, radice fibrosa caespitosa. ♃. In pascuis alpinis et subalpinis, (stw. v. d. Schweiz d. d. Alpenk. bis Steyerm.; auf d. Belchen im Schwarzwald; a. d. Sudeten.) Jun.-Aug. D. fl. 1. 599. St. h. 29. Reichenb. ic. 11. f. 1630 et 1631., (pedicelli nimis tenues delineati.) Smith. engl. fl. 1. 122. P. flexuosa Sm. brit. 101., secund. citat. ipsius auctoris. P. elegans DC. fl. fr. 3. p. 62. Pedunculi et pedicelli tenues quidem, tamen evidenter crassiores, quam in sequente. — Varietas

β. pallescens, flavescenti-pallida: P. flavescens. Thomas. pl. exsicc.

5. **P. minor** (Gaud. helv. 1. p. 253.) *panicula* oblonga vel subovata *contracta nutante, ramis capillaribus geminis solitariisque* glabriusculis, spiculis oblongo-ovatis 4-6 floris, *floribus* lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus basique *lana cohaerentibus*, foliis anguste linearibus, *ligulis omnibus oblongis acutis*, radice fibrosa caespitosa. ♃. In pascuis petrosis et rupium fissuris alpium; cum fluviis in convalles descendens, (stw. v. d. Schweiz d. d. Alpenk. bis Steyermark.) Jul. Aug. D. fl. 1. p. 602. Reichenb. ic. 11. f. 1623. P. supina Panz. ap. St. h. 34. icon imperfecta. Panicula capillaris, nutans, perpetuo tremulans si herbam manu teneas.

6. **P. pumila** (Host. fl. austr. 1. 146.) *panicula erecta divaricata, ramis geminis solitariisque ramulisque fere rectangule divergentibus* scabris, spiculis per anthesin subaequaliter sparsis ovatis 4-6 floris, *floribus* oblongo-lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus *liberis*, foliis anguste linearibus, *ligulis omnibus oblongis acutis*, radice fibrosa caespitosa. ♃. In montibus et pratis montanis Carnioliae; (meine Exempl. sind um Laibach gesammelt.) Mai. Jun. Panicula durante anthesi rectangule divaricata ab antecedente et duabus sequentibus differt, ab illa et a P. bulbosa insuper floribus liberis; filum unum tantum alterumve flores connectens nonnunquam observavi. G.

7. **P. concinna** (Gaud. agrost. helv. 1. 196., non Rob. Brown.) *panicula erecta patente, ramis geminis solitariisque* scabris, *spiculis in apice ramorum confertis* ovato-acutis 6-10 *floris*, floribus oblongo-lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus liberis, foliis anguste linearibus, *ligulis omnibus oblongis acutis*, radice fibrosa caespitosa. ♃. In arenosis siccis, (im untern Wallis; um Triest.) Jun. Reichenb. ic. 11. f. 1617 et 1618. Culmus in locis siccis basi subbulboso-incrassatus, in horto aequalis persistit. Similis antecedenti, sed panicula patente, nec divaricata, spiculis congestis, nec sparsis, omnino differt; a sequente, ipsi simillima, distinguitur floribus liberis et spiculis 6-10 floris. H.

8. **P. bulbosa** (L. sp. 102.) *panicula erecta patente, ramis geminis solitariisque* scabris, spiculis in apice ramorum confertis ovatis 4-6 floris, flori-

bus oblongo-lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus *lana copiosa longe protrahenda cohaerentibus*, foliis anguste linearibus, *ligulis omnibus oblongis acutis*, radice fibrosa caespitosa, culmo basi saepe bulbiformi-incrassato. 4. In apricis incultis, (stw. d. d. Gebiet.) Mai. Jun. D. fl. 1. 609. Reichenb. ic. 11. f. 1619.

β. vivipara, floribus in gemmas foliaceas mutatis, quae frequentior occurrit, quam forma normalis: P. bulbosa *β.* L. l. c. Reichenb. ic. 11. f. 1620.

9. **P. alpina** (L. sp. 99.) *panicula erecta sub anthesi patentissima, ramis geminis* glabris scabrisve, spiculis ovatis 4-10 floris, floribus ovato-lanceolatis margine dorsoque dense pubescentibus liberis vel per pilos paucos cohaerentibus, foliis latiuscule linearibus subito in apicem acutum contractis, *ligulis inferioribus brevibus truncatis, superioribus oblongis acutis, fasciculis foliorum basi cum culmo florente vaginis communibus inclusis.* 4. In pascuis alpium et reg. subalpinarum; var. *β.* in arenosis dimissis, (d. d. g. Alpenk. u. auf d. Schwarzw.; die Variet. *ε.* stw. auf d. Rheinfläche von Oberbaden bis Darmstadt u. Bingen, im Sponheimischen an d. Mosel; in Thüringen zwischen Halle u. dem östl. Harze; in Mähren u. Unteröstreich.) Mai. Jun., in alpibus serius. D. fl. 1. 606. Reichenb. ic. f. 1625-1628. P. badensis St. h. 29. Variat:

β. vivipara, floribus in gemmas foliaceas mutatis: P. alpina vivipara L. sp. 99.

γ. minor, culmis tripollicaribus, foliis longiusculis, pedunculis tenuissimis: P. alpina *γ.* Gaud. helv. 1. 245. In summis alpibus ad moles glaciales.

δ. brevifolia, foliis brevibus, margine cartilagineo angusto cinctis, culmeis vix semipollicem longis, panicula densiore, ligulis fasciculorum sterilium longioribus paulum exsertis, tamen truncatis: P. alpina II. brevifolia Gaud. helv. 1. 245. Haec varietati sequenti similis est et differt tantum foliis laete viridibus atque non rigidis; transitum autem exhibet a specie primitiva in varietatem sequentem.

ε. badensis, foliis brevibus, latis, rigidis, glaucis, margine albo cartilagineo praeditis, ligula ut in var. *δ*: P. badensis Haenk. ap. Willd. sp. 1. 392. P. brevifolia DC. synops. p. 131. P. collina Host. gr. 2. t. 66. P. trivialis Pollich. pal. 1. p. 84. Koel. gr. 157. P. Koeleri DC. syn. p. 131. P. brizoides Wohlleb. suppl. fl. hal. 5. P. thermalis Pers. syn. 1. 90. P. Molinerii Balb. add. ad fl. pedem. 85. P. cenisia Reichenb. fl. exc. p. 46. ic. 11. f. 1624 et 1625., non All. — Varietas insignis, sed ob varietatem *δ.* intermediam characterem solidum, quo distingueretur, eruere non potui. — P. cenisia Host., e semine hort. vindob. educta, est P. alpinae varietas elatior, spiculis multifloris.

Poa caesia subsequens plerumque ramos geminos in panicula quoque gerit.

c. Rami paniculae inferiores quini, in speciminibus macris tantum pauciores 2-3. Flores obsolete 5 nervii, praeter lanam, eos quandoque constringentem, linea in nervo dorsali et utrinque in nervo marginali sericeo-pubescente praediti.

10. **P. caesia** (Smith. brit. 103.) panicula patente, *ramis* scabris, inferioribus *geminis quinisve*, spiculis ovato-lanceolatis 2-5 floris, floribus obsolete nervosis margine dorsoque pubescentibus, *vaginis internodio longioribus nodos culmeos tegentibus, suprema folio suo longiori, ligula brevi truncata* vel suprema ovata, radice fibrosa caespitosa. 4. Ad rupes apricas in Alpibus et subalpinis, (in d. Schweiz nicht sehr selten; südl. Tyrol; Schlesien am Köpernickstein im Gesenke, Altvater.) Jun. Jul. P. glauca Smith. engl. fl. 1. 128. spiculis 2-3 floris; P. caesia ibid. spiculis 4-5 floris. P. Gaudini R. et S. syst. 2. 548. Variat culmo laevi et

α. aspera, culmo superne evidenter scabro: P. aspera Gaud. agr. helv. 1. p. 198. Planta viva pulchre caesio-glauca, ligula brevis, truncata, vel

suprema ovata, semper magis prominens, quam in P. nemorali. Nodus culmi superior quandoque denudatur, sed culmus ad tertiam partem tantum vaginis vestitus est. E semine plantae scabrae specimina culmis laevibus et scabris eduxi. Gaudinus sub varietate sua glauca et caesia Poae nemoralis varietates huius et P. caesiae confudit, et ego ipse in D. fl. in eundem errorem incidi.

11. **P. nemoralis** (L. sp. 102.) panicula patente, *ramis* scabris, *inferioribus* geminis *quinisve*, spiculis ovato-lanceolatis 2-5 floris, floribus obsolete nervosis margine dorsoque pubescentibus, *vaginis internodio brevioribus*, nodis culmi denudatis, *vagina suprema folio suo breviore, ligula brevissima subnulla*, radice caespitosa breviter stolonifera. ♃. In sylvis, rupibus, muris. Jun. Jul. D. fl. 1. 615. Culmus ultra medium, saepe fere ad apicem, foliatus est. Variat adeo, ut diversas species coram habere credas.

α. vulgaris, gramineo-viridis, culmi tenues debiles cum panicula laxa nutantes, *spiculae biflorae*. Gaud. helv. 1. 238. Leers. t. 5. f. 3. Haec varietas occurrit spiculis unifloris, cum rudimento secundi floris capituliformi, pedicellato: P. nemoralis *β.* D. fl. 1. 617. Modificatio morbosa est P. nemoralis vulgaris *β.* nodis culmeis spongioso-cirrhosis Gaud. l. c.

β. firmula, gramineo-viridis, culmi rigidi, *vaginae foliorum glabrae*, panicula erecta vel apice nutans, *spiculae* 3-5 *florae;* haec forma, in virgultis pratorum nascens, paniculam amplam patentemque et flores plerumque liberos habet: P. nemoralis II. firmula Gaud. helv. 1. 239.; in muris locisque siccis panicula contracta apparet floresque pilis lanatis cohaerent: P. nemoralis VI. coarctata Gaud. helv. 1. 241. P. coarctata Hall. fil. ap. Murith. bot. val. 86. DC. fl. fr. 5. p. 273. P. dubia Sut. helv. 1. 49. et P. Scheuchzeri Sut. helv. 1. 50. P. caespitosa Poir. dict. 5. 73. P. trivialis Leers. herb. t. 6. f. 2.

γ. rigidula, obscure viridis, saepe subglauca, *culmi* rigidi *cum vaginis scabriusculi*, panicula erecta vel apice nutans, spiculae 3-5 florae, floribus lana connexis: P. nemoralis *δ.* D. fl. 1. 617. P. pratensis Leers. herborn. t. 6. f. 4. P. palustris DC. fl. fr. 5. p. 272. P. polymorpha Wib. werth. 113. sec. specim. authent. P. serotina Schrad. germ. 1. 299. secund. specimen ab ipso auctore et egregiam descriptionem, „ligula brevis, truncata.“ Haec varietas non ubique occurrit.

δ. glauca, magis minusque *glauco-viridis*, culmi rigidi, *panicula* ut in variet. *β.* et *γ. spiculis copiosis* dense obsita: P. nemoralis *η.* glauca et *ϑ.* caesia D. fl. 1. p. 619., pro parte. A P. caesia differt culmo ultra medium foliato, nodis culmi, ob vaginas internodio breviores, denudatis et folio supremo vaginam suam aequante vel longiore. Haec varietas montes altiores inhabitare videtur. Vivam in horto possideo.

ε. montana, culmi graciles, *panicula rara*, *spiculis magnis* 2-5 floris *parce obsita;* rami paniculae 1-3 spiculas gerentes, spiculae tenuiter et longe pedicellatae. Varietas insignis, multis tamen formis intermediis in ceteras abiens: P. nemoralis III. montana Gaud. helv. 1. 209.

12. **P. fertilis** (Host. gram. 3. t. 15.) panicula diffusa patente, *ramis* scabris, *inferioribus* plerumque *quinis*, spiculis ovato-lanceolatis 2-5 floris, floribus obsolete nervosis margine basin versus dorsoque linea angusta pubescente notatis, culmis vaginisque glabris, *ligula oblonga acuta*, *radice fibrosa* caespitosa. ♃. In pratis humidis, ad ripas. Jun. Jul. D. fl. 1. 614. P. palustris Roth. tent. 2. 1. 117. P. serotina Gaud. helv. 1. 256., et quoque Ehrhartii secundum cl. Meyer. in chlor. Hannov. 1. 632., sed nomen incongruum, nam planta non serius floret, quam affinis P. nemoralis et huius varietates: P. effusa Kit. in Schult. oestr. fl. 1. 227. P. angustifolia L. sp. 99. sec. cl. Fries. et Wahlenb., sed descriptio Linnaeana, in fl. suecica proposita, in illam non quadrat. P. angustifolia Reichenb. ic. 11. f. 1645-1647. Specimen Ehrhartianum nondum vidi.

d. Rami paniculae inferiores semiverticillati, quini. Flores nervis 5 validis, in planta exsiccata praecipue visibilibus, instructi, glabri vel inferne dorso pilis lanatis adspersi, linea pilosa marginali autem destituti.

13. **P. sudetica** (Haenck. sudet. 120.) panicula patente, ramis scabris, inferioribus quinis, spiculis ovato-oblongis 3-5 floris, *floribus elevato-5 nerviis totis glabris* vel basi pilis lanatis parce obsitis, *foliis lanceolato-linearibus apice subito-acuminatis et cucullato-contractis*, vaginis ancipitibus, *ligula brevi, fasciculis foliorum sterilibus distichis plano-compressis*, sub anthesi vegetis. 4. In sylvis montanis et subalpinis, (v. d. Schweiz durch d. Alpenk. bis Oestr.; Vogesen; Schwarzwald; höhere Gebirge an d. Mosel u. Wälder um Coblenz; Hessen; Franken; Thüringen am Harze; im Teutoburger Walde; u. zerstreut im nördl. D.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 609. Reichenb. ic. f. 1657 et 1658. P. rubens Moench. meth. 187. P. quadripedalis Ehrh. calam. 135. P. sylvatica Vill. delph. 2. 128. P. trinervata DC. fl. fr. 3. 58. non Ehrh. Capita radicis in ambitu caespitis radicant, sed radicem vere repentem vel stoloniferam huius speciei in plantis cultis horti nostri hucusque non vidi. Variat:

β. remota, ramis paniculae valde elongatis, apice pendulis: P. sudetica *β.* remota Fries. nov. fl. suec. p. 11. In synopsis editione prima hanc formam cum P. hybrida non recte conjunxeram; crescit in Silesia et Franconia, (im Gesenke der Sudeten u. in der Brucker Lache bei Erlangen, einem Waldsumpfe; u. in Wäldern bei Darmstadt.) P. hybrida Reichenb. 11. f. 1656.

14. **P. hybrida** (Gaud. helv. 1. 229.) panicula diffusa, ramis scabris, inferioribus quinis, spiculis ovato-oblongis 3-5 floris, *floribus elevato-5 nerviis glabris basi pilis lanatis parce* adspersis, *foliis e basi lanceolato-lineari sensim attenuatis acutissimis*, vaginis ancipitibus, *ligula brevi, fasciculis foliorum sterilibus* distichis *plano-compressis* sub anthesi plerumque emarcidis. 4. In sylvis humidis, (im Jura am Fusse der hochgelegenen Felsen; auf d. Untersberge bei Salzburg; Kitzbichel in Tyrol; auf d. Kalbling u. im Dyrrthale auf d. Gailer Alpen in Steyermark; Grimsel in der Schweiz.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 610. in annot. Festuca montana Sternberg. et Hopp. Denkschr. d. Regensb. bot. Ges. 1818. p. 95. secund. specimen authenticum, ab ipso Hoppio acceptum, et secund. diagnosin, l. c. propositam. — Fasciculis foliorum sterilium plano-compressis haec et antecedens ab omnibus generis speciebus valde diversae sunt.

15. **P. trivialis** (L. sp. 99.) panicula patente, *ramis* scabris, *inferioribus quinis*, spiculis ovatis plerumque trifloris, *floribus* elevato-5 nerviis *glabris* basi obsolete pilosis, *vaginis* subcompressis *scabris*, *ligula* vaginarum superiorum *protracta oblonga acuta*, radice fibrosa. 4. In pratis udis locisque humidis. Jun. Jul. D. fl. 1. 611. P. dubia Leers. herborn. t. 6. f. 5. P. scabra Ehrh. calam. 72. P. pratensis Pollich. pal. 1. p. 87.

B. Radix stolonibus elongatis longe lateque repens.

16. **P. pratensis** (L. sp. 99.) panicula patente, ramis scabris, inferioribus plerumque quinis, spiculis ovatis 3-5 floris, *floribus* dorso margineque dense pubescentibus *lanaque longe protrahenda connexis* quinquenerviis, *nervis prominulis*, culmo vaginisque glabris, vagina suprema folio suo multo longiore, ligula brevi truncata, *radice stolonibus elongatis repente.* 4. In pratis, pascuis, arvis arenosis. Mai. Jun. D. fl. 1. 612. P. glabra Ehrh. calam. n. 62. P. angustifolia Pollich. palat. 1. p. 85. Leers. herborn. t. 6. f. 3. Occurrit in pratis fertilibus colore laete viridi, foliis radicalibus elongatis, angustioribus quidem, sed non setaceo-complicatis; in locis vero arenosis subhumidis, etiam siccioribus, saepe fit

β. latifolia, folia radicalia breviora latioraque sunt, atque, ut tota planta, colorem glaucum vel caesium induunt: P. subcaerulea Engl. bot. t. 1004. P. pratensis *γ.* Smith. engl. fl. 1. 126. P. depressa Presl. cech. p. 20. P. humilis Ehrh. calam. n. 113. — In locis siccis sterilibusque saepe evadit

γ. angustifolia, folia radicalia complicato- vel convoluto-setacea: P. pratensis *β.* angustifolia Smith. brit. 105. P. angustifolia L. sp. 99., secund. Smith., Leers. herborn. t. 6. f. 3. In locis humidis pinguioribus, quae herbis nondum dense tecta sunt.

δ. anceps, maior, culmus compressus fere anceps: P. pratensis IV. anceps Gaud. helv. 1. 260.

17. **P. cenisia** (Allion. auct. p. 40. n. 2209.) panicula patente, pedunculis laevibus vel scabriusculis, inferioribus geminis, raro quinis, spiculis ovatis 3-5 floris, *floribus* dorso margineque dense pubescentibus *lanaque longe protrahenda connexis* quinquenerviis, *nervis lateralibus obsoletis*, culmo vaginisque glabris, vagina suprema folio suo multo longiore, ligulis brevibus, superiore ovata, *radice stolonibus elongatis repente.* 4. In glareis torrentium alpinarum, (stw. dch. d. Alpenk. u. auf d. Brocken.) Jul. Aug. P. cenisia Bertol. fl. ital. 1. 533. St. h. 86. P. stolonifera Bellard. app. ad fl. ped. in act. taur. t. 5. p. 215. P. distichophylla Gaud. helv. 1. 250. D. fl. 1. 603. Reichenb. ic. 11. f. 1632. P. flexuosa Wahlenb. lapp. n. 63. Host. gr. 4. t. 26. D. fl. 1. 604. Reichenb. ic. 11. f. 1633. Variat:

β. pallescens, pallida, flaccida e loco natali umbroso; P. Halleridis R. et S. syst. 1. 350., D. fl. 1. 605., Reichenb. ic. 11. 1634., P. pallens Gaud. agr. 1. 201.

18. **P. compressa** (L. sp. 101.) panicula patente subsecunda, pedunculis scabris, inferioribus plerumque geminis rarius quinis, spiculis ovato-oblongis 5-9 floris, floribus dorso margineque basin versus pubescentibus liberis vel lana parca subcohaerentibus obsolete nervosis, *culmis ancipiti-compressis* basi procumbentibus, *radice stolonibus elongatis repente.* 4. In pascuis, locis siccis, cultis et incultis, campis arenosis. Jun. Jul. D. fl. 1. 621. — P. compressa Wib. werth. 114. est modificatio floribus liberis, P. muralis Wib. l. c. floribus lana connexis. Variat porro:

β. Langeana, culmo bipedali, panicula laxa, opulenter spiculis obsita: P. Langeana Reichenb. ic. 11. f. 1647. P. compressa *β.* effusa Tausch. pl. select.

50. GLYCÉRIA (R. Brown., additis speciebus.) Flores obtusi, dorso semicylindrici, introrsum subventricosi; caetera ut Poae. Glyceria et Catabrosa N. ab E. gen. 14. 11.

Sect. I. Genuinae. Spiculae 4-11 florae.

1. **G. spectabilis** (Mertens et Koch. Deutschl. flor. 1. p. 586.) *panicula aequali ampla ramosissima*, spiculis 5-9 floris, *floribus* obtusis *septemnerviis, nervis validis* prominentibus, radice repente. 4. In aquis stagnantibus et ad ripas. Jul. Aug. Glyceria aquatica Wahlb. gothob. p. 18. Poa aquatica L. sp. 98. Leers. herborn. t. 5. f. 5. P. altissima Moench. meth. 185. Molinia maxima Hartm. scand. fl. ed. 2. p. 28. Hydrochloa aquatica Hartm. gr. suec. 8.

2. **G. plicata** (Fries. nov. mant. 3. p. 176.) *panicula verticillata subaequali, ramis inferioribus subquinis, spiculis 7-11 floris, floribus ovali-oblongis* obtusissimis obsolete tricrenatis *septemnerviis nervis validis prominentibus*, foliis novellis pluries plicatis. 4. In aquis quietis et stagnantibus passim, cum sequente confusa. Jun. Jul.

3. **G. fluitans** (Rob. Brown. prodr. 1. 179.) *panicula secunda*, ramis sub anthesi rectangule patentibus, *inferioribus subgeminis, spiculis* 7-11 floris *ramo adpressis, floribus lanceolato-oblongis* acutiusculis saepe obsolete tricrenatis septemnerviis nervis validis prominentibus, foliis novellis simpliciter complicatis, radice repente. 4. In aquis stagnantibus, rivulis, fossis. Jun. Jul. D. fl. 1. 587. Festuca fluitans L. sp. 111. Schreb. gr. 37. t. 3. Poa fluitans Scop. carn. 106. Hydrochloa fluitans Hartm. suec. 8.

4. **G. distans** (Wahlenb. fl. upsal. p. 36.) panicula aequali divaricata, *ramis inferioribus subquinis, fructiferis deflexis*, spiculis 4-6 floris, *floribus*

ovato-oblongis truncato-obtusis obsolete 5 *nerviis*, radice fibrosa, stolonibus destituta. 4. In locis humidis, ad fossas; praecipue solo salso, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 1. 589. Poa distans L. mant. 32. P. salina Pollich. pal. 1. p. 89. P. retroflexa Curt. lond. 6. t. 1. P. arenaria var. *α.* Trin. in act. petrop. 6. 1. 390. Festuca distans Kunth. en. 1. 393. Molinia distans Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 24. — Glyceria capillaris Wahlenberg. gothob. p. 17., sec. Hartm. scand. fl. l. c., est varietas Glyceriae distantis, ramis capillaribus flaccidis et spiculis acutioribus.

5. **G. festucaeformis** (Heynhold. ap. Rchb. icon. 11. f. 1613.) panicula aequali patente, *ramis* inferioribus subquinis, *fructiferis rachi adpressis vel erecto-patulis*, spiculis 5-9 floris, *floribus lineari-oblongis* obtusis saepe subtricrenatis *obsolete* 5 *nerviis, caulibus sterilibus stoloniformibus prostratis deficientibus, radice fibrosa.* 4. In paludosis et arenosis ad mare adriaticum. Jun. Jul. Glyceria capillaris D. fl. 1. p. 869., excl. syn. Wahlenbergii. Poa festucaeformis Host. gr. 3. 12. t. 17., pessime descripta. P. arenaria var. *β.* Trin. act. petrop. 6. 1. 390. Festuca Hostii Kunth. gram. 1. 129. F. palustris Seenus sec. Schrader. Ab antecedente differt ramis fructiferis spiciformiter contractis, vel erecto-patulis, nunquam deflexis, floribusque longioribus; a subsequente G. maritima defectu caulium sterilium elongatorum prostratorum et defectu stolonum radicalium. Culmi basi non ramosi ut in subsequente. G.

6. **G. maritima** (Mertens et Koch. D. fl. 1. p. 588.) panicula aequali patente, ramis *inferioribus subgeminis*, fructiferis contractis, spiculis 4-6 floris, *floribus* lineari-oblongis obtusis vel subtricrenatis obsolete 5 nerviis, *caulibus non florentibus elongatis stoloniformibus prostratis*, radice repente. 4. In arenosis maritimis et ad fluviorum ripas, mari contiguas, (von Ostfriesland bis Mecklenburg.) Jun. Jul. D. fl. 1. 588. Poa maritima Huds. angl. 42. P. arenaria var. *γ.* Trin. in act. petrop. 6. 1. 390. Hydrochloa maritima Hartm. gr. suec. 8. Molinia maritima scand. fl. p. 27. Festuca thalassica Kunth. gram. 1. 394. — Haec et antecedens colendae et in horto ulterius observandae sunt. G.

Sect. II. Catabrosae. Spiculae biflorae, rarissime pluriflorae.

7. **G. aquatica** (Presl. fl. cech. p. 25. 1819.) panicula aequali diffusa, spiculis linearibus bifloris, *floribus* oblongis obtusis *trinerviis, nervis prominentibus*, radice stolonibus repente. 4. In aquis stagnantibus, fossis, fontibus, locis arenosis humectatis, (stw. dch. d. Geb., aber nicht überall.) Jun. Jul. D. fl. 1. 589. G. airoides Reichenb. fl. exc. 1. 589. Aira aquatica L. sp. 95. Molinia aquatica Wib. werth. 116. Poa airoides Koel. gram. 194. Hydrochloa airoides Hartm. gr. suec. 8. Catabrosa aquatica Beauv. agr. 97. Colpodium aquaticum Trin. act. petrop. 6. p. 395. Variat rarissime spiculis 3-5 floris. Varietas haec e speciminibus constat luxuriantibus, quales ante multos annos in planitie Rheni Palatinatus vidi, quae ita se habebant ad formam vulgarem, aeque atque Poa nemoralis firmula ad Poam nemoralem vulgarem et Poam nemoralem unifloram; sed quum ex eo tempore hanc varietatem non iterum reperire potuerim, eam ut rarissimam hic propono.

51. MOLÍNIA (Schrank. baier. flor. 1. p. 334.) Flores e basi introrsum ventricosa conici, dorso semicylindrici; caetera ut Poae.

Sect. I. Moliniae genuinae. Spiculae muticae.

1. **M. caerulea** (Moench. meth. 183.) panicula subcoarctata, spiculis erectis muticis plerumque trifloris, floribus trinerviis, *culmo subnudo.* 4. In sylvis et pratis sylvaticis humidis; varietas minor in pascuis uliginosis sterilibus. Aug. Sept. D. fl. 1. p. 334. M. variabilis Wib. werth. p. 115.; Aira caerulea L. sp. 95. Leers. herborn. t. 4. f. 5. Melica caer. L. mant. 2. 325. Enodium caer. Gaud. agr. 1. 145. Festuca caer. DC. fl. fr. 3. p. 46. Hydrochloa caer. Hartman. gr. 8. Varietas maior, in sylvis humo pingui repletis proveniens: M. altissima Link. hort. 1. 197. M. arundi-

nacea Schrank. l. c. 336. M. littoralis Host. secund. Kunth., sed „radicem valde repentem", quam b. Hostius huic plantae tribuit, nunquam vidi.

Sect. II. Diplachne Beauv. agr. 80. Link. hort. 1. 154. Palea inferior ex apice integro vel breviter bifido aristata, arista recta brevi.

2. **M. serotina** (Mertens. u. Koch. Deutschl. flor. 1. 585.) panicula patente, spiculis 2-5 floris breviter aristatis, floribus 5 nerviis, *culmo ad apicem fere vaginis foliorum tecto.* 4. In collibus lapidosis, ad vias, (Istrien, Littor., südl. Tyrol, Cant. Wallis, Waadt, Tessin.) Aug. Sept. Festuca serotina L. sp. 111. Agrostis serotina L. mant. 30. Melica nodosa Pill. et Mitterbach. it. 143. Bromus strictus Scop. carn. 1. p. 79. Diplachne serotina Link. hort. 1. 155.

52. DÁCTYLIS (L. gen. n. 86.) Flores carinato-compressi, ut Poae, sed inaequilateri, apice ad latus interius flexi, ex apice integro vel emarginato breviter aristati. — Plantae habitu Cynosuri, characteribus Koeleriae. Ab hac differt solummodo habitu, spiculis turgidioribus et floribus apice paulum introrsum flexis, a Poa floribus breviter aristatis, a Festuca floribus carinato-compressis, neque dorso teretibus.

1. **D. glomerata** (L. sp. 105.) *palea inferiore* 5 *nervia*, radice caespitosa, stolonibus nullis. 4. In pratis et sylvis. Jun. Jul. D. fl. 1. 634. Leers. herborn. t. 3. f. 3. St. h. 6. Festuca glomerata Allion. ped. 2. p. 252. Bromus glomeratus Scop. carn. 1. p. 76. Rami inferne nudi. Variat foliis glaucescentibus: D. glaucescens Willd. en. 111. D. altaica Bess. in Schult. mant. 3. 626. Variat porro

β. hispanica, panicula in spicam lobatam contracta, rami a basi spiculis obsiti: D. hispanica Roth. catalect. 1. 8. Festuca phalaroides Lam. ill. n. 1036. sec. DC.

2. **D. littoralis** (Willd. sp. 1. 408.) *palea inferiore* 9-11 *nervia*, stolonibus elongatis prostratis. 4. In littore maris adriatici, (Triest, Fiume.) Jun. Jul. D. maritima Schrad. germ. 1. 313. t. 6. f. 1. D. distichophylla Brignol. fasc. pl. forojul. 16. Poa littoralis Gouan. monsp. 470. D. fl. 1. 594. P. pungens MBieb. t. c. 1. 65. Calotheca littoralis Spreng. s. veg. 1. p. 347. G.

53. CYNOSÚRUS (L. gen. 87.) Spiculae singulae basi bractea, e glumis et glumellis numerosis distichis alternis composita, fultae; caetera ut Festucae. N. ab E. gen. 14. 5.

1. **C. cristatus** (L. sp. 105.) panicula spiciformi conferta lineari recta, *glumis bractearum in mucronem attenuatis.* 4. In pratis. Jun. Jul. D. fl. 1. 632. St. h. 4. Phleum cristatum Scop. carn. 1. 57.

2. **C. echinatus** (L. sp. 105.) panicula spicato-contracta ovata, *glumis bractearum longissime aristatis.* ⊙. In cultis, ad vias, in pratis, (Istrien; bei Steyer in Oestreich; Stattenberg u. Cilli in Steyermark; im obern Wallis; am Gardasee in Tyrol, Fiume.) Mai-Jun. Host. gr. t. 95.

54. FESTÚCA (L. gen. n. 88.) Flores lanceolati vel lanceolato-subulati, dorso teretes cum et absque nervo prominente. Caetera ut Poae. Palea superior subtilissime ciliata, qua nota a Brachypodio differt. — Festuca, Schedonorus et Vulpia N. ab E. gen. fasc. 14. n. 13. 14. 15.

Sect. I. Nardurus Comp. fl. germ. ed. 2. p. 193. Spiculae in racemo simplici brevissime pedicellatae, pedicelli crassi, sed aequalis latitudinis. Radix parva, annua. Fasciculi foliorum steriles nulli. — A Tritico haec sectio differt spiculis racemosis, nempe pedicellatis, a Brachypodio palea superiore subtilissime ciliata.

1. **F. tenuiflora** (Schrad. fl. germ. 1. 345.) *racemo simplici, spiculis brevissime pedicellatis distiche unilateralibus*, valvis lanceolatis attenuato-acutis, inferiore dimidio angustiore uninervia, *floribus lanceolato-linearibus acutissimis* in mucronem abbreviatum aristamve elongatam attenuatis. ⊙. In

locis incultis apricis, (Istrien und im Wallis.) Jun. Jul. Variat floribus glabris et pubescentibus atque

α. mutica, floribus omnibus breviter mucronatis: Triticum unilaterale L. mant. 35. DC. fl. fr. 5. p. 285.

β. biuncialis, floribus spicularum racemi inferiorum mucronatis, superiorum longe aristatis: T. biunciale All. auct. p. 46., secund. Bertolon. in fl. ital. 1. 810.

γ. aristata, floribus aristatis, arista florem ipsum subaequante terminatis: T. Nardus DC. fl. fr. 3. p. 87. T. tenellum *α.* Lam. dict. 2. 561. Host. gr. 2. t. 26. Brachypodium tenellum et tenuiflorum R. et S. p. 745. B. psilanthum Link. 2. 193. H.

2. **F. Lachenalii** (Spenn. fl. friburg. p. 1050.) *racemo simplici, spiculis brevissime pedicellatis* alternis, valvis oblongo-lanceolatis obtusiusculis, inferiore paulo breviore, utraque trinervia, *floribus oblongo-lanceolatis obtusiusculis* muticis aristatisve. ☉. In locis arenosis et in agris, (in Menge auf den trocknen Sandplätzen der Granitischen Vogesen und auf d. Kiese der Bäche daselbst; im Oberbadischen bei Freiburg, zwischen Weil u. Basel; Cant. Tessin.) Jun. Jul. F. Poa Kunth. en. 1. 394. Triticum Lachenalii Gmel. bad. 1. p. 291. T. tenellum L. sp. 127. secund. Bertol. fl. italic. 1. 812. T. Poa DC. fl. fr. 3. p. 86. T. Halleri Vivian. ann. 2. p. 155. t. 5. Brachypodium Poa et Halleri R. et S. syst. 2. 746. 747. — Variat

β. ramosa, spica inferne ramosa: Triticum Festuca DC. fl. fr. 3. p. 87. T. Poa *β.* Dub. bot. gall. p. 530. Var. porro:

γ. aristata, floribus aristatis: Triticum tenuiculum Lois. not. 27. T. festucoides Bertol. flor. ital. 1. p. 808. T. hispanicum Vivian. ann. bot. 1. p. 2. p. 152. t. 3. f. 2. Festuca tenuicula Kunth. en. 1. p. 395.

Sect. II. Sclerochloa. Panicula rigida. Pedicelli breves, crassi, sed aequalis latitudinis. Radix parva, annua.

3. **F. rigida** (Kunth. en. 1. 392.) *panicula* distiche unilaterali coarctata *rigida, ramis ramulisque triquetris, spiculis* oblongis 6-12 floris *erecto-patulis* approximatis, *lateralibus* ramorum *brevissime pedicellatis*, floribus linearibus obtusis leviter emarginatis brevissimeque mucronatis, radice fibrosa. ☉. In locis graminosis siccis, vineis, ad vias, (östr. Littorale bei Fiume, Triest; Südtyrol; in d. Gegend d. Genfersees u. im C. Tessin, bei Aachen, Lehrer Kaltenbach.) Jun. Jul. St. h. 86. Poa rigida L. sp. 101. Glyceria rig. Smith. engl. fl. 1. 119. Megastachya rig. Beauv. agr. 74. Sclerochloa rig. Link. en. 1. 90. Reichenb. ic. 11. f. 1518.

4. **F. divaricata** (Desf. atl. 1. 89. t. 22.) *panicula rigida, ramis triquetris, spiculis* linearibus 6-12 floris sub anthesi *divaricato-patentibus, lateralibus* ramorum *brevissime pedicellatis*, floribus lineari-lanceolatis obtusis breviter emarginatis brevissimeque mucronatis, radice fibrosa. ☉. In locis aridis, lapidosis, (Fiume, Noé.) April. Mai. Sclerochloa articulata Link. en. 1. 90. Schenodorus divaricatus R. et S. syst. 2. 753. Dactylis memphitica Spreng. s. veg. 1. 356. Roth. catal. 3. p. 18. J.

Sect. III. Vulpia Gmel. Mygalurus Link. Paniculae ramuli crassiusculi vel etiam versus apicem conspicue incrassati et subclavati. Flores lanceolato-subulati, longe aristati, in pluribus monandri. Radix parva, fibrosa, fasciculis foliorum sterilibus destituta.

5. **F. uniglumis** (Soland. in Ait. hort. kew. ed. 1. v. 1. 108.) panicula secunda contracta subspicata, *valva superiore aristata, inferiore minima vel nulla, floribus* lanceolatis subulato-attenuatis longe aristatis *arista brevioribus* glabris apice scabriusculis, radice fibrosa. ☉. In locis sterilibus siccis, (bei Triest.) Mai. F. uniglumis Soyer-Willemet. observat. sur quelques plantes de france p. 133. Mygalurus uniglumis Link. en. 1. 92. Vulpia membranacea Link. hort. 1. 147. V. uniglumis Reichenb. fl. exc. 37. G.

Cl. Willemet. a Festuca uniglumi separat Festucam bromoidem Linn. panicula laxa et valva inferiore lineam longa, quae in F. uniglumi fere nulla; sed haec nota non satis certa est, nam mea specimina Festucae uni-

glumis valvam nunc fere nullam, nunc longiorem et lineam aequantem habent; panicula quoque inferne in vaginam supremam inclusa vel cum nudo culmo longius breviusve exserta bonam notam non suppeditat tam in hac quam in sequentibus duabus.

6. **F. ciliata** (Auctor. **F. myuros** L. sp. 109. sec. cl. Willemet. et verba Linnaei sub F. bromoide, differt a F. myuro glumis non ciliatis.) panicula secunda contracta subspicata, *valva* superiore acuta, *inferiore brevissima vel nulla, floribus* lanceolatis subulato-attenuatis longe aristatis *arista brevioribus villosis denseque ciliatis,* ligula biaurita, radice fibrosa. ☉. In locis incultis, ad sepes reg. calid., (Istrien u. bei Fiume, um Triest, Tommasini; bei Genf.) Mai. Jun. F. myuros Soyer-Willemet. l. c. 132. F. ciliata Danth. ap. DC. fl. fr. 3. p. 55. Vulpia ciliata Link. hort. 1. 147., 2. 272.

7. **F. myuros** (Auctor. **F. Pseudo-myuros** Soyer-Willemet. l. c. p. 132.) *panicula* secunda *contracta subspicata arcuato-nutante, ramis infimis panicula multo brevioribus,* valva superiore acuta, inferiore duplo pluriesve breviore, *floribus* lanceolatis subulato-attenuatis longe aristatis *arista brevioribus* scabris, ligula biaurita, radice fibrosa. ☉. In locis incultis, collibus, campis arenosis. Mai. Jun. D. fl. 1. 637. F. myuros Ehrhart. calam. n. 15. et plurimor. auctor. Vulpia myuros Gmel. bad. 1. p. 8. V. Pseudo-myuros Reichenb. fl. exc. 37. Mygalurus caudatus Link. en. 1. 115. Culmus non raro e vagina emergit.

8. **F. bromoides** (Auctor. plurim. **F. sciuroides** Roth. tent. 2. 130.) *panicula secunda sub anthesi stricte erecta patente, ramis infimis dimidium paniculae subaequantibus,* valva superiore acuta, inferiore duplo pluriesve breviore, floribus lanceolatis subulato-attenuatis longe aristatis *arista brevioribus* scabris, ligula biaurita, radice fibrosa. ☉. In locis incultis, pascuis siccis. Mai. Jun. F. bromoides D. fl. 1. 636. plurim. auctorum et sec. cl. Bertolonium etiam Linnaei. Bromus dertonensis Allion. ped. 2. p. 249. secund. Bertolon. B. ambiguus Cyrill. pl. rar. fasc. 1. p. 10. Vulpia bromoides Link. hort. 1. 147. V. sciuroides Reichenb. fl. exc. p. 37. — Valva inferior in hac specie, sicut in antecedente, nunc longior, nunc brevior occurrit, sed in hac panicula brevis, stricte erecta, sub anthesi patens est, et rami infimi dimidium paniculae fere attingunt. Per plures annos ambas nunc colui, quae constantissimae permanebant et quas e longinquo habitu penitus diverso distinguas.

Sect. IV. Festucae genuinae. Paniculae pedunculi filiformes, sub flore modice tantum crassiores. Flores lanceolati acuti vel acuminati, mutici aristative. Folia omnia complicato-filiformia vel culmea plana. Ligula biaurita, nempe brevissima et utrinque in auriculam subrotundam protracta. Radix perennis fibrosa vel stolonifera, semper fasciculis foliorum sterilibus praedita.

9. **F. Halleri** (Allion. ped. 2. p. 253.) panicula contracta, sub anthesi erecto-patula, spiculis 4-5 floris, superioribus solitariis subsessilibus, inferioribus longius pedicellatis solitariis vel duabus tribusve in ramo alternis, floribus lanceolatis aristatis, arista florem dimidium aequante, *palea* inferiore 5 nervia, *superiore lanceolato-attenuata apice bifida, foliis omnibus complicato-setaceis, ligula biaurita,* radice fibrosa. ♃. In summis alpibus, (stw. dch. die Alpenk.) Jul. Aug. F. alpina St. h. 86. et h. l. etiam videtur F. alpina Sut. fl. helv. 1. p. 55. Floribus evidenter nervatis et palea superiore a basi fere attenuata a F. ovina differt. F. Halleri gallica, et planta eiusdem nominis helvetica, non differunt, quod speciminibus ab ipsis auctoribus, cl. De Cand. et cl. Gaudinio, acceptis probare possum.

10. **F. ovina** (L. sp. 108.) panicula per anthesin patente, spiculis 4-8 floris, floribus lanceolatis muticis aristatisve, arista brevi vel longiore floremque dimidium aequante, *palea* inferiore obsolete 5 nervia, *superiore oblongo-lanceolata apice bidentata, foliis omnibus complicato-setaceis, ligula biaurita,* radice fibrosa. ♃. In pratis vilioribus, pascuis, locis incultis ubique, in alpes altissimas adscendens. Mai. Jun. F. duriuscula Bertolon. fl. ital. 1. 601. Multis formis occurrit, inter quas, quum in observationibus per lon-

gum tempus continuatis transitus innumeros viderim, nunc differentias specificas proferre nequeo. Varietates praecipuae sunt

α. vulgaris, folia viridia vel paulum tantum glaucescentia, tenuissima, scabriuscula vel scabra, spiculae minores breviter aristatae: F. ovina D. fl. 1. 641. Occurrit 1. raro, spiculis muticis, F. tenuifolia Sibth. oxon. 44. Schrad. germ. 1. 318. 2. foliis, (in nemorosis umbrosis,) tenuissimis, elongatis: F. capillata Lam. fl. fr. 3. 597. Poa capillata Merat. par. ed. 2. t. 2. P. setacea Koel. gr. 162. 3. spiculis muticis 6 floris: Festuca paludosa Gaud. agr. 1. 229.

β. alpina, eadem, sed humilior, folia glabra, panicula e paucioribus spiculis composita, spiculae maiores, aristae longiores, quandoque florem aequantes: F. alpina Gaud. agr. 1. 232. D. fl. 1. 644. In alpibus et subalpinis. Haec forma, si spiculae colore violaceo tinctae sunt, est secund. cl. Schuttleworthium F. Gaudini Kunth. enum. 1. p. 399. exclusis synonymis.

γ. violacea, eadem, sed flores nitidi, colore violaceo, luteo et viridi eleganter variegati: F. violacea Gaud. agr. 1. p. 31. D. fl. 1. 646. In alpibus et subalpinis provenit.

δ. valesiaca, elatior, spiculae maiores, folia elongata, tenuissima, caesio-glauca, scaberrima: F. valesiaca Schleich. secund. specimen ab auctore. D. fl. 1. 651. Gaud. helvet. 1. 285. Occurrit inter vulgares formas hinc inde.

ε. duriuscula, elatior, spiculae maiores, folia viridia vel glaucescentia, tenuiora vel crassiuscula, stricta vel recurva: F. duriuscula L. sp. 108., non syst. nat. Pollich. pal. t. 101. D. fl. 1. 646. F. ovina Schrad. germ. 1. 320. F. duriuscula Host. gr. 2. t. 83. et F. stricta Host. gr. 2. t. 86. Occurrit vaginis foliisque inferioribus villosis, spiculis plus minusve pubescentibus, h. l. est: F. hirsuta Host. gr. 2. 61. In montibus petrosis humilior, foliis brevibus recurvis: F. curvula Gaud. agr. 1. 239. F. duriuscula *β.* curvula Gaud. helv. 1. 282.; vel folia longiora crassioraque acquirit: F. dura Host. gr. 2. t. 87. — Var. *ε.* ubique vulgaris.

ζ. glauca, eadem foliis glaucis: F. glauca Schrad. germ. 1. 322. D. fl. 1. 649. F. pallens Host. gr. t. 88. St. h. 26. Occurrit, praesertim in arenosis maritimis, caesio-glauca: F. glauca Lam. dict. 2. 459.; in alpibus foliis crassioribus laevigatis: F. duriuscula *γ.* laevigata Gaud. agr. 1. 351., F. laevigata Clairvill. man. 24., atque fol. rigidissimis, longis, crassissimis: F. pungens R. et S. syst. v. 2. 721.

η. amethystina, folia viridia vel glaucescentia, rigida, pungentia, spiculis muticis vel breviter mucronatis: F. amethystina Host. gr. 2. t. 89. D. fl. 1. 653. Spiculae minores, quam in antecedente. In Austria crescit.

ϑ. vaginata, folia tenuia, mollia, elongata, viridia vel glauca, spiculae longiores, 8 florae, muticae: Festuca vaginata Willd. en. 1. 116. secund. specim. e horto berolinensi. D. fl. 1. 652. Paniculam, sub anthesi valde divaricatam, etiam in aliis modificationibus quandoque observamus. Haec in Suevia superiore et Bavaria superiore, et copiose quidem in glareosis Isarae prope Monachium crescit.

ι. pannonica, folia paulo crassiora, glauca, spiculae longae, 8-10 florae, aristatae: F. pannonica Host. gr. 4. t. 62. D. fl. 1. 652. Haec a F. glauca non differt nisi numero florum in spiculis.

Varietates viviparae praesertim in montibus altioribus et in alpibus occurrunt.

11. **F. heterophylla** (Lam. fl. fr. edit. 1. 2. p. 600. 1778.) panicula sub anthesi patente, spiculis 4-5 floris, floribus aristatis lanceolatis, arista brevi vel longiore floremque subaequante, *foliis radicalibus complicato-setaceis, culmeis planis, ligula biaurita, radice fibrosa.* 4. In sylvis montanis, subalpinis et alpibus; in montibus humilioribus rarius occurrit. Mai. Jun., in alpibus serius, F. heterophylla Haenk. ap. Jacq. collect. 2. p. 93. 1788.

D. fl. 1. p. 655. F. duriuscula L. syst. nat. 2. 96., non spec. plant. Schrad. germ. 1. 328. var. *a.* F. nemorum Leyss. in Abhandl. der hall. naturf. Ges. 1. 368. In umbra sylvarum folia radicalia tenuissima et elongata sunt, paniculaque cum spiculis viridibus nutat; in sylvis caesis, soli expositis, folia rigida fiunt paniculaque erigitur, in alpibus spiculae ex violaceo et luteo variegatae apparent; haec ultima est F. nigrescens Lam. dict. 2. p. 460. F. nigricans Schleich. exsicc. Festucam heterophyllam et nigrescentem e semine eductas in horto observavi.

12. **F. rubra** (L. sp. 109.) panicula sub anthesi patente, spiculis sub 5 floris, floribus lanceolatis aristatis, arista breviore longioreve, *foliis radicalibus complicato-setaceis culmeis planis, ligula biaurita, radice stolonifera* caespitesque laxos agente. ♃ In pratis, pascuis, campis arenosis, sylvarum oris. Mai. Jun. D. fl. 1. 653. In locis arenosis longe repit culmosque per interstitia solitarios profert. Variat spiculis superne paulum villosis et

β. villosa, totis villo brevi adspersis: F. dumetorum L. sp. 109. F. barbata Schrank. salisb.

γ. arenaria, notabilis varietas spiculis maioribus lanuginoso-villosis: F. rubra *γ.* lanuginosa K. syn. ed. 1. p. 813., F. cinerea DC. fl. fr. 3. 51. F. arenaria Osbeck. in Retz. supplem. fl. scand. 1. 4. F. rubra *β.* arenaria Fries. F. baltica Hohmann. in litt. F. dumetorum Rafn. danm. og Holst. fl. 5. 549.

Sect. V. Schedonori. Paniculae pedunculi, spiculae floresque ut in sectione antecedente, sed ligula truncata, vel etiam protracta et oblonga, non vero biaurita. Folia saepius plana, etiam radicalia. — In sola F. loliacea spiculae in racemum dispositae, pedicellis brevibus et crassis insident; caeterae species paniculatae earumque spiculae pedicellis longioribus et tenuioribus instructae sunt.

13. **F. varia** (Haencke in Jacq. collect. 2. p. 94.) panicula contracta sub anthesi patente, ramis solitariis geminisve, spiculis 5-8 floris breviter aristatis muticisve, *palea inferiore obsolete* 5 *nervia lanceolata a medio sensim angustiore, ovario apice piloso, foliis omnibus complicatis filiformibus subteretibus, ligula oblonga,* radice fibrosa, stolonibus destituta. ♃. In pascuis petrosis alpium et reg. subalp., (stw. d. die Alpenk. und in die Sudeten.) Jul. Aug. D. fl. 1. 658. Gaud. helv. 1. 300. F. acuminata Gaud. agr. 1. 272. DC. fl. fr. 5. p. 265. Folia laete- vel glauco-viridia. Spiculae colore viridi, albo- et purpureo-pulchre variegatae; ligula nunc obtusa, nunc acuta. In varietate

β. flavescens, spiculae pallidae, multo minus variegatae sunt: F. flavescens Bellard. app. ad fl. pedem. in act. taur. 5. p. 217., si, sec. Bertol., folia tenuia et flaccida sunt; folia enim in hac specie variant et crassitie et rigiditate, coloreque viridi vel glauco, sicut F. ovina: eadem fere varietas est F. xanthina R. et S. syst. 2. 721. et F. alpina Host. gr. 4. t. 63. secund. specimina e seminibus hort. vindob. educta. Varietas

γ. crassifolia, habet folia crassa et rigida: F. Eskia Ramond. ap. DC. fl. fr. 3. p. 52. Hanc in Carniolia legit Müller. Axis variat magis minusve scaber vel breviter pilosus, ut in tota specie.

Nomen Festucae variae anteposui, quamvis b. Haenck. sub F. varia et hanc et Festucam pumilam comprehendisse videtur; nomen Festucae flavescentis in plantam saepe insigniter variegatam non quadrat.

14. **F. pumila** (Villars. fl. delph. 2. 102.) panicula erecta contracta sub anthesi subpatente, ramis solitariis geminisve, spiculis 3-4 floris aristatis, *palea inferiore obsolete* 5 *nervia oblongo-lanceolata supra medium subito acuminata, ovario apice piloso, foliis omnibus complicato-filiformibus subteretibus, ligula oblonga,* radice fibrosa. ♃. In pascuis petrosis alpium, (dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 1. 661.

15. **F. pilosa** (Hall. fil. in Sut. flor. helv. 1. p. 56.) panicula patente, ramis semiverticillatis, inferioribus plerumque quinis, spiculis subtrifloris aristatis muticisve, *axe sub floribus fasciculo pilorum barbato, ovario glabro,* foliis culmeis complicatis planisve, radicalibus subteretibus, ligula oblongo-lanceolata, radice fibrosa. ♃. In jugis alpium editissimis, (Schweiz, Tyrol,

Kärnthen, Steyerm.) Jul. Aug. F. rhaetica Sut. helv. 1. p. 56., excl. syn. Scheuchz. et Halleri patris. D. fl. 1. 661. St. h. 86. F. poaeformis Host. gr. 2. t. 81. Poa violacea Bellard. act. taur. 5. 214. t. 5.

16. **F. laxa** (Host. grm. 2. 58. t. 80.) *panicula patente flaccide nutante, ramis capillaribus scabriusculis a basi longe denutatis* solitariis geminisve, spiculis sub 5 floris muticis aristatisve, axe pubescente, palea inferiore obsolete 5 nervia non punctata, *ovario apice piloso, foliis anguste linearibus supra velutinis,* infimis complicatis, *ligula brevi truncata* subbiloba. 4. In alpibus carniolicis, (auf dem Loibl.) Jun. Jul. D. fl. 1. 662. G.

17. **F. spectabilis** (Jan. elench. 2. n. 38.) panicula ampla nutante, ramis inferioribus geminis ternisve inferne nudis, ramulis scabris, spiculis sub 5 floris muticis, axe pube brevi obsito, *palea inferiore subtilissime punctulata conspicue 5 nervi, ovario apice piloso,* foliorum fasciculis inferne squamis aphyllis sensim in folia abeuntibus tectis, *foliis elongato-linearibus planis concoloribus supra scabris,* ligula protracta oblonga, radice fibrosa. 4. In locis glareosis et lapidosis lateris alpium australis, (in Tyrol u. Krain) Jun. Jul. Bertolon. fl. ital. 1. 612. F. spadicea *β.* nemorosa Pollin. fl. veron. 1. 117. G.

18. **F. spadicea** (L. syst. nat. ed. 21. v. 2. p. 732. in addend.) panicula coarctata sub anthesi patula, ramis solitariis geminisve ramulisque glabris, spiculis sub 5 floris muticis breviterve mucronatis, axe scabriusculo, *palea inferiore subtilissime punctulata 5 nervi, nervis 3 prominentibus, ovario apice piloso, foliis anguste linearibus glaberrimis planis,* vaginis foliorum fasciculorum sterilium denique convolutorum cartilagineo-incrassatis, ligula ovata, radice fibrosa caespitosa. 4. In alpium editissimarum pascuis, (auf d. südl. Kette der Schweiz, in Tyrol, Salzb. Kärnthen, Krain.) Jul. Aug. D. fl. 1. 667. St. h. 86. Poa Gerardi All. ped. 2. 245. Anthoxanthum paniculatum L. sp. 40. Vaginae foliorum fasciculorum sterilium bulbum elongato-conicum aemulant.

19. **F. sylvatica** (Vill. delph. 2. 105.) panicula erecta diffusa ramosissima, ramis scabris, inferioribus geminis ternis quaternisve, spiculis sub 5 floris, axe scabriusculo, palea superiore attenuata acutissima mutica punctulato-scabra 5 nervi, nervis 3 prominentibus, *ovario apice piloso,* foliorum fasciculis inferne squamis aphyllis sensim in folia abeuntibus tectis, *foliis lanceolato-linearibus supra glaucis subtus laete viridibus* margine scabris, ligula oblonga obtusa, *radice fibrosa.* 4. In sylvis umbrosis, (stw. d. d. Gebiet.) Jun. Jul. D. fl. 1. 669., excl. synon. Wibelii. F. calamaria Smith. brit. 121. (F. decidua Sm. engl. bot. 32. t. 2266., F. calamaria *β.* Hook. scot. 40., Sm. engl. fl. 1. 145. specimina foliis angustioribus et spiculis 2-3 floris.) F. calamaria Host. a. 1. 153. gr. 4. t. 60. Poa trinervata Schrad. spicil. p. 3. Fl. dan. t. 1145. F. sylvatica Pollich. palat. 1. p. 83. Bromus triflorus Ehrh. Beitr. 1. p. 90. calam. n. 36. In solo humido montium altiorum folia latiora fiunt; haec var. secund. specimina ab amic. Hoppe. ad fontem Fürstenbrunnen in monte Untersberg prope Salisburgum lecta, est Festuca latifolia Host. fl. austr. 1. 152., F. sylvatica Sternb. Denkschr. d. regensb. bot. Ges. 1818. p. 94. Sed modificatio haec vix ut varietas proponenda est, nam specimen vivum angustifolium, e loco natali sylvarum Erlangensium in locum pinguem horti Erlang. transplantatum, iam in sequente anno folia latiora nactum est, quam quae in planta e monte Untersberg exstant. Radix in hac specie mere fibrosa, et raro stolo unus alterve filiformis et brevis, quo caespes augetur, occurrit, sed planta neutiquam repens dici potest.

20. **F. drymeia** (Mertens. et Koch. Deutschl. flor. 1. 670.) panicula diffusa ramosissima apice nutante, ramis scabris, inferioribus geminis ternisve, spiculis subquinquefloris, axe scabriusculo, palea inferiore acuminata mucronata subtilissime punctulata 5 nervia, nervis 3 magis prominentibus, *ovario apice piloso,* foliorum fasciculis a basi foliatis, *foliis lanceolato-linearibus supra glaucis subtus laete viridibus* margine scabris, ligula oblonga obtusa, *radice stolonibus elongatis squamatis repente.* 4. In sylvis montanis

humidis, (Oestreich, Mähren, Böhmen, Host.) Jun. Jul. F. drymeia M. et K. l. c. excluso synonymo Festucae montanae Sternb. et Hopp., ad Poam hybridam pertinente. F. sylvatica Host. fl. a. p. 153. gr. t. 78., non Vill. F. montana Reichenb. fl. exc. p. 41., non Sternb. F. exaltata Presl. fl. sic. 1. p. 45. Bertolon. fl. ital. 1. 613. — Simillima quidem antecedenti, sed panicula florente nutante, floribus minus attenuatis, vix scabris, praesertim autem stolonibus elongatis, pedalibus, bipedalibus, squamatis, crassitie et forma stolonum Caricis hirtae, diversa est speciemque valde insignem exhibet. Vivam in horto possideo. G.

21. **F. Scheuchzeri** (Gaud. agr. 1. 267.) panicula patente apice nutante, *ramis glabris*, inferioribus geminis, spiculis 4-5 floris, axe scabriusculo, palea inferiore acuta mutica vel sub apice mucronulata scabra 5 nervia, nervis prominulis, *ovario glabro*, foliis linearibus planis glabris, *ligula oblonga* obtusa, radice repente parum caespitosa. 4. In alpium pascuis, (stw. dch. d. g. Alpenk.) Jul. Aug. D. fl. 1. 668. St. h. 86. F. pulchella Schrad. germ. 1. 336. t. 5. f. 5. F. nutans Host. gr. 4. t. 61., non Wahlenb. carpat., quae mihi ignota.

22. **F. gigantea** (Villars. delph. 2. 110.) panicula patentisima, ramis apice flaccide nutantibus, spiculis 5-8 floris; floribus sub apice aristatis, *aristis flexuosis palea duplo longioribus, ovario glabro, foliis* linearibus *planis* glabris, ligula brevissima. 4. In sylvis umbrosis. Jun. Jul. D. fl. 1. 671. Bromus giganteus L. sp. 114. Schrek- gr. 1. t. 11. Variat:

β. triflora, spiculis trifloris, culmo humiliore, foliis angustioribus: Festuca triflora Engl. bot. t. 1918. Bromus triflorus L. sp. 115.

23. **F. borealis** (Mert. et Koch. D. flor. 1. p. 664.) panicula diffusa apice nutante ramosissima, ramis scabris subquinis, spiculis 4-5 floris, axe scabriusculo, *palea inferiore* 5 nervia punctulato-scabra apice obtusa denticulato-trimucronata *basi fasciculo pilorum cincta, ovario apice piloso*, foliis lanceolato-linearibus margine scabris, ligula oblonga truncata lacera, radice repente. 4. In aqua fluviorum et lacuum, (bei Berlin, in d. Spree u. Havel u. in den damit in Verbindung stehenden Seen; um Stettin; bei der Steinschleusse am Eiderkanal bei Friedrichsort in Holstein.) Jun. Jul. F. arundinacea Liljeb. sv. fl. 2. p. 47. 1792., non Schreb., qui suam 1771 promulgavit. F. donacina Wahlenb. suec. p. 64. Donax borealis Trin. fund. p. 156. D. festucaceus Beauv. agr. 78. Arundo festucacea Willd. en. 1. 126. Glyceria arundinacea Fries. nov. fl suec. mant. 2. p. 8. G.

24. **F. arundinacea** (Schreb. spicil. fl. lips. p. 57. 1771.) panicula diffusa nutante, *ramis scabris geminis ramulosis spiculis* 5-15 *gerentibus*, spiculis ovato-lanceolatis 4-5 floris, palea inferiore sub apice mucronata vel mutica, *ovario glabro*, foliis planis lanceolato-linearibus, *ligula brevissima.* 4. In pratorum dumetis, ad ripas. Jun. Jul. D. fl. 1. 665. F. elatior Sm. brit. 124. F. spadicea Moench. meth. 190. Bromus arundinaceus Roth. germ. 2. 141. B. littoreus Retz. scand. ed. 2. n. 140. 1792. Host. gr. 1. t. 8. B. elatior Spreng. syst. 1. 359. Poa Phoenix Scop. carn. 1. p. 74.

Festuca decolorans M. et K. D. fl. 1. p. 663., Koch syn. ed. 1. p. 816., nihil est nisi Festuca arundinacea Schreberi particulis subtilissimis calcis carbonici obtecta, quae ex nebula aquae rivi Staubbach in valle Lauterbrunn provinciae Bernensis praecipitantur, Guthnik. — „Cette plante n'est autre chose que Festuca arundinacea récouverte d'un enduit calcaire faisant evervescence avec l'acide nitrique, et deposé par l'eau en poussière, qui mouille continuellement la place ou cette plante croit.“ v. Charpentier in schedula speciminis benevole transmissi.

25. **F. elatior** (L. fl. suec. ed. 2. p. 32.) panicula secunda contracta sub anthesi patente, *ramis scabris geminis, altero brevissimo spiculam unam, altero racemoso spiculas* 3-4 *gerente*, spiculis linearibus 5-10 floris, valvis obtusis, palea inferiore 5 nervia apice denticulata mutica vel sub apice mucronata, *ovario glabro*, foliis planis lanceolato-linearibus, *ligula brevissima.*

4. In pratis fertilibus. Jun. Jul. F. pratensis Hudson. fl. angl. ed. 1. p. 37. Bromus elatior Koel. gram. 214. Poa curvata Koel. gr. 207.

26. **F. loliacea** (Huds. fl. angl. ed. 1. 38.) *racemo disticho* subnutante, *spiculis* lineari-oblongis *alternis distantibus*, inferioribus breviter pedicellatis interdum geminis, superioribus sessilibus, *foliis planis lanceolato-linearibus.* 4. In pratis fertilibus, (stw. dch. d. Geb.) Mai. Jun. D. fl. 1. 344. F. elongata Ehrh. Beitr. 6. 133. F. adscendens Retz. prodr. scand. 134. F. Phoenix Thuill. paris. 2. 1. 52. Lolium festucaceum Link. hort. 1. 273. — Spiculae ut in antecedente specie, sed habitus Lolii perennis, a quo differt spiculis inferioribus evidenter pedicellatis, valva inferiore instructis nec univalvibus, atque valva superiore florem, cui incumbit, non superante. In spiculis superioribus valva inferior saepe desideratur, vel minuta et in duas fissa exstat. — F. loliacea, me judicante, bonam speciem exhibet; non vulgaris est, sed in locis, ubi provenit, plerumque copiose adest, ibidemque cum affinibus plantis non commutabis.

55. BRACHYPODIUM (Palisot. de Beauv. agr. p. 100. t. 19. f. 3.) Palea superior margine setulis rigidis pectinato-ciliata; caetera ut Festucae. N. ab E. gen. 14. 16., excl. Narduro.

1. **B. sylvaticum** (Roem. et Schult. 2. 741.) spica disticha nutante, *spiculis numerosis* aristatis, *aristis florum superiorum palea longioribus*, foliis planis lanceolato-linearibus flaccidis, radice fibrosa. 4. In sylvis et dumetis. Jul. Aug. D. fl. 1. 691. Festuca sylvatica Huds. angl. ed. 1. 38. (nomen triviale caeteris prius.) Bromus pinnatus β. L. sp. 115. B. sylvaticus Pollich. pal. 1. p. 118. B. dumosus Vill. delph. 2. 119. B. gracilis Weigel. obs. 15. Festuca gracilis Moench. meth. 191. Triticum sylvaticum Moench. hass. n. 103. T. teretiflorum Wib. werth. 104.

2. **B. pinnatum** (Beauv. agrostograph. p. 101.) spica disticha erecta vel paulum nutante, spiculis numerosis aristatis, *aristis palea brevioribus*, *foliis planis* linearibus vel lanceolato-linearibus rigidiusculis, radice repente. 4. In collibus apricis incultis, locis lapidosis dumetosis. Jun. Jul. D. fl. 1. 692. Bromus pinnatus L. sp. 115. Festuca pinnata Moench. meth. 191. Triticum pinnatum Moench. hass. n. 102. T. bromoides Wib. werth. 11. Occurrit spiculis brevioribus et elongatis cornuque instar curvatis, villosis, scabris, glabrisve; atque porro

α. *vulgare*, spiculae scabrae vel villosae, rectae vel curvatae. Reichenb. ic. 11. f. 1376.

β. *rupestre*, spiculae var. antecedentis, sed glabrae; non raro quoque elongatae et subfalcatae: B. pinnatum β. Gaud. helv. 1. 306. B. rupestre R. et S. syst. 2. 737. Bromus rupestris Host. gr. 4. p. 10. t. 17. B. corniculatus Lam. fl. fr. 3. p. 608. Triticum pinnatum γ. DC. fl. fr. 5. p. 283.

γ. *caespitosum*, spiculae minores, glabrae, rectae vel subfalcatae, folia angustiora: B. caespitosum R. et S. syst. 2. 737. Bromus caespitosus Host. gr. 4. p. 11. t. 18. Triticum gracile DC. fl. fr. 3. p. 85. T. pinnatum β. DC. fl. fr. 5. p. 283. Praeter folia angustiora et spiculas minores nullam differentiam essentialem inter hanc varietatem et antecedentem detegere possum; plantam vivam ex horto vindobonensi possideo.

3. **B. ramosum** (Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 737.) spica erecta e spiculis 2-5 composita, floribus aristatis, *aristis palea brevioribus*, *foliis patentibus convoluto-angustissimis* glaucis rigidis, culmis basi ramosissimis. 4. In locis siccis petrosis Istriae. Jun. Brachypodium Plukenetii Link. hort. 1. 40. Bromus ramosus L. mant. 1. p. 34. Host. a. 1. 174. B. Plukenetii Allion. ped. 2. p. 250. Host. gr. t. 19. Festuca caespitosa Desf. atl. 1. 91. t. 24. f. 1. Triticum caespitosum DC. fl. fr. 5. p. 284. Specimina prope Nicaeam lecta, (e manu Cl. virorum DeCand. et Balbisii,) in omnibus exactissime conveniunt cum iis, quae amice mecum communicavit Biasolettius, ab ipso in Istria lecta. Variat:

β. *phoenicoides*, culmus minus ramosus, folia erectiora, spica e spiculis

pluribus composita. Triticum phoenicoides DC. fl. fr. v. 3. p. 85., v. 5. p. 284. sec. specimen ab ipso clariss. auctore acceptum, verosimile etiam Linn. mant. 1. p. 33. Dn. Sonder in Gallia australi specimina intermedia inter varietatem *α.* et *β.* legit, mecumque benevole communicavit. Festuca n. 5. Gerard. gallo-provinc. p. 95. ad varietatem *γ.* Brachyp. pinnati pertinet.

4. **B. distachyon** (Roem. et Schult. syst. veg. 2. 741.) *spiculis* 1-3 terminalibus *alternis* 6-12 floris aristatis, *aristis palea longioribus*, culmo glabro, foliis planis, radice fibrosa. ⊙. In locis cultis, ad vias, (Triest, Istrien u. bei Fiume.) Mai. D. fl. 1. 694. St. h. 86. Bromus distachyos L. sp. 115. Festuca diandra Moench. meth. 191. F. monostachya Poir. it. 2. 98. Desf. atl. 1. t. 24. f. 2. F. ciliata Gouan. monsp. 48. Triticum ciliatum DC. fl. fr. 3. 85. 5. 547. Trachynia distachya Link. hort. berol. 1. 43. Reichenb. ic. 11. f. 1368.

56. BROMUS (L. gen. n. 89.) Gluma bivalvis, multiflora, valvae flore proximo breviores. Flores bipaleacei; palea inferiore sub apice aristata, arista erecta vel recurva. Ovarium apice pilosum, in latere anteriore supra medium stylos emittens. Styli breves. Stigmata plumosa, versus basin floris egredientia.

Bromus asper, B. erectus et B. inermis, postquam character egregius, ab insertione stigmatum petitus, detectus fuit, aptissime in Bromi genus rursus redeunt.

Sect. I. Libertia Weihe. Palea inferior infra medium dente ovato membranaceo utrinque appendiculata, 7-9 nervia, nervis 2 marginalibus approximatioribus.

1. **B. arduennensis** (Kunth. en. 1. 416.) panicula patente denique nutante, floribus ex ovata basi attenuatis, *palea inferiore* 9 nervia *ad marginem infra medium utrinque dente ovato membranaceo appendiculata.* ☉. Inter segetes, (bisher bloss bei Aiwaille in den zu der Provinz Lüttich gehörigen Ardennen beobachtet, wo sie von dem bot. Gärtner Michel entdeckt wurde.) Jun. Jul. Libertia arduennensis Lejeun. in nov. act. acad. leop. carol. vol. 12. 2. 757. t. 63. Calotheca bromoidea Lej. messag. d. scienc. sept. 1823. Michelaria bromoidea Dumort. agr. 77. t. 16. Bromus multiflorus *β.* Reichenb. fl. exc. 43. Tota spicularum florumque fabrica longe recedit a Bromo secalino, et certissime haec planta e semine illius non propullulat. Hyemes nostras aegre fert et saepe in horto nostro perit. G.

Sect II. Serrafalcus Parlatore. Bromi secalini Bertolon. fl. ital. 1. 654. Spiculae, etiam defloratae, apicem versus angustiores. Valva inferior 3-5 nervia, superior 5-multinervia. Palea superior setis rigidulis remote pectinato-ciliata.

2. **B. secalinus** (L. sp. 112.) panicula patente deflorata nutante, spiculis oblongis, floribus lato-ellipticis, *fructiferis margine contractis teretibus non se tegentibus, palea inferiore* 7 nervia margine rotundata *superiorem aequante,* arista porrecta flexuosa rectiusculave, vaginis glabris. ☉. In agris inter segetes. Jun. Jul. Variat:

α. grossus, spiculis maioribus glabris vel scabris: B. grossus *β.* Gaud. agrost. 1. 301. B. grossus *α.* D. fl. 1. 680.

β. velutinus, spiculis maioribus hirto-velutinis; B. grossus *α.* Gaud. agr. l. c. B. grossus *β.* et *γ.* D. fl. l. c. B. grossus DC. fl. fr. 3. p. 68. Gmel. bad. 4. t. 2. B. velutinus Schrad. 1. 349. t. 6. f. 3. B. multiflorus Smith. brit. 1. 126.

γ. vulgaris, spiculis minoribus glabris vel scabris: B. secalinus Schrad. germ. 1. 147. Leers. herb. t. 11. f. 2. D. fl. 1. 679., si spiculae glabrae aristaeque breves et conspicue flexuosae sunt; si vero aristae longiores fiunt et longitudinem floris attingunt, oritur: Bromus elongatus Gaud. agr. 1. 305., secund. specimen ab ipso auctore.

δ. hordaceus Gmelin, spiculis minoribus pubescentibus hirtisve: B. hordaceus Gmel. bad. 4. p. 68. t. 1., si spiculae pilis brevissimis pubescunt

et aristae paleam subaequant, atque, B. badensis Gmel. l. c. p. 74. t. 5., si spiculae pilis brevibus hirto-velutinae apparent. B. hordaceus Fries. alia planta est, mihi nondum satis nota.

3. **B. commutatus** (Schrader. flor. germ. 1. p. 353.) *panicula* patente *demique nutante, spiculis* oblongo-lanceolatis *glabris,* floribus ellipticooblongis, fructiferis margine imbricatim se tegentibus, palea inferiore 7 nervia margine *supra medium angulum obtusum exhibente* superiorem conspicue superante, *aristis porrectis* fere longitudine paleae, vaginis inferioribus pilosis. ☉. Inter segetes et in pascuis, (südl. Hannover u. nördl. Thüringen, Bezirke v. Göttingen, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg u. bis an d. Harz, Oberbaden, Schweiz.) Mai. Jun. D. fl. 1. 683. Reichenb. ic. 11. f. 1589. B. simplex Gaud. agrost. 1. p. 236., in flora helvetica cum B. racemoso coniunctus. A B. secalino differt floribus fructiferis margine imbricatis, palea inferiore superiorem conspicue superante, pedunculis tenuioribus vaginisque inferioribus villosis; a B. racemoso palea inferiore longiore et, si explanetur, oblongo-ovata, margine supra medium angulum obtusum exserente, arista remotius ab apice inserta, palea superiore lineari-oblonga marginibus fere parallelis basi tantum angustata, (in B. racemoso palea inferior, si explanetur, lato-ovata est marginibus rotundatis, superior lineari-obovata); a B. patulo, qui ad B. arvensem multo propius accedit, quam ad B. commutatum, floribus latioribus fructiferis margine arctius imbricatis, nunquam convolutis, aristisque rectis. Per plures annos nunc in horto colo, ubi ex semine semper immutatus redivit. Semper stricte biennis est. Antherae Bromi commutati tertia parte breviores sunt, quam Bromi racemosi.

4. **B. racemosus** (L. sp. 114.) *panicula* patente *erecta* vel subnutante *deflorata contracta,* spiculis ovato-oblongis glabris, floribus lato-ellipticis fructiferis margine imbricatim se tegentibus, *palea* inferiore 7 nervia *margine rotundata* superiorem conspicue superante, *aristis porrectis* fere longitudine paleae, vaginis inferioribus pilosis. ☉. In pratis et pascuis. Mai. Jun. D. fl. 1. 681. Reichenb. ic. 11. f. 1590. B. pratensis Ehrh. calam. 16. B. multiflorus Roth. tent. 2. 134. Planta biennis est, ut cultura me docuit.

5. **B. mollis** (L. sp. 112.) *panicula erecta, deflorata contracta,* spiculis ovato-oblongis molliter pilosis rarius subglabris, floribus lato-ellipticis, fructiferis margine imbricatim se tegentibus, *palea inferiore* 7 nervia, *margine supra medium angulum obtusum exhibente* superiorem conspicue superante, *aristis porrectis* fere longitudine paleae, vaginis foliisque pilosis. ☉. In pratis, ad vias. Mai. Jun. D. fl. 1. 682. Leers. herb. t. 11. f. 1. Variat panicula maiore, diffusiore et minore magisque coarctata, et raro spiculis glabris in nervis tantum pilis brevissimis scabriusculis. — B. nanus Weigel. obs. 8. t. 1. f. 9. comprehendit specimina pygmaea.

6. **B. confertus** (Marsch. a Bieberst. flor. taur. cauc. 1. p. 71.) *panicula conferta erecta, deflorata contracta,* spiculis ovato-oblongis scabris vel molliter pilosis, floribus ellipticis, fructiferis margine imbricatim se tegentibus, palea inferiore 7 nervia superiorem conspicue superante, *aristis siccitate contortis flexisque* fere longitudine paleae, vaginis foliisque pilosis. ☉. Inter segetes Istriae, Biasoletto! Mai. Jun. B. confertus Reichenb. ic. 11. f. 1593., specimen non satis evolutum, aristis rectis pictum. B. intermedius Guss. fl. sicul. prodr. p. 114. B. erectus Moris. stirp. sard. elench. fasc. 1. p. 50. B. alopecuroides Moris. l. c. fasc. 2. p. 11. Varietates spiculis scabris et villosis jam MBieberst. observavit, conf. fl. taurico-cauc. v. 3. p. 78.
J.

7. **B. brachystachys** (Hornung. in bot. Zeitg. 16. 2. p. 418. t. 1.) *spicula erecto-patula deflorata immutata,* spiculis ovato-lanceolatis ovatisve, *floribus subrhombeis,* fructiferis margine imbricatim se tegentibus, *palea* inferiore 7 nervia margine supra medium angulum obtusum exhibente, *superiore inferiorem fere aequante,* arista porrecta flore dimidio breviore, vaginis

inferioribus pilosis. ☉. In agrorum versuris prope Aschersleben provinciae Magdeburg. Jun. Spiculae glabrae. In horto nostro stricte biennis est, constans permansit, atque cultura nec habitum nec characteres mutavit. Conferri potest cum B. arvensi, patulo et molli; ab hoc praeter pubem differt panicula deflorata non contracta, ramis elongatis, in verticillis inferioribus sensis, speciminum maiorum duodenis et pluribus, paleis aequalis longitudinis, antheris linearibus duplo-longioribus; a B. arvensi radice bienni, panicula strictiore, ramis validioribus, floribus brevioribus et latioribus, aristis multo brevioribus, atque *caryopside obovato-oblonga paleasque paulum superante,* quae in B. arvensi linearis et paleis quarta parte brevior est; a B. patulo iisdem notis et paleis subaequalibus distinguitur. Conf. Hornung l. c. G.

8. **B. arvensis** (L. sp. 113.) *panicula patente* erecta, *fructifera subnutante,* spiculis lineari-lanceolatis, *floribus elliptico-lanceolatis,* fructiferis margine imbricatim se tegentibus, palea inferiore 7 nervia margine supra medium angulum obtusum exhibente, *superiore inferiorem subaequante,* aristis porrectis fere longitudine paleae, siccatis quandoque extrorsum arcuatis, vaginis foliisque pilosis. ☉. In agris inter segetes. Jun. Jul. D. fl. 1. 686. Leers. herborn. t. 11. f. 3. B. versicolor Pollich. palat. 1. p. 109. B. multiflorus Weigel. obs. 2. t. 1. f. 1.

9. **B. patulus** (Mertens et Koch D. flor. 1. p. 685.) *panicula patente deflorata unilateraliter nutante,* spiculis lanceolatis, floribus elliptico-lanceolatis, fructiferis remotiusculis, palea inferiore 7 nervia margine supra medium angulum obtusum exhibente superiorem conspicue superante, *aristis maturitate divaricata-reflexis,* vaginis foliisque pilosis. ☉. Inter segetes biennes, (stw. dch. d. Gebiet, aber d. Standörter sind nicht auszumitteln, weil die Pfl. überall mit B. commutatus verwechselt wurde.) Mai. Reichenb. ic. 11. f. 1588. B. commutatus Koch et Ziz. cat. pl. palat. p. 4., non Schrad. B. multiflorus Host. gr. 1. t. 11., non Weigel. In horto stricte biennis est et iam fructibus maturis onustus nutat, quando B. arvensis florere incipit, qui in horto semper annuus est. Antherae triplo breviores, quam in arvensi, et palea inferior semper conspicue brevior, quam superior. Variat spiculis glabris et

β. velutinus, spiculis molliter pilosis: B. patulus *β.* M. et K. l. c. G.

10. **B. squarrosus** (L. sp. 112.) *panicula patente flaccideque nutante,* spiculis oblongo-lanceolatis, floribus lato-ellipticis, fructiferis margine imbricatim se tegentibus, palea inferiore 7 nervia margine supra medium angulum obtusum exhibente inferiorem conspicue superante, *aristis siccatis contorto-divaricatis.* ☉. In arvis et vineis, (südl. Schweiz, südl. Tyrol, Littorale, Steyerm., auch selten in Oberbaden, nämlich bei Crenzach u. Wyl in d. Gegend v. Basel.) Mai. Jun. D. fl. 1. 685. Variat spiculis glabris et

β. villosus, spiculis molliter pilosis: B. squarrosus *β.* D. fl. l. c. B. squarrosus Host. gr. 1. t. 13. B. villosus Gmel. bad. 1. 229. B. hirsutus Schrank in Denkschr. d. Regensb. bot. Ges. 1818. p. 161.

Sect. III. Bromi festucacei. Bertol. fl. ital. 1. 676. Spiculae, etiam defloratae, apicem versus angustiores. Valva inferior uni-superior trinervia. Palea superior margine pilis brevissimis pubescens.

11. **B. asper** (Murr. prodr. fl. goett. p. 42.) *panicula ramosa flaccide nutante,* spiculis lineari-lanceolatis 7-9 floris, floribus lineari-lanceolatis acutis, *palea* inferiore ex apice brevissime bidentato aristata aristamque superante 5 nervia, nervis 2 intermediis obsoletis, *superiore margine subtiliter pubescenti-ciliata,* vaginis inferioribus foliisque hirsutis. ♃. In sylvis, praecipue montanis. Jun. Jul. B. ramosus Murr. syst. veg. ed. 13. p. 102., non Linn. mant. 34. B. nemoralis Huds. angl. 51. B. nemorosus Vill. delph. 2. 177. B. hirsutus Curt. lond. fasc. 2. t. 8. B. montanus Pollich. pal. 1. 116. B. montanus et asper Gmel. bad. 1. p. 232. et 242.

12. **B. erectus** (Huds. angl. 49.) *panicula aequali erecta,* ramis inferiori-

bus ternis senisque, spiculis lineari-lanceolatis, floribus lanceolatis, *palea* inferiore apice brevissime bidentata ex emarginatura aristata aristamque superante 5-7 nervia, *superiore margine subtiliter pubescenti-ciliata*, *foliis* radicalibus angustioribus *margine ciliatis*. ♃. In collibus incultis apricis, agrorum marginibus, pratis siccis. Mai. Jun. B. agrestis All. ped. 2. p. 249. Host. gr. 1. t. 10. B. perennis Vill. delph. 2. 122. B. angustifolius Schrank. baier. fl. p. 366. B. montanus Fl. wett. 1. p. 134. B. arvensis Pollich. palat. 1. p. 113. B. pseudoarvensis Koel. gr. 241. Festuca montana Savi pis. 1. 118. D. fl. 1. 673.

13. **B. inermis** (Leysser. fl. halens. ed. 1. p. 16. 1761.) *panicula aequali erecta*, ramis inferioribus ternis senisque, spiculis lineari-lanceolatis, floribus lanceolatis, *palea* inferiore apice brevissime bidentata ex emarginatura mucronata vel breviter aristata 5-7 nervia, *superiore margine subtiliter pubescenti-ciliata*, *foliis glabris*. ♃. In collibus incultis, pratorum marginibus, ad vias. Jun. Jul. Bromus inermis L. mant. alt. p. 186. 1771. Schreb. gr. 1. t. 13. Festuca inermis DC. fl. fr. 3. p. 49. D. fl. 1. 674. F. speciosa Schreb. spicil. p. 59. F. Leysseri Moench. hass. n. 82.

Sect. IV. Bromi genuini. Spiculae superne latiores. Valva inferior 1-superior 3 nervia. Palea superior setis rigidulis remote pectinato-ciliata.

14. **B. sterilis** (L. sp. 113.) panicula laxa denique nutante, *ramis elongatis apice pendulis*, *spiculis* oblongis *superne latioribus*, floribus lineari-subulatis, palea inferiore ex apice bipartito aristata, aristis rectis paleam superantibus, palea superiore pectinato-ciliata, *culmo glabro*. ☉. In locis cultis, ruderatis, ad vias. Mai. et per totam aestatem. D. fl. 1. p. 688. Leers. herborn. t. 11. f. 4.

15. **B. tectorum** (L. sp. 114.) *panicula pendula* subsecunda, spiculis linearibus denique *superne latioribus*, floribus lanceolato-subulatis, palea inferiore ex apice bipartito aristata, aristis rectis paleam aequantibus, palea superiore pectinato-ciliata, *culmo apice pubescente*. ☉. In agris, campis, muris. Mai. Jun. D. fl. 1. p. 688. Leers. herborn. t. 10. f. 2.

16. **B. rigidus** (Roth. in Roem. et Ust. annal. fasc. 10. 21.) *panicula pedunculisque erectis*, *spiculis* oblongis *superne latioribus*, floribus lanceolatis attenuato-acutis, palea inferiore infra apicem ad medium bifidum aristata, aristis rectis palea longioribus, palea superiore pectinato-ciliata, *culmo superne pubescente*. ☉. In locis cultis, vineis, ad vias, (im östr. Littorale u. in Istrien.) Mai. Jun. Schrad. germ. p. 367. D. fl. 1. 689. B. rubens Host. gram. 1. t. 18. Differt a sequente „panicula ramis simplicissimis brevioribus; spiculis lineari-lanceolatis, tumidiusculis; glumis, inprimis calycina et corollina exteriori longe maioribus; aristis gluma sua longioribus, nec non villo molli, quo rachis ramique (in B. madritensi semper nudi et scabri) et reliquae partes plantae conspersi reperiuntur" Schrader l. c. Propius accedit Bromus rigidus ad Bromum maximum Desfont., a quo differt panicula contractiore, spiculis brevius pedicellatis, atque culmo superne rachi pedicellisque villo brevi obductis. Spiculae paulo tantum minores et aristae palea sua sesquilongiores vel duplo longiores sunt. Floris infimi palea inferior 10-14 lineas longa, arista sesquipollicaris et bipollicaris. H. l. videtur B. maximus? Babingt. man. p. 374.

17. **B. diandrus** (Curt. fl. lond. fasc. 6. t. 5.) *panicula pedunculisque erectis*, *spiculis* lineari-oblongis *superne latioribus*, floribus lanceolato-subulatis, palea inferiore infra apicem fere ad medium bifidum aristata, aristis rectis paleam aequantibus, *culmo glabro*. ☉. In locis cultis, ad vias, (Oestr. Littorale u. südl. Tyrol.) Mai. Jun. B. diandrus Smith. engl. fl. 1. p. 60. fl. brit. 135. B. gynandrus Roth. in Roem. et Ust. ann. fasc. 10. p. 20. B. madritensis K. syn. ed. 1. p. 823. Host. gram. 1. p. 14. t. 17. Schrad. germ. p. 366. Linn. sp. 114. quod locum natalem „Anglia" attinet. B scaberrimus Bertol. fl. it. 1. p. 676. sec. specimina ab ipso celeberr. Auctore accepta; specimina anglica ad pedem rupis St. Vincent prope Bristol in

Anglia lecta cum italicis memoratis exacte congruunt. — Nomen B. madritensis, quippe ambiguum factum, amplius anteponere nolui. G.

Trib. XIV. *HORDEACEAE.* Kunth. enum. 1. 435. *Spiculae* 2-multiflorae, flore terminali saepe tabescente, *ad excisuras racheos sessiles;* pedicelli nulli. Styli brevissimi vel nulli. *Stigmata* plumosa, *e basi floris utrinque egredientia.*

57. GAUDINIA (Palisot. de Beauv. agr. p. 95. t. 19. f. 5.) Spiculae solitariae, in racheos excisuris sessiles, rachi parallelae. Gluma bivalvis, 4-7 flora. Glumella bipaleacea, palea inferior dorso aristata, arista basi torta.

1. **G. fragilis** (Beauv. agr. l. c.) spica articulata, ad articulos fragili. ☉. In locis incultis, (Istrien, im Canton Waadt d. Schweiz u. auf einer Wiese bei Eppendorff unweit Hamburg; Insel Sansego bei Istrien.) Jun. D. fl. 1. 474. Avena fragilis L. sp. 118. Schreb. gram. 1. t. 24. f. 3.

58. TRITICUM (L. gen. n. 99.) Spiculae solitariae, in racheos excisuris sessiles, rachi parallelae. Gluma bivalvis, 3-multiflora, valvae carinatae acutae vel mucronatae. Glumella bipaleacea, palea inferiore ex apice aristata vel mutica.

Sect. I. Cerealia. Spiculae plus minusve ventricoso turgidae. Valvae ovatae vel oblongae.

1. **T. vulgare** (Vill. delph. 2. 153.) *spica tetragona* imbricata, rachi tenaci, spiculis plerumque quadrifloris, *valvis ventricosis ovatis* truncatis mucronatis *sub apice compressis* dorso rotundato-convexis, nervo obtuse prominulo, fructibus liberis. ☉ et ☉. Colitur. Jun. Jul. D. fl. 1. 696. Metzger. europ. cereal. t. 1. et 2. Variat spica aristata, (T. aestivum L. sp. 126.) et submutica (T. hybernum L. l. c.) alba, rufa et nigra, glabra et velutina. Colit.

2. **T. turgidum** (L. sp. 126.) *spica tetragona* imbricata, rachi tenaci, spiculis plerumque quadrifloris, *valvis ventricosis ovatis* truncatis mucronatis *carinatis, carina* tota prominente *subalaeformi*, fructibus liberis. ☉ et ☉. Colitur. Jun. Jul. D. fl. 1. 696. Metzger. europ. cereal. t. 3. Variat ut antecedens; et insuper spica composita: T. compositum L. syst. veg. ed. 13. p. 108. — Ab antecedente carina, etiam in dorso valvae valde prominente differt. Colit.

3. **T. durum** (Desf. atl. 114.) *spica tetragona* imbricata, rachi tenaci, spiculis plerumque quadrifloris, *valvis centricosis oblongis latitudine sua triplo longioribus* lato-mucronatis *carinatis, carina* tota prominente *subalaeformi,* fructibus liberis. ☉ et ☉. Colitur hinc inde in Helvetia circa Bernam. Jun. Jul. D. fl. 1. 697. Metzger. europ. cereal. t. 4. T. hordeiforme Host. gram. 4. t. 5. Valvae triplo longiores, quam latae, caetera ut in antecedente. Colit.

4. **T. polonicum** (L. sp. 127.) *spica irregulariter tetragona vel compressa,* rachi tenaci, spiculis plerumque trifloris, *valvis subventricosis oblongo-lanceolatis herbaceo-chartaceis conspicue multinerviis* dorso carinatis apice breviter bidentatis, dente anteriore obsoleto, fructibus liberis. ☉ et ☉. Colitur hinc inde in Helvetia australi. Jul. Aug. Metzger, europ. cereal. t. 5. et 6. Colit.

5. **T. Spelta** (L. sp. 127.) spica tetragona subaequilatera parallele compressa laxe imbricata, *rachi fragili;* spiculis plerumque quadrifloris, *valvis lato-ovatis truncatis bidentatis, dente* carinali recto, *anteriore obsoleto,* fructibus corticatis. ☉. In terra argillacea et calcarea ubique colitur. Jun. Jul. Variat colore et indumento spicarum ut T. vulgare. D. fl. 1. 699. Metzger. europ. cereal. t. 6. Colit.

6. **T. dicoccum** (Schrank. baier. fl. 1. p. 389.) spica opposite (a latere) compressa arcte imbricata, *rachi fragili*, spiculis plerumque quadrifloris,

valvis oblique truncatis dentato-mucronatis, *carina compressa valde prominente* superne cum dente apicis inflexa, fructibus corticatis. ☉ et ☉. Colitur. Jun. Jul. D. fl. 1. 699. T. amyleum Sering. melang. bot. 1. 124. Metzger. europ. cereal. t. 7. T. tricoccum Schübl. bot. Ztg. 3. 2. 458. t. 1 et 2. Colit.

7. **T. monococcum** (L. sp. 127.) spica opposite (a latere) compressa arcte imbricata, *rachi fragili*, spiculis plerumque trifloris, *valvis apice bidentatis, dentibus acutis* carinaque apice *rectis*, fructibus corticatis. ☉ et ☉. Colitur in regionibus montanis in solo macriore, ubi T. Spelta non provenit. Jun. Jul. D. fl. 1. 700. Host. gram. 3. t. 32. Metzger. europ. cereal. t. 17. Colit.

8. **T. villosum** (Marsch. Bieb. flor. taur. cauc. 1. p. 85.) spica disticha, *spiculis* plerumque 4 floris, valvis cuneatis truncatis aristatis rachique *fasciculato-pilosis*, foliis tuberculato-pilosis. ☉. Inter segetes, (Istria, Fiume.) Mai. Jun. D. fl. 1. p. 700. Secale villosum L. sp. 124. Host. gram. 2. t. 48. In horto semper bienne. J.

Sect. II. Agropyra. Spiculae non ventricoso-turgidae. Valvae lanceolatae vel linearioblongae, apice rectae vel extrorsum flexae. N. ab E. gen. 13. 17.

a. Nervi foliorum supra seriebus numerosis pilorum brevissimorum densissime obsiti.

9. **T. junceum** (L. sp. 108.) spica disticha, spiculis 5-8 floris remotis, *valvis* lineari-lanceolatis 9-11 *nerviis* obtusis spicula tertia parte brevioribus obtusiusculis muticis, *foliis supra molliter densissime brevissimeque velutinis*, rachi glabra, radice longe repente. 4. Ad littora maris arenosa, (an d. nördl. und südl. Seeküsten.) Jun.-Aug. D. fl. 1. 701. Host. gr. 3. t. 33. T. farctum Viv. fragm. 1. t. 26. Agropyrum junceum Beauv. agr. 102. G.

10. **T. strictum** (Dethard. consp. plant. megap. p. 11.) spica disticha, spiculis 5 floris approximatis, *valvis* lineari-lanceolatis glabris 5 *nerviis* acutis spiculam dimidiam superantibus, floribus obtusis muticis *a basi supra medium axeque pilosis*, rachi margine scabra, *foliis supra densissime brevissimeque velutinis scabriusculisque*, radice longe repente. 4. In arenosis hyeme aqua marina inundatis prope Warnemünde. Jun. Jul. T. acutum δ. strictum D. fl. 1. 703. Culmus crassus, rigide erectus. G.

11. **T. acutum** (DC. cat. hort. monsp. 153.) spica disticha, spiculis 5-8 floris approximatis, valvis lineari-lanceolatis 7 nerviis acutis obtusiusculisve spicula tertia parte brevioribus, floribus acutis obtusiusculisve muticis breviterve aristatis glabris, rachi plerumque glabra, *foliis supra punctulis acutis dense obsitis scabris*, radice longe repente. 4. In arenosis maritimis, (an d. Seeküste bei Triest, im Holsteinischen u. an d. Insel Norderney.) Jun. Jul. D. fl. 1. 702. Variat rachi margine scabra, et rachi dorso villosa. Triticum, quod nomine Tritici affinis in collectionibus asservatur, a Tritico acuto diversum non habeo. T. laxum Fries. herbar. normal. 6. n. 91. varietas foliis flaccidioribus mihi videtur. G.

b. Nervi foliorum supra serie simplici aculeorum minutissimorum vel setularum obtiti eoque scabri.

12. **T. rigidum** (Schrader. seminar. hort. Goett. 1803., fl. germ. 1. 392.) spica disticha, spiculis 5-10 floris, inferioribus remotis, superioribus approximatis, *valvis* oblongis 9 *nerviis lato-truncatis* obtusissimisve spicula dimidia brevioribus, floribus obtusissimis muticis, rachi setuloso-scabra, *foliis supra setulis solitariis scaberrimis, radice fibrosa caespitosa stolonibus destituta*. 4. In arenosis ad littus maris adriatici inque campis arenosis Austriae, Bohemiae. Jul. Aug. D. fl. 1. 704. T. elongatum Host. gr. 2. t. 18. T. junceum β. giganteum Roth. n. Beitr. 1. p. 138. In horto radix mere fibrosa et stolonibus penitus destituta est, qua nota ab omnibus speciebus sectionis, Tritico canino et T. bifloro exceptis, quae pariter stolonibus carent, evidenter differt. G.

13. **T. pungens** (Persoon. syn. 1. 109.) spica disticha, spiculis 5-10 floris approximatis, *valvis* lanceolatis 7 *nerviis acutiusculis breviterve mucronatis* spicula dimidio brevioribus, floribus obtusis muticis, rachi glabra scabrave, *foliis supra setulis solitariis scaberrimis, radice repente.* 4. In arenosis ad littus maris adriatici et septentrionalis. Jun. Jul. D. fl. 1. 704. Fortasse mera T. repentis varietas. G.

14. **T. glaucum** (Desf. cat. hort. paris. p. 16.) spica disticha, spiculis subquinquefloris approximatis, inferioribus paulum remotis, *valvis* oblongis 5-7 *nerviis obtusissimis* vel truncatis spicula dimidio brevioribus, floribus obtusissimis muticis vel aristatis, rachi setuloso-scabra, *foliis supra punctulis acutis solitariis scabriusculis, radice repente.* 4. In ripis et ad vias, (Böhmen, Oestreich, Steyermark, südl. Tyrol, Schweiz.) Jun. Jul. D. fl. 1. p. 706. T. intermedium Host. fl. a. 1. 180. T. junceum Host. gr. 2. t. 22. — Videtur varietas maior T. repentis floribus obtusioribus. T. repens colore caesio-glauco quoque occurrit.

15. **T. repens** (L. sp. 128.) spica disticha, spiculis subquinquefloris, *valvis* lanceolatis 5 *nerviis acuminatis,* floribus acuminatis obtusiusculisve muticis aristatisve, rachi plerumque scabra, *foliis supra punctulis acutis solitariis* magis minusve *scabris, radice repente.* 4. In locis cultis et sepibus, praecipue solo arenoso ubique. Jun. Jul. D. fl. 1. 706. Leers. herborn. t. 12. f. 3. 4. Variat floribus acutis acuminatisve et floribus obtusis, iisque aristatis, (Elymus caninus Leers. herborn. t. 12. f. 4.,) mucronatis muticisve, foliis viridibus glaucisve; specimina foliis glaucis et floribus acutis aristatis: Agropyrum caesium Presl.; floribus obtusis muticis: Agropyrum firmum Presl. fl. cech. p. 28. — T. repens b. maritimum Koch. et Ziz. cat. pl. pal. p. 5. est varietas tota caesio-glauca, foliis convolutis floribusque obtusis vel obtusiusculis, quae etiam rachi perfecte laevi occurrit. Crescit in campis arenosis prope Moguntiam. — T. littorale Host. gr. 4. t. 9. secundum specimina e seminibus horti vindobon. educta, a Tritico repente non differt. Specimen ex horto Hostiano in collect. Mertensiana asservatum folia angustiora, supra scaberrima et rachin glabram habet, sed eadem certo quoque nil est, nisi varietas T. repentis.

16. **T. biflorum** (Brignoli fasc. plant. rar. forojul. an. 1810.) spica disticha, spiculis 2-rarius 3-4 floris, *valvis lanceolatis trinerviis acuminatis,* floribus aristatis, *arista flore subtriplo breviore,* axe scabriusculo; foliis glabris margine scabriusculis, radice fibrosa. 4. In alpibus Goritiae, (auf den felsigen Kämmen des Matajur.) Jul. Aug. T. biflorum Brignol. in regensb. bot. Ztg. v. 23. p. 97., conf. quoque ibid. p. 638. In regionibus maxime borealibus variat:

β. Hornemanni, culmis humilioribus, rigidioribus et spiculis coloratis fere semper 2-3 floris: T. violaceum Hornem. fl. dan. t. 2044. Fries herbar. normal. 5. n. 99. — Folia Tritici biflori duplo angustiora, quam folia T. canini, cui planta valde similis, supra subtusque laevia et margine tantum scabra, nervi valvarum aequidistantes. G.

17. **T. caninum** (Schreber. spicileg. flor. lips. p. 51.) spica disticha, spiculis plerumque 5 floris, *valvis* lanceolatis 4-7 *nerviis acuminatis,* floribus acuminatis aristatis *arista florem excedente,* rachi setuloso-scabra, *foliis utrinque scabris, radice fibrosa.* 4. In sylvis ad rivulos sylvaticos et sepes umbrosas. Jun. Jul. D. fl. 1. 709. Host. gr. 2. t. 25. Elymus caninus L. sp. 124.

T. imbricatum MB. „circa Pragam non crescit, neque unquam ibidem crevit, semel quasi spontaneum in vallo urbis, et quidem in unico tantum loco, lectum fuit, sed ex hoc tempore evanuit, neque iterum rediit.“ Kosteletzk. in litt.

59. SECÁLE (L. gen. n. 97.) Valvae subulatae. Spiculae biflorae

cum rudimento tertii floris longe pedicellato; caetera ut Tritici. — N. ab E. gen. 13. 15.

1. **S. cereale** (L. sp. 124.) valvis spicula brevioribus, rachi tenaci ⊙ et ⊙. Ubique colitur. Mai. D. fl. 1. 710. Metzger europ. cereal. t. 9. Colit.

60. ÉLYMUS (Linn. gen. n. 96.) Spiculae binae, ternae, quaternae 2-multiflorae, in racheos excisuris sessiles. Gluma bivalvis, ante flores posita; valvae spicularum ternarum involucrum hexaphyllum referentes. Flos summus saepe tabescens. Glumella bipaleacea. N. ab E. gen. 13. 14.

1. **E. arenarius** (L. sp. 122.) spica erecta conferta, *spiculis* plerumque trifloris *pubescentibus valvas in carina ciliatas aequantibus* superantibusve, in medio spicae ternis, foliis denique convolutis rigidis. ♃. In arenosis maritimis inque campis arenosis hinc inde, (an der Küste der Nord- und Ostsee; stw. auf Sandfeldern bei Berlin, in Böhmen, der Lausitz, in Sachsen, d. Rheinpfalz.) Jul. Aug. D. fl. 1. 718. Schreb. gram. 2. t. 40. G.

2. **E. europaeus** (L. mant. p. 35.) spica erecta, *spiculis* bifloris vel 1 floris cum rudimento secundi floris, ternis in medio spicae, valvis rectis linearibus subulatis aristatis, *palea inferiore scabra aristata, arista paleam bis excedente,* foliis planis glabris, vaginis pilosis. ♃. In sylvis montanis et subalpinis, (stw. dch. d. Geb.) Jun. Jul. D. fl. 1. 719. Host. gr. 1. t. 28. Triticum sylvaticum Salisb. pr. 27. Cuviera europaea Koel. gr. 328. Hordeum cylindricum Murr. prodr. fl. goett. 43. H. sylvaticum Huds. angl. ed. 2. p. 57. Vill. delph. 2. 175. H. europaeum All. ped. 2. 60. H. montanum Schrank. baier. fl. 1. p. 386.

3. **E. crinitus** (Schreber. gram. t. 24. f. 1.) spica erecta, spiculis geminis unifloris cum rudimento secundi floris, valvis rectis lineari-subulatis aristatis, *palea inferiore scabra aristata, arista paleam multo superante,* foliis planis supra villosis, vaginis glabris. ⊙. In arvis et ruderatis, (auf der neuen Aufschüttung bei Triest in Menge, Tommasini.) Mai. Jun. E. intermedius M. Bieberst. fl. taur. cauc. v. 1. p. 82. Hordeum crinitum Desfontaines atl. v. 1. p. 113.

61. HÓRDEUM (L. gen. n. 98.) Spiculae 1 florae vel 1 florae cum rudimento floris secundi aristaeformi; caetera ut Elymi. Flores laterales plerumque masculi. N. ab E. gen. 13. 13.

Sect. I. Hordea sativa. Flores omnes hermaphroditi, vel laterales masculi, masculi semper mutici. Fere omnes species ad cerealia culta pertinent.

1. **H. vulgare** (L. sp. 125.) *spiculis* omnibus hermaphroditis, fructiferis *sexfariam dispositis, seriebus binis utrinque prominentioribus.* ⊙ et ⊙. Colitur. Mai. Jun. D. fl. 1. 720. Metzger. europ. cereal. t. 9. Variat spica nigra et seminibus liberis, paleis non adnatis; ad posteriorem pertinet H. vulgare β. coeleste L. sp. 125. Colit.

2. **H. hexastichon** (L. sp. 125.) *spiculis* omnibus hermaphroditis *ovatis aequaliter sexfariam dispositis.* ⊙. Colitur. Mai. Jun. D. fl. 1. 720. Metzger. europ. cereal. t. 10. Colit.

3. **H. distichum** (L. sp. 125.) *spicula intermedia* hermaphrodita *ovata* aristata, *arista erecta, lateralibus* masculis *linearibus* muticis, aristis valvarum spiculam aequantibus, radice fibrosa. ⊙. Colitur. Jun. Jul. D. fl. 1. 721. Metzger. europ. cereal. t. 11. Colit.

4. **H. zeocriton** (L. sp. 125.) *spicula intermedia* hermaphrodita *ovata* aristata; *lateralibus* masculis *linearibus* muticis, *aristis* spicularum intermediarum *flabelliformi-patentibus.* ⊙. Colitur. Jun. Jul. D. fl. 1. p. 721. Metzger. europ. cereal. t. 11. Colit.

5. **H. strictum** (Desfont. atl. v. 1. p. 113.) *spiculis lanceolatis*, intermedia hermaphrodita aristata, arista erecta, *lateralibus* masculis *muticis*, aristis valvarum spiculas superantibus, culmo supra basin bulboso-tumido. ♃. In graminosis, (Istrien, Biasoletto, bei Preussisch-Oldendorf in Westphalen, Göring.) Mai. Jun. H. bulbosum L. sp. 125.? Linnaeus flosculos omnes fertiles dicit. H. bulbosum Bertolon. fl. ital. v. 1. p. 777. H. nodosum Sav. cent. 2. p. 37. G.

Sect. II. Hordea murina. Flores laterales masculi vel neutri; omnes aristati.

6. **H. murinum** (L. sp. 126.) *spiculis omnibus aristatis, valvis spiculae intermediae lineari-lanceolatis ciliatis*, spicularum lateralium exteriore setacea scabra, interiore lineari-setacea basin versus uno latere ciliata. ☉. Ad vias, muros, in ruderatis. Jul. Aug. D. fl. 1. 722.

7. **H. pseudo-murinum** (Dr. Tappeiner in litt.) *spiculis omnibus aristatis, valvis spiculae intermediae et lateralium interiori lineari-lanceolatis utrinque ciliatis*, lateralium exteriori lineari-setacea basin versus uno latere ciliata. ☉. Ad vias in Tyroli australi, (bei Schlanders im Vintschgau, Dr. Tappeiner.) Jul. Aug. Simillimum H. murino, sed valvis latioribus et spicularum lateralium inferiori utrinque ciliata statim dignoscenda. Num fortassis varietas omnino memorabilis sit, observationes ulteriores docebunt.

8. **H. secalinum** (Schreb. spicileg. p. 148. 1771.) *spiculis omnibus aristatis, valvis* spicularum omnium setaceis scabris. ♃. In pratis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Jun. Jul. H. pratense Huds. fl. angl. ed. 2. p. 56. 1778. H. nodosum MBieb. fl. taur. cauc. v. 1. 212. D. fl. 1. p. 7. 22. Koch. syn. ed. 1. p. 837. ex auctoritate Biebersteinii sic denominatum, sed perperam, nam Linnaeana planta flosculos laterales involucellaque mutica habet, conf. sp. pl. p. 126. Verum H. murinum *β*. L. sp. l. c. secund. syn. Scheuchzeri ad H. secalinum pertinet. Vaill. par. t. 17. f. 6. Planta perennis est, ut cultura docet. Vaginae foliorum radicalium inflatae ad basin culmi bulbum aemulant, culmus ipse rarius bulboso tumescit. — Variat:

β. marinum, spiculae laterales pilis aliquot obsitae. H. maritimum Roth. tent. v. 2. p. 1. p. 150.

9. **H. maritimum** (Withering. arr. 172.) *spiculis omnibus aristatis*, valvis spicularum omnium scabris, *interioribus spicularum lateralium subulato-semilanceolatis caeteris setaceis*. ☉. In pascuis et locis arenosis maritimis, (an d. Nordsee in Holstein und am Adriatischen Meere.) Mai. Jun. D. fl. 1. 723. H. geniculatum Allion. ped. 2. 259. t. 91. f. 3. H. rigidum Roth. catal. 1. 24. G.

62. LÓLIUM (L. gen. n. 95.) Spiculae solitariae, in racheos excisuris sessiles, rachi contrariae. Gluma 1 valvis, tri-multiflora, saepe spiculam dimidiam, etiam integram aequans, in spicula terminali 2 valvis. Palea inferior mutica vel sub apice aristata. — Species nonnullae in spiculis lateralibus valva superiore minima bifida vel in duas singulas partita instructae sunt. — N. ab E. gen. 14. 18.

Sect. I. Radix culmos florentes et fasciculos foliorum steriles agens, perennis. Flores lanceolati, paleis membranaceis, superiore lanceolata, ab inferiore tecta.

1. **L. perenne** (L. sp. 122.) spiculis valva longioribus, floribus lanceolatis, *radice culmos florentes fasciculosque foliorum steriles agente, foliis novellis simpliciter complicatis*. ♃. In pratis, pascuis, ad vias. Jun. in autumnum. D. fl. 1. 714. Leers herb. t. 12. f. 1. Flores mutici vel breviter mucronati. Variat spiculis 7-9 floris et 3-4 floris, spica composita, ramosa et vivipara. Ad varietatem spiculis 3-4 floris, sec. b. Smith. pertinet L. tenue L. sp. 122.

2. **L. italicum** (Alex. Braun. regensb. bot. Ztg. 17. p. 241.) spiculis valva longioribus, floribus lanceolatis, *radice culmos florentes fasciculosque foliorum steriles agente, foliis novellis convolutis*. ♃. In pratis et locis gra-

minosis, (zerstreut dch. d. Geb., jetzt aber an vielen Orten gefunden und hin und wieder angesäet, an den meisten Orten aber sicherlich wild, nur bisher mit dem vorherg. verwechselt.) Jun. in autumn. L. Boucheanum Kunth. en. 1. p. 436. L. multiflorum Poiret in Lam. dict. v. 8. p. 828. DC. fl. fr. 3. p. 90. et varietas mutica fl. fr. 5. p. 286. — Occurrit spiculis aristatis et rarius muticis, quae ultima varietas foliis novellis convolutis, nota a cl. Alex. Braun. detecta, statim a Lolio perenni distinguitur.

Sect. II. Radix non nisi culmos florentes agens, biennis vel in Lolio rigido fortasse annua. Flores lanceolati paleis membranaceis, superiore lanceolata.

3. **L. multiflorum** (Gaud. fl. helv. 1. p. 354. et hortorum botanicorum.) *valva spicula triplo breviore, spiculis* superne attenuatis acutis 12-20 *floris, floribus lanceolatis* arcte imbricatis, superioribus aristatis, *radice fasciculis foliorum sterilibus destituta.* ⊙. In agris Helvetiae australioris. Jun. Jul. Gaud. fl. helv. 1. 354. Reichenbach. ic. 11. f. 1345. specimen fructif. Icon Vaillantiana t. 17. f. 3. habitum huius speciei etiam non male exprimit, ut Gaudin. optime monet. Hucusque non nisi cultum vidi. H.

4. **L. rigidum** (Gaud. fl. helv. 1. 355.) *valva spiculam dimidiam superante* vel eam subaequante, spiculis 5-10 floris obtusis, *floribus lanceolatis* muticis, *radice fasciculis foliorum sterilibus destituta.* ⊙. In pratis siccis et ad vias, (Triest, Fiume; eigentlich nicht in d. Schweiz, sondern im Aostathale in Piemont von Gaudin gefunden.) Jun. Jul. Sub nomine L. stricti Presl., cyp. et gram. sicul. p. 49., e Sicilia misit b. Decker.

Sect. III. Radix non nisi culmos floriferos agens, annua. Flores caryopsi maturescente elliptici. Palea inferior infra medium fere cartilaginea, conspicue angustior, quam superior, quae maturitate fructus in latere utroque prominet.

5. **L. linicola** (Sonder. in litt.) *valva spiculam dimidiam superante* vel vix aequante, spiculis oblongis ovatisve, *floribus* breviter aristatis muticisve *fructiferis ellipticis*, radice fasciculis foliorum sterilibus destituta. ⊙. In agris inter Linum. Jun. Jul. L. arvense Schrad. germ. p. 399. D. fl. 1. 715. et plurimorum auctorum. Reichenb. ic. 11. f. 1337-39. L. remotum Hoffm. D. fl. ed. 2. 1. p. 63. Variat:

β. complanatum, spiculis latioribus floribus fructu maturo magis patentibus: Lolium complanatum Schrader, Reichenb. ic. 11. f. 1341. — Lolium arvense With., ut egregie observavit Dn. Sonder, ad varietatem *β.* et *γ.* Lolii temulenti pertinet.

6. **L. temulentum** (L. sp. 122.) *valva longitudine spiculae vel saepius longiore*, spiculis oblongis, *fructiferis ellipticis*, floribus longius breviusve aristatis, radice fasciculis foliorum sterilibus destituta. ⊙. Inter segetes Jun. Jul. D. fl. 1. 717. Leers. t. 12. f. 2. Craepalia temulenta Schrank. baier. fl. 1. 382. Vaginae scabrae sicut culmus, aristae validae rectae vel paulum flexuosae, flore longiores. Variat autem aristis brevibus et brevissimis valde flexuosis, quae formae se habent ad speciem primariam aeque atque Bromus secalinus vulgaris breviaristatus ad Bromum secalinum longearistatum. Praeterea haec varietas occurrit:

β. speciosum, vaginis culmoque laevibus: L. speciosum Steven. in MBieb. fl. taur. cauc. 1. p. 80. L. speciosum var. culmo glabro Koch. syn. ed. 1. p. 828. L. temulentum *β.* arvense Babingt. man. p. 377. L. arvense With. arrang. 168. secundum descriptionem, locum natalem et specimina anglica. L. arvense Sm. engl. fl. v. 1. p. 175., qui jam suspicatus est, nil nisi varietatem Lolii temulenti exhibere.

γ. robustum, varietati *β.* simillimum, neque differt nisi culmo vaginisque scabris: L. robustum Reichenb. ic. 11. f. 1340. L. speciosum scabrum Koch. syn. ed. 1. p. 828.

63. ÄEGILOPS (L. gen. n. 1150.) Spiculae solitariae, in racheos excisuris sessiles, rachi parallelae. Gluma bivalvis, 3-4 flora; valvae dorso rotundato-convexae, ecarinatae, apice 2-4 dentatae, dentibus lanceolato-subu-

latis, aristatis muticisve. Glumella 2 paleacea, palea inferiore apice 1-4 aristata. N. ab E. gen. 13. 18.

1. **A. ovata** (L. sp. 1489.) *spica ovata,* e spiculis 3-4 composita, valvis hirtis, omnibus plerumque 4 aristatis, *aristis* spicularum omnium *subaequalibus a basi margine scabris*, palea inferiore 2-3 aristata, aristis patulis palea multo longioribus. ⊙. In vineis aliisque locis cultis, (im Littorale bei Triest, in Istrien, bei Fiume.) Mai. D. fl. 1. 711. St. h. 86. Reichenb. ic. 11. f. 1353. A. geniculata Roth. catal. 1. 121. Phleum Aegilops Scop. carn. 1. p. 55. G.

2. **A. triaristata** (Willd. sp. 4. 943.) *spica ovata superne attenuata* ex spiculis 4-5 composita, valvis hispidis, omnibus 2-3 aristatis, *aristis* omnium *subaequalibus basi margine glabris*, palea inferiore 2-3 aristata, aristis erectis palea multo-longioribus. ⊙. Cum antecedente. Mai. D. fl. 1. 711. Rchb. ic. 11. f. 1354. A. neglecta Requien. apud Bertolon. fl. ital. 1. 787. A. ovata Roth. in Uster. annal. 4. p. 41. Spiculae maiores, quam in antecedente, aristae longiores. Ad plantam nostram Aegilops ovata Roth. certissime pertinet; ab ipso auctore possideo, neque dubito, quin Willdenowius eandem plantam coram habuerit. G.

3. **A. triuncialis** (L. sp. 4. 943.) *spica lineari-elongata* e spiculis 5-6 composita, valvis omnibus triaristatis vel spicularum infimarum biaristatis, *aristis spicularum superiorum duplo longioribus*, palea inferiore tridentata, dentibus acutis aristatisve, *aristis palea brevioribus.* ⊙. In locis cultis et ad vias, (im östr. Littorale, bei Triest, Fiume u. auf d. Inseln.) Mai. Jun. D. fl. 1. 713. St. h. 86. Reichenb. ic. 11. f. 1365. Variat rachi villosa et glabra, ad posteriorem pertinet: A. triaristata Requien. apud Bertolon. fl. ital. 1. 789. A. echinata Presl. cyp. et gram. sicul. p. 47. G.

Aegilops caudata L. (A. cylindrica Host. et Gaud.) in Pedemontio, non vero in Helvetia crescit.

64. LEPTÚRUS (R. Brown. prodr. fl. nov. holland.) Spiculae solitariae 1 florae, aut 1 florae cum rudimento pedicellato vel pedicelliformi secundi floris, excavationibus spicae articulatae inmersae. Gluma 1-2 valvis, cartilaginea, florem tegens. Glumella membranacea. Styli breves, stigmata plumosa. Monerma et Ophiurus N. ab E. gen. 10. n. 16. et 17.

1. **L. incurvatus** (Trin. fund. agrost. 123.) spica tereti arefactione incurvata, *gluma bivalvi flore tertia parte longiore.* ⊙. In arenosis ad littus maris adriatici, (Triest u. a. d. Insel Veglia.) D. fl. 1. 723. Rottboellia incurvata L. fil. suppl. 114. Aegilops incurvata L. sp. 1490. Ophiurus incurvatus Beauv. agr. 116. Agrostis incurvata Scop. carn. 1. 62. G.

2. **L. filiformis** (Trin. fund. agr. 123.) spica tereti paulum compressa erecta vel subcurvata, *gluma bivalvi florem aequante vel vix paulo longiore.* ⊙. In arenosis maritimis, (Istrien, bei Varel in Oldenburg, an der Ostsee in Holstein.) Mai. Rottboellia filiformis Roth. catal. 1. 21. R. erecta Savi bot. etr. 1. 26. R. incurvata Nolt. nov. fl. hols. p. 14., secundum Dom. Sonder. Ophiurus filiformis Roem. et Schult. s. v. 2. 797. G.

3. **L. cylindricus** (Trin. fund. agr. 123.) spica tereti erecta, *gluma univalvi.* ⊙. In arenosis maritimis, (an d. Salzwerken bei Triest.) Mai. Rottboellia cylindrica Willd. sp. 1. 464. R. subulata Sav. bot. etr. 1. 27. Monerma subulata Beauv. agr. 117. G.

65. PSILÚRUS (Trinius fund. agrost. 1. 73.) Spiculae solitariae, rarius geminae, biflorae, excavationibus spicae articulatae inmersae. Flos inferior tuberculo insidens; superior pedicellatus, plerumque abortiens. Gluma 1 valvis, flore multo brevior. Glumella bipaleacea, palea inferior aristata. Styli brevissimi, stigmata plumosa. N. ab E. gen. 10. 14.

1. **P. nardoides** (Trin. fund. l. c.) ⊙. In locis siccis sterilibus, (Triest, Istrien, Fiume.) Mai. Jun. D. fl. 1. 283. Nardus aristata L. sp. 78. Rott-

boellia monandra Cav. ic. 1. 27. t. 39. f. 1. Monerma monandra Beauv. agr. 117. Asprella nardiformis Host. gr. 4. t. 29. G.

Trib. XV. *NARDOIDEAE. Spiculae in excavationibus racheos spicae sessiles. Stigmata* filiformia, pubescentia, *ex apice floris emergentia.* N. ab E. gen. 10. 15.

66. NARDUS (L. gen. n. 69.) Spiculae solitariae, excavationibus racheos immersae, 1 florae. Gluma nulla. Glumella bipaleacea, palea inferiore subcoriacea, subulata, trigona, superiorem membranaceam includens. Styl. 1. Stigma simplex, filiforme, elongatum, ex apice floris emergens.

1. **N. stricta** (L. sp. 77.) 4. In pascuis uliginosis turfosis, in alpes adscendens. Mai. Jun. D. fl. 1. 460. Schreb. gram. t. 7.

Class. III. ENDOGENEAE CRYPTOGAMAE seu ACOTYLEDONEAE VASCULARES.

Truncus e tela cellulosa regulari fasciculisque vasorum vario modo dispositis formatus. Stamina nulla, sexus masculus femineusque passim in sporis minutis majoribusque obscure indicatus. Sporae sporodermide obductae; embryo nullus. — Massa sporarum, in corpus foliaceum vel coralloideum, in proembryonem, plerumque enascens, plantam novellam producit, quo facto corpus istud moritur. Paucae caeterum species, quod germinationem attinet, exceptis Filicibus, hucusque observatae fuerunt.

Ord. CXXXII. EQUISETACEAE. DeCandoll. fl. franc. 2. p. 580.

Fructificatio: amentum terminale, e squamis verticillatis compositum. Squamae peltatae, angulatae, stipitatae, in pagina inferiore sporangia 4-7, in orbem disposita gerentes. Sporangia membranacea, oblonga, latere interiore longitudinaliter fissa. Sporae numerosissimae, globosae, apiculatae, filis 2 fultae; fila utrinque in apicem spathulatum desinentia, in crucem disposita, circa sporam spiraliter convoluta, siccitate elastice resilientia. Rhizoma subterraneum, articulatum, repens. Caulis simplex vel ramosus, ad articulos vagina dentata, e foliis diminutis connatis orta, instructus; rami ramulique verticillati.

1. EQUISETUM (L. gen. n. 1169.) Character generis et ordinis idem.

Sect. I. Equiseta vernalia Alex. Braun. Caules biformes, fructiferi praecoces, decolores, simplicissimi, teneri, sporis dispersis cito marcescentes et evanescentes; seriores steriles, duriores, ramos virides agentes, aestatem perdurantes. Spicae obtusae.

1. **E. arvense** (L. sp. 1516.) *caulibus fructiferis praecocibus simplicissimis, vaginis* turbinato-tubulosis superne scariosis *in dentes* 8-*lanceolatos* acutos passim cohaerentes *fissis,* sterilibus serioribus verticillato-ramosis, ramis quadrangularibus simplicibus ramulosisve, vaginis ipsorum quadridentatis, spica obtusa. 4. In pratis vilioribus, aggeribus, pascuis inque agris

limosis subhumidis. April. Mai.; caules fructiferi serius prodeunt. Schk. t. 167. Occurrit 1. sub *forma serotina,* quae caulem habet ramosum simulque spica fructifera terminatum; genicula ipsius ramis obsita sunt, exceptis 2-3 superioribus, quae nuda sunt: E. arvense *a* serotinum Meyer. chlor. Hannov. p. 666. E. campestre Schultz. fl. stargard. suppl. p. 59. Non absimile Equiseto palustri, sed scabritie evidentiori, vaginis ramulorum quadridentatis, dentibus concoloribus anguste albo-marginatis apice patulis, statim dignoscendum. Specimen originale, a b. Schultzio mecum communicatum, possideo. Perrarum provenire videtur. 2. Forma decumbens *caule sterili decumbente,* praeterea plantae vulgari simili: E. arvense *c.* decumbens Meyer. chloris Hannov. p. 667.

β. alpestre, caule sterili decumbente, a primo verticillo 3-4 uncias tantum longo, verticillis valde approximatis: E. arvense *β.* alpestre Wahlenberg. fl. lapp. p. 296. „ad latera alpium inferiora saepius frequentat, habitu longe alieno notabile" Wahlenb. l. c. Hoc in monte Rittnerberg in Tyroli australi, (unweit Botzen,) altitudine 4500′ in pratis subalpinis copiose observavit B. d. Hausmann.

γ. nemorosum, E. arvense *c.* nemorosum Alex. Braun. ap. Doell. rhein. fl. p. 27., caulibus erectis altioribus, bipedalibus, inferne longe nudis, ramis longissimis horizontalibus vel recurvato-patentibus, non vel parce ramulosis: E. arvense *β.* Schultz. fl. stargard. suppl. p. 58. E. pratense Roth. tent. 3. p. 6., non Ehrh. Hoc in sylvis humidis; in alpes adscendit.

2. **E. Telmalteja** (Ehrh. Beitr. 2. p. 159.) *caulibus fructiferis praecocibus simplicissimis, vaginis* turbinato-tubulosis superne scariosis 20-30 *dentatis, dentibus subulato-setaceis,* caulibus sterilibus serioribus verticillato-ramosis, ramis simplicibus, vaginis ipsorum 4-5 dentatis, spica obtusa. ♃. In nemorosis et sylvaticis humidis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Aprili; Maio caules fertiles prodeunt. E. eburneum Roth. catal. bot. 1. p. 128. E. fluviatile Smith. brit. 3. p. 1104., non Linn., Fl. dan. t. 1461. Caulis fertilis saepe ultra pedalis digitumque crassus albo-rubellus, vaginae albae, dentibus rubicundis dein fuscescentibus, caules steriles bi-tripedales, albi, nitidi, rami elongati, tenues, saturate virides.

Sect. II. Equiseta subvernalia Alex. Braun l. c. Caules fructiferi coëtanei, albidi vel rubelli, fructescentiae tempore simplicissimi vel rudimentis ramorum brevibus instructi. Spica in pedunculo tenero nudo terminalis, sporis dispersis cum pedunculo cito marcescens, dum rami elongantur et cum caule, sicut caules steriles, aestatem perdurant.

3. **E. sylvaticum** (L. sp. 1516.) *caulibus fructiferis* coëtaneis *denudatis denique spica emarcida ramosis, ramis* caulium fructiferorum steriliumque dense verticillatis elongatis *apice arcuato-nutantibus* tetragonis *verticillato-ramulosis,* ramulis triquetris, vaginis caulinis turbinato-tubulosis scariosis superne lobato-fissis dentatisve, ramulorum tridentatis, dentibus subulatis. ♃. In sylvis umbrosis humidis et pratis sylvaticis udis. April. Mai. Schk. t. 166.

4. **E. umbrosum** (Meyer. ap. Willd. sp. pl. 5. p. 3.) *caulibus fructiferis* coëtaneis *denudatis denique spica emarcida ramosis, ramis* caulium fructiferorum steriliumque dense verticillatis elongatis *arcuato-nutantibus simplicibus* triquetris, vaginis caulinis turbinato-tubulosis 10-15 dentatis, dentibus scariosis acutis, ramorum tridentatis, dentibus ovatis acutis. ♃. In sylvis, nemoribus et pratis sylvaticis inque agris humidis, (Mecklenburg, Neubrandenburg, Stargard, Schultz; Unterharz, Hampe, Meyer; Osnabrück, Meyer; Bergschluchten des Habichtswaldes bei Cassel, Pfeiffer; Berlin, Schlechtend.; Sachsen sehr selten, Reichenb.; Nahethal bei Duchroth, nach Bogenhard; Salzburg u. Heiligenblut sehr gemein, Hoppe; Tyrol bei Innsbruck, Heuffler; Zermatten in Wallis, Mühlenbeck.) Mai. Jun. E. Ehrharti Meyer. chlor. Hannov. p. 666. E. pratense Ehrh. Beitr. 3. p. 77., non Roth. Hoffm. phyt. Blätt. p. 117. t. 2. E. sylvaticum *β.* minus Wahlenb. suec. p. 689. E. amphibolium Retz. fl. scand. suppl. 2. p. 12. E. Drummondii Hook. Babingt. man. p. 380. sec. Alex. Braun. in litt.; specimen scoticum nondum vidi. Antecedente triplo minus. Caules fructiferi

eleganter variegati, vaginae albido-virides, nitentes, dentibus pallide fuscis dorso stria nigricante notatis dein nigricantibus, Schultz. fl. starg. suppl. p. 59.

Sect. III. Equiseta aestivalia Alex. Braun. Caules fructiferi sterilesque conformes, virides, et fructificationis tempore perfecte evoluti, aestatem perdurantes, sed hyeme proxima emorientes. Spica obtusa.

5. **E. palustre** (L. sp. 1516.) *caulibus fructiferis sterilibusque conformibus profunde 6-8 sulcatis*, vaginis subturbinatis 6-8 dentatis, *dentibus* lanceolatis *margine lato albo-membranaceo cinctis*, ramis simplicibus profunde 5-6 sulcatis, vaginulis 5-6 dentatis, *spica obtusa*. 4. In pratis humidis, ad fossas. Aestate Schk. t. 160. Bischoff. crypt. h. 1. t. 3. Occurrit spica unica terminali et polystachyum ramis spiciferis; porro tenuius, caulibus simplicissimis, ramis destitutis: E. prostratum Hoppe.

6. **E. limosum** (L. sp. 1517.) *caulibus fructiferis sterilibusque conformibus* simplicissimis ramosisve *leviter* 10-20 *striatis exsiccatis profunde striatis, vaginis* cylindricis arctis apice paulo latioribus 10-20 *dentatis, dentibus* lanceolato-subulatis *angustissime membranaceo-marginatis*, ramis simplicibus 5-6 angulatis, vaginulis 5-8 dentatis, *spica obtusa*. 4. In paludibus, fossis, piscinis, aquis lente fluentibus. Aestate. Schk. t. 171. Occurrit 1. simplicissimum, monostachyum, ramis destitutum, et superne verticillato-ramosum, ramis brevibus adscendentibus; 2. polystachyum, ramis verticillorum supremorum spiciferis caulem superantibus, spica primaria plerumque abortiente; 3. sterile, ramis elongatis gracilibus saepe arcuato-dependentibus. Porro: dentibus vaginarum a medio apicem versus nigris, vaginularum viridibus vel in apice ipso tantum fuscescentibus: E. limosum Wahlenb. fl. suec. p. 689. et sec. Wahlenb. Linn. suec. p. 368.; atque dentibus totis cum margine vaginarum nigris, vaginularum a medio nigricantibus: E. fluviatile Wahlenb. fl. suec. p. 690. et sec. Wahlenb. Linn. suec. l. c.; sed hoc cum E. limoso Wahlenb. formis intermediis apud nos ubique confluit. — „E. uliginosum Mühlenberg ap. Willd. spec. pl. 5. p. 4. est forma minor Equiseti limosi prata turfosa Germaniae inhabitans, secund. spec. original. herbar. Willd.“ Alex. Braun in litt.

Sect. IV. Equiseta hyemalia Alex. Braun. Caules fructiferi sterilesque conformes, hyemem perdurantes, sempervirentes. Spica acuminato-mucronata. Omnia magis minusve scabra.

7. **E. ramosum** (Schleicher. cat. plant. helv. 1807. p. 27.) caulibus fructiferis sterilibusque conformibus 8-15 costatis, costis linea dorsali impressa destitutis, ramis solitariis vel 2-9 verticillatis, *vaginis convexo-costatis, ramorum turbinatis* internodium laxe ambientibus 6-8 dentatis, *dentibus* medio *convexis lineaque impressa exaratis* vel obsolete quadristriatis *acumine imposito lanceolato-subulato membranaceo terminatis*, spica acuminato-mucronata. 4. In arenosis humidis et siccis, (auf der Fläche des Rheines stellenweise von Strasburg auf beiden Ufern bis Mainz u. Ingelheim; Wetterau zw. Offenbach u. Biber; südl. u. westl. Schweiz; Tyrol, Innsbruck, zw. Botzen u. Meran; Littorale bei Triest.) Aestate. E. ramosum DeC. fl. fr. suppl. p. 245. E. elongatum Willd. sp. 5. p. 8. E. pannonicum Willd. sp. 5. p. 6. fide speciminis herbarii Willd. (Alex. Braun.) E. illyricum Hoppe secund. auctorem. E. ramosissimum Desf. atl. 2. p. 398., non Humb. et Bonpl. E. procerum Pollin. sec. Alex. Braun. regensb. bot. Ztg. 22. p. 308. E. hyemale C. elongatum Doell. rhein. fl. p. 31. Glaucum, rami graciles, plerumque valde elongati; specimina minora saepe in basi ramosissima, ramis elongatis, caules caespitosos simplices aemulantia. Vaginae concolores, nec nisi apice in dentibus vel potius in dentium basi nigricantes, margine tamen semper albido membranaceo cinctae. Saepe punctulum fuscum in dentibus solummodo adest, et rarissime fascia nigricans sub dentibus vaginae apicem ambit. Vaginulis ramorum superne evidenter amplioribus, turbinatis, ab affinibus mihi satis differre videtur.

8. **E. hyemale** (L. sp. 1517.) caulibus fructiferis sterilibusque conformi-

bus simplicibus vel basi subramosis 14-20 costatis, *costis vaginarum planiusculis, vaginis cylindricis arctis,* dentibus subpatulis rotundatis obtusis cum costarum apice subaequaliter quadristriatis, *acumine imposito lanceolato-subulato membranaceo cito crispato evanidoque* terminatis, spica acuminato-mucronata. 4. In sylvis umbrosis humidis, in asperis uliginosis, (zehr zerstreut dch. d. Geb.; in der Schweiz u. in Tyrol bis in die Alpen hinaufsteigend.) Aestate. Schk. t. 171. E. hyemale A. vulgare Doell. rhein. fl. p. 30. Caulis, si in medio defringitur vel descinditur, ramos agit 2-3 verticillatos, simplices, tenues, spica terminatos. Vaginae semper basi fascia nigra praeditae, passim etiam basi apiceque nigro-fasciatae occurrunt, quandoque etiam infimae totae atro colore tinctae sunt.

9. **E. trachyodon** (Alex. Braun reg. bot. Ztg. 22. p. 308.) caulibus fructiferis sterilibusque conformibus simplicibus solitariis vel caespitosis 7-11 costatis, *costis vaginarum planiusculis, vaginis internodium laxiuscule ambientibus, dentibus* ovatis obtusis cum costarum apice subaequaliter quadristriatis, *acumine imposito lanceolato-subulato membranaceo persistente terminatis,* spica acuminato-mucronata. 4. In locis arenosis humidis, (auf der Rheinfläche bei Dachslanden im Bad.; zw. Speier und der Rheinschanze bei Mannheim, hier häufig, Doell.) Aestate. Sequente triplo crassius, pars membranacea, dentibus vaginarum imposita, subulata ex ovato-lanceolata basi, in dorso et margine muriculato-scabra, albida, linea dorsali fusca, in apicem excurrente. — An h. l. E. Mackaii Newman ap. Babingt. man. p. 381.? Occurrit vaginis inferioribus et intermediis apice fascia lata atra cinctis, et vaginis basi apiceque fascia, sed angustiore, notatis: E. palleaceum Schleich. cat. pl. helv.

10. **E. variegatum** (Schleich. cat. pl. helv. 1807. p. 27.) caulibus fructiferis sterilibusque conformibus caespitosis simplicibus 6-8 costatis, *costis vaginarum convexis, linea dorsali impressa notatis,* vaginis superne amplioribus internodium laxe ambientibus *in dentes* 6-8 *sensim transeuntibus apice dentibusque subaequaliter quadristriatis, dentibus planis scariosis albomembranaceis,* stria media nigricante praeditis cuspidatis, dejecta *cuspide decidua,* ovatis. 4. (Zerstreut im Geb.; in der Schweiz u. auf d. Rheinfläche bis Worms; bei München; Salzburg; Heiligenblut; in Steyermark, am Harze und wohl noch anderwärts.) Aestate. E. tenue Hoppe. E. reptans β. variegatum Wahlb. fl. lapp. p. 298. — A nostra planta luculenter differt Equisetum scirpoides Mich. fl. bor. amer. p. 281., (E. reptans var. α. Wahlenb. fl. lappl. p. 298., cui cl. auctor plantam nostram tanquam varietatem β. adnumerat,) caulibus humilioribus, dimidio tenuioribus sexangularibus cum vaginis tantum tridentatis, quarum dentes persistunt. Caules Equiseti scirpoidis re vera tricostati sunt, sed linea impressa costarum dorsalis ita excavata est, ut strias inter costas sitas aequet.

Ord. CXXXIII. MARSILEACEAE. Rob. Brown. prodr. 166.

Sporangia dimorpha, sporocarpiis, (involucris seu receptaculis,) inclusa. Sporocarpia globosa vel oblonga, nucibus capsulisve aemula, basi foliorum petiolorumve vel intra fibras radicales inserta. Herbae aquaticae.

Trib. I. *MARSILEAE.* Marsileaceae Bartling. ord. nat. p. 15. Sporocarpia coriacea, basi foliorum petiolorumve inserta. Rhizoma filiforme sub aqua prostratum et radicans. Folia vernatione circinalia.

1. PILULARIA (L. gen. n. 1183.) Sporocarpia ad foliorum basin solitaria, brevissime pedunculata, globosa, coriacea, quadrilocularia, maturitate apice in 4 lobos dehiscentia. Sporangia lineae elevatae intervalvulari longitudinali inserta, inferiora in loculo sporam unicam majorem ovalem medio constrictam, superiora sporulas copiosas minutissimas continentia.

1. **P. globulifera** (L. sp. 1563.) folia juncea, setacea, lamina destituta, sporocarpia pisi magnitudine. 4. In aquis quietis et stagnantibus, in fossis, paludibus et ad margines piscinarum lacuumque; aqua aestate diminuta in humidis quoque viget, (vom Oberelsass durch die Rheinfläche zerstreut bis Hanau u. weiter hinab bis Westphalen u. von da deh. d. nördl. Deutschl.; in der Lausitz; Dechsendorfer Weiher bei Erlangen.) Aug. Sept. Bischoff. krypt. Gew. tab. 7. 8. St. II. h. 1.

2. MARSILEA (L. gen. n. 1182., excl. speciebus.) Sporocarpia ad inferiorem partem petiolorum pedicellata, solitaria, vel 2-3 in pedicello bitrifido, subsessilia, subglobosa vel ovalia, coriacea, bilocularia, transverse multilocellata, maturitate in lobos 2 dehiscentia. Sporangia lineis parietalibus elevatis, in locellis transversalibus, inserta, majora minoraque mixta; majora spora unica ovali-oblonga non constricta praedita, minora sporulis copiosis minutissimis referta.

1. **M. quadrifolia** (L. sp. 1563.) foliolis obovato-cuneatis integerrimis glabris, sporocarpiis pedicellatis. 4. In aquis quietis et stagnantibus, fossis, (sehr zerstreut auf der Rheinfläche deh. d. Elsass bis Germersheim hinab, und durch Baden bis gegen Mannheim; zw. Rosenheim u. Kloster Roth in Oberbayern; Salzburg, Kärnthen, Krain, Steyerm.) Jul.-Sept. Folia quaternata, foliolis natantibus. Bischoff. crypt. Gew. tab. 7. 8. St. II. h. 1.

Trib. II. *SALVINIACEAE.* Bartl. ord. nat. p. 15. Sporocarpia membranacea, intra fibras radicales inserta, vel caulis ramorumve basi adnata et deorsum spectantia. Plantae libere in aqua natantes. Folia disticha, vernatione a latere involuta.

3. SALVINIA (Michel. gen. 107. t. 58.) Sporangia globosa, (in specie nostrae florae indigena,) intra fibras radicales ramo brevi deorsum spectanti inserta, 4-8 glomerata, membranacea, non dehiscentia, unilocularia, in basi loculi carpophoro, in stipites sporangia sustinentes fisso, praedita. Sporangia monospora, in sporocarpiis exterioribus globosa, in uno alterove interiorum ovalia; spora sporangio conformis.

1. **S. natans** (Hoffm. Deutschl. fl. v. 2. p. 1.) foliis ellipticis obtusis supra stellato hispidulis, sporocarpiis glomeratis. 4. In aquis quietis natans, (sehr zerstreut deh. d. Geb., südl. Tyrol; Istrien; Schles.; bei Berlin; bei Barby; Lübeck; in Baden bis Mannheim hinab; Unterelsass; Rheinpfalz bei Germersheim.) Jun. Aug. Bischoff. krypt. Gew. t. 9. St. II. h. 1. Marsilea natans L. sp. 1562.

Trib. III. *ISOËTEAE.* Bartling. ord. nat. p. 16. Sporocarpia membranacea, in baseos foliorum superficie interiori innata. Folia etiam vernatione stricta. — Planta sub aqua degens. Rhizoma tuberiforme, discoideum, subtus fibris longis copiose obsitum, supra foliorum fasciculo dense tectum. Caulis nullus. Folia subulata, subpellucida, intus septata, inferne quadrilocularia.

4. ISOËTES (L. gen. n. 1184.) Sporocarpia ovalia vel subrotunda, basi foliorum dilatatae concavae innata, membranacea, non dehiscentia, superne membrana semilunari e folio emergente semitecta et apice squamula cordata-fulta, intus filis e dorso radiatim progredientibus et sporangia gerentibus perducta, biformia, alia externe torulosa, sporangia majora continentia, alia laevia, sporangiis minutissimis pulveraceis farcta. Sporae majores costis 3 apice conjunctis annuloque elevato notatae sunt. Sporangia e tenui membrana, arcte accumbente confecta, in statu juniore a spora tanquam membrana integra solvi possunt, in statu maturo autem in frustulis a spora sponte secedunt.

1. **I. lacustris** (L. sp. 1563.) 4. Sub aqua in fundo lacuum, (im Bistritzer See in Böhmen, eine Abänderung mit sichelförmiggebogenen Blättern im Eisensteiner See im Böhmerwalde, Tausch; auf dem Grunde des Sees

Gerardmer in den granitischen Vogesen, F. W. Schultz. fl. exsicc. n. 574.; Feldsee im Breisgau, Lang; im See unweit Trittau Fl. v. Hamburg, Sonder; sodann in sumpfigen Wiesen (?) bei dem Dorfe Süsel in Holstein nach Wiggers.) Jul.-Sept. St. II. h. 17.

Ord. CXXXIV. LYCOPODIACEAE. DeC. fl. fr. 2. p. 257.

Sporangia in axillis foliorum caulinorum sessilia, in valvas dehiscentia. — Caulis basi decumbens vel tanquam rhizoma supra vel intra terram repens, ramis caulibusve erectis. Fibrae radicales validae. Folia semper alterna, sed quandoque disticha vel tetrasticha, quae fructus fulcrant, in pluribus speciebus in bracteas diminuta, quo fructificatio spicata fit.

1. LYCOPODIUM (L. gen. n. 1185., excl. Lycopodioide et Selaginoide Dillen.) Sporangia sessilia vel brevissime stipitata, subrotunda, reniformia vel transverse ovalia, unilocularia, rima transversali dehiscentia, omnia conformia. Sporae tenuissimae, farinam simulantes, globosae, quaternatim in corpuscula 3 gona cohaerentes.

§. 1. Sporangia axillaria non spicata, folia omnia conformia, nulla in bracteas dissimiles mutata.

1. **L. Selago** (L. sp. 1565.) *caulibus erectis adscendentibusque* dense foliosis a basi dichotome ramosis ramis fastigiatis, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis subdenticulatisve coriaceis rigidis, *sporangiis axillaribus*. 4. In sylvis umbrosis montanis ad rupes et arborum radices. Jul. Aug. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 1. et 7. t. 11. f. 22-24. St. II. h. 5. Folia erecta, adpressa; passim quoque occurrit foliis patentibus reflexisve, ramisque recurvis: L. recurvum Kit. ap. Willd. sp. pl. 5. p. 50.

§. 2. Sporangia obscurius spicata, spica in ramo erecto simplicissimo, bracteae foliis conformes, basi tantum paulum dilatatae.

2. **L. inundatum** (L. sp. 1565.) *caulibus terrae adpressis radicantibus* ramisque dense foliosis, ramis erectis simplicissimis spica solitaria terminatis, foliis lineari-lanceolatis attenuato-acutis integerrimis, *bracteis conformibus*. 4. In ericetis et locis sterilibus humidis turfosis, (zerstreut durch d. Gebiet.) Jul. Aug. Bracteae basi dilatatae et denticulo uno alterove instructae. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 2. et 8. t. 11. f. 26. St. II. h. 5.

§. 3. Spicae ad ramorum apicem sessiles, solitariae; bracteae foliis dissimiles. Rami caulis erecti vel adscendentes ramosi vel ramosissimi.

3. **L. annotinum** (L. sp. 1566.) caulibus repentibus, ramis erectis adscendentibusve inferne semel pluriesve dichotome fissis, ramis simplicibus, *foliis* lineari-lanceolatis acuminatis *mucronatis antice serratis* patentibus reflexisve, *spicis* terminalibus *solitariis sessilibus*, bracteis lato-ovatis cuspidatis eroso-denticulatis. 4. In sylvis umbrosis montanis et subalpinis, (sehr zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. Caulis et rami linea impressa, e marginibus foliorum decurrente orta, notati. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 3. et 9. t. 11. f. 21. St. II. h. 5.

4. **L. alpinum** (L. sp. 1367.) caulibus repentibus ramis erectis dichotome fasciculatis, *foliis* lanceolatis, *acutis integerrimis adpressis, ramorum quadrifariis, spicis terminalibus solitariis sessilibus*, bracteis lato-ovatis acuminatis denticulatis. 4. In locis siccis elatioribus reg. subalpinarum et alpinarum usque ad nives perennes, (zerstreut durch die Alpenkette; auf den hohen Punkten der Vogesen, des Harzes u. der Sudeten.) Aug. Sept. St. II. h. 5.

§. 4. Spicae pedunculo elongato plerumque apice bi-tri-sexfido impositae. Bracteae foliis dissimiles, rami erecti, ramosi, vel ramosissimi.

5. **L. Chamaecyparissus** (Alex. Braun. ap. Doell. rhein. Flora p. 36.) caulibus repentibus, ramis erectis dichotome ramosissimis, *ramulis erectis*

compressis ancipitibus latere interiore planis fasciculatis, *fasciculis fastigiatis*, foliis ramulorum quadrifariis lanceolatis acuminato-mucronatis, lateralibus erecto-patulis inferne connatis decurrentibusque, exterioribus interioribusque adpressis et magnitudine subaequalibus, *pedunculis elongatis* 2-6 *stachyis*, bracteis lato-ovatis cuspidatis eroso-crenulatis. 4. In sylvis et ericetis, praecipue arenosis, (zerstreut in Tyrol, der Schweiz u. d. Gebirgen zu beiden Seiten des Rheines bis Westphalen; von da durch das nördliche Deutschland bis nach Preussen, der Lausitz und Schlesien.) Jul. Aug. L. complanatum Pollich. palat. 3. p. 27. et plurarum florarum germ. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 5. St. II. h. 5. Chamaecyparissus Tabernaem. Kräuterb. p. 1357. icon.

6. **L. complanatum** (Linn. sp. 1567.) caulibus repentibus, ramis adscendentibus dichotome ramosissimis, *ramulis flabellato-secedentibus* compressis ancipitibus latere interiore planis, foliis ramulorum quadrifariis, lateralibus ovatis connatis decurrentibus acuminato-mucronatis patulis, exterioribus lanceolatis adpressis, interioribus subulatis minimis, *pedunculis elongatis* 2-6 stachyis, bracteis lato-ovatis cuspidatis eroso-crenulatis. 4. In sylvis montanis subalpinis et alpinis, (Schweiz, Tyrol u. zerstreut dch. die Alpenkette; sodann in Schles.; Mähr.; Böhm. u. angeblich auch im nördl. D.) Jul. Aug. St. II. h. 5.

7. **L. clavatum** (L. sp. 1564.) caulibus repentibus, ramis adscendentibus, *foliis* sparsis lineari-lanceolatis acuminatis *pilo elongato terminatis*, spicis pedunculatis geminis, bracteis lato-ovatis cuspidatis eroso-denticulatis. 4. In sylvis et ericetis subhumidis. Jul. Aug. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 4. et 11. f. 14. 15. 16. 25. St. II. h. 5.

2. SELAGINELLA (Spring. apud Doell. rhein. fl. p. 38.) Sporangia biformia, alia reniformia vel subrotunda, sporulis minutissimis quaternatim cohaerentibus ut in Lycopodio, sed muriculatis, repleta; alia 3-4 cocca, 3-4 sporas maiores continentia, quae striis tribus elevatis in vertice conniventibus praedita sunt.

1. **S. spinulosa** (Alex. Braun ap. Doell. l. c.) caulibus repentibus ramis adscendentibus, *foliis sparsis* lanceolatis patulis *spinuloso-dentatis*, spicis terminalibus solitariis. 4. In locis humidis subalpinis et alpinis, (durch die Alpenkette und auf dem Feldberge im Breisgau, dem höchsten Punkte des Harzes u. der Sudeten.) Jul. Aug. Lycopodium Selaginoides L. sp. 1565. Bischoff. krypt. Gew. t. 11. f. 17-19. 35-38. St. II. h. 5. Selaginoides foliis spinosis Dill. musc. t. 68. f. 1.

2. **S. helvetica** (Spring. ap. Doell. rhein. fl. p. 39.) caulibus procumbentibus caespitosis basi radicantibus, ramis complanatis, *foliis tetrastichis*, margine denticulato-scabris oblongo-ovatis ovatisve, *serierum lateralium rectangulo-patentibus*, *serierum interiorum duplo minoribus erecto-incumbentibus*, spicis elongatis simplicibus bifidisve pedunculo minute foliato impositis, bracteis ovatis acutis. 4. (Auf Felsen der Alpen und Voralpen, bis in die Wälder am Fusse der Alpen u. daselbst auf Baumwurzeln; um Salzburg, München u. s. w.; Vogesen.) Jul. Aug. Lycopodium helveticum L. sp. 1568. Bischoff. krypt. Gew. t. 10. f. 6. et 10. t. 11. f. 31-34. St. II. h. 5. L. radicans Schrank. baier. fl. n. 1447. Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, spicis pediculis insidentibus Dillen. musc. 465. et 65. f. 2. Simillima Selaginella denticulata (Lycopodium denticulatum L. sp. 1569.) differt sequentibus: folia paulo evidentius serrulata sunt et bracteae magnitudinem et colorem foliorum rameorum habent, qua de causa spicae sessiles vocantur; bracteae superiores in cuspidem abeunt, quae in S. helvetica simpliciter acutae sunt.

Ord. CXXXV. FILICES. Linn. gen. pl. edit. 4. p. 484., exclus. generibus. Rob. Brown. prodr. p. 146.

Sporangia inferiori paginae foliorum, (frondium,) inserta, et passim, laciniis foliorum angustatis et ad costam mediam reductis spicas paniculasve referentia. — Herbae perennes, rhizomate repente, rarius caule erecto praeditae.

Trib. I. *OPHIOGLOSSEAE.* Rob. Brown. prodr. p. 163. Sporangia sessilia vel lateribus suis connata, subglobosa, coriacea, opaca, exannulata, evasculosa, unilocularia, regulariter bivalvia.

1. BOTRYCHIUM (Swartz. syn. p. 171.) Sporangia disjuncta in spicas compositas subpaniculatas unilaterales distiche disposita, semibivalvia.

1. **B. Lunaria** (Swartz. syn. 171.) *fronde sterili* solitaria *oblonga* longitudine sua duplo triplove angustiore petiolum frondis fertilis ad medium usque et altius adnato-involvente pinnatipartita, *pinnis transverse latioribus cuneato-semilunaribus* integerrimis crenulatis flabellatove incisis. 4. In pratis pascuisque siccis, sylvarum locis denudatis, ericetis, in alpes altissimas adscendens. Mai. Jun. Osmunda Lunaria L. sp. 1519. St. II. h. 1. Strempel. filic. berol. fig. 1-4.

2. **B. matricariaefolium** (Alex. Braun ap. Doell. rhein. fl. p. 24.) *fronde sterili* solitaria *oblonga* longitudine sua duplo triplove angustiore petiolum frondis fertilis ad medium usque et altius adnato-involvente pinnati-partita, *pinnis ovatis oblongisve* pinnatifido-lobatis, lobis 2-3 crenatis. 4. In pratis pascuisque siccis, (selten u. sehr zerstreut durch d. Geb.) Mai. Jun. B. rutaceum Swartz. syn. filic. p. 171. Willd. sp. pl. 5. p. 62. B. Lunaria β. rutaceum Wahlenb. fl. suec. p. 681. Fries. nov. ed. 2. p. 289. B. Lunaria δ. rutaefolia Roep. fl. meklenb. 1. p. 111. Strempel. fil. berol. f. 5. — Lunaria racemosa minor Matricariae folio Breyn. cent. p. 184. t. 94. Seorsum proposui, ut ulterius observetur, mihi enim species peculiaris neque varietas B. Lunariae videtur. — Folia huius speciei quodammodo aemulant folia Matricariae Parthenium, folia sequentis cum his nullam similitudinem habent.

3. **B. rutaefolium** (Alex. Braun ap. Doell. rhein. fl. p. 24.) *frondibus sterilibus* plerumque binis longe petiolatis, petiolo inferioris basin frondis fertilis vaginante, superioris adnato, *limbo triangulari transverse latiori* ternato, segmentis pinnatis, pinnis oblongis obtusis crenato-lobatis. 4. In pascuis et sylvis inque subalpinis, (Oberschlesien, bei Gnadenfeld, Radoscher u. Wroniner Wald, im Gesenke bei Ludwigsthal, am Uhustein bei Einsiedel, Grabowski; Woleschna in Böhmen, Tausch pl. select.; Nisky in d. Lausitz; in dem Hayforste bei Hadersbach zw. Regensburg u. Straubing; nicht wiedergefunden auf d. in den naturh. Topogr. v. Rgbg. angegebenen Standorten, Fürnrohr; Bachergebirge in Steyerm. v. Heuffler; hohe Vogesen auf Granit, Ballon v. Sultz, Rotherück, Hoheneck; Steyermark.) Jun. Jul. B. rutaceum Swartz. syn. 171. (non Willd.) Cl. Swartz. cum B. Lunariae varietate rutacea, Botrychio rutaceo Willd., confudit. Fries. nov. p. 289. B. rutaceum Wahlenb. fl. suec. p. 681. B. matricarioides Willd. sp. 5. p. 62. Osmunda matricariae Schrank. baier. fl. 2. p. 419. St. II. h. 6. Nomina a cl. Alex. Braun. proposita adhibui ob nomen B. rutacei pluries confusum.

2. OPHIOGLOSSUM (L. gen. n. 1171.) Sporangia in spicam unilateralem distiche disposita, lateralibus suis connata, transverse bivalvia; spica ante maturitatem nodoso-articulata, tum, sporangiis apertis, emarginato-dentata.

1. **O. vulgatum** (L. sp. 1518.) fronde sterili ovata vel oblonga basi breviter decurrente, spica solitaria simplici bifidave. 4. In pratis humidis et sylvarum locis graminosis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jun. St. II. h. 1.

2. **O. lusitanicum** (L. sp. 1518.) fronde sterili lanceolata a medio basin versus cuneato-attenuata, spica solitaria. 4. In arenosis maritimis, (am Hafen von Veruda in Istrien.) Januar. Barrel. t. 252. f. 2. Frons sterilis pollicem et dimidium longa, 2-3 lineas lata.

Trib. II. *OSMUNDACEAE.* R. Brown. prodr. p. 161. Sporangia exannulata, vasculoso-reticulata, dorso gibbere striato, (annulo incompleto,) instructa, longitudinaliter a basi ad gibberem dorsalem in valvas 2 regulariter dehiscentia, spicata vel spicato-paniculata, pinnulis frondis angustatis vel ad costam mediam reductis.

3. OSMUNDA (L. gen. n. 1172.) Sporangia subglobosa, pedicellata, venoso-reticulata, dorso gibbere parvo instructa, regulariter bivalvia.

1. **O. regalis** (L. sp. 1521.) frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis obsolete crenulatis basi oblique truncatis, soris subrotundis alternis dense spicatis, spicis in paniculam terminalem bipinnatam dispositis. 4. In pratis sylvaticis udis, inque sylvis paludosis, (montium et planitierum.) Jun. St. II. h. 6. Pinnulae pinnarum binarum, sub panicula fructifera positarum, saepe basi lobato-crenatae evadunt ibidemque pagina inferiore soros marginales ferunt; passim quoque frons inferne et superne non mutatur dum pinnulae pinnarum intermediarum basi fructificant.

Trib. III. *POLYPODIACEAE.* R. Brown. prodr. p. 146 Sporangia unilocularia, reticulato-venosa, annulo articulato longitudinali plerumque in altero latere incompleto cincta, transversim irregulariter rumpentia.

Subtrib. I. *Polypodiaceae nudae.* Sori nudi, nec indusio membranaceo, nec margine frondis revoluto tecti.

4. GRAMMITIS (Swartz. syn. p. 21.) Sori lineares, disco frondis oblique pinnatim furcatimve impositi. Indusium nullum.

1. **G. Ceterach** (Swartz. filic. 23.) frondibus pinnatifidis subtus paleaceo-squamosis, laciniis ovatis oblongisve obtusis, paleis margine repando-denticulatis. 4. Ad rupes et muros locis apricis, praecipue solo calcareo, (zerstreut dch. d. Geb.) Jun. Jul. Asplenium Ceterach L. sp. 1538. St. II. h. 5. Ceterach officinarum Willd. sp. 5. p. 136. Gymnogramma Ceterach Spreng. syst. veg. 4. p. 38. Scolopendrium Ceterach Roth. tent. 3. p. 48.

5. POLYPODIUM (Linn. gen. n. 1179., excl. spec.) Sori subrotundi sparsi vel seriati. Indusium involucrumque nullum.

1. **P. vulgare** (L. sp. 1544.) *frondibus* ambitu lanceolatis *pinnatipartitis, pinnis* a basi versus apicem sensim decrescentibus approximatis alternis lineari-oblongis *indivisis* subserrulatis, soris in pinna biserialibus, stipite glabro. 4. In muris vetustis, rupium fissuris et saxis inque arborum annosarum radicibus in sylvaticis. Jun. Jul. St. II. h. 1. Varietas *β.* ap. Willd. sp. pl. vol. 5. p. 173., laciniis frondis inferioribus basi superiore auriculatis et *γ.* frondibus maioribus evidenter serratis passim occurrunt, sed var. *ε.* fronde multo latiore laciniis pinnatifido-dentatis, P. cambricum L. sp. 1546., monstrosa progenies, apud nos non nisi in hortis colitur.

2. **P. Phegopteris** (L. sp. 1550.) frondibus ambitu ovatis longe acuminatis utrinque pubescentibus margine ciliatis pinnatis, pinnis pinnatifidis, infimis deflexis, pinnulis oblongis obtusis obsolete crenulatis, *pari infimo pinnularum cum eodem pari lateris oppositi in figuram quadrangularem rhombeamve connatis.* 4. In locis saxosis, rupibus et ad radices arborum annosarum in sylvis humidiusculis, planitierum, montium et reg. subalpinarum. Jun.-Aug. Schk. krypt. 17. t. 20.

3. **P. Dryopteris** (L. sp. 1555.) *frondibus* inclinatis *glabris ambitu deltoideis ternato-bipinnatis*, pinnis infimis pinnatipartitis, pinnulis oblongis obtusis integerrimis vel inferioribus crenatis, soris semper disjunctis. 4. In rupibus locis saxosis et ad arborum radices in sylvis inque muris vetustis umbrosis. Jun.-Aug. St. II. h. 1.

4. **P. robertianum** (Hoffm. D. fl. cryptog. ann. 1795., in addend. pag. 10.) *frondibus* rectis *glanduloso-pubescentibus ambitu deltoideis ternato-bipinnatis*, pinnis infimis pinnati-partitis, pinnulis oblongis obtusis integerrimis vel inferioribus crenatis, soris denique confluentibus. 4. In locis lapidosis sylvaticis et dumetosis praecipue montium calcareorum, (Schweiz, Elsass, Baden, Regensburg, Salzburg, Oestreich, Steyermark, Böhmen, Harz.) Jun.-Aug. P. calcareum Smith. brit. p. 1117. 1804. P. Dryopteris Bolt. filic. 53. t. 1.

5. **P. alpestre** (Hoppe pl. exsicc.) *frondibus glabris ambitu oblongo-lanceolatis apicem et basin versus sensim decrescentibus, bipinnatis, pinnulis* lanceolatis *pinnatipartitis*, lobulis oblongis inciso-crenatis oblique mucronatis, soris disjunctis. 4. In locis humidis et juxta frutices alpium et reg. subalpinarum, (dch. d. Alpenkette; auf d. höchsten Punkten der Vogesen u. des Schwarzwaldes; Harz, Felsen an der Bude; Oberschlesien, im Gesenke weit verbreitet.) Jun.-Aug. P. alpestre Spenn. fl. frib. 1. p. 12. Wallr. fl. crypt. p. 14. Doell. rhein. fl. p. 6. P. rhaeticum DC. fl. fr. 5. p. 242. Vill. voyag. p. 12., excl. syn. Rothii. Schk. crypt. t. 60. Godron fl. de Lorr. 2. p. 213. P. molle All. ped. 2. p. 287., Vill. delph. 3. p. 844. P. rhaeticum L. sp. 1552., secund. citatum J. Bauhini (hist. 3. p. 470., cum icone exacte nostram plantam referente.) Dignoscitur facile a simillimo Asplenio Filix femina (Polypodio L.) soris ab initio orbicularibus. — B. Smith memorat, in herbario Linnaeano sub nomine Polypodii rhaetici specimen Polypodii Filix femina asservatum esse, sed hoc specimen, me judicante, denuo accurate inquirendum est, quum b. Smith. simillimum Polypodium alpestre Hoppii non noverit. Polypodium rhaeticum plerorumque auctorum post Linnaeum ad modificationes Cystopteridis fragilis pertinet.

6. WOODSIA (Rob. Brown. transact. of the linn. soc. v. 11. 1816. p. 170-174.) Sori subrotundi. Involucrum calyciforme, apertum, margine crinitum, includens capsulas pedicellatas. R. Brown l. c. — Membranam pilos paleaceos soris adjectos in involucrum basi connectentem in siccis plantis invenire non possum; in statu recenti hanc stirpem examinandi occasio hucusque mihi non data fuit.

1. **W. hyperborea** (Koch.) frondibus ambitu oblongis lanceolatisve subtus rachi stipiteque paleaceo-hirsutis pinnatis, pinnis ovatis vel ovato-lanceolatis pinnatifidis, lobulis subrotundis ovatisve integerrimis leviterve obtuse crenatis. 4. Ad rupes in regionibus montanis, subalpinis et alpinis. Aestate. W. ilvensis Babington. manual. p. 384. Polypodium hyperboreum Wahlenb. fl. suec. p. 670. Acrostichum Marantae Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 5., secundum loca natalia memorata, scilicet in monte Tollstein et in Styria. Occurrit

α. arvonica, pinnae breves, triangulari-ovatae, lobuli infimi 1-2 margine incumbentes vel contigui, caeteri coadunati: Polypodium arvonicum Withering., Smith. brit. 3. p. 1115. P. hyperboreum Swartz. syn. filic. p. 39. St. II. h. 11. Acrostichum hyperboreum Liljebl. in act. holm. 1793. p. 201. t. 8. Ceterach alpinum DeC. fl. fr. 2. p. 567. Hoc in alpibus Helvet., Salisb., Carinth.; Siles., (kleine Schneegrube im Riesengeb.)

Specimina *intermedia* inter hanc et sequentem varietatem cl. Babington. sub sua varietate *β.* intermedia comprehendit.

β. rufidula, pinnae lanceolatae, lobuli earum paulum a se invicem remoti. Woodsia ilvensis R. Brown l. c. Acrostichum ilvense L. sp. 1528. Polypodium ilvense Swartz. syn. filic. 39. St. II. h. 6. P. Marantae Hoffm. Deutschl. fl. 2. p. 5. Polystichum Marantae Roth. tent. 3. p. 92. Aspidium rufidulum Swartz syn. filic. p. 58. Nephrodium rufidulum Mich. amer.

2. p. 269. (Tyrol, Oetzthal oberhalb Umhausen, Bischoff; Böhmen, an dem Schlosse Tollenstein auf der Grenze d. Lausitz, auf dem Berge Kleis an der schroffen Mittagsseite, an dem hohen Felsen des Dorfes Kauerzimeg am Ufer der Beraun, Wulfen; an den Milleschauer Bergen, Tausch. plant. sel.; Schlesien an Felsen im Weistritzthal, Wimmer; Hessen, Burghasungen bei Cassel, Pfeiffer; Rhön; Wenderoth; Harz, in dem Ocker- u. Budethale, G. F. W. Meyer.

Subtrib. II. *Polypodiaceae indusiatae.* Sori juniores indusio membranaceo tecti.

7. ASPIDIUM (R. Brown. prod. fl. nov. holland. ed. norimb. p. 3.) Sori subrotundi, seriati vel sparsi. Indusium membranaceum, orbiculare, peltatum, stipitatum, puncto centrali affixum, circumcirca liberum. — Hoc genus indusia vere peltata gerit, itaque nomen Aspidii prae omnibus meretur.

1. **A. Lonchitis** (Swartz synops. filic. 43.) frondibus ambitu elongato-lanceolatis pinnatis, *pinnis indivisis* lanceolato-falcatis basi antice acute auriculatis subtus paleaceo-pilosis duplicato-serratis, serraturis maioribus spinuloso-cuspidatis, stipite rachique paleaceis. 4. Ad rupes in subalpinis et alpinis, (dch. d. Alpenkette; hohe Vogesen; Feldberg in Baden; rauhe Alp in Würtemberg; Vogelsberg in Hessen; Kessel im Schles. Gesenke; Harz.) Jul. Aug. Polypodium Lonchitis L. sp. 1548. St. II. h. 1. Polystichum Lonchitis Roth. tent. 3. p. 71. Pinnae frondium infimae ovatae et plerumque basi utrinque auriculatae.

2. **A. aculeatum** (Doell. rhein. fl. p. 20.) *frondibus* ambitu oblongo-lanceolatis subtus paleaceo-pilosis *bipinnatis,* pinnis lanceolatis acuminatis, pinnulis oblique ovatis sublunulatis antice saepe auriculatis inaequaliter spinuloso-denticulatis pedicellatis, superioribus sessilibus confluentibus, stipite rachique paleaceis. 4. In locis sylvarum humidis, umbrosis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. St. II. h. 11. Polypodium aculeatum L. sp. 1552. Polystichum aculeatum Roth. tent. 3. p. 79. Varietates sequentes insignes sunt:

α. vulgare Doell. rhein. flor. p. 20., frondes rigidae, pinnulae subrhombeae, basi breviter cuneatae, latiuscule pedicellatae, pedicellis subdecurrentibus; pinnulae superiores basi confluunt, in pinnis supremis in unam grosse dentatam coalescunt. Pinnula infima superior caeteris conspicue maior est. A. lobatum Swartz synops. filic. 53. A. aculeatum St. II. h. 11. haud bona. Polypodium lobatum Huds. angl. 459. Polystichum lobatum Presl. pterid. p. 83.

Polystichum Plukenetii DC. fl. fr. 5. p. 241., Polypodium Plukenetii Lois. not. 146., consistere videtur in speciminibus varietatis *α.* junioribus, pinnis pinnatifido-lobatis, pinnulis scilicet omnibus ad medium usque coalitis et incomplete fructificantibus; specimen vero originale nondum vidi.

β. Swartzianum, frondes molliores, pinnulae oblique ovatae, obtusiusculae, basi truncatae, pedicello brevi quidem sed graciliore neque decurrenti insidentes, antice auriculatae, pinnula infima superior saepe caeteris non maior: Aspidium aculeatum Swartz. synops. filic. 53. Smith. engl. fl. v. 4. p. 277. Willd. sp. 5. p. 258. Polystichum aculeatum Presl. pterid. p. 83. Ab hoc vix varietate sejungendum:

A. angulare, Kit. apud Willdenow, in omnibus enim convenit et non differt, nisi pinnula infima superiore pinnatifida et caeteris evidenter majore. A. angulare Willd. sp. 257. Smith. engl. fl. 4. p. 278. A. aculeatum Schultz. fl. gall. et germ. exsicc. n. 571. Polystichum angulare Presl. pterid. p. 83. Insignis forma est A. aculeatum Swartzianum:

subtripinnatum, quod formae antecedenti simile est, sed pinnas multo latiores habet et pinnulas inferiores pinnati-partitas, lobulis infimis pedicellatis liberis.

γ. Braunii Doel. l. c., frondes basin versus magis attenuatae, pinnae oblongo-lanceolatae, inferiores obtusae et in apice obtuso breviter acuminatae, pinnulae conformes, latiuscule oblongae et basi fere rectangule truncatae: A. Braunii Spenner. flor. frib. 1. p. 9.

Loci natales varietatum hic memoratarum accuratius enumerandi sunt. Varietas *α.* in regionibus rhenum comitantibus passim vulgaris: var. *β.* in regionibus badensibus rarissima; *γ.* e Gallia, et *δ.* ex Anglia possideo; *ε.* in valle Hölle sylvae nigrae et in Sudetis, unde habeo, repertum est.

10. POLYSTICHUM (Roth. tent. fl. germ. 3. p. 69.) Sori subrotundi, seriati vel sparsi. Indusium membranaceum, subrotundum, puncto centrali et plica depressa affixum, reniforme. — Lastrea Presl. pteridograph. p. 73. Nomen Polystichi, a b. Rothio speciebus hic enumeratis impositum retinui, remotis speciebus paucioribus, quae indusiis vere peltatis instructae sunt et ad Genus Aspidium R. Brownii pertinent. Rothius primus fuit, qui Polypodia indusiata in tria genera clare divisit scilicet in Athyrium, Polystichum et Cyatheam, (Cystopteridem). Genus Athyrium praeeunte cl. Bernhardio cum Asplenio combinavi. — De Nephrodio Michauxii, qui primus hoc genus distinxit, conf. Link. hort. reg. bot. berolinens. v. 2. p. 125., nomen Nephrodii a recentioribus botanicis varie adhibitum est.

1. **P. Thelypteris** (Roth. tent. fl. germ. 3. p. 77.) *frondibus eglandulosis* pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis pinnati-partitis, *pinnulis* oblongis acutiusculis *integerrimis* repandisve, *frondium fertilium margine revolutis,* soris in disco pinnularum biserialibus denique confluentibus, rhizomate repente. 4. In pratis uliginosis turfosis, ad fossas sylvarum solo humido, (zerstr. dch. d. Geb.) Jul. Aug. Polypodium Thelypteris L. mant. 505. St. II. h. 1. Acrostichum Thelypteris L. sp. pl. 1528. Aspidium Thelypteris Swartz. syn. filic. 50. Lastrea Thelypteris Presl. pterid. p. 276. Sori in medio disci pinnulae biseriales, quod in speciminibus majoribus, quorum pinnae inferiores margine non revolvuntur, observamus, sed in his quoque pinnae superiores, quemadmodum in minoribus omnes, margine revolutae sunt, quo fit, ut sori marginem occupare videantur; denique hi confluunt ita ut in minoribus speciminibus totam superficiem obtegant.

2. **P. Oreopteris** (DeCand. fl. fr. 2. p. 562.) *frondibus subtus resinoso-glandulosis* ambitu lanceolato-oblongis a medio deorsum decrescentibus pinnatis, *pinnis* lineari-lanceolatis pinnatipartitis, *infimis minimis* ambitu *triangularibus*, pinnulis oblongis acutiusculis integerrimis repandisve, sororum seriebus margini contiguis, rhizomate caespitoso. 4. In sylvis umbrosis humidis praecipue montanis, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. Polystichum montanum Roth. tent. 3. p. 74. Polypodium Oreopteris Ehrh. crypt. n. 22. P. montanum Vogler. dissert. Gies. 1781. P. limbospermum Allion. auct. p. 49. P. pterioides Vill. delph. 4. p. 841. Aspidium Oreopteris Swartz. syn. filic. 50. Schk. crypt. t. 35. 36. Lastrea Oreopteris Presl. pterid. p. 76.

3. **P. Filix mas** (Roth. tent. fl. germ. v. 3. p. 82.) frondibus ambitu elliptico-oblongis pinnatis, pinnis lanceolatis acuminatis, pinnatipartitis, *pinnulis* glabris vel subtus in costa sparsim paleaceis *oblongis obtusis subtruncatisve adpresso-, apice inaequaliter, denticulatis,* denticulis muticis, *soris* biserialibus *discum a basi pinnulae* ultra medium occupantibus, stipite rachique paleaceis. 4. In sylvis et locis lapidosis dumetosis. Jul. Aug. Polypodium Filix mas L. sp. 1551. Aspidium Filix mas Swartz. synops. filic. 55. Schk. crypt. t. 44. Lastrea Filix mas Presl. pterid. p. 76. Occurrit raro pinnulis subtruncatis integerrimis vel apice minute denticulatis; atque pinnis remotioribus, pinnulis longioribus margine lobulato-subpinnatifidis, lobulis denticulatis: Aspidium Filix mas *β.* erosum Doell. rhein. flor. p. 16. A. depastum et A. erosum Schk. crypt. t. 45. et 51. Polypodium Heleopteris Borkhausen in Roem. arch. 1. 3. p. 19. Magis ad degenerationem monstrosam vergit haec forma, quam ad typum varietatis.

4. **P. cristatum** (Roth. tent. fl. germ. v. 3. p. 84.) *frondibus ambitu*

elongato-lanceolatis a medio versus basin frondis longitudine decrescentibus pinnatis, pinnis ambitu ovato-lanceolatis pinnatipartitis, infimis lato-triangularibus pinnulis oblongis pinnatifido-lobulatis, *lobulis rotundatis* 2-6 *dentatis dentibus mucronatis*, soris in disco biserialibus. 4. In locis turfosis inter virgulta et in sylvis humidis planitierum, montium et regionum subalpinarum, (zerstreut dch. d. Geb.) Jul. Aug. Polypodium cristatum L. sp. 1551. P. Callipteris Ehrh. Beitr. 3. p. 77. Aspidium cristatum Swartz syn. filic. 52. Schk. crypt. t. 37. Lastrea cristata Presl. pterid. p. 77.

5. **P. spinulosum** (DeCand. fl. fr. 2. p. 561.) *frondibus ambitu ovatis oblongisve* bipinnatis, *pari infimo* tantum pinnarum primariarum *caeteris breviore,* pinnulis pinnatipartitis, lobis oblongis obtusis simpliciter duplicatove serratis, superioribus confluentibus, *serraturis cuspidatis spinulosoque mucronatis,* soris subbiseriatis, stipite rachi costaque pinnarum subtus paleaceis. 4. In sylvis umbrosis. Jul. Aug. Aspidium spinulosum Doell. rhein. fl. p. 17. A. dilatatum Godron. fl. de Lorr. p. 209. Nephrodium spinulosum Stremp. fil. berol. 30. Occurrit majus et minus, fronde ambitu latiore et angustiore, stipite et rachi valde paleaceis vel paucis tantum paleis praeditis atque insuper varietatibus duabus insignioribus, quae vero formis intermediis copiosis confluunt.

α. vulgare, lobulis pinnularum (pinnarum secundariarum) infimis tantum sejunctis, caeteris rachi lata confluentibus. Hujus frons ambitu oblonga vel ovato-oblonga, et infimum par pinnarum primarium plerumque sterile magisque remotum: Polystichum spinosum Roth. tent. 3. p. 91. Aspidium spinulosum Willd. sp. pl. 5. p. 262. Swartz. syn. filic. 420. A. spinulosum *α.* Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 252. Lastrea spinulosa Presl. pterid. p. 76. — Non solum in hac varietate sed etiam in sequente glandulae pedicellatae ad marginem indusiarum juniorum reperiuntur, saepe autem quoque desiderantur.

β. dilatatum, lobulis pinnularum (pinnarum secundariarum) fere omnibus separatis rachique angusta conjunctis, supremis tantum confluentibus. Hujus frons plerumque latior et triangulari-ovata est. Occurrit caeterum in formis minutis et maximis: Polystichum multiflorum Roth. tent. 3. p. 87. Polypodium dilatatum Hoffm. D. fl. 2. p. 7. Aspidium dilatatum Willd. sp. 5. 263. Swartz syn. ficil. 420. A. spinulosum var. *β.* Hartm. scand. fl. ed. 3. p. 252. Lastrea dilatata Presl. pterid. p. 77. Specimen authenticum Aspidii dumetorum Smith. engl. fl. 4. 281., quod cl. Babington. inter varietates A. spinulosi enumerat, nondum vidi.

γ. muticum Alex. Braun. ap. Doell. rhein. fl. p. 18.; insignis varietas, primo adspectu specimen varietatis *β.* pinnulis angustis pinnatifidis praeditum refert, sed propius inspectum evidenter discrepat pinnularum dentibus muticis neque mucronatis, lobulisque pinnularum inferioribus caeteris conspicue longioribus et pluridentatis; lobuli subsequentes fere abrupte breviores et ex unico tantum dente formati sunt, (sehr selten auf dem hohen Schwarzwald, Alex. Braun.)

6. **P. rigidum** (DeCand.. fl. fr. 2. p. 560.) *frondibus ambitu oblongo-lanceolatis subtus glandulosis* bipinnatis, pinnis secundariis lanceolatis pinnatipartitis, *pinnulis* ovatis oblongisve *apice dentatis dentibus* acutis *mucronulatis,* soris in pinnis secundariis biserialibus, stipite rachi costaque pinnarum subtus paleaceis. 4. In rupibus alpinis, (Schweiz, Salzburg, Tyrol, Steyermark.) Aestate. Aspidium rigidum Swartz. filic. 53. St. II. h. 11. Willd. sp. 5. p. 265. Polypodium rigidum Hoffm. 2. p. 6. P. fragrans Vill. delph. 3. p. 843. P. Villarsii Bellard. app. ad fl. pedem. p. 49. Polystichum strigosum Roth. tent. 3. p. 86. Lastrea rigida Presl. pterid. p. 77. — *Aspidium rigidum b. remotum* Alex. Braun ap. Doell. rhein. flor. p. 16., cujus pulchra specimina benignitati cl. auctoris debeo, mihi sic ut auctori ipsi hucusque in dubio mansit. Auctor pro varietate A. rigidi habet, sed fortasse potius varietatem submuticam Aspidii spinulosi elevati sistit. Cultura e seminibus facile rem clariorem reddet.

11. CYSTOPTERIS (Bernhard. in Schrad. neuem Journ. v. 1. p. 2. p. 26.) Sori subrotundi, sparsi vel subseriati. Indusium membranaceum, subrotundum vel ovatum, puncto marginis affixum, denique corrugatum et evanescens.

1. **C. fragilis** (Bernhard. l. c.) *frondibus* bipinnatis *ambitu oblongis lanceolatisve, pari infimo pinnarum* quam proxime sequentes *breviori*, pinnulis inferioribus lobulato-pinnatifidis vel basi pinnatipartitis, *lobulis* obovatis ovatis vel oblongo-ovatis *denticulatis dentatisve*, dentibus acutiusculis. 4. In umbrosis ad rupes et muros. Aestate. Polypodium fragile L. sp. 1553. Multis ludit formis, quae vero intermediis evidenter confluunt, duae tamen varietates insigniores propono.

α. lobulato-dentata, pinnulae breves, ovatae, lobulatae vel pinnatifido-lobulatae, breviter dentatae: Cystea dentata Sm. engl. fl. 4. p. 287. Polypodium dentatum Dicks. crypt. fasc. 3. t. 7. Hoffm. D. fl. 2. p. 9. Cyathea dentata Sm. brit. 1141. Aspidium dentatum Sw. syn. filic. 59. Willd. sp. v. 5. p. 273. A. fragile St. II. h. 11. Cyathea fragilis Roth. tent. v. 3. p. 94.

β. pinnatipartita. Huius formas cl. Roth., Hoffm. et Smith. sub tribus speciebus diversis descripserunt, quas hic enumero, licet vix tanquam varietates distinguendae sunt; scilicet: 1) *C. anthriscifolia*, pinnulae oblongo-ovatae pinnatipartitae, lobuli oblongi breviter dentati: Cystea fragilis Sm. engl. fl. v. 4. p. 285. Aspidium fragile Swartz. syn. filic. 58. Willd. sp. v. 5. p. 280. Cyathea fragilis Sm. brit. 1139. C. anthriscifolia Roth. tent. v. 3. p. 94. Polypodium anthriscifolium Hoffm. D. fl. 2. p. 9., excluso P. angustato; 2) *cynapifolia*, pinnulae oblongo-ovatae pinnatipartitae, lobis obovatis apice dentatis et quasi retusis: Cyathea cynapifolia Roth. tent. 3. p. 98. Polypodium cynapifolium Hoffm. D. fl. 2. p. 9. 3) *angustata*, pinnulae lanceolatae, acutae, pinnatipartitae, lobis lanceolato-oblongis inciso-dentatis dentibus acutis: Cystea angustata Sm. engl. fl. v. 4. p. 288. Polypodium fragile angustatum Hoffm. in Roem. u. Ust. mag. fasc. 9. P. tenue Hoffm. D. fl. v. 2. p. 9. P. rhaeticum Dicks. hort. sicc. fasc. 1. n. 17. Aspidium rhaeticum Willd. sp. v. 5. p. 280., excl. synon. Cyathea regia Roth. tent. v. 3. p. 96., non Smith.

2. **C. regia** (Presl. pteridogr. p. 93.) *frondibus bipinnatis ambitu oblongis lanceolatisve, pari infimo pinnarum* quam proxime sequentes *breviori*, pinnulis inferioribus pinnatipartitis, *laciniis subpinnatifido-dentatis*, dentibus ovato-oblongis rotundato-obtusis apice integris vel brevissime bidentato-marginatis. 4. In rupibus subhumidis praecipue subalpinis et alpinis. Aestate. — Occurrit:

a. *fumariaeformis*, pinnularum lobis brevioribus: Polypodium regium L. sp. 1553., secund. citatum Vaillantii. Filicula regia Fumariae pinnulis: Vaillant. par. p. 52. t. 9. f. 1. Aspidium regium Sw. filic. 58. Willd. sp. v. 5. p. 281. Cyathea regia Smith. brit. p. 1140., non Roth. C. incisa engl. bot. t. 163. Cystea regia Smith. engl. fl. p. 290.

b. *alpina*, pinnularum laciniis remotioribus longioribus, in medio et in apice dentibus duobus instructis vel apice tridentatis, rachi pinnularum non latiore, quam rachis pinnarum. Cystopteris alpina Link. h. b. berol. 2. p. 130. Polypodium alpinum Wulf. in Jacq. collect. 2. p. 171., ic. rar. t. 642. Aspidium alpinum Willd. spec. 5. p. 282. St. II. h. 11. — Polypodium regium L. et Polypodium alpinum Wulf. a cl. DeCandollio aliisque botanicis pro varietatibus Cystopteridis fragilis habentur, quod observationibus ulterioribus confirmandum est; certe habitu proprio cognoscuntur.

3. **C. montana** (Link. hort. bot. berol. 2. p. 131.) *frondibus* glabris *ambitu deltoideis* ternato-tripinnatis, pinnulis pinnatifidis, inferioribus pinnatipartitis, lobulis dentatis, dentibus plerisque apice emarginato-bidentatis. 4. In rupibus alpinis et subalpinis, (Schweiz, Salzburg, Steyermark u. wahrscheinlich dch. einen grossen Theil der Alpenkette.) Aestate. Poly-

podium montanum Haenke in Jacq. collect. 2. p. 46. P. myrrhidifolium Vill. delph. 3. p. 851. t. 53. Aspidium montanum Swartz. syn. filic. 61. Schk. crypt. t. 63. Willd. sp. 5. p. 286. Cyathea montana Roth. tent. 3. p. 100. Ambitus foliorum Polypodium Dryopteris aemulat, sed pinnulae pinnulis Cystopteridis regiae similes sunt.

12. ASPLENIUM (L. sp. 1178., excl. spec.) Sori lineares vel ovales, disco frondis impositi. Indusium membranaceum, lineare vel transverse ovale, rectum vel subsemilunare, soro exterius affixum, interius apertum.

a. Pinnae versus apicem et basin frondis decrescentes et saltem inferne pinnatifido-lobatae.

1. **A. Filix femina** (Bernhard. in Schrad. neuem Journ. V. p. 2. p. 27. t. 2. f. 7.) *frondibus* ambitu elliptico-oblongis acuminatis *basin versus angustioribus bipinnatis*, pinnis longe acuminatis, pinnulis lanceolatis pinnatifidis pinnatipartitisve, lobulis ovatis oblongisve dentatis, dentibus acutis obtusiusculisve muticis, *indusiis transverse ovalibus margine fimbriato laceris*, inferioribus pinnularum semilunaribus. 4. In sylvis et locis lapidosis virgultis. Aestate. Polypodium Filix fem. L. sp. 1551. Aspidium Filix fem. Swartz. synops. filic. 59. Schk. crypt. 56. t. 58. 59. Athyrium Filix fem. Bernhardi in Schrad. neuem Journ. v. 1. p. 2. p. 27. t. 2. f. 7. Multum ludit magnitudine frondis et incisuris pinnularum. B. Rothius sequentes distinxit formas: 1. *Athyrium molle* Roth. tent. 3. p. 61.; forma minor, pinnulae oblongae, obtusae, rachi foliacea conjunctae, lobuli ovati, inferiores bidentati, vel in infimis pinnulis tridentati, superiores dentem unicum formantes, dentes breviter acuminati, rectiusculi; hujus loci est: Aspidium irriguum Smith. engl. fl. 4. p. 283. Polypodium dentatum St. II. h. 1. icon imperfecta. 2. *Ath. trifidum* Roth. l. c. p. 63., forma antecedente major, pinnulae saepe decurrentes, sed rachis foliacea in superiore pinnarum parte tantum evidens, lobi ovati infimi basi utrinque dente instructi et apice tridentati, dentes in acumen inflexum desinentes. 3. *Ath. ovatum* Roth. l. c. p. 64., forma major, pinnulae approximatae, rachis in inferiore pinnarum parte non alata, lobuli pinnularum lato-oblongi, obtusi, saepe obtusissimi, margine dentibus 1-2 utrinque notati et dentibus 3 terminati, dentes ovati acuti vel obtusiusculi porrecti. 4. *Ath. Filix femina* Roth. l. c. p. 65., forma major, pinnulis ad basin fere pinnatipartitis, lobulis anguste oblongis vel linearibus inciso-dentatis, dentibus lanceolatis acutis porrectis; rachis in inferiore pinnarum parte non alata. 5. *Ath. rhaeticum* Roth. l. c. p. 67., lobuli pinnarum recurvati sunt et soros pro parte tegunt, atque pinnae totae a rachi sua deflectuntur, adeo ut pagina sua inferiore fere se tegant, quo haec modificatio habitum singularem crispum induit. Haec modificatio verum est Athyrium Roth. l. c. secundum specimen ab ipso auctore acceptum et descriptionem datam; Rothius enim in tentam. 3. p. 68. dicit „fructificationum puncta ex subrotundo-ovata, et involucro paleaceo ferrugineo, e venula lateraliter ortum ducente, laciniato-fimbriato tecta,“ quod neutiquam in Polypodium alpestre Hoppii, ab Aliis Athyrium rhaeticum Rothii vocatum, quadrat; verum Polypodium alpestre insuper est planta subalpina et alpina, in Germania boreali nondum observata.

2. **A. Halleri** (Rob. Brown.) frondibus ambitu lineari-lanceolatis vel oblongo-lanceolatis pinnatis, *pinnis versus apicem et basin frondis sensim decrescentibus* ambitu ovatis basique *pinnatifido-lobatis* vel oblongo-ovatis *pinnatisque*, pinnulis subrotundo- vel rhombeo-ovatis angulato-dentatis *dentibus spinuloso-mucronatis* divaricatis, *indusiis transverse ovalibus integerrimis* rectis subcurvatisve. 4. Ad rupes, muros, in locis saxosis, non ad fontes, (Cant. Genf am Saleve; Cant. Waadt; nicht in Deutschland.) Aestate. Occurrit:

α. pedicularifolium, pinnis oblongo-ovatis pinnatis: Polypodium fontanum L. sp. 1550. Smith. engl. fl. 4. p. 209. Aspidium Halleri Willd. sp. 5. p. 274. Athyrium Halleri Roth. tent. 3. p. 60. Polypodium pedicularifolium Hoffm. D. fl. v. 2. p. 10.

β. angustatum, pinnis breviter ovatis subcordatis lobulatis, lobulo uno alterove ad basin pinnae in pinnulam sejuncto, frondes igitur ratione longitudinis angustiores. Aspidium fontanum Willd. sp. v. 5. p. 272. Haec varietas se habet ad varietatem *α.* aeque atque Woodsia hyperborea ad Woodsiam ilvensem et Cystea dentata Smith ad Cysteam fragilem ejusdem. Helveticum specimen hujus varietatis nondum vidi, a cl. Salzmanno in Cebennis lectam possideo. H.

b. Pinnae versus apicem et basin frondis decrescentes, integrae, repandae, vel crenatae, sed non pinnatifido-incisae.

3. **A. Trichomanes** (L. sp. 1540.) *frondibus* ambitu lanceolato-linearibus *simpliciter pinnatis*, pinnis ovalibus subrotundisve repandis crenulatisve basi truncatis vel subcuneatis, stipite glabro, *rachi margine* anguste *scarioso* denticulato praedita. 4. In rupibus sylvaticis et ad muros subumbrosos. Aestate. Schk. crypt. 69. t. 74. Stipes, ut rachis, fuscus et splendens.

4. **A. viride** (Huds. fl. angl. ed. 2. p. 453.) *frondibus* ambitu lanceolato-linearibus *simpliciter pinnatis*, pinnis rhombeo-subrotundis crenatis postice truncato-cuneatis, stipite pilis articulatis adsperso, *rachi margine scarioso destituta*. 4. In rupium fissuris et ad muros in regionibus subalpinis et alpinis, (in d. Alpenkette, auf den Vogesen, dem Harze u. d. Sudeten.) Aestate. St. II. h. 1. Stipes apice et rachis viridia.

c. Frondes bi-tripinnatae vel saltem basi bipinnatae, basique latiores.

5. **A. Breynii** (Retz. 1769. sec. Fries. herbar. norm. fasc. 9. n. 100.) *frondibus* ambitu lanceolatis *a medio ad apicem simpliciter pinnatis*, pinnis alternis remotis erectis cuneiformibus apice inciso-dentatis, pinnis mediis apice bi-trifidis, infimis bi-tripartito-pinnatifidis longioribus, laciniis cuneatis, indusiis margine integerrimis. 4. In rupium fissuris regionum montanarum et subalpinarum, (zerstreut dch. d. Gebiet.) Aestate. A. germanicum Weis. pl. crypt. fl. goett. p. 299. 1779. St. II. h. 5. A. alternifolium Wulf. in Jacq. misc. 2. p. 51. t. 5. f. 2.

6. **A. fissum** (Kitaib. ap. Willd. sp. pl. 5. 348.) *frondibus ambitu ovatis tripinnatis*, pinnulis cuneiformibus trifidis, laciniis apice bi-tridentatis, dentibus saepe emarginatis, *indusiis margine integerrimis*. 4. In rupium alpinarum fissuris, (auf d. Loibl in Krain, Kärnthen, Sieber; Eisenerzerhöhe in Steyermark, Zechenter.) Aestate. Frons tenuiter divisa, bipollicaris, stipiti tripollicari insidens, pinnulae minutae. Planta, ut recte monet Willdenowius, habitu fere Cystopteridis alpinae.

7. **A. Ruta muraria** (L. sp. 1541.) *frondibus ambitu triangulari-ovatis* bi-tripinnatisve, pinnulis obovatis vel oblongo-obovatis integris sublobatisve antice crenulatis, *indusiis margine lacero-fimbriatis*. 4. In rupium fissuris et ad muros. Aestate. Schk. crypt. t. 80. b.

8. **A. Adianthum nigrum** (L. sp. 1541.) *frondibus ambitu deltoideo-oblongis acuminatis nitidis* bipinnatis basi subtripinnatis, *pinnis* a basi *versus apicem frondis sensim decrescentibus*, pinnulis ovatis acute serratis basin versus cuneatis integerrimisque, superioribus confluentibus, indusiis margine integris. 4. In rupium fissuris et in locis lapidosis muscosis umbrosis, regionum subalpinarum et montanarum, (zerstreut dch. d. Geb.) Aestate. St. II. h. 5. Variat:

β. Serpentini, pinnulis minoribus remotioribus infimis profundius lobatis: A. Serpentini et A. Serpentini *β.* incisum Tausch. pl. select., (auf Serpentinsteinfelsen um Einsiedel, Tausch.)

d. Frondes e foliolis 2-4 petiolulatis compositae.

9. **A. septentrionale** (Swartz synops. filic. 75.) *frondibus* longe stipitatis *foliola* 2-4 *petiolulata gerentibus*, foliolis linearibus vel lineari-lanceolatis basi integerrimis margine dentibus 1-2 linearibus apice inaequaliter incisotridentatis. 4. In rupium fissuris, locis siccis regionum montanarum et subalpinarum, (zerstreut dch. d. Geb.) Aestate. St. II. h. 5. Acrostichum

septentrionale L. sp. 1524. Scolopendrium septentrionale Roth. tent. 3. p. 49. Acropteris septentrionalis Link. hort. bot. berol. v. 2. p. 56. Blechnum septentrionale Wallroth. in comp. fl. germ. 3. p. 24.

13. SCOLOPENDRIUM (Smith. act. taurin. 5. p. 410. t. 9. f. 2.) Sori lineares, recti, in disco frondis oblique transversales, paralleli, utroque latere indusio praediti. Indusia membranacea sorum versus aperta.

1. **S. officinarum** (Swartz syn. filic. 89.) frondibus lanceolatis vel oblongo-lanceolatis basi cordatis. 4. In nemorosis saxosis umbrosis, montanis et subalpinis, (Vogesen, Moselthal, Spa; Odenwald, Werthheim, Nassauisches Geb. u. weiter hinab längs d. Rheine; Harz; sodann längs der Alpenkette u. zerstreut in alten Brunnen niederer Gegenden.) Aestate. Schk. crypt. 78. t. 83. S. Phyllitis Roth. tent. 3. 47. Asplenium Scolopendrium L. sp. 1537. In hortis colitur varietas 1. *crispa* fronde undulata et saepe margine inciso-lobata et 2. *daedalea* fronde apice dilatata multifida.

14. BLECHNUM (L. gen. n. 1175.) Sori lineares, recti, elongati, costae pinnarum utrinque paralleli, continui. Indusium membranaceum, e disco pinnae ortum, continuum, interius apertum.

1. **B. Spicant** (Roth. tent. v. 3. p. 44.) frondibus ambitu elongato-lanceolatis pinnatipartitis, fructiferis subduplo longioribus, pinnis integerrimis breviter acuminatis, frondium sterilium lanceolato-linearibus approximatis, fertilium linearibus remotioribus, omnibus versus basin frondis decrescentibus infimis minimis. 4. In sylvis humidis umbrosis, (zerstreut dch. d. Geb.) Aestate. Blechnum boreale Swartz syn. filic. 115. St. II. h. 11. Acrostichum Spicant Vill. delph. 4. p. 838. Roth. tent. 1. p. 444. Lomaria Spicant Desv. Mag. d. Natf. z. Berlin 5. 325. Onoclea Spicant Hoffm. D. fl. 2. p. 11. Osmunda Spicant L. sp. 1522. Struthiopteris Spicant Scop. carn. 2. p. 288. Weis. crypt. p. 287.

15. PTERIS (Linn. gen. 1174., excl. spec.) Sori marginales, lineares, continui. Indusium membranaceum, e margine frondis ipso vel paulum ante marginem e disco oriens, lineare, continuum, interius apertum.

1. **P. aquilina** (L. sp. 1533.) frondibus tripinnatis, pinnulis oblongo- vel lineari-lanceolatis obtusis margine revolutis integris, infimis pinnatifidis. 4. In sylvis et pratis sylvaticis sterilibus. Aestate. St. II. h. 1. pars frondis. Allosorus aquilinus Presl. pterid. p. 153. Occurrit frondibus sesquipedalibus et fere quinquepedalibus. Pinnulae utrinque vel saltem subtus pubescentes. Pteridem brevipedem, tanquam speciem, hucusque distinguere non potui.

16. ADIANTHUM (Linn. sp. 1180.) Sori marginales, indusio ipso, non frondis paginae, inserti. Indusia initio membranacea, denique scariosa et subcoriacea, e margine frondis prodeuntia, squamaeformia, subrotunda, oblonga vel linearia, saepe lunulata, versus frondem aperta.

1. **A. Capillus veneris** (L. sp. 1558.) frondibus bi-tripinnatis, pinnulis obovatis basi cuneatis, fertilibus antice inaequaliter lobatis, lobis soro transverse lineari-oblongo terminatis, sterilibus crenatis. 4. In rupium humectarum fissuris regionum australiorum, (Schweiz bei St. Aubin am Newchateller See in den Tuffstein-Grotten dicht am See in Menge, Alex. Braun; transalpinische Schweiz, südl. Tyrol, Littorale.) Aestate. Jacq. misc. 2. t. 7.

Subtrib. III. *Polypodiaceae velatae.* Latera vel crenae pinnarum pinnularumve reflexa, soros totos vel earum partem tegentia, plerumque in marginem membranaceum angustiorem latioremve abeuntia, indusium supplentia.

17. NOTHOLAENA (Rob. Brown. prodr. fl. nov. holland. ed. N. ab Esenb. p. 1.) Margo pinnularum revolutus, tenui linea membranacea cinctus,

sporangia pro parte tegens, indusium supplens. Sporangia in margine pinnularum et in basi istarum sparsa, in nostra specie sub pilis paleaceis abscondita. — Caeterae species hujus generis a cl. R. Br. propositae ab hoc charactere generico, ut ex descriptionibus patet, recedunt.

1. **N. Marantae** (R. Brown. l. c.) frondibus bipinnatis, pinnulis linearioblongis obtusis subtus paleis imbricatis dense tectis integris vel infimis basi lobulato-pinnatifidis, stipite paleaceo-piloso. 4. In declivibus et rupium fissuris meridiem versus sitis convallium calidarum, nullibi in alpibus, (um Botzen im südl. Tyrol gemein, v. Hausmann.) Aestate. Notochlaena Marantae Desv. Journ. d. Bot. 1. 92. Spreng. syst. veg. 4. p. 43. Acrostichum Marantae L. sp. 1527. St. II. h. 6. Ceterach Marantae DeC. fl. franc. 2. p. 567. — Polystichum Marantae Roth. tent. 3. p. 92., non ad nostram plantam sed secundum locum natalem allegatum ad Woodsiam ilvensem pertinet. G.

18. ALLOSORUS (Bernhard. in Schrad. neuem Journ. v. 1. p. 2. p. 36.) Pinnulae frondis fertilis ad costam mediam usque revolutae, torulosae, soros involventes; pars reflexa in marginem membranaceum abiens, denique horizontaliter expansa lobatoque fissa. Sori primum subrotundi, sed cito confluentes sorumque continuum, ante marginem membranaceum disco impositum, constituentes.

1. **A. crispus** (Bernhard. l. c.) frondibus tripinnatis, pinnulis fertilium linearibus integris, sterilium incisis lacinulis linearibus apice bidentatis integrisve. 4. In locis saxosis alpium et reg. subalpinarum, (zerstreut in der Alpenkette, auf d. Vogesen u. Sudeten.) Aestate. Osmunda crispa L. sp. 1512. Pteris crispa All. ped. 2. p. 284. Swartz syn. filic. 101. Onoclea crispa Hoffm. D. fl. 2. 2. p. 11. St. II. h. 1. frons fructifera. Acrostichum crispum Vill. delph. 4. p. 838. Blechnum crispum Hartman. scand. fl. ed. 3. p. 255. Cryptogramma crispa R. Brown. Hook. scot. 448. Struthiopteris crispa Wallr. in comp. fl. germ. 3. p. 27.

19. STRUTHIOPTERIS (Willd. en. hort. berol. p. 1071.) Pinnae frondis fertilis ad costam mediam usque revolutae, torulosae, soros involventes; pars reflexa in marginem membranaceum abiens, denique horizontaliter expansa lobatoque fissa, relictis frustulis costae mediae adhaerentibus. Sori totum discum pinnae densissime tegentes.

1. **S. germanica** (Willd. l. c.) frondibus pinnatis; sterilibus ambitu latooblongis acuminatis basin versus angustatis, pinnis pinnatipartitis, pinnulis oblongis obtusis integerrimis, fertilibus lanceolatis, pinnis linearibus integris subteretibus denique explanatis. 4. In sylvis humidis pratis uliginosis, convallibus profundis ad rivulorum ripas, (in den Voralpen v. Bern; Kärnthen; Steyerm.; Oestr., Böhm.; Sudet.; Preussen selten; Sachs.; Oberlausitz; Harz; Nassau, Siegen.) Aestate. Osmunda Struthiopteris L. sp. 1522. Onoclea Struthiopteris Hoffm. D. fl. 2. p. 11.

DISPOSITIO

SPECIERUM GENERIS CIRSII,

TAM GENUINARUM, QUAM HYBRIDARUM,

QUAE

DITIONEM FLORAE NOSTRAE ET TERRARUM ADJACENTIUM INHABITANT,

AUCTORE

CAROLO NAEGELIO.

Confer. annotationem ad finem pag. 341 *insertam.*

A. SPECIES GENUINAE *).

Sect. I. Epitrachys DC. *Folia supra spinuloso-hirta.* Corollae limbus ad medium fidus. Pappus corolla semper brevior. Involucri foliola spina simplici terminata.

1. **C. eriophorum** (Carduus e. L. sp. 1153.) pedunculis parum elongatis foliosis arachnoideis, *foliis non decurrentibus supra spinuloso-hirtis* subtus plerumque tomentosis profunde sinuato-pinnatifidis, pinnis ad basin bipartitis, laciniis lanceolatis, nervis infra exstantibus in spinas validas exeuntibus, capitulis globosis bracteatis, bracteis foliiformibus, involucri foliolis apice recurvis vel horizontaliter patentibus, corollae limbo quam tubo breviori. ☉. Ad vias, in pascuis et locis silvaticis montanis, subalpinis et alpinis usque ad 6500′ s. m., (westl., südl. u. südöstl. Schweiz bis nach Oestreich, durch Mähren nach Böhmen, Schlesien, Thüringen u. Franken; von Elsass u. Würtemberg durch d. Rheingegenden bis Frankfurt.) Jul. Aug. Jacq. a. t. 171. Cirsium eriophorum Scop. carn. 2. p. 130. Cnicus eriophorus Roth. tent. 2. 286. Flores purpurei. — Variat: foliis subtus glabriusculis, pinnis indivisis v. bipartitis v. bipartitis et antice ad basin lobatis, apice foliolorum involucri ante spinam plus minus dilatato v. filiformi, et

a) *vulgare,* foliolis involucri arachnoideo-lanuginosis. C. eriophorum Auct.

b) *spathulatum* (Cnicus sp. Moretti pl. ital. dec. 3. p. 6.) squamis glabriusculis. Cirsium spathulatum Gaud. fl. helv. 5. p. 202.

2. **C. lanceolatum** (Carduus l. L. sp. 1149.) pedunculis parum elongatis foliosis arachnoideis, *foliis decurrentibus supra spinuloso-hirtis* plerumque sinuato-pinnatifidis pinnisque ad basin bipartitis, laciniis lanceolatis, nervis saltem ad apices loborum infra exstantibus in spinas duras exeuntibus, capitulis ovatis v. subrotundis bracteatis, bracteis foliiformibus involucro parum brevioribus, involucri foliolis in spinam longam patentem sensim angustatis, corollae limbo quam tubo breviori. ☉. Ad vias, in pascuis ruderatis locisque silvaticis usque ad 4000′ s. m. Jun.-Sept. Fl. dan. t. 1173. Cirsium lanceolatum Scop. carn. 2. p. 130. Cnicus lanceolatus Willd. sp. 3. 1666. Flores purpurei rarius carnei. — Variat: caule simplici v. ramoso, foliis parum v. penitus fere decurrentibus, foliis supra spinulis v. spinulis et pilis tectis, foliis integriusculis v. lobatis v. fere ad costam pinnatifidis pinnisque bipartitis ad basin anteriorem lobatis, laciniis lanceolatis elongatis v. brevi-

*) Methodum dispositionis specierum genuinarum atque hybridarum in Monographia hujus generis ampliori (Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik von Schleiden und Nägeli) explicabo.

bus ovato-triangularibus, pedunculis brevibus v. capitulum pluries superantibus, involucris arachnoideo-lanatis v. glabriusculis, demum

a) *vulgare*, foliis subtus parum arachnoideis profunde pinnatifidis, capitulis potius ovatis. C. lanceolatum Auct.

b) *nemorale* (C. n. Reichenbach fl. excurs. p. 286. Koch. syn. ed. 1. 392.) foliis subtus arachnoideo-tomentosis plerumque minus profunde pinnatifidis v. tantum lobatis, capitulis potius subrotundis. (Im Walde von Lindenthal bei Leipzig; Holstein, Schleswig; Schweiz, besonders in der Bergregion: Uto bei Zürich, Sihlthal, Bergthäler des Wallis.) C. lanigerum Nägeli Cirsien der Schweiz p. 113. t. III.

c) *paradoxum*, foliis lanceolato-oblongis integris spinuloso-denticulatis subtus pilosiusculis, supremis subtus tomentosis, capitulis minoribus lanatis, involucri squamis late lanceolatis in spinam brevem exeuntibus. (Bei Speier im Igelheimer Wald.) Habitus C. arvensis ut primo intuitu hybridum e C. lanceolato atque C. arvensi esse videtur. Sed characteres C. lanceolati integri adsunt neque ad illos C. arvensis aut alius speciei accedunt quomodo in C. lanceolato-palustri fit. Ceterum non modo varietatis sed etiam monstrositatis rationem exhibet quippe quum omnia organa foliacea (inde a foliis usque ad pappi radios) sunt latiora, integra et multo mitiora.

Sect. II. Chamaeleon. Folia supra non spinuloso-hirta. Corollae limbus ad medium 5 fidus. Pappus corolla semper brevior. Involucri foliola spina simplici terminata.

§. I. Folia decurrentia.

3. **C. palustre** (Carduus p. L. sp. 1151.) caule folioso, *pedunculis nullis v. brevibus* nudis tomentosis, *foliis profunde decurrentibus supra non spinuloso-hirtis* plerumque sinuato-pinnatifidis pinnisque bifidis, laciniis lanceolatis, *capitulis numerosis* parvis oblongis *racemoso-glomeratis* ebracteatis, *involucri foliolis* oblongis obtusis adpressis spinula patente brevissima molli purpurascenti v. flavescenti terminatis *carinatis*, *carina purpurea viscosa*, corollae limbo quam tubo longiori. ☉. In pratis udis, locis paludosis, in silvis caesis usque ad 4500′ s. m. Jul. Aug. Engl. bot. tab. 974. Cirsium palustre Scop. carn. 2. p. 128. Cnicus palustris Willd. sp. 3. 1662. Flores purpurei. — Variat: caule simplici apice polycephalo v. ramoso, foliis supra glabris v. pilosis subtus pilosis v. arachnoideo-tomentosis lobatis v. pinnatifidis, pinnis dentatis v. bifidis lobatisque. — Rami, qui post foenisecium e basi caulis proveniunt, sunt humiliores foliis dentatis v. integriusculis minus profunde decurrentibus, capitulis paucioribus et longius pedunculatis: C. Chailleti Gaud. fl. helv. 5. p. 182. (non Koch.) C. palustre *β.* putatum Nägeli Cirs. d. Schweiz. t. II. — C. Chailleti Koch syn. ed. 1. p. 393. hybridum est e C. arvensi et palustri: C. arvensi-palustre.

4. **C. pannonicum** (Carduus p. L. fil. suppl. p. 348.) *radicis fibris filiformibus*, caule inferne folioso superne squamis raris instructo, *pedunculis elongatis* nudis arachnoideis, *foliis breviter decurrentibus* supra non spinuloso-hirtis integerrimis spinoso-denticulatis, caulinis mediis plerumque supra basin dilatatam angustatis, *capitulis paucis* (1-3) majoribus ovatis *solitariis* ebracteatis, *involucri foliolis* oblongis *acutis* apice patentibus spinula brevissima terminatis *non viscosis*, *corollae limbo quam tubo distincte longiori.* ♃. In collibus asperis pascuisque montanis, (Böhmen, Oestreich, Kärnthen, Krain, südl. Tyrol; Littorale auf dem Monte Maggiore; ital. Schweiz auf dem Corni di Canzo.) Jun. Jul. Cirsium pannonicum Gaud. fl. helv. 6. p. 363. Carduus serratuloides Jacq. a. t. 127. (non Linn.) Cirsium serratuloides Scop. carn. 2. p. 127. Flores purpurei. — Variat: foliis utrinque pubescentibus v. supra pubescentibus infra arachnoideis v. utrinque arachnoideis supra basin angustatis v. aeque latis v. a basi aequaliter dilatatis, capitulis solitariis v. raro binis approximatis sessilibus. — Carduus serratuloides L. sp. 1155. cum cit. Gmel. fl. sib. t. 22. est planta longe diversa caule scilicet usque ad apicem folioso ramoso polycephalo ramis foliosis (secundum iconem Gmelini), foliis subamplexicaulibus capitulis bractea lanceolata fultis (secundum descriptionem Linnaei.)

5. **C. canum** (Carduus c. L. mant. p. 108.) *radicis fibris incrassatis fusiformibus fasciculatis*, caule ultra medium folioso apice subnudo, *pedunculis elongatis* nudiusculis arachnoideis, *foliis semidecurrentibus* supra non spinuloso-hirtis integris v. repando- et sinuato-pinnatifidis, pinnis triangulari-lanceolatis integris v. dentatis, *capitulis paucis* majoribus ovatis *solitariis* ebracteatis, *involucri foliolis* ex ovata basi lanceolatis *obtusiusculis* adpressis subito in spinulam brevissimam patentem acuminatis *non viscosis*, *corollae limbo quam tubo paulo breviori v. eum aequante.* ♃. In pratis fertilibus humidis, (Oestreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.) Jul. Aug. Jacq. a. t. 42. et 43. Carduus tuberosus Jacq. en. stirp. agr. vindob. p. 280. Cirsium canum M. Bieberst. suppl. n. 1657. (non All.) Flores purpurei. — Variat: caule simplici monocephalo v. superne ramoso, foliis pubescentibus v. glabris v. subtus arachnoideis, involucro glabro v. subarachnoideo. — A C. pannonico praeterea differt: foliis supra basin non angustatis, capitulis majoribus, involucri foliolis parabolicis (non aequaliter angustatis), corollis longioribus gracilioribus.

§. 2. Folia non decurrentia.

6. **C. bulbosum**, *radicis fibris incrassatis fusiformibus*, caule inferne v. toto folioso, *pedunculis* elongatis *nudiusculis arachnoideis*, *foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis *subtus arachnoideis semi-amplexicaulibus* plerumque sinuato-dentatis v. sinuato-pinnatifidis, pinnis ovatis 3-4 fidis, laciniis lanceolatis, *capitulis paucis* ventricosis *solitariis* ebracteatis, involucri foliolis oblongis obtusiusculis subito in spinulam brevissimam acuminatis ecarinatis arachnoideis, *corollae limbo quam tubo longiori.* ♃. In pratis subhumidis, in nemorosis montanis, (nördliche Schweiz v. Zürich bis Basel, Baden u. Elsass bis Mainz, im Maingebiete bis Würzburg, Thüringen, Harz.) Jul. Aug. *Flores purpurei*, raro dilute carnei. — Variat: caule humili monocephalo v. elato ramoso polycephalo, foliis supra pubescentibus v. glabris v. parum arachnoideis subtus pilosis ad costas arachnoideis v. ubique arachnoideo-lanatis integris spinoso-denticulatis v. dentatis v. profunde pinnatifidis, pinnarum laciniis ovatis v. oblongis v. lanceolato-linearibus, involucri squamis adpressis v. superne patentibus, demum

a) *vulgare*, caule a medio aphyllo 1-3 cephalo, foliis mitioribus. Carduus tuberosus Poll. pal. 2. 420. et plur. auct. germ. C. tuberosus var. *β.* L. sp. 1154. Cirsium tuberosum All. ped. 1. p. 151. Cnicus tuberosus Willd. sp. 3. 1680. Engl. bot. t. 2562. C. spurius Hoffm. fl. germ. ed. 2. v. 2. p. 128. Cirsium bulbosum DC. fl. fr. 4. p. 118. Koch syn. ed. 1. p. 399.

b) *ramosum* (Nägeli Cirs. d. Schw. p. 73.) caule alto ramoso poly- (6-15) cephalo ramisque foliosis, foliis magis spinosis majoribus dorso subarachnoideo-villosis. (Zürich am Uto.)

c) *anglicum* (Lobel. icon. t. 583. f. 1. Koch. syn. ed. 1. 399.) caule plerumque simplici monocephalo, foliis integris v. lobatis, caulinis paucis supra basin dilatatam angustatis, involucri foliolis oblongo-lanceolatis magis acutis. (Stockach u. Zizenhausen in Oberbaden, nach Gmelin; Obersteyermark, nach Host.) Carduus anglicus Lam. dict. 1. p. 705. C. pratensis Huds. angl. p. 353., non Lam. C. dissectus Huds. fl. angl. ed. 1. 307. Vill. delph. 3. p. 15., non Linn. Cnicus pratensis Willd. sp. 3. 1672. (non Cirsium pratense DC. fl. fr. 4. p. 113. quod idem cum var. *α.* Cardui tuberosi L. sp. 1154., in ditione florae nostrae nondum repertum est). — C. bulbosum et C. anglicum in unam speciem combinavi quia characteres differentiales desunt, nam C. bulbosum subinde foliis tantum dentatis et supra basin paulum angustatis, necnon C. anglicum foliis profundius pinnatifidis supra basin non angustatis, pinnis 2-3 lobis reperitur.

7. **C. rivulare** (Carduus r. Jacq. austr. 1. p. 57. t. 91. 1773.) radicis fibris filiformibus, caule inferne folioso superne nudiusculo, *pedunculis* nullis v. brevibus *nudis arachnoideis*, *foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis subpubescentibus *nec subtus arachnoideis auriculato-amplexicauli-*

bus denticulatis v. subsinuato-pinnatifidis, pinnis nonnisi dentatis, *capitulis paucis subcongestis* ebracteatis, involucri foliolis oblongo-triangularibus subacutis in spinulam brevissimam mollem coloratam terminatis ecarinatis glabriusculis purpurascentibus, *corollae limbo quam tubo longiori.* 4. In pratis humidis montium et alpium usque ad 4500′ s. m. atque planitierum alpes comitantium, (durch die ganze Alpenkette, sodann in Oberschwaben, Oberbayern, Mähren, Schlesien, Böhmen u. um Königsberg in Preussen.) Jun. Jul. Cirsium tricephalodes Lam. dict. 1. 704. C. carniolicum All. ped. 1. p. 149., excl. syn. Scop. Carduus Erisithales Vill. delph. 3. p. 20. Cnicus rivularis Willd. sp. 3. p. 1676. *Flores purpurei.* — Variat: caule simplici 1-4 cephalo, capitulis congestis sessilibus et pedunculatis solitariis, (haec ultima forma est Cnicus salisburgensis Willd. sp. 3. 1675.) v. caule alto ramoso 8-12 cephalo, capitulis in apice caulis congestis inque ramis solitariis (C. r. Var. heteropus Nägeli C. d. Schweiz p. 81.), foliis supra pubescentibus v. glabris subtus totis v. ad nervos tantum pubescentibus integris v. pinnatifidis, pinnis oblongis v. raro lanceolato-linearibus integris v. dentatis, involucri foliolis appressis v. apice breviter patentibus.

8. **C. heterophyllum** (Carduus h. L. sp. 1154.) radicis fibris filiformibus, caule folioso apice nudiusculo, *pedunculis* subbrevibus *nudis arachnoideis, foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis *supra glabris subtus niveo-tomentosis cordato-amplexicaulibus* integris v. intermediis antice acute incisis, pinnis integris lanceolato-linearibus antrorsum versis, capitulis paucis solitariis v. subcongestis ebracteatis ventricosis, involucri foliolis oblongis obtusiusculis in spinulam brevissimam acuminatis ecarinatis glabris, *corollae limbo tubum subaequante vel paulo breviore.* 4. In pratis humidis, ad rivulos inque silvis regionis montanae et subalpinae, (durch die ganze Alpenkette, 4000—6000′ s. m.; sodann in Oberbaden, Oberbayern, Mähren, Schlesien, Böhmen.) Jun. Jul. *Flores purpurei.* Cirsium heterophyllum All. ped. 1. p. 152. t. 34. Cnicus heterophyllus Willd. sp. 3. 1673. — Variat: caule simplici v. ramoso, 1-6 cephalo, capitulis sessilibus v. longius pedunculatis solitariis, foliis subtus niveis v. leviter arachnoideis, involucri foliolis adpressis v. apice breviter patentibus. Specimina foliis omnibus integris sunt: Cirsium helenioides All. ped. 1. p. 152. t. 13. Carduus helenioides Sut. helv. 2. p. 163., non Linn. — Carduus helenioides L. secundum cl. Smith differt „caule duplo altiori, floribus in summo caule sessilibus, quatuor pluribusve, duploque minoribus.“

9. **C. acaule** (Carduus a. L. sp. 1156.) radicis fibris filiformibus, *caule et pedunculo saepe nullis v. parum elatis foliosis* villosis v. pubescentibus *non arachnoideis, foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis subpubescentibus *nec arachnoideis exauriculatis* lobatis v. sinuato-pinnatifidis, pinnis ovatis angulato-3-4 fidis, laciniis ovatis, capitulis paucis cylindricis bracteatis, bracteis foliiformibus, *involucri foliolis* ovatis adpressis obtusis subito in spinulam brevissimam patentem acuminatis ecarinatis *glabris, corollae limbo quam tubo breviori.* 4. In pratis pascuisque montium et alpium usque ad 7000′ s. m., (durch das ganze Gebiet.) Jul. Aug. Jacq. ic. rar. t. 579. Cirsium acaule All. ped. 1. p. 153. Cnicus acaulis Willd. sp. 1681. St. h. 24. *Flores purpurei*, raro dilute carnei. — Variat: acaule v. caulescens pedale, monocephalum v. rarius 2-4 cephalum, capitulis in radice v. in apice caulis ramorumque solitariis v. in radice congestis, foliis supra glabris v. pilosis subtus ad nervos v. ubique pilosis lobatis v. profunde pinnatifidis, pinnis discretis v. invicem se tegentibus dentatis v. lobato-incisis dentatisque. — Varietas caulescens pedalis est: Cnicus dubius Willd. prodr. n. 801. t. 6. f. 11. Carduus Roseni Vill. delph. 3. 14. t. 21. Specimina acaulia plerumque pleiocephala pinnis foliorum magis numerosis fere imbricatis subcrispis valde spinosis sunt: Cirsium gregarium Boiss. DC. Pr. VII. 305. (Alpen des Wallis an sonnigen, dürren Stellen).

10. **C. Erisithales** (Cnicus E. L. sp. 1157.) caule folioso superne nudiusculo, *pedunculis* breviusculis *subnudis dense pubescentibus*, foliis non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis utrinque pubescentibus (non arachnoi-

deis) auriculato-amplexicaulibus profunde subsinuato-pinnatifidis, pinnis horizontaliter subrecurvis lanceolato-oblongis dentatis, *capitulis subcongestis nutantibus* ebracteatis subrotundis, *involucri foliolis* oblongo-lanceolatis spinula brevissima terminatis *viscoso-carinatis pubescentibus* non arachnoideis a medio horizontaliter patentibus, corollae limbo quam tubo longiori. 4. In montium nemorosis rupestribus, (Schweiz; im Jura und am Südabhang der Alpen 2000—4000′; durch die übrige Alpenkette und in Oberbaden.) Carduus Erisithales Jacq. a. t. 310. Lam. dict. 1. 704. Cirsium Erisithales Scop. carn. 2. p. 125. C. glutinosum Lam. fl. fr. 2. 27. DC. fl. fr. suppl. p. 464. C. ochroleucum *α.* DC. fl. fr. 4. p. 115. Rchb. fl. exc. 1923. *Flores citrini.* — Variat: caule simplici oligo- (2-5) cephalo v. ramoso poly- (10-15) cephalo, capitulis solitariis v. congestis et fere sessilibus. — C. ochroleucum All. ped. 1. p. 150. secundum descriptionem est Cirsium ab omnibus hucusque a me visis diversum. In herbario Candolleano sub hoc nomine specimina C. Erisithalis atque Cirsii e rivulari et oleraceo hybridi consociata sunt. In Koch. Syn. ed. 1. p. 396. planta culta descripta est, quae mihi saltem hybrida videtur e C. Erisithali et e C. oleraceo-cano v. C. oleraceo-acauli. Hybridum e C. palustri-oleraceo et C. Erisithali quod in horto turicensi sponte ortum, C. [palustri-oleraceo]-Erisithales, cum diagnosi Kochiana congruit non vero cum exemplari idem est. — Planta Allionii habet caulem continuo-foliosum folia inferius ex brevi hirsutie *albicantia,* pinnas dentatas dentibus utrinque 2 aut 3 majoribus, foliolum unum aut alterum non pinnatum lanceolatum capitulo subjectum, capitula 4 aut 5 subsessilia, involucrum viscidum ex subrotundo-conicum, foliola lanceolata in fine paululum reflexa ex viridi lutea.

11. **C. carniolicum** (Scop. carn. 2. p. 128. t. 54.) caule folioso cum pedunculis brevibus bracteatis villoso-tomentoso, pilis rufescentibus, foliis non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis utrinque pubescentibus *(non arachnoideis)* auriculato amplexicaulibus, inferioribus petiolatis *basi rotundatis* integris v. acute pinnatifidis, pinnis ovatis dentatis, superioribus sessilibus basi cordatis, *capitulis* paucis congestis *erectis bracteatis,* bracteis linearibus spinoso-ciliatis, *involucri foliolis* lanceolatis sensim in spinulam brevem attenuatis *ecarinatis pubescentibus* (non arachnoideis) superne patentibus, *exterioribus margine spinosis,* corollae limbo quam tubo longiori. 4. In locis rupestribus alpium, (Kärnthen, Krain, Oberöstreich.) Jul. Aug. C. rufescens Ram. ap. DC. fl. fr. 4. p. 114. *Flores ochroleuci.*

12. **C. spinosissimum** (Cnicus sp. L. sp. 1157.) caule usque ad apicem folioso, *pedunculis nullis v. brevissimis* arachnoideis, *foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis utrinque *subpilosis (non arachnoideis)* basi auriculatis valde spinosis nervis ante spinam infra exstantibus sinuato-pinnatifidis, pinnis ovatis angulato-trifidis, laciniis triangularibus, *capitulis congestis bracteatis, bracteis* capitula superantibus oblongo-linearibus *decoloratis spinoso-laciniatis, involucri foliolis* lanceolato-linearibus ecarinatis *glabris in spinam ceteram squamam aequantem duram patentem sensim attenuatis,* corollae limbo quam tubo longiori. 4. In pascuis, ad rivulos inque glareosis alpium 4000—8000′. s. m., (Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen, Steyermark, Krain.) Jul. Aug. Cirsium spinosissimum Scop. carn. 2. p. 129. *Flores ochroleuci.* — Variat: acaule (in summis Alpibus) v. caule simplici v. caule elato ramoso, capitulis in apice caulis ramorumque aggregatis (C. sp. Var. ramosum Nägeli Cirs. d. Schweiz p. 97.), foliis supra glabris v. sparsim pilosis subtus ad nervos pubescentibus v. villosis.

13. **C. oleraceum** (Cnicus o. L. sp. 1156.) caule usque ad apicem folioso, pedunculis nullis v. brevibus arachnoideis, *foliis* non decurrentibus supra non spinuloso-hirtis *subglabris (non arachnoideis)* amplexicaulibus integris v. pinnatifidis, pinnis oblongo-lanceolatis dentatis, *capitulis congestis bracteatis* cylindricis, *bracteis capitula superantibus ovatis v. oblongis decoloratis integriusculis, involucri foliolis* lanceolatis *albo-carinatis in spinam squama triplo breviorem mollem* patentem *sensim attenuatis,* corollae limbo quam tubo longiori. 4. In pratis humidis, ad fossas, in silvis caesis usque ad

5000′ s. m. Cirsium oleraceum Scop. carn. 2. 124. Carduus acanthifolius Lam. enc. 1. pag. 703. *Flores ochroleuci.* — Variat.: capitulis sessilibus v. pedunculatis, foliis supra glabris v. sparsim pubescentibus basi auriculatis v. cordatis.

Sect. III. Breea Lessing. Synops. compos. p. 10. Cephalonoplos. DC. Prodr. VI. p. 643. Folia supra non spinuloso-hirta. *Corollae limbus usque ad basin 5 partitus. Pappus corolla demum longior.* Involucri foliola spina simplici terminata.

14. **C. arvense** (Serratula L. sp. 1149.) caule folioso ramis inferioribus brevibus foliosis sterilibus, pedunculis breviusculis nudis arachnoideis, foliis subdecurrentibus supra non spinuloso-hirtis glabriusculis v. subtus arachnoideis, integriusculis v. sinuato-pinnatifidis, pinnis subdentatis, *capitulis abortu dioecis ebracteatis* cylindricis paniculato-corymbosis, *involucri foliolis adpressis* subarachnoideis *ecarinatis* in spinulam brevissimam patentem acuminatis, *pappo molli fragili* sordide albido *corolla demum tertia parte longiori, corollae limbo ad basin usque 5 partito quam tubo parum v. multo breviori, filamentis glabriusculis.* 4. In agris, locis cultis, ruderatis, ad vias in silvis caesis usque ad 5000′ s. m. Cirsium arvense Scop. carn. 2. p. 126. *Flores dilute purpurei*, raro albidi. — Variat: caule superne glabro v. arachnoideo, pedunculis incanis v. albo-tomentosis fere nullis v. subelongatis, foliis brevissime v. penitus decurrentibus supra glabris v. leviter arachnoideis subtus glabris v. niveo-tomentosis planis v. undulatis et crispatis, spinis longis durisque v. brevibus mitibus, involucri foliolis virescentibus v. purpureis, inferioribus tantum v. etiam mediis apice spinosis. — Specimina foliis integris planis: C. setosum M. Bieb. tauric. cauc. 3. p. 561. Cnicus setosus Bess. cat. h. cremenec. 1816. Serratula setosa Willd. sp. 3. p. 1645. Eadem foliis sublobatis: Serratula complicata Schweigg. in Hag. chlor. bor. p. 303. Specimina foliis subtus tomentosis: C. argenteum Vest., sec. Maly fl. styr. p. 73. C. incanum Fisch. cat. h. gor. 1812. (Sunt C. arvensis specimina germanica quae a planta caucasica non differunt).

Sect. IV. Picnomon (Lob. ic. 2. t. 14. f. 2.) Folia supra non spinuloso-hirta. Corollae limbus non usque ad medium 5 fidus. Pappus corolla semper brevior. *Involucri foliola in appendicem pinnato-spinosam acuminata.*

15. **C. Acarna** (Cnicus A. L. sp. 1158.) caule ad apicem folioso, foliis penitus decurrentibus supra non spinuloso-hirtis, utrinque arachnoideis remote dentatis v. pinnatifidis, pinnis bifidis, laciniis ovato-triangularibus, capitulis in apice ramorum aggregatis bracteatis, bracteis lanceolatis spinoso-dentatis capitulum superantibus, *involucri foliolis arachnoideo-intertextis foliaceis in appendicem subulatam pinnato-spinosam reflexam acuminatis,* pappo molli multiseriali corolla breviori, corollae limbo non usque medium 5 fido quam tubo paulo breviori. ⊙. In sterilibus apricis, (Istrien). Jul. Aug. Cirsium Acarna DC. fl. fr. 4. p. 111. Picnomon Acarna Cass. dict. sc. nat. v. 25. p. 225. Flores purpurei.

B. SPECIES HYBRIDAE*).

§. 1. *Folia supra spinuloso-hirta.* Involucri foliola spina simplici terminata.

16. (2 + 3.) **C. e lanceolato et palustri.** In locis silvaticis inter parentes, (Zürich!, bei Lausa in Sachsen nach Reichenbach).

C. lanceolato-palustre (Nägeli Cirs. d. Schweiz p. 158. t. VIII.) caule folioso (ramoso) subarachnoideo, pedunculis breviusculis minute bracteatis,

*) Cirsia omnia, quae sequuntur sunt hybrida. Secundum parentes disposui; atque ubi genesis certa erat, nomen compositum dedi ita ut ambarum specierum, altera quae pollen praebuit primum, altera quae semen genuit secundum, in verbo copulato locum teneret. In diagnosi conficienda atque in characteribus notandis praecipue parentes respexi. Ceterum quod attinet ad rationes et argumenta hujus methodi ad tractatum supra dictum (Zeitschrift für wissenschaftl. Bot.) relego.

foliis profunde decurrentibus *supra spinulis parcioribus minutis* pilisque brevibus tecta (subtus arachnoideis) sinuato-pinnatifidis, pinnis bifidis, laciniis lanceolatis, capitulis ovatis subracemosis subebracteatis, *bracteis lanceolatis basi spinoso-denticulatis involucro multo brevioribus, involucri foliolis in spinam* patentem *subinermem gracilem flavescentem* squama ipsa quintuplo breviorem *sensim angustatis vix viscose carinatis*, corollae limbo quam tubo paulo longiore vel eum aequante. ☉. (Zürich am Uto unter den Eltern!) Flores purpurei. — Folia magis C. palustre referunt, spinis minoribus gracilibus, nervis ante spinas subtus parum exstantibus, laciniis apice purpurascentibus; bracteae intermediae; capitula etiam media potius tamen ad C. lanceolatum accedunt.

17. (2 + 9.) **C. e lanceolato et acauli.**

C. lanceolato-acaule *caule* humili usque ad apicem folioso *villoso*, pedunculis breviusculis foliosis subarachnoideo-villosis, *foliis breviter decurrentibus* supra puberulis et *spinulis raris obsitis* subtus pilosis valde spinosis sinuato-pinnatifidis, *pinnis ovatis trifidis, laciniis oblongis,* capitulis paucis (5) ovatis bracteatis, bracteis foliiformibus involucro parum brevioribus, involucri foliolis glabriusculis *ex oblongo brevius acuminatis superne patentibus in spinam brevem attenuatis,* corollae limbo quam tubo breviore. ♃? (bei Chambéry in Savoien.) Flores purpurei. — Folia C. acaulis sed paulo decurrentia, supra sparsim spinulosa, magis spinosa, apice producto; capitula C. lanceolati, sed foliola in acumen brevius spinamque minorem exeunt; corollae longae graciles ut in C. lanceolato. Etsi de loco natali hujus plantae nil scio, characteres tam manifeste parentes indicant ut sine minima dubitatione nominari possit.

§. 2. *Folia supra non spinuloso-hirta, plus minus decurrentia.* Involucri foliola spina simplici terminata.

18. (3 + 6.) **C. e palustri et bulboso.** Cnicus palustri-tuberosus Schiede de pl. hybr. 56. Cirsium semidecurrens (Richter) Reichenbach fl. excurs. 1920. C. palustri-bulbosum DC. Pr. VI. 646. C. Kocheanum Löhr Flora 1842. 7. C. laciniatum Doell Rheinische Flora p. 508. In pratis humidis inter parentes, (Zürich!, Elsass, Rheinpfalz!, Bayern.)

I. **C. palustri-bulbosum** (Nägeli C. d. Schw. p. 154.) *radicis fibris subincrassatis*, caule inferne densius superne remotius et minute folioso, pedunculis subelongatis nudis tomentosis, *foliis vix ad medium decurrentibus* subspinosis sinuato-pinnatifidis, pinnis oblongis 2-3 fidis, laciniis lanceolatis, *capitulis mediocriter numerosis* (6-15) *parvis oblongis* ebracteatis *subsolitariis, involucri foliolis* oblongis obtusiusculis adpressis spinula patente brevissima inermi terminatis *leviter viscoso-carinatis,* corollae limbo quam tubo longiore. ♃. (Zürich am Uto unter den Eltern!, bei Deidesheim in der Rheinpfalz!) Flores purpurei. — Radix fasciculata, rhizoma perenne, folia et ramificatio potius sunt C. bulbosi, capitula (parum majora) C. palustris. Folia supra pubescentia, subtus pilosiuscula v. arachnoidea.

B. recedens (*ad C. bulbosum*) radicis fibris magis incrassatis, pedunculis valde elongatis, *foliis breviter decurrentibus* minus spinosis, *capitulis paucis* (2-3) majoribus *ventricosis* solitariis, *involucri foliolis ecarinatis.* — A C. bulboso, quocum valde congruit, praesertim foliis breviter decurrentibus differt. (Zürich!, Deidesheim!).

? II. **C. bulboso-palustre** radice?, caule inferne folioso superne nudiusculo, pedunculis subelongatis nudis tomentosis, *foliis profunde decurrentibus* subtus arachnoideis spinosis sinuato-pinnatifidis, pinnis oblongo-lanceolatis 2-3 fidis, laciniis lanceolato-linearibus, *capitulis mediocriter numerosis* (8-16) *magnis ventricosis* ebracteatis *subsolitariis, involucri foliolis* oblongis obtusiusculis adpressis spinula patenti brevissima terminatis *non viscosis*, corollae limbo quam tubo longiore. ☉? (Zürich am Uto unter den Eltern!) Flores purpurei. — Folia C. palustris, inflorescentia intermedia, capitula C. bulbosi. Num vere e semine C. palustris a C. bulboso foecundati ortum sit, ulterius inquirendum.

19. C. 3 + 7.) **C. e palustri et rivulari.** Cnicus palustri-rivularis Schiede de pl. hybr. 54. Cirsium palustri-rivulare Nägeli C. d. Schw. p. 155. C. subalpinum Gaud. fl. helv. V. p. 182. (excl. Var. *β.* Koch. Syn. ed. 1. p. 393. In pratis humidis cum parentibus, Schweiz, Süddeutschland von Bregenz bis ins Breisgau).

I. **C. palustri-rivulare** caule fere ad apicem (superne et remotius et minute) folioso, inferne interrupte alato superne fere exalato, pedunculus brevibus nudis tomentosis, *foliis vix ad medium* (*superioribus breviter*) *decurrentibus* utrinque pubescentibus parum spinosis subsinuato-pinnatifidis, *pinnis* oblongis *dentatis v. lobato-dentatis, capitulis mediocriter numerosis* (6-12) *parvis* ebracteatis *subcongestis, involucri foliolis* oblongis obtusiusculis adpressis in spinulam brevissimam mollem patentem terminatis purpurascentibus *leviter viscoso-carinatis,* corollae limbo quam tubo longiore. ♃. (Schweiz in der Vallée de Toux und im Sihlthal mit den Eltern!) Rhizoma perenne et folia magis C. rivularis, capitula C. palustris, inflorescentia media sed secundae speciei similior.

B. recedens (*ad C. rivulare*) (Nägeli C. d. Schw. p. 157.) caule superne nudiusculo, *foliis breviter decurrentibus* minus spinosis acutius incisis, pinnis dentatis, *capitulis paucis* (2-4) majoribus, *involucri foliolis non viscosis.* — A C. rivulari praesertim foliis breviter decurrentibus differt. Capitula iis C. rivularis similia ut in hac specie variant sessilia et pedunculata; folia subinde integra. (Schweiz in der Vallée de Toux und im Sihlthal!). — Haec forma praecipue, vulgatius quam ceteris occurrens, C. subalpinum dicta.

II. **C. rivulari-palustre** caule fere ad apicem (superne remotius) folioso, inferne fere omnino superne interrupte alato, pedunculus breviusculis nudis tomentosis, *foliis profunde* (*superioribus ad medium*) *decurrentibus* supra pubescentibus subtus plerumque leviter arachnoideis spinosis sinuato-pinnatifidis, *pinnis plerumque bifidis,* laciniis lanceolatis, *capitulis mediocriter numerosis* (6-12) *majoribus* ebracteatis *subcongestis, involucri foliolis* oblongo-triangularibus subacutis in spinulam brevissimam mollem patentem terminatis *non viscosis* purpurascentibus, corollae limbo quam tubo longiore. ☉? (Schweiz im Sihlthal mit den Eltern!) Flores purpurei. — Folia et alae (crispae spinosae) C. palustris, capitula C. rivularis, inflorescentia media sed secundae specie similior. — In ramis autumnalibus speciminum putatorum folia magis integra minusque decurrentia ut in C. palustri putato.

20. (3 + 9) **C. e palustri et acauli.** C. Kirschlegeri C. H. Schultz in litt. In pascuis humidis cum parentibus (bei Blankenburg im Harz, bei Strassburg). — Hujus speciei hybridae nonnisi specimen unicum, idque recedens ad C. acaule vidi.

C. palustri-acaule (Hampe Prodr. fl. hercyn. p. 48).

B. recedens (*ad C. acaule*) (Nägeli Cirs. d. Schw. p. 165.) *caule brevi* (dicephalo), *pedunculis foliosis* arachnoideo-villosis, *apice tomentosis, foliis breviter decurrentibus* utrinque sparsim pilosis (*non arachnoideis*) sinuato-pinnatifidis, pinnis ovatis 2-3 lobatis, *capitulis paucis* (2) *majoribus* solitariis oblongis *bracteatis, bracteis linearibus involucrum subaequantibus,* involucri foliolis ovato-oblongis adpressis obtusis (apice fusco-purpurascentibus) margine leviter arachnoideis in spinulam brevissimam patentem terminatis, *corollae limbo tubum aequante.* ♃. (bei Blankenburg!) Flores purpurei. — Differt a C. acaule: foliis breviter decurrentibus, spinis gracilioribus in basi foliorum magis numerosis, pedunculo arachnoideo, capitulis bracteisque paulo minoribus, corollae tubo limbum aequante.

21. (3 + 10.) **C. e palustri et Erisithali.**

C. palustri-Erisithales caule folioso ramoso apice nudiusculo, inferne interrupte alato superne fere exalato, *pedunculis* brevibus nudis *arachnoideo-pubescentibus, foliis ad medium* (*superioribus breviter*) *decurrentibus* subpubescentibus (superioribus subtus leviter arachnoideis) subspinosis profunde sinuato-pinnatifidis, *pinnis horizontalibus oblongo-lanceolatis dentatis v. lo-*

batis, *capitulis numerosis parvis ovatis erectis* ebracteatis *in apice caulis et ramorum racemoso-glomeratis*, involucri foliolis oblongo-elongatis obtusiusculis superne coloratis pubescentibus (non arachnoideis) viscoso-carinatis in spinulam brevissimam mollem patentem terminatis, corollae limbo quam tubo longiori. ♃. In horto turicensi inter parentes sponte enatum. Jul. Aug. *Flores purpurei.* — Rhizoma (perenne), caulis et folia praeterquam decurrunt magisque spinosa sunt, simillima iis C. Erisithalis; inflorescentia intermedia; capitula C. palustris sed paulo majora et latiora, involucri foliola longiora et apice subpatentia. — Modus, in quem haec planta apparuit, haud dubium relinquit quod semen a C. Erisithali, foecundato a C. palustri, provenerit.

22. (3 + 13.) **C. e palustri et oleraceo.** Cnicus palustri-oleraceus Schiede de pl. hybr. p. 63. Cirsium hybridum Koch ap. DC. fl. fr. 5. p. 463. Koch Syn. ed. 1. p. 394. Cnicus lacteus Schleich. exsic. Cirsium subalpinum *β.* lacteum Gaud. fl. helv. 5. p. 183. C. lacteum Koch Syn. ed. 1. p. 394. Cnicus parviflorus Heller Wirc. supl. 76. Cirsium parviflorum DC. Pr. VI. p. 647. Cnicus nudiflorus Schl. exsic. Cirsium subalatum Thom. exsic. (non Gaud.) C. oleraceo-palustre Nägeli C. d. Schw. p. 148. — In pratis humidis, locis paludosis, in silvis caesis cum parentibus, (durch Deutschland und die Schweiz hin und wieder.)

C. palustri-oleraceum caule folioso v. in summo apice nudiusculo, inferne interrupte alato superne fere exalato, pedunculis nullis v. brevibus nudiusculis tomentosis, *foliis ad medium* (*superioribus breviter*) *decurrentibus* subpubescentibus v. subtus leviter arachnoideis integriusculis v. subsinuato-pinnatifidis, *pinnis* oblongis v. oblongo-lanceolatis *dentatis* v. rarius bifidis, *capitulis numerosis parvis* in apice caulis ramorumque glomeratis *subbracteatis*, *bracteis lanceolatis capitula fere aequantibus v. linearibus brevioribus*, *involucri foliolis* oblongo-elongatis apice brevius patentibus in spinulam brevem mollem terminatis superne coloratis *dorso subviscosis* margine leviter arachnoideis, corollae limbo quam tubo longiore. ♃. *Flores ochroleuci v. lactei dilute in rubellum vergentes*, stylis purpureis. — Rhizoma (perenne) caulem et folia a C. oleraceo, inflorescentiam et bracteas intermedias, capitula a C. palustri habet; sed folia magis fissa magisque spinosa quam in C. oleraceo, capitula paulo majora et foliola paulo longiora sunt quam in C. palustri.

B. recedens (*ad C. oleraceum*) caule usque ad apicem folioso; *foliis subamplexicaulibus breviter decurrentibus* subglabris (non arachnoideis), *capitulis* minus numerosis majoribus *bracteatis*, *bracteis oblongo-lanceolatis v. oblongis subdecoloratis* capitula aequantibus v. superantibus, involucri foliolis magis elongatis non viscosis. ♃. Flores ochroleuci, stylis purpureis. — A C. oleraceo adhuc differt: foliis decurrentibus, bracteis et capitulis minoribus, et involucri foliolis minus carinatis in spinulam breviorem tenuiorem terminatis. — C. oleraceo-palustre d. frigido-glomeratum Nägeli Cirs. d. Schw. t. VI. est forma subrecedens.

Variat haec species hybrida ut parentes ejus: caule simplici v. ramoso, foliis profunde pinnatifidis v. integris supra glabris v. pubescentibus, capitulis sessilibus v. breviter pedunculatis. — In ramis post foenisecium exortis folia sunt integra v. lobata parum decurrentia et capitula minora longiusque pedunculata. — Plerique Auct. hanc speciem in duas dividunt: in C. hybridum atque C. lacteum, v. in C. hybridum atque C. parviflorum, v. in C. palustri-oleraceum et C. oleraceo-palustre etc. Omnium autem speciminum quae vidi, pauciora ad merum C. palustri-oleraceum plura ad formas recedentes referenda erant, nulla inveni quae folia et radicem C. palustris, capitula C. oleracei haberent indeque C. oleraceo-palustre constituerent. C. lacteum Schleich. quod Koch Syn. ed. 1. p. 394. hybridum e C. palustri e C. Erisithali conjicit, a C. palustri-oleraceo non nisi varietatis ratione sed a *C. palustri-Erisithali* plane differt.

23. (3 + 14.) **C. e palustri et arvensi.**

C. arvensi-palustre caule folioso (superne nudiusculo), pedunculis brevibus nudis arachnoideo-tomentosis, *foliis profunde decurrentibus* glabriu-

sculis, basi alisque sinuato-lobatis, superioribus remotis parum decurrentibus, *capitulis* ebracteatis cylindricis *in apice caulis glomeratis*, involucri foliolis adpressis subarachnoideis ecarinatis in spinulam flavescentem patentem terminatis, pappo? *corollae limbo ad* $^3/_4$ *vel ultra* 5 *partito*, filamentis pilosiusculis ☉? (in sumpfigen Wiesen zwischen Bruck und Batrandorf unweit Wien.) Aug. C. Chailleti Koch Syn. ed. 1. p. 393. (non Gaudin.) C. pannonico-palustre Koch Taschenbuch p. 291. Flores purpurei. — Etsi de parentibus in loco natali nil notum, ex characteribus cognosci possunt; nam folia profunde decurrentia, alarum conformatio et inflorescentia C. palustre, capitula autem, praesertim corollae profundius quinque-fidae graciliori et longiori tubo instructae C. arvense indicant. Ceterum specimen unicum quod vidi ex collectione cl. Alex. Braun, forma putata esse videtur itaque inter C. arvense et C. palustre putatum (C. Chailleti Gaud.) intermedium.

24. (4 + 9.) **C. e pannonico et acauli.**

C. pannonico-acaule *caule parum elato folioso, pedunculis* elongatis (caulem aequantibus) *nudiusculis arachnoideis, foliis brevissime decurrentibus* glabris v. sparsim pubescentibus (non arachnoideis) *subsinuato-pinnatifidis, pinnis ovatis* 2-3 *lobis* lobis brevibus ovatis v. oblongis, *capitulis* paucis (1-2) solitariis *ebracteatis, involucri foliolis oblongis acutiusculis* vix arachnoideis spinula brevissima terminatis, *corollae limbo quam tubo paulo longiori.* ♃. Locis incultis, (Gottsche in Unterkrain.) C. Freyerianum Koch Taschenbuch p. 228. Flores purpurei. — Folia C. acaulis sed glauca, pedunculi inter C. acaule caulescens et C. pannonicum medii, capitula involucri foliola et flores C. pannonici sed paulo majores. — Nescio an hoc Cirsium vere in C. acaulis et C. pannonici consortis inventum sit; sed ex characteribus si conjicere licet, parentes facillime sese indicant.

25. (4 + 10.) **C. e pannonico et Erisithali.** Carduus tenuifolius? Thom. exsic. Cirsium Erisithali-pannonicum Heer in lit. In silvaticis montanis inter parentes, (Corni di Canzo in der ital. Schweiz.)

C. pannonico-Erisithales caule inferne folioso superne nudiusculo fere exalato, *pedunculis* subelongatis v. rarius breviusculis nudis *arachnoideis, foliis subamplexicaulibus breviter decurrentibus* utrinque pubescentibus v. subtus leviter arachnoideis *subsinuato-pinnatifidis, pinnis horizontalibus v. paulo antrorsum versis oblongis dentatis, capitulis paucis* (2-3) late ovatis ebracteatis *erectis, involucri foliolis* oblongis acutis apice erecto-patentibus *leviter viscosis* spinula brevissima terminatis, corollae limbo quam tubo longiori. ♃. *Flores purpurei.* — Folia potius C. Erisithalis, inflorescentia involucrum et flores magis sunt C. pannonici.

B. recedens (*ad C. Erisithalem*) foliis auriculato-amplexicaulibus vix decurrentibus *capitulis* paulo majoribus *subrotundis subnutantibus, involucri foliolis* magis elongatis *dorso viscosis* superne *arcuato-patentibus.* ♃. Flores rubelli v. purpurei. — A C. Erisithali adhuc differt foliis subdecurrentibus et florum colore.

26. (5 + 13.) **C. e cano et oleraceo.** Carduus tataricus L. sp. 1155. Jacq. a. t. 92. Cnicus tataricus Bess. fl. gal. 2. p. 171. Cirsium tataricum Wimm. et Grab. fl. siles. 2. p. 96. (non All.) Koch Syn. ed. 1. 394. C. cano-oleraceum Rchb. fl. exc. 1927. In pratis humidis inter parentes, (Oestreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.)

C. cano-oleraceum *radicis fibris filiformibus*, caule inferne densius superne remotius folioso *pedunculis subelongatis minute foliosis* arachnoideis, *foliis subamplexicaulibus breviter* (superioribus vix) *decurrentibus* glabriusculis v. subtus leviter arachnoideis integris v. sinuato-pinnatifidis, pinnis dentatis, *capitulis paucis* (1-5) *solitariis* v. subapproximatis *bracteatis, bracteis* paucis (1-5) *viridibus* (non decoloratis) *linearibus* margine spinosis *involucro brevioribus, involucri foliolis* oblongo-lanceolatis *sensim angustatis acutis* apice breviter patentibus *in spinulam brevem* inermem *terminatis*, corollae limbo quam tubo longiore. ♃. *Flores ochroleuci v. lactei.* — Radice et foliis cum C. oleraceo, pedunculis (elongatis) et involucro magis cum C. cano con-

venit, foliis (parvis) pedunculorum et bracteis inter utramque speciem versatur. Folia quam in C. oleraceo firmiora subtus glaucescentia magis spinosa.

B. recedens (*ad C. oleraceum*) caule ad apicem folioso, pedunculis breviusculis foliosis, *foliis auriculato-amplexicaulibus vix decurrentibus* non arachnoideis, *capitulis subcongestis* paulo magis numerosis bracteatis, *bracteis oblongo-lanceolatis capitula aequantibus* spinoso-denticulatis subdecoloratis, involucri foliolis magis elongatis subcarinatis apice longius patentibus. — Flores ochroleuci. — A C. oleraceo adhuc differt: foliis subdecurrentibus ad basin magis spinosis, bracteis angustioribus brevioribus subviridibus.

27. (13 + 14.) **C. ex oleraceo et arvensi.** In silvis caesis inter parentes. (Zürich! an der Weisseritz in Sachsen nach Reichenbach.)

C. oleraceo-arvense (Nägeli C. d. Schw. p. 146. t. IV.) caule usque ad apicem folioso, *ramis inferioribus paucis brevibus foliosis sterilibus,* pedunculis breviusculis arachnoideis, *foliis breviter auriculato-decurrentibus* glabriusculis subtus glaucis (in ramis sterilibus dorso tenuiter arachnoideis) sinuato-lobatis v. sinuato-pinnatifidis, pinnis oblongis subdentatis, *capitulis* subcongestis cylindricis *bracteatis, bracteis involucrum subaequantibus oblongis viridibus* integris, *involucri foliolis* leviter arachnoideis subcarinatis *in spinulam inermem squama multoties breviorem* patentem *terminatis, pappo corolla demum paulo breviore v. eam vix aequante, corollae limbo ultra medium* 5 *fido quam tubo breviore,* filamentis glabriusculis. 4. (Zürich am Uto unter den Eltern!) *Flores ochroleuci v. lactei,* subinde apice rubelli. — Folia firmiora atque ramificatio praecipue rami inferiores steriles iidem ac in C. arvense; inflorescentia, bracteae et involucri foliola magis sunt intermedia; corollae iterum parum ab iis C. oleracei recedunt nisi sunt graciliores longiusque tubulosae.

B. recedens *(ad C. arvense)* (Nägeli C. d. Schw. p. 147.) *foliis exauriculatis* breviter decurrentibus magis spinosis firmioribus, *bracteis* minoribus *lanceolatis involucro multo brevioribus,* capitulis subsolitariis subnudis, involucri foliolis spinula breviori duriori patenti terminatis, *pappo corollam demum fere quarta parte excedente,* corollis profundius quinquefidis lacteis. 4. (Zürich mit der reinen Bastardform!). — Omnibus partibus propius ad C. arvense accedit a quo adhuc praesertim capitulis majoribus parum bracteatis, corolla non ad basin usque partita floribusque lacteis diversum est.

§. 3. *Folia supra non spinuloso-hirta non decurrentia.* Involucri foliola spina simplici terminata.

28. (6 + 9.) **C. e bulboso et acauli.** Cnicus acauli-tuberosus Schiede de pl. hybr. p. 61. Cirsium medium All. fl. ped. t. 49. f. 2. C. Zizianum Koch Syn. ed. 1. p. 398. — In pratis subhumidis montanis cum parentibus, (bei Zürich!, um Mainz!, am Bienitz bei Leipzig in Sachsen.)

C. bulboso-acaule radicis fibris parum incrassatis, caule folioso, *pedunculis* elongatis (caulem fere aequantibus) *arachnoideis* nudiusculis, *foliis exauriculatis* pilosiusculis *nec arachnoideis* lobatis v. sinuato-pinnatifidis, *pinnis ovatis trifidis, laciniis oblongis, capitulis paucis* (1—4) solitariis subventricosis *ebracteatis,* involucri foliolis oblongis obtusiusculis subito in spinulam brevissimam patentem acuminatis leviter arachnoideis v. glabriusculis, *corollae limbo quam tubo paulo longiori.* 4. (Zürich am Uto unter den Eltern!) 4. Flores purpurei. — Folia C. acaulis, capitula C. bulbosi. Pedunculus bracteis paucis minutis linearibus obsitus.

B. recedens *(ad C. acaule)* radicis fibris filiformibus, *pedunculis* glabriusculis v. puberulis *apice vix arachnoideis minute foliosis,* foliis in pedunculo lanceolatis dentatis, *capitulis* vix ventricosis *subebracteatis* glabriusculis, involucri foliolis latioribus, corollae limbo tubum aequante v. paulo breviori. (Zürich mit der reinen Bastardform!) — Flores purpurei. — A C. acaulis var. caulescente differt praesertim pedunculis superne et capitulis subnudis pedunculis subarachnoideis et corollis minus gracilibus.

Altera quoque forma hybrida C. acauli-bulbosum foliis C. bulbosi capitulis C. acaulis nec non hujus forma ad C. bulbosum recedens occurrere videtur, sed ulterius inquirenda.

29. (7 + 9.) **C. e rivulari et acauli.** C. Heerianum Nägeli C. d. Schw. p. 75. In pratis humidis montium inter parentes, (Schweiz in der Vallée de Toux!)

C. rivulari-acaule caule foliosо apice nudiusculo, *pedunculis* brevibus v. elongatis *nudiusculis arachnoideis, foliis exauriculatis* pubescentibus *sinuato-pinnatifidis, pinnis oblongis bifidis, laciniis oblongis, capitulis* paucis (1-5) *ebracteatis* solitariis v. subaggregatis, *involucri foliolis oblongo-triangularibus* in spinulam brevissimam mollem terminatis glabriusculis *purpurascentibus, corollae limbo quam tubo longiori.* 4. Flores purpurei. — Folia C. acaulis, sed paulo minus profunde pinnatifida, incisurae angustiores, pinnae et laciniae minus latae, spinae minores; inflorescentia et capitula C. rivularis sed haec paulo majora.

B. recedens *(ad C. acaule)* minus, *pedunculis* glabriusculis v. puberulis *apice vix arachnoideis* minute foliosis, foliis magis spinosis profundius sinuato-pinnatifidis, *pinnis latioribus* 2-3 *fidis,* foliis pedunculorum lanceolatis dentatis v. lobatis, *capitulis* solitariis maioribus, *bractea una alterave lineari v. lanceolata spinoso-denticulata involucrum subaequante fultis,* involucri foliolis latioribus minus coloratis, corollis gracilioribus. — Flores purpurei. — Differt a C. acaulis Var. caulescente foliis et eorum partitionibus paulo angustioribus, pedunculis minus foliosis subarachnoideis, capitulis parum bracteatis, involucri foliolis magis elongatis magisque acutis, corollae limbo tubum saltem aequante.

Variat haec species hybrida in eundem modum ut parentes ejus: caule simplici 1 cephalo v. subramoso 3-5 cephalo, capitulis congestis sessilibus et pedunculatis solitariis, foliis supra pubescentibus v. glabriusculis, involucri foliolis adpressis v. apice breviter patentibus.

30. (8 + 9.) **C. ex heterophyllo et acauli.** C. alpestre Nägeli C. d. Schw. p. 84. In pratis humidis subalpinis inter parentes, (Schweiz im Wallis bei Zermatt!)

C. heterophyllo-acaule caule brevi folioso, *pedunculis* elongatis caulem aequantibus v. longioribus *arachnoideis subfoliosis, foliis* sessilibus *(non amplexicaulibus)* supra sparsim pubescentibus *subtus subarachnoideis* subsinuato-pinnatifidis, *pinnis oblongis dentatis bifidis* paulo antrorsum versis, lobis oblongis, foliis pedunculorum lanceolatis dentatis, *capitulis* paucis (1-3) solitariis *nudis v. bractea una alterave lineari involucro duplo breviore fultis ventricosis,* involucri foliolis oblongis obtusiusculis in spinulam brevissimam acuminatis glabris, corollae limbo quam tubo breviore. 4. Flores purpurei. — Habitus C. acaulis var. caulescentis; folia iis C. acaulis similiora, sed minus profunde pinnatifida minus spinosa dorso arachnoidea v. glabra glauca, incisurae et pinnae angustiores; capitula sunt C. heterophylli, sed paulo majora foliolis involucri paulo latioribus minusque coloratis.

B. recedens *(ad C. acaule)* minus, *foliis subtus pilosiusculis* (non arachnoideis), pinnis latioribus minus antrorsum versis, pedunculis parum arachnoideis foliosis, *capitulis* vix ventricosis *bracteis paucis lanceolatis dentatis capitulum aequantibus fultis,* involucri foliolis latioribus minusque coloratis. — Flores purpurei. — A C. acaulis var. caulescente adhuc differt: foliis et eorum partitionibus minus latis paulo mitioribus, pedunculis arachnoideis, capitulis paulo minoribus et angustioribus.

C. heterophyllo-acaule variat, ut parentes ejus, foliis lobato-dentatis v. pinnatifidis supra glabriusculis v. pubescentibus subtus leviter arachnoideis v. glabris, pinnis dentatis v. bifidis.

31. (7 + 8.) **C. e rivulari et heterophyllo.** C. pauciflorum Koch Syn. ed. 1. p. 395. Reichenb. fl. exc. 1908. In pratis alpium graniticarum Styriae superioris (am Bürgersee, Host., am Rottenmannertauern, Angelis!)

C. rivulari-heterophyllum caule folioso superne nudiusculo, pedunculis subbrevibus nudis arachnoideis, foliis supra glabriusculis (raro sparsim brevissimeque pubescentibus) *subtus arachnoideo-albidis cordato-amplexicaulibus* dentatis v. totis pinnatifidis, *pinnis horizontalibus v. parum antrorsum versis lanceolatis* basi subdentatis, capitulis paucis (2-5) ebracteatis subcongestis, *involucri foliolis oblongo-triangularibus* in spinulam brevissimam patentem terminatis glabriusculis superne purpurascentibus, *corollae limbo quam tubo longiori.* 4. Flores purpurei. — Foliis C. heterophyllo, capitulis C. rivulari similius.

A speciminibus pedemontanis ea, quae cl. Schleicher sub nomine C. ambigui venditavit diversa. In his caulis subinde fere ad apicem foliosus, folia subtus arachnoidea v. glabriuscula, pinnae subinde bifidae, involucri foliola oblonga obtusiuscula. [Conf. annotationem ad speciem sequentem serius adpositam K.]

32. (8+10.) **C. ex heterophyllo et Erisithali.** Cnicus pauciflorus Waldst. et Kit. pl. r. h. t. 161. Cnicus ambiguus Schleich. cat. 1807. Cirsium pauciflorum Sprengel Syst. 3. p. 375. Cirsium ambiguum Koch Syn. ed. 1. 396. In pratis alpium humidis inter parentes, (im mittlern Vinschgau, Dr. Tappeiner).

C. Erisithali-heterophyllum caule folioso superne nudiusculo, *pedunculis* breviusculis nudis *arachnoideo-tomentosis*, *foliis* supra subpubescentibus *subtus arachnoideo-incanis cordato-amplexicaulibus*, inferioribus petiolatis ovatis lobatis, lobis dentatis, *capitulis paucis* (2-7) subcongestis *nutantibus* ebracteatis v. bractea lanceolato-lineari suffultis *subrotundis*, involucri foliolis oblongo-lanceolatis spinula brevissima terminatis *viscoso-carinatis* purpurascentibus *superne arcuato-patentibus, corollae limbo quam tubo longiori.* 4. Flores purpurei. — E characteribus et ex analogia cum ceteris C. pauciflorum hybridum utriusque speciei dictae puto, quum saltem nulla nota repugnat. Folia subtus arachnoidea supra laete viridia et caulis tomentosus C. heterophyllum, capitula (superiora congesta inferius unum alterumve solitare pedunculatum) nutantia subrotunda foliolis viscosis C. Erisithalem in mentem vocant. Involucri foliola purpurea ut etiam subinde in C. heterophyllo; flores purpurei, quia florum color in C. Erisithali facillime mutatur (in C. pannonico-Erisithalis speciminibus valde recedentibus flores adhuc purpurei remanent). Ad hoc pertinet Cnicus pauciflorus W. K. l. c., capitula enim nutant et squamae viscosae sunt; sed specimina germanica Cirsii pauciflori, ut videtur, Cirsio rivulari-heterophyllo subjungenda sunt.

Cirsium Erisithali-heterophyllum nuper demum in alpibus tyrolensibus a Dr. Tappeiner inter parentes detectum est, cum speciminibus ad C. heterophyllum recedentibus. Hybrida haec forma cognoscitur capitulis nutantibus globosis, squamis patentibus viscosis foliisque subtus albo-tomentosis. Folia in speciminibus e Valle venusta pinnatifida sunt, laciniis paulum antrorsum versis dentatis bilobisve. Hujus loci est Cnicus ambiguus Schleicher secundum specimina ab ipso auctore exhibita.

33. (7+12.) **C. e rivulari et spinosissimo.** C. spinosissimo-rivulare Nägeli C. d. Schw. p. 140. t. VII. In pratis Alpium, (Mt. Cenis im Piemont!)

C. rivulari-spinosissimum? *caule usque ad apicem ibidemque remotius folioso* superne atropurpureo subarachnoideo, pedunculis nullis v. brevissimis tomentosis, *foliis* utrinque sparsim pubescentibus auriculato-amplexicaulibus *sinuato-pinnatifidis, pinnis ovato-oblongis* acuminatis dentatis v. *trifidis angulatis* laciniis subtriangularibus, *capitulis* paucis (6) congestis *bracteatis, bracteis lanceolato-linearibus* v. linearibus inferne dentatis capitula superantibus *viridibus* (non decoloratis), *involucri foliolis lanceolatis* apice patentibus *in spinam brevem latiusculam inermem terminatis* superne coloratis, corollae limbo quam tubo longiori. 4. *Flores lactei.* — Foliis ad C. spinosissimum, capitulis et inflorescentia propius ad C. rivulare accedit. Exemplar unicum quod e collectione cl. de Charpentier vidi quodque olim prō C.

spinosissimo-rivulari habui, nunc melius edoctus C. rivulari-spinosissimum paulo ad C. spinosissimum recedens credo.

34. (8 + 12.) **C. ex heterophyllo et spinosissimo.** C. purpureum All. ped. n. 548. t. 36. Cnicus Cervini Thom. exsicc. (!) Schl. cat. 1821. Cirsium Cervini Koch Syn. edit. 1. p. 399 (!). C. Hallerianum Gaud. fl. helv. V. 188. (!). C. controversum DC. Pr. VI. 654 (!). C. crucagineum DC. Pr. VI. 649. (excl. specim.) (!). C. ambiguum *γ* albidum DC. Pr. VI. 653.! Carduus autareticus Vill.! dauph. 3. p. 12. t. 19. Cnicus autareticus Lois. fl. gall. 541. Cirsium autareticum Mutel. fl. dauph. Cirsium rigens *β.* laevigatum, *β. α.* Gaud. fl. helv. V. 186. C. spinosissimo-heterophyllum Nägeli C. d. Schw. p. 142. C. spinosissimo-alpestre Nägeli C. d. Schw. p. 141. In pratis humidis ad rivulos inque silvis alpium cum parentibus, (Schweiz auf dem Bernina! im Rheinwald! am Scopi! im Urserenthal! bei Zermatt! am Mt. Cenis!

C. heterophyllo-spinosissimum caule ad apicem folioso superne arachnoideo, pedunculis nullis v. brevissimis tomentosis, *foliis* supra glabris v. sparsim pubescentibus *subtus arachnoideo-albidis* late auriculato-amplexicaulibus subspinosis *sinuato pinnatifidis*, *pinnis* oblongis 2-3 *fidis*, laciniis oblongo-lanceolatis posteriori anteriorem plerumque superante, *capitulis* paucis (2-5) congestis *bracteatis*, *bracteis lanceolato-linearibus v. linearibus* basi dentatis *capitula aequantibus viridibus* (non decoloratis), *involucri foliolis oblongo-elongatis* apice vix patentibus *in spinam brevem latiusculam inermem terminatis*, corollae limbo quam tubo paulo longiore. ♃. Flores lactei plerumque apice rubelli v. purpurei. — Folia radicalia iis C. spinosissimi valde similia subtus parum arachnoidea, supra pilosiuscula, partitionibus et incisuris quam caulinorum latioribus; folia caulina eadem ratione qua apici propinquant, iis spinosissimi minus, C. heterophylli magis similia, subtus tomentosa supra glabra, partitionibus et incisuris angustioribus; bracteae intermediae; capitula propius ad C. heterophyllum accedunt.

B. recedens *(ad C. spinosissimum) foliis subtus parum arachnoideis* v. glabris et glaucis magis spinosis incisuris et pinnis latioribus, *bracteis* lanceolato-linearibus v. *oblongo-linearibus* capitula superantibus viridibus (non decoloratis), *involucri foliolis* lanceolatis superne patentibus in *spinam longiorem inermem sensim angustatis.* — Flores lactei v. ochroleuci. — Differt a C. spinosissimo foliis subtus subarachnoideis, bracteis minoribus non decoloratis, et involucri foliolis superne coloratis brevius et inerme spinosis.

In speciminibus quae hybrida inter C. heterophyllum et C. spinosissimum hucusque vidi, pro certo nonnisi C. heterophyllo-spinosissimum et ejus formas recedentes cognovi. Proprium C. heterophyllo-spinosissimum rarius invenitur, plerumque plus minus ad C. spinosissimum recedit. Num etiam C. spinosissimo-heterophyllum occurrat, ulterius inquirendum.

35. (9 + 12.) **C. ex acauli et spinosissimo.** C. spinosissimo-acaule Nägeli C. d. Schw. 139. t. V. In pascuis Alpium cum parentibus, (Schweiz auf dem Bavonnaz bei Bex! in den Alpen von St. Moriz im Engadin!)

C. acauli-spinosissimum caule humili, toto dense folioso villoso, *pedunculis brevibus* arachnoideo-villosis, foliis utrinque subpilosis auriculato-amplexicaulibus v. exauriculatis spinosis sinuato-pinnatifidis, *pinnis* ovatis *angulato-trifidis*, *laciniis subtriangularibus*, foliis superioribus capitula superantibus, *capitulis paucis* (1-4) *in apice caulis congestis* bracteatis, bracteis lanceolato-linearibus spinoso-laciniatis capitula superantibus viridibus *(non decoloratis)*, *involucri foliolis oblongis apice breviter patentibus in spinam brevem latiusculam subinermem terminatis* superne coloratis, *corollae limbo quam tubo paulo longiori* v. eum aequante. ♃. *Flores ochroleuci v. lactei.* — Sunt specimina, quae foliis maxime cum C. spinosissimo, capitulis non minus cum C. acauli consentiunt, et alia quae capitulis cum altero utroque similitudinem habent ideoque ad formas recedentes referenda videntur nisi C. spinosissimo-acaule constituunt, quod in posterum examinandum erit.

36. (6 + 13.) **C. e bulboso et oleraceo.** Cnicus tuberoso-oleraceus Schiede de pl. hybr. p. 51. Cnicus Lachenalii Gmel. fl. bad. 2. p. 380. Cirsium Lachenalii Koch Syn. ed. 1. p. 397. (pro parte.) C. inerme Reichenbach fl. excurs. 1926. C. bulbosum β pallens Wallr. sched. p. 445. La Chen. act. helv. 4. p. 294. t. 16. C. pallens DC. Pr. VI. 647. C. oleraceo-bulbosum Nägeli C. d. Schw. p. 123. C. oleraceo-ramosum Nägeli C. d. Schw. p. 126. C. oleraceo-lanceolatum Schultz. In pratis subhumidis cum parentibus, (Schweiz bei Zürich und Basel; Baden und Elsass bis Mainz, Thüringen!, Sachsen.)

I. **C. bulboso-oleraceum** *radicis fibris filiformibus*, caule inferne densius superne parum folioso, *pedunculis subelongatis* subarachnoideis minute foliolis, foliis glabriusculis s. pubescentibus *(non arachnoideis)* lobatis v. sinuato-pinnatifidis, *pinnis oblongis v. oblongo-lanceolatis dentatis* rarius bifidis, *capitulis solitariis ventricosis bractea una alterave lineari quam involucro breviore fultis, involucri foliolis oblongo-elongatis* apice patentibus arachnoideis in spinulam brevissimam gracilem subinermem terminatis, corollae limbo quam tubo longiore. 4. (Zürich unter den Eltern!) *Flores ochroleuci v. lactei.* — Radice et foliis magis ad C. oleraceum, capitulis et inflorescentia ad C. bulbosum accedit. — Variat: caule inferne simplici apice 2-5 cephalo v. ramoso poly- (10-30) cephalo, foliis profunde pinnatifidis v. tantum dentatis.

B. recedens *(ad C. oleraceum)* caule toto folioso, pedunculis brevioribus, *capitulis subcongestis bracteatis, bracteis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis capitulum subaequantibus* viridibus *(non decoloratis), involucri foliolis lanceolatis* subcarinatis in spinam squama multoties breviorem latiusculam inermem terminatis (Zürich mit dem reinen Bastard!). — A C. oleraceo differt capitulis minus congestis minusque bracteatis et involucri foliolis brevioribus. Demum, quum magis recedit, C. oleraceo simillimum, sed *bracteae* ovato-oblongae capitulum superantes *virides.*

II. **C. oleraceo-bulbosum** radicis fibris subincrassatis, caule inferne densius superne remotius folioso, *pedunculis abbreviatis subfoliosis* tomentosis, foliis subamplexicaulibus supra pubescentibus *subtus subarachnoideis* sinuato-pinnatifidis, *pinnis ovato-oblongis* 2-3 *fidis*, lobis lanceolatis v. oblongis, *capitulis subcongestis bracteatis,* bracteis lanceolatis capitulis paulo brevioribus non decoloratis, *involucri foliolis lanceolatis* superne patentibus carinatis *in spinam inermem squama multoties breviorem* latiusculam *sensim attenuatis,* corollae limbo quam tubo longiore. 4. (Zürich mit den Eltern!). Flores ochroleuci. — Folia C. bulbosi, inflorescentia intermedia, capitula C. oleracei. — Variat caule simplici oligocephalo v. ramoso polycephalo, foliis lobatis v. profunde pinnatifidis.

B. recedens *(ad C. bulbosum)* radicis fibris incrassatis, *caule superne nudiusculo,* foliorum pinnis 3 fidis, laciniis lanceolatis, *capitulis subventricosis solitariis ebracteatis,* involucri foliolis oblongo-elongatis apice parum patentibus in spinulam graciliorem brevissimam terminatis (Zürich mit der reinen Bastardform!). Flores ochroleuci v. lactei, subinde apice parum rubelli. — Differt a C. bulboso capitulis minus ventricosis et brevius pedunculatis, involucri foliolis longioribus, et floribus ochroleucis. Demum nonnisi florum colore cognoscitur, ut mera *varietas pallens* C. bulbosi videatur.

C. Lachenalii Koch e speciminibus duarum specierum, scilicet ex hybridis C. oleracei et acaulis atque ex hybridis C. oleracei et bulbosi compositum est; specimina helvetica et synonymon rigens Gaud. ad C. hybridum ex oleraceo et acaule pertinent. Minime vero ad hybriditatem explicandam C. lanceolatum requirendum est (quod cl. Koch Taschenbuch p. 294 conjecit) quum plantae nulla nota nec foliis decurrentibus nec foliorum pagina superiori spinulosa nec involucri foliolis spinosis patentibus C. lanceolatum in memoriam revocant.

37. (7 + 13.) **C. e rivulari et oleraceo.** Cnicus oleraceo-rivularis Schiede de pl. hybr. p. 58. Cirsium oleraceo-rivulare DC. Pr. VI. 647. C. erucagineum DC.! fl. fr. 3083. (excl. specim. et syn. Cardui autaretici Vill. qui

hybridus e C. spinosissimo et C. heterophyllo.) C. ochroleucum β. DC.! fl. fr. v. 3. 3082. Prodr. VI. p. 648. (pro parte) Cnicus saanensis Schl. exsicc. (!). C. semipectinatus Schleicher exsic. (!). Cirsium semipectinatum Reichenbach. fl. excurs. 1929. (non DC. Pr. VI. 646; nec Carduus semipectinatus Lam. dict. 1. p. 705.) Koch Syn. ed. 1. p. 396. C. praemorsum Michl. bot. Ztg. 3. 1. p. 317. Koch Syn. ed. 1. p. 397. In pratis humidis subalpinis atque planitierum alpes comitantium inter parentes, (Schweiz in Appenzell, im Sihlthal!, im Saanenland! und im Jura!; in Oberbaiern!; Oberschwaben).

C. caule inferne densius superne remote folioso, *pedunculis* brevibus tomentosis *minute foliosis*, foliis glabris v. pubescentibus auriculato-amplexicaulibus integris v. pinnatifidis, pinnis oblongo-lanceolatis v. lanceolatis subdentatis, *capitulis* congestis *bracteatis*, *bracteis lanceolatis v. lanceolato-linearibus capitula subaequantibus* viridibus *(non decoloratis)*, *involucri foliolis* oblongo-lanceolatis v. lanceolatis apice patentibus *in spinulam* inermem *brevem terminatis* glabriusculis v. leviter arachnoideis superne subcoloratis, corollae limbo quam tubo longiore. ♃. *Flores ochroleuci v. lactei*, *subinde apice rubelli.* — Variat: caule simplici 1-4 cephalo v. ramoso 6-10 cephalo, foliis subtus viridibus v. glaucis integris v. postice pinnatifidis antice integris v. totis pinnatifidis, incisuris acutiusculis v. sinuato-obtusis. — Ceterum omnes gradus intermedii inter C. oleraceum et C. rivulare inveniuntur nec desunt formae ad utramque speciem recedentes quo patet, tam *C. oleracco-rivulare*, quam *C. rivulari-oleraceum* in speciminibus hybridis abscondita esse. Sed quum differentiae diagnosticae in foliis et in capitulis inter C. oleraceum et C. rivulare minores sunt quam inter ceteras species, vices earum in hybridarum genesi adhuc determinari nequeunt. — Specimina ad C. oleraceum recedentia huic sunt valde similia, sed bracteae minores et angustiores viridis (non decoloratae) et capitula vix minora (Cnicus hybridus Schleich. exsicc.! Cirsium ochroleucum γ. mixtum DC. Pr. VI. 649!). — Specimina ad C. rivulare recedentia ab hoc non differunt nisi quod foliola involucri paulo longiora minusque colorata, flores lactei (v. in rubellum vergentes) et capitula paulo majora sunt.

38. (8 + 13.) **C. ex heterophyllo et oleraceo.** C. oleraceo-heterophyllum Nägelii C. d. Schw. p. 138. C. affine Tausch. pl. siles. exsic.! In pratis humidis montanis et subalpinis inter parentes, (Schweiz im Veltlin! und im Rheinwald! Böhmen um Kuschwarta! im sächsischen Gebirge bei Hammern, nach Reichenbach.)

C. oleraceo-heterophyllum caule ad apicem folioso arachnoideo, pedunculis nullis v. brevibus tomentosis, foliis cordato-amplexicaulibus supra glabris, *subtus arachnoideo-albidis* integris *v. acute incisis*, *pinnis lanceolatis antrorsum versis* integris, *capitulis* paucis congestis *bracteatis*, *bracteis oblongo-lanceolatis v. lanceolatis capitula superantibus*, *involucri foliolis oblongo-lanceolatis sensim in spinulam brevem inermem angustatis*, corollae limbo quam tubo longiori. ♃. (Böhmen!) Flores ochroleuci. — Folia C. heterophylli, capitula C. oleracei.

II. **C. heterophyllo-oleraceum** caule ad apicem folioso arachnoideo, pedunculis nullis v. brevibus tomentosis, foliis auriculato-amplexicaulibus supra glabriusculis subsinuato-pinnatifidis, pinnis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis subdentatis, foliis *infimis subtus glabriusculis glaucis*, mediis subtus arachnoideo incanis, supremis subtus tomentosis, *capitulis* congestis *subventricosis bracteatis*, *bracteis oblongo-linearibus v. lanceolato-linearibus non decoloratis capitula aequantibus v. superantibus*, *involucri foliolis oblongis adpressis* v. apice breviter patentibus *spinula brevissima terminatis*, corollae limbo quam tubo longiori. ♃. (Rheinwald!) *Flores ochroleuci v. lactei.* — Folia magis C. oleracei, capitula C. heterophylli.

C. heterophyllo-oleraceum et C. oleraceo-heterophyllum non multum inter se diversa sunt et ulterius inquirenda; formas recedentes veras ad unam alteramve speciem nondum vidi.

39. (9 + 13.) **C. ex acauli et oleraceo.** Cnicus rigens Ait. hort. kew. ed. 1. v. 3. p. 144. Cirsium rigens Wallr. sched. p. 446. C. tataricum DC. fl. fr. 4. p. 114, excl. syn. Allionii et Jacquinii. Cnicus acauli-oleraceus Schiede (!) de pl. hybr. p. 46. Cirsium oleraceo-acaule Hampe (!) in Linnaea 1837. p. 1. Nägeli C. d. Schw. p. 120. C. decoloratum Koch. Syn. ed. 1. p. 393. C. Lachenalii Koch. Syn. ed. 1. p. 397. (pro parte). In pratis humidis cum parentibus, (zerstreut durch das ganze Gebiet.)

I. **C. oleraceo-acaule** caule plerumque humili toto folioso, *pedunculis brevibus* v. parum elongatis foliosis *subarachnoideis*, *foliis subsessilibus* (parum auriculatis) sparsim pubescentibus subsinuato-pinnatifidis, *pinnis ovatis* 3 *fidis*, laciniis oblongis, capitulis subcongestis v. solitariis bracteatis, *bracteis lanceolatis non decoloratis spinoso-denticulatis* capitula subaequantibus, *involucri foliolis oblongo-lanceolatis superne patentibus sensim in spinam brevem inermem* latiusculam *attenuatis* subcarinatis glabriusculis, *corollae limbo quam tubo longiori.* 4. (Zürich! Alpen von Bex! Jura! Harz! Thüringen!) *Flores ochroleuci.* — Folia C. acaulis, capitula C. oleracei, inflorescentia et bracteae intermediae. Variat: humile 2-5 cephalum (habitu C. acaulis caulescentis sed ramis brevioribus) v. elatum 2-3 pedale 6-15 cephalum.

B. recedens *(ad C. acaule)* foliis sinuato-pinnatifidis, *pedunculis elongatis* pubescentibus *(nec arachnoideis), capitulis solitariis* bracteatis, bracteis lineari-oblongis dentatis, *involucri foliolis ex ovato-elongatis* apice breviter patentibus *in spinulam brevissimam acuminatis* (Zürich, Jura mit dem reinen Bastard!). Flores ochroleuci v. apice parum rubelli. — A C. acauli differt praesertim involucri foliolis longioribus et acutioribus, florum colore et corollae limbo quam tubo longiore.

II. **C. acauli-oleraceum** caule plerumque humili toto folioso, *pedunculis subelongatis* foliolis *leviter arachnoideo-pubescentibus, foliis subamplexicaulibus* glabriusculis v. pubescentibus lobatis v. pinnatifidis, *pinnis oblongis dentatis v. bilobis, capitulis solitariis* bracteatis, *bracteis lineari-lanceolatis v. lineari-oblongis spinoso-denticulatis non decoloratis* capitula subaequantibus, *involucri foliolis ovato-elongatis apice breviter patentibus in spinulam brevissimam* subinermem *acuminatis, corollae limbo quam tubo paulo longiore.* 4. (Zürich! Alpen von Bex! Jura! Harz!). *Flores ochroleuci v. lactei.* — Foliis magis ad C. oleraceum, capitulis ad C. acaule accedit; inflorescentia et bracteae mediae sed secundae speciei similiores. — Variat caule humili 1-3 cephalo (habitu C. acaulis caulescentis) et elatiori 4-8 cephalo.

B. recedens *(ad C. oleraceum)* foliis auriculato-amplexicaulibus, pedunculis brevioribus, capitulis bracteatis, *bracteis oblongo-lanceolatis capitula superantibus* non decoloratis, *involucri foliolis oblongo-lanceolatis* superne patentibus *sensim in spinam brevem inermem latiusculam angustatis subcarinatis, corollae limbo quam tubo paulo longiori.* (Zürich mit dem reinen Bastard!) Flores ochroleuci. — Differt a C. oleraceo foliorum pinnis subinde bilobis, capitulis longius pedunculatis, bracteis angustioribus viridibus, involucri foliolis latioribus in acumen brevius terminatis.

40. (10 + 12.) **C. ex Erisithali et spinosissimo.** C. flavescens Koch Taschenbuch p. 292. In pratis alpinis, (Monte di Pozza im Fassa im südl. Tyrol, Facchini! im mittlern Vintschgau, Dr. Tappeiner!).

C. spinosissimo-Erisithales (Koch l. c.) *caule ad apicem folioso*, pedunculis nullis v. brevibus arachnoideo-villosis, foliis auriculato-amplexicaulibus supra pubescentibus subtus in nervis villosis parum spinosis profunde sinuato-pinnatifidis, *pinnis oblongis angulato-dentatis horizontaliter subrecurvis, capitulis* congestis *bracteatis* subnutantibus, *bracteis lanceolato-linearibus* spinoso-dentatis *capitula subaequantibus* v. paulo brevioribus non decoloratis, *involucri foliolis lanceolatis glabris* (non viscosis) *superne arcuato-patentibus in spinam duriusculam cetera squama triplo breviorem sensim attenuatis*, corollae limbo quam tubo longiore. 4. Flores ochroleuci. — De parentibus in loco natali nihil adhuc observatum. At folia C. Erisithalis sed minus

latae magisque spinosae, pinnis brevioribus latioribus incisuris inter dentes pinnarum magis obtusis; bracteae intermediae; capitula C. spinosissimi sed involucri foliolis magis patentibus brevioribus minus spinosis.

B. recedens *(ad C. Erisithales)* caule ad apicem folioso, foliorum pinnis longioribus, bracteis minoribus, *capitulis nutantibus* subrotundis, *involucri foliolis subviscosis oblongo-lanceolatis in spinam brevem latiusculam terminatis.* — In horto Erlangensi e seminibus C. spinosissimo-Erisithalis enatum. — A C. Erisithali, cui valde simile, differt: caule toto folioso, foliorum pinnis latioribus magis lobatis magisque spinosis, bracteis majoribus, involucri foliolis minus viscosis sensim in spinam brevem latiusculam nec subito in spinulam brevem gracilem terminatis.

41. (10 + 13.) **C. ex Erisithali et oleraceo.** C. Candolleanum Nägeli C. d. Schw. p. 98. In montium nemorosis inter parentes, (ital. Schweiz im Val Assino und am Monte Legnone beim Comersee!).

C. Erisithali-oleraceum caule usque ad apicem (superne remote) folioso, *pedunculis* nullis v. brevibus *pubescentibus vix arachnoideis,* foliis glabriusculis amplexicaulibus sinuato-pinnatifidis, pinnis subhorizontalibus oblongo-lanceolatis dentatis, *capitulis subrotundis* congestis *nutantibus bracteatis, bracteis lanceolatis* basi dentatis apice acuminatis *capitula subaequantibus non decoloratis, involucri foliolis* oblongo-lanceolatis *spinula brevi inermi terminatis viscosis superne horizontaliter patentibus,* corollae limbo quam tubo longiori. ♃. Flores citrini v. ochroleuci. — Folia et bracteae potius C. oleracei; inflorescentia et capitula magis C. Erisithalis.

C. recedens *(ad C. oleraceum)* caule toto folioso, *pedunculis tomentosis, capitulis erectis* bracteatis, *bracteis oblongo-lanceolatis v. oblongis capitula superantibus* nondum decoloratis, *squamis* longioribus superne *erecto-patentibus* sensim in spinulam parum longiorem atque latiorem attenuatis *non viscosis.* — Differt a C. oleraceo: bracteis angustioribus viridibus et involucri foliolis altioribus spinula minori terminatis.

42. (12+13.) **C. e spinosissimo et oleraceo.** C. Thomasii Nägeli C. d. Schw. p. 93. In pratis humidis subalpinis inter parentes, (Schweiz auf dem Bavonnaz bei Bex!).

C. spinosissimo-oleraceum caule usque ad apicem folioso, pedunculis nullis v. brevibus arachnoideis, *foliis* auriculato-amplexicaulibus utrinque sparsim pubescentibus *parum spinosis* pinnatifidis, *pinnis oblongis lobatis dentatisque,* capitulis congestis bracteatis, *bracteis ovato-lanceolatis v. oblongo-linearibus* laciniato-dentatis decoloratis capitula superantibus, *involucri foliolis* lanceolato-linearibus glabris ecarinatis *in spinam duriusculam* patentem *squama triplo breviorem terminatis,* corollae limbo quam tubo longiore. ♃. Flores ochroleuci. — Foliis magis ad C. oleraceum, capitulis ad C. spinosissimum accedit, bracteae intermediae.

INDEX

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM.

INDEX

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM, NOMINUMQUE PLANTARUM, QUAE COMPARATIONIS GRATIA IN SYNOPSI COMMEMORANTUR.

Nomina literis cursivis impressa, nomina Specierum Florae germanicae et helveticae in Synopsi propositarum, litteris erectis impressa, Synonyma et nomina plantarum comparatarum exhibent. Numeri paginam libri indicant.

A.

Abama ossifraga DC. 628.
Abies excelsa Lk. 578.
excelsa Poir. 578.
Larix Lmk. 578.
pectinata DC. 578.
vulgaris Poir. 578.
Absinthium angustifolium Dod. 317.
vulgare Gärtn. 313.
Abutilon Trnf. 114.
Avicennae Gärtn. 114.

ACANTHACEAE 499.
Acanthus L. 499.
longifolius Hst. 500.
mollis L. 499.
niger Mill. 500.
spinosus L. 500.
spinosissimus Rchb. 500.
Acarna cyanoides Wib. 349.
Acer L. 117.
austriacum Tratt. 117.
campestre L. 117.
italicum Lauth. 117.
laciniatum Du Roi 117.
monspessulanum L. 117.
neapolitanum Ten. 117.
Acer obtusatum Kit. 117.
opulifolium Vill. 117.
Opulus Ait. 117.
Opulus DC. 117.
platanoides L. 117.
Pseudoplatanus L. 117.
rotundifolium Lmk. 117.
trilobatum Lmk. 118.
Aceras R. Brw. 600.
anthropophora R. Brw. 600.
Acerineae 117.
Acetosa hispanica maxima Munt. 533.
montana lato arifolio rotundato Bocc. mus. 533.
montana maxima C. Bauh. 533.
Achariterium arvense Bl. Fgh. 310.
Achillea L. 317.
alpina Ledeb. 318.
alpina L. 318.
ambigua Pollin. 321.
atrata Jacq. 319.
atrata L. 319.
atrata v. fol. bipinnatis L. 319.
Bocconi Koch. 318.
Clavenae L. 318.
Clavenae *β.* glabrata Hopp. 318.
Clusiana Tsch. 319.
collina Beck. 320.

Achillea compacta DC. 320.
dentifera DC. 320.
dentifera Rchb. 320.
distans Roch. 320.
distans Willd. 320.
Haenkeana Tsch. 320.
helvetica Schleich. 318.
hybrida Gaud. 319.
impunctata Vest. 319.
incisa Clairv. 318.
intermedia Schlch. 319.
lanata Spr. 320.
ligustica All. 321.
livia Scop. 319.
macrophylla L. 318.
macrophylla Rchb.? 318.
magna All. 320.
magna DC. 320. 321.
magna Haenk. 320.
magna Roch. 321.
magna Willd. 320.
Millefolium L. 319.
Millefolium β. alpestris Wimm. et Grab. 320.
Millefolium β. crustata Roch. 320.
Millefolium δ. lanuginosa Gaud. 321.
montana Schleich. 318.
moschata Wulf. 318.
moschata β. hybrida Gaud. 319.
nana L. 319.
nobilis L. 321.
ochroleuca Ehrh. 321.
ochroleuca Rchb. 321.
ochroleuca Willd. 321.
odorata L. 321.
odorata Schleich. 320.
odorata DC. 321.
odorata Wulf. 320.
pectinata Willd. 321.
polyphylla Schleich. 320.
Ptarmica L. 318.
sambucifolia Desf. 326.
scabra Host. 320.
Schkuhrii Spr. 321.
Seidlii Presl. 320.
setacea W. K. 320.
stricta Schleich. 321.
sudetica Opitz. 320.
sylvatica Beck. 320.
tanacetifolia All. 320.
tanacetifolia Roch. 320.
Thomasiana Hall. fil. 318.
tomentosa L. 319.
valesiaca Rchb. 318.
valesiaca Sut. 318.
Achnodon Bellardii Link. 674.
Achnodonton Bellardii Beauv. 674.
tenue Beauv. 674.
Achyranthes papposa Forsk. 526.
Achyrophorus radicatus Scop. 366.
Acinos thymoides Mönch. 484.
vulgaris Pers. 484.
Aconitum L. 20.
acuminatum Rchb. 21.
acutum Rchb. 21.
album Ait. 21.
amoenum Rchb. 21.
angustifolium Bernh. 21.
Anthora L. 20.
autumnale Rchb. 21.
Bernhardianum Rchb. 21.
Bernhardianum Wallr. 21.
Cammarum Jacq. 21.
Cammarum L.? 21.
cernuum Rchb. 22.
cernuum Wulf. 22.
Decandollii Rchb. 21.
eminens Koch. 21.
eulophum Rchb. 21.
exaltatum Bernh. 21.
flexicaule Hopp. Hsch. 22.
formosum Rchb. 21.
Funkianum Rchb. 21.
hebegynum DC. 22.
Hoppeanum Rchb. 21.
Jacquini Rchb. 20.
intermedium DC. 21.
Koelleanum Rchb. 21.
Lamarkii Rchb. 22.
laxum Rchb. 21.
Lycoctonum L. 22.
molle Rchb. 22.
multifidum Koch. 21.
Myoctonum Rchb. 22.
Napellus Dod. Rchb. 21.
Napellus L. 21.
Napellus Stoerk. 21.
nasutum Fisch. 21.
nemorosum MB. 20.
neomontanum Willd. 21.
neomontanum Wulf. 21.
neubergense Rchb. 21.
pallidum Rchb. 22.
palmatifidum Rchb. 21.
paniculatum Lmk. 22.
paniculatum Rchb. 22.
pyramidale Mill. 21.
pyrenaicum DC. 22.
rostratum album Rchb. 21.
rostratum Bernh. 21.
Stoerkianum Rchb. 21.
strictum Bernh. 21.
tauricum Wulf. 21.
Thelyphonum Rb. 22.
variegatum L. 21.
variegatum Rchb. 21.
Vulparia Rchb. 22.
Acorus L. 592.
Calamus L. 592.

Acropteris septentrionalis Link. 768.
Acrostichum crispum Vill. 769.
hyperboreum Liljeb. 731.
ilvense L. 731.
Marantae L. 769.
Marantae Wulf. 731.
septentrionale L. 767-768.
Spicant Vill. 768.
Thelipteris L. 733.
Actaea L. 22.
spicata L. 22.
cimicifuga L. 22.
Adenarium peploides Rafin. 96.
Adenophora Fisch. 410.
communis Fisch. 410.
lilifolia DC. 410.
suaveolens Fisch. Mey. 410.
Adenostyles Cass. 298.
albida Cass. 298.
albifrons Rchb. 298.
alpina Bl. Fgh. 298.
candidissima Cass. 299.
hybrida DC. 298.
leucophylla Rchb. 299.
Petasites Bl. Fgh. 298.
viridis Cass. 298.
Adianthum L. 768.
Capillus veneris L. 768.
Adonis L. 8.
aestivalis Gaud. 9.
aestivalis L. 9.
aestivalis Rchb. 9.
ambigua Gaud. 9.
anomala Wallr. 9.
apennina Jcq. 9.
apennina L. 9.
autumnalis L. 8.
citrina DC. 9.
citrina Hoffm. 9.
flammea Jcq. 9.
flava Schlcht. 9.
flava Vill. 9.
maculata Wallr. 9.
miniata Jcq. 9.
pyrenaica 9.
vernalis L. 9.
Adoxa L. 278.
Moschatellina L. 278.
Adyseton calycinum Scop. 52.
Aegopodium L. 245.
Podagraria L. 245.
Aegilops L. 719.
caudata L. 720.
cylindrica Hst. et Gaud. 720.
echinata Presl. 720.
geniculata Roth. 720.
incurvata L. 720.
neglecta Req. 720.
ovata L. 720.
ovata Roth. 720.
Aegilops triaristata Req. 720.
triaristata Willd. 720.
triuncialis L. 720.
Aesculus L. 118.
Hippocastanum L. 118.
Aetheorrhiza bulbosa Cass. 375.
Aethionema R. Brw. 64.
gracile DC. 64.
saxatile R. Brw. 64.
Aethusa L. 252.
Bunius Murr. 244.
cynapioides M. B. 252.
Cynapium L. 252.
Cynapium *β.* D. Fl. 252.
Cynapium *β.* agrestis Wallr. 252.
Meum Murr. 257.
segetalis v. Boeningh. 252.
Agathophyton Bonus Henricus Moq. Tand. 525.
rubrum Rchb. 525.
Agave L. 610.
americana L. 610.
Agraphis nutans Link. 627.
Agraulos caninus Beauv. 679.
Agrimonia L. 192.
Agrimonioides L. 193.
Eupatoria L. 192.
odorata Ait. 192.
odorata Mill. 192.
procera Wallr. 192.
repens L. 192.
Agropyrum caesium Presl. 716.
firmum Presl. 716.
junceum Beauv. 715.
Agrostemma L. 92.
coronaria L. 92.
Flos Jovis L. 92.
Flos Jovis Poll. 92.
Githago L. 93.
nicaeensis Willd. 93.
Agrostis L. 677.
aculeata Scop. 674.
alba *α*, *β*, *γ*, *δ*. D. Fl. 678.
alba var. *α*. Schrad. 678.
alba L. 678.
alba *α*. major. Gaud. 678.
alba II. decumbens Gaud. 678.
alba III. patula Gaud. 678.
alba *ε*. pumila Kunth. 678.
alba a. gigantea Mey. 678.
alba b. stolonifera Mey. 678.
alba c. maritima Mey. 678.
alba *β*. stolonifera Sm. 678.
alba Schrad. 677.
alpina DC. 679.
alpina Dub. 679.
alpina Leyss. 679.
alpina Scop. 679.
arundinacea L. 681.
australis L. 682.

Agrostis Calamagrostis L. 683.
canina L. 679.
capillaris Pollich. 677.
compressa Willd. 678.
decumbens Hall. 678.
decumbens Host. 678.
diffusa Host. 678.
festucoides Vill. 679.
filiformis Schleich. Vill. 679.
gigantea Gaud. 678.
gigantea Roth. 678.
hispida Willd. 678.
hybrida Gaud. 679.
incurvata Scop. 720.
interrupta L. 680.
littoralis Sm. 677.
lutosa Poir. 677.
maritima Lmk. 678.
miliacea L. 682.
minima L. 676.
panicea Lmk. 682.
panicea Willd. 677.
patula Gaud. 678.
pauciflora Schrad. 678.
pilosa Schleich. 681.
pumila L. 678.
purpurea Gaud. 680.
rubra L. 678.
rubra *β*. Whlbg. 678.
rupestris All. 679.
rupestris DC. 679.
rupestris Dub. 679.
serotina L. 702.
setacea Vill. 679.
Spica Venti L. 679.
stolonifera Hst. 678.
stolonifera *α*. L. 678.
stolonifera *β*. L. 677. 678.
stolonifera L. it. scan. 678.
stolonifera Poll. 678.
sylvatica Hst. 678.
sylvatica L. Rchb. 678.
sylvatica Poll. 678.
tenella Hoffm. 678.
varia Hst. 678.
ventricosa Gouan. 682.
verticillata Vill. 678.
vulgaris Schrad. 678.
vulgaris With. 678.
Aira L. 687.
alba Wulf. 685.
alpina Roth. 687.
altissima Lmk. 687.
aquatica L. 701.
bottnica Whlbg. 687. 688.
caerulea L. 701.
caespitosa L. 687.
caespitosa *α*. fluviatilis Mey.? 687.
caespitosa *β*. Roth. 687.
caespitosa D. fl. 687.
Aira caespitosa var. littoralis Gaud. 687.
caespitosa var. setifolia Bisch. 687.
canescens L. 688.
capillaris Hst. 693.
caryophyllea L. 693.
cristata L. 686.
flevuosa L. 687.
flexuosa b. paludosa Mey, 688.
glauca Schrad. 686.
hirsuta Schleich. 686.
juncifolia Wulf. 684.
montana L. 688.
paludosa Roth., Weih. 687. 688.
paludosa Wib. 687.
parviflora Thuill. 687.
praecox L. 693.
pusilla Wigg. 693.
spicata L. spec. 692.
subspicata L. syst. 692.
uliginosa Weih. 687. 688.
valesiaca All. 686.
Wibeliana Sond. 687.
Airochloa cristata Link. 686.
hirsuta Link. 686.
Ajuga L. 497.
alpina L. 497.
alpina Thom. 497.
alpina Vill. 497.
Chamaepytis Schreb. 498.
chia Schreb. 498.
foliosa Schleich. 497.
genevensis L. 497.
latifolia Hst. 497.
montana Rchb. 497.
pyramidalis L. 497.
repens Hst. 497.
reptans Hst. 497.
reptans L. 497.
rugosa Hst. 497.
rupestris Schleich. 497.
Alchemilla L. 201.
alpina L. 201.
alpina *β*. hybrida L. 201.
Aphanes Leers. 202.
arvensis Scop. 202.
cuneata Thom. 201.
fissa Schummel 201.
minor Tsch. 201.
montana Willd. 201.
pentaphyllea L. 201.
pubescens M. B. 201.
pyrenaica Duf. 201.
truncata Tausch. 201.
vulgaris L. 201.
vulgaris *γ*. hybrida Wallr. 201.
Alectorolophus grandiflorus Wallr. 471.
grandiflorus *β*. pubens Wallr. 471.
hirsutus All. 471.

Alectorolophus major. Rchb. 471.
minor β. Rchb. 471.
minor. β. fallax Wimm. et Grab. 471.
parviflorus Wallr. 471.
Reichenbachii Drejer 472.

ALISMACEAE 580.
Alisma L. 580.
Damasonium Willd. 581.
dubium Willd. 581.
graminifolium Ehrh. 580.
lanceolatum Wither. 580
natans L. 581.
natans Pollich. 580.
natans sparganifolium Fries. 581.
parnassifolium L. 580.
Plantago L. 580.
Plantago β. Willd. 580.
Plantago γ. graminifolium Whlbg. 580.
ranunculoides L. 581.
ranunculoides zosterifolium Fries. 581.
Alliaria officinalis Andrz. 43.
Allium L. 621.
acutangulum Schrad. 623.
acutangulum Willd. 623.
acutangulum β. montanum D. Fl. 623.
acutangulum γ. calcareum D. Fl. 623.
altaicum Pall. 627.
ambiguum DC. 623.
ambiguum Sibth. et Sm. 622.
Ampeloprasum L. 624.
Ampeloprasum Waldst. K. 625.
angulosum Jacq. 623.
angulosum α. minus Trev. 623.
angulosum β. majus Trev. 623.
angulosum β. petraeum DC. 623.
angulosum β. calcareum Wallr. 623.
angulosum γ. serotinum Gaud. 623.
angulosum Poll. 623.
appendiculatum Ram. 623.
arenarium L. suec. 625.
arenarium Sm. et plurim. auct. 625.
Ascalonicum L. 626.
carinatum Fries. 625.
carinatum Pollich. 625.
carinatum Sm. 625.
carneum Bertol. 622.
Cepa L. 627.
Chamaemoly L. 622.
controversum Schrad. 624.
descendens Koch., L. 625.
ericetorum Thore. 623.
fallax Don. 622.
Allium *fistulosum* L. 627.
flavum L. 626.
flexum W. K. 625.
flexuosum Hst. 625.
foliosum Clarion. 626.
illyricum Jacq. 622.
montanum Schmidt. 623.
montanum Sibth. et Sm. 626.
moschatum L. 623.
multibulbosum Jacq. 622.
nigrum Bertol., Schult. 622.
nigrum Red. 622.
ochroleucum W. Kit. 623.
oleraceum Koch. 625.
oleraceum L. 625.
oleraceum α. D. Fl. 625.
oleraceum β. D. Fl. 625.
oleraceum β. complanatum Fries. 625.
Ophioscorodon Don. 624.
Ophioscorodon Link. 624.
pallens L. 626.
paniculatum L. 626.
paniculatum Koch., Rb. 626.
plantagineum Lmk. 622.
Porrum L. 624.
pulchellum Don. 626.
reticulatum Presl. 624.
roseum L. 622.
roseum β. DC. 622.
rotundum L. 624.
sativum L. 624.
sativum α. D. Fl. 624.
saxatile MB. 623.
Schoenoprasum L. 626.
Schoenoprasum β. alpinum Gaud. 626.
Scorodoprasum L. 625.
senescens L. 623.
senescens Schmidt 623.
senescens Wimm. et Grab. 623.
setaceum W. K. 623.
sibiricum Willd. 626.
sphaerocephalum L. 625.
strictum Schrad. 624.
suaveolens Gaud. 624.
suaveolens Jacq. 623.
subhirsutum L. 622.
subvillosum Salzm. 622.
trifoliatum Cyrill. 622.
Tenorii Spreng. 622.
ursinum L. 622.
veronense Pollin. 625.
Victorialis L. 621.
vineale L. 625.
violaceum Willd. 625.
volhynicum Bess. 624.
Allosorus Bernh. 769.
aquilinus Presl. 768.
crispus Bernh. 769.

Alnus L. 573.
badensis Lang 573.
barbata Mey. 573.
glutinosa Gaertn. 573.
glutinosa β. incisa Willd. 573.
incana DC. 573.
incana β. pinnatifida Whlbg. 573.
pubescens Tsch. 573.
viridis DC. 573.
Alopecurus L. 673.
agrestis L. 673.
aristatus Hds. 677.
arundinaceus Poir. 673.
fulvus Sm. 673.
geniculatus L. 673.
geniculatus Pollich. 674.
monspeliensis L. 677.
nigrescens Jacq. 673.
nigricans Hornm. 673.
paludosus Beauv. 674.
paniceus Lmk. 677.
paniceus L. 677.
pratensis L. 673.
repens M. B. 673.
ruthenicus Weinm. 673.
utriculatus Pers. 674.
ventricosus Pers. 673.

ALSINEAE 93.
Alsine Whlbg. 97.
aretioides M. K. 97.
austriaca M. K. 98.
biflora Whlb. 97.
fasciculata M. K., Gouan. 99.
Gerardi Whlbg. 98.
Jacquini Koch. 99.
laricifolia Whlbg. 97.
marginata Schrb. 95.
marina Whlbg. 96.
marina α. D. fl. 96.
media L. 103.
mucronata Gouan., L., Sibth. 99.
peploides Whlbg. 96.
propinqua R. Brw. 98.
recurva Whlbg. 99.
rostrata Koch. 99.
rubra Whlbg. 96.
saxatilis Whlbg. 98.
sedoides Froel. 98.
segetalis L. 96.
setacea M. K. 99.
stricta Whlbg. 97.
tenuifolia Whlbg. 99.
umbellata DC. 102.
verna Bartl. 98.
Villarsii M. K. 98.
Villarsii β. D. fl. 98.
viscosa Schreb. 100.
Alsinella erecta Mönch. 104.
viscosa Hartm. 99.

Althaea L. 113.
cannabina L. 113.
hirsuta L. 113.
officinalis L. 113.
pallida Kit. 113.
rosea L. 113.
Alyssum L. 51.
alpestre L. 51.
alpestre Wulf. 52.
alpestre β. D. Fl. 51.
alpestre β. argenteum Gaud. 51.
alpinum Scop. 58.
arenarium Gmel. 52.
arenarium Lois. 52.
argenteum Vitm. DC. 52.
Bertolonii Dsv. 52.
calycinum L. 52.
campestre L. 52.
campestre M. B. 52.
campestre auct. 52.
clypeatum L. 53.
Draba Willd. 52.
edentulum W. K. 51.
gemonense D. fl. 51.
gemonense L. 51.
hirsutum M. B. 52.
incanum L. 53.
maritimum Lmk. 53.
medium Hst. 51.
minimum Willd. 52.
montanum L. 52.
murale W. K., M. B. 52.
myagroides All. 58.
obtusifolium Stev. 52.
paniculatum Willd. 66.
petraeum Ardn. 51.
rupestre Willd. 58.
saxatile L. 51.
serpyllifolium M. B. 51.
sinuatum L. 51.
tortuosum W. K. 51.
utriculatum L. 51.
Wulfenianum Bernh. 52.

AMARANTHACEAE 519.
Amaranthus L. 519.
adscendens Lois. 519.
adscendens Rchb. ic. 519.
Blitum L. 519.
Blitum Rchb. 519.
Blitum β. DC. 519.
polygonoides L. 519.
prostratus Balb. 519.
retroflexus L. 520.
spicatus Lmk. 520.
sylvestris Dsf. 519.
viridis All. 519.
viridis Poll. 519.

AMARYLLIDEAE. 610.

Amaryllis lutea. L. 610.
Ambrina ambrosioides Spach., Moq. Tand. 524.
Botrys Moq. Tand. 525.

AMBROSIACEAE. 401.

Amelanchier vulgaris Mönch. 205.
Ammi L. 245.
daucifolium Scop. 254.
majus L. 245.
Ammophila arenaria Link. 681.
arundinacea Hst. 681.
Amonia agrimonioides Nestl. 193.

AMPELIDEAE. 118.

Ampelodesmos Link. 684.
tenax Link. 684.
Ampelopsis Mich. 118.
hederacea Mich. 118.

AMYGDALEAE. 178.

Amygdalus L. 178.
communis L. 178.
nana L. 178.
persica L. 178.
Anacampseros maxima Haw. 222.
Anacamptis Rich. 597.
pyramidalis Rich. 597.
Anacyclus L. 323.
officinalis Hayn. 323.
pulcher Bess. 324.
Pyrethrum 324.
Anagallis L. 503.
arvensis L. 503.
caerulea Schreb. 503.
carnea Schrk. 503.
femina Vill. 503.
mas Vill. 503.
Monelli Rchb. 503.
phoenicea Lmk. 503.
tenella L. 503.
Anagalloides procumbens Krock. 461.
Anarrhinum Dsf. 453.
bellidifolium. Desf. 453.
Anastatica syriaca L. 65.
Anchusa L. 432.
angustifolia DC. 432. 433.
angustifolia Lehm. 432.
angustifolia L.? 432.
angustifolia Pollich. 432.
angustifolia Rchb. 433.
arvalis Rchb. 432.
arvensis M. B. 433.
arvensis Tsch. 432.
azurea Rchb. 433.
incarnata Schrad. 432.
italica DC. 433.
italica Rchb. 433.
italica Retz. 433.
leptophylla R. S. 432.
Anchusa *officinalis* L. 432.
officinalis Poll. 432.
officinalis Rchb. 432.
officinalis Tsch. 432.
paniculata Ait. 433.
paniculata Rchb. 433.
perlata Lmk. 433.
pulla M. B. 433.
variegata Lehm. 433.
Andrachne L. 543.
telephioides L. 543.
Andromeda L. 412.
calyculata L. 412.
polifolia L. 412.
Andropogon L. 668.
Allionii DC. 669.
angustifolius Sm. 669.
arundinaceum Scop. 669.
avenaceus Humb. et Kunth. 669.
contortum All. 669.
dystachius L. 669.
Gryllus L. 669.
halepensis Sibth. 669.
Ischaemum L. 669.
pubescens Vis. 669.
Ravennae L. 668.
Androsace L. 503.
alpina Gaud. 505.
alpina Lmk. 504.
Aretia Lapeyr. 504.
argentea Gaertn. 504
bryoides DC. 504.
carnea L. 505.
Chamaejasme Hst. 505.
Chamaejasme Wulf. 505.
elongata L. 505.
glacialis Hoppe 504.
Heerii 504.
helvetica Gaud. 504.
imbricata Lmk. 504.
Lachenalii Gmel. 505.
lactea L. 505.
lactea Vill. 505.
maxima L. 506.
nana Hornem 505.
obtusifolia All. 505.
obtusifolia β. aretioides Gaud. 505.
pauciflora Vill. 505.
pennina Gaud. 504.
pubescens DC. 504.
septentrionalis L. 505.
tomentosa Schlch. 504.
villosa Jacq. 505.
villosa L. 505.
villosa α. β. D. fl. 505.
Vitaliana Lapeyr. 506.
Androsaemum All. 115.
officinale All. 115.
vulgare Gaertn. 115.
Andryala chondrilloides Scop. 376.

Andryala lanata L. 391.
nemausensis Vill. 373.
nudicaulis Lam. 373.
pontana Vill. 379.
Anemagrostis Spica venti Trin. 680.
Anemone L. 6.
acutipetala Schlch. 7.
alpina L. 7.
alpina Scop. 8.
apiifolia Wulf. 8.
baldensis L. 8.
fragifera Wulf. 8.
Hackelii Koch. 6.
Hackelii Tausch. 6.
Halleri All. 6.
Halleri Koch 6.
Hepatica L. 6.
hortensis L. 7.
intermedia Hopp. 7.
montana Hopp. 7.
myrrhidifolia Vill. 8.
narcissiflora L. 7.
nemorosa L. 8.
patens L. 7.
pratensis L. 7.
Pulsatilla L. 6.
Pulsatilla *α.* praecox Gaud. 7.
Pulsatilla nutans Gaud. 7.
ranunculoides L. 8.
sulphurea L. 8.
stellata Lmk. 7.
sylvestris L. 8.
tenuifolia Schleich. 7.
trifolia L. 8.
vernalis L. 6.
Wolfgangiana Bess. 7.
Anethum L. 263.
Foeniculum L. 253.
graveolens L. 263.
Pastinaca Wib. 263.
Angelica L. 258.
aquilegifolia DC. 266.
Archangelica L. 259.
Carvifolia Spr. 258.
chaerophyllea Lotterm. 257.
Levisticum All. 258.
littoralis Fries. 259.
montana Gaud. 259.
montana Schleich. 258.
paludapifolia Lmk. 258.
paniculata Lmk. 255.
pratensis M. B. 258.
pyrenaea Spr. 259.
Razoulii A. 259.
sativa Mill. 259.
sylvestris L. 258.
sylvestris *β.* elatior Whlbg. 259.
verticillaris L. 262.
Anisum vulgare Gaertn. 248.
Antennaria carpatica Bl. Fgh. 312.
Antennaria dioica Gaertn. 312.
Anthemis L. 321.
agrestis Wallr. 322—323.
alpina L. 323.
altissima L. 322.
arvensis L. 322.
arvensis Wallr. 322. 323.
austriaca DC. 322.
austriaca Jacq. 322.
austriaca var. virens Rchb. 322.
austriaca *β.* Triumfetti DC. 322.
brachycentros Gay. 322.
carpatica Willd. 323.
caucasica Hornem. 322.
corymbosa Haenk. 319.
Cota Vivian. 322.
Cota Willd. 322.
Cotula L. 323.
grandiflora Hst. 323.
Kitaibelii Spr. 323.
montana L. 323.
montana *δ.* Gay. 323.
mucronulata Bertol. 323.
mucronulata Rchb. 323.
nobilis L. 323.
rigescens Willd. DC. 322.
ruthenica M. B. 322.
saxatilis Willd. 323.
styriaca Vest. 323.
tinctoria L. 321.
tinctoria *β.* Triumfetti L. 322.
Triumfetti All. 322.
Anthericum L. 616.
autumnale Scop. 621.
calyculatum L. 629.
calyculatum *α. β.* L. 629.
Liliago L. 616.
Liliastrum L. 617.
ossifragum L. 628.
Pseudasphodelus Jacq. 629.
ramosum L. 616.
serotinum L. 615.
sulphureum W. K. 617.
Anthoxanthum L. 673.
aculeatum L. 674.
odoratum L. 673.
paniculatum L. 707.
Anthriscus Hoffm. 270.
alpestris Wim. et Grab. 271.
Caucalis M. B. 272.
Cerefolium Hoffm. 271.
Cerefolium *β.* D. Fl. 271.
fumarioides Spr. 271.
nemorosa M. B. 271.
nodosa Pers. 272.
sylvestris Hoffm. 270.
sylvestris DC. 271.
sylvestris *β.* alpestris Wim. 271.
sylvestris *β.* tenuifolia DC. 271.
sylvestris *γ.* pilosula DC. 271.

Anthriscus sylvestris γ. D. Fl. 271.
sylvestris δ. DC. 271.
torquata Dub. Thom. 271.
trichosperma Roch. 271.
trichosperma Pers. 271.
trichosperma Schult. 271.
vulgaris Pers. 271.
Anthyllis L. 137.
affinis Britt. 137.
alpestris Hgtschw. 137.
Dillenii Schult. 137.
maritima Schweigg. 137.
montana L. 137.
Vulneraria L. 137.
Vulneraria Hgtschw. 137.
Vulneraria ζ. polyphylla DC. 137.

ANTIRRHINEAE 448.

Antirrhinum L. 450.
alpinum L. 452.
arvense α. L. 452.
arvense β. L. 452.
arvense Willd. 452.
Bauhini Gaud. 453.
chalepense L. 453.
Cymbalaria L. 451.
Elatine L. 451.
galioides Lmk. 452.
genistifolium L. 453.
genistifolium Vill. 453.
gracile Pers. 452.
latifolium Mill. 450.
Linaria L. 453.
linifolium L. 453.
majus L. 450.
minus L. 451.
monspessulanum L. 452.
odoratissimum Güldenst. 453.
odoratum M. B. 453.
Orontium L. 450.
parviflorum Jacq. 452.
pelisserianum L. 452.
repens L. 452.
repens Sm. 452.
simplex Willd. 452.
spurium L. 451.
striatum Lmk. 452.
triphyllum L. 452.
Apargia alpina Willd. Hst. 359.
aspera W. K. 359. 361.
aurantiaca Kit. 359.
autumnalis Willd. 358.
autumnalis β. Hartm. 358.
Berinii Bartl. 360.
Brumati Schied. 358.
canescens Siebr. 360.
crispa Willd. 360.
crocea Willd. 359.
dubia Hopp. 359.
dubia Willd. 359.
Apargia Gouani Schlchr. 359.
guestphalica v. Bngh. 359.
hastilis Hst. 359.
hastilis Willd. 359.
hastilis β. lucida Saut. 359.
hastilis γ. pinnatifida Saut. 360.
hirta Sm. 358.
hispanica Willd. 361.
hispida Hst. 359.
hyoseridiflora Saut. 360.
hyoseridifolia Less. 379.
hyoserioides Vest. 358.
hyoserioides Welw. 360.
incana Scop. 360.
pratensis Link. 358.
salina Fl. d. Wett. 367.
saxatilis Ten. 361.
Taraxaci Sm. 358.
Taraxaci Willd. 359.
tenuiflora Gaud. 360.
tergestina Hopp. 361.
umbellata Schrk. 361.
Apera Adans. 679.
interrupta Beauv. 680.
Spica venti Beauv. 679.
Aphanes arvensis L. 202.
Apium L. 242.
Ammi Crtz. 245.
crispum Mill. 243.
graveolens L. 243.

APOCYNEAE. 419.

Apocynum L. 420.
venetum L. 420.
Aposeris Neck. 356.
foetida Less. 356.

AQUIFOLIACEAE. 417.

Aquilegia L. 18.
alpina Haenk. 19.
alpina L. 19.
alpina Lmk. 19.
alpina Stbg. 19.
atrata Koch 19.
Haenkeana Koch 19.
montana Stbg. 19.
nigricans Rchb. 19.
nigricans Baumg. 19.
platysepala Rchb. 19.
pyrenaica DC. 19.
Sternbergiana Rchb. 19.
viscosa W. K. 19.
vulgaris L. 18.
vulgaris atroviolacea Avé Lallem. 19.
Arabis L. 33.
alpina L. 34.
arenosa Scop. 37.
aspera All. 34.
auriculata Lmk. 34.

Arabis *bellidifolia* Jcq. 37.
bellidifolia Scop. 38.
bellidioides Lmk. 38.
brassicaeformis Wallr. 33.
ciliaris Willd. 37.
ciliata R. Brw. 35.
caerulea Haenk. 37.
collina Ten. 36.
contracta Spenn. 35.
Crantziana Ehrh. 36.
crispata Willd. 34.
Gerardi Bess. 34.
glastifolia Rchb. 35.
Halleri DC. 37.
Halleri L. 37.
hirsuta Scop. 35.
hirsuta β. longisiliqua Koch. 35.
hirsuta I. sessilifolia Gaud. 35.
hirsuta II. incana Gaud. 35.
hirsuta γ. glaberrima Whlbg. 35.
hirta Lmk. 36.
hispida L. fil. 36.
incana Mönch. 34.
incana Roth. 34.
incana Willd. 36.
longisiliqua Wallr. 35.
muralis Bertol. 35.
nova Vill. 34.
nutans Mönch. 37.
ochroleuca Lmk. 37.
ovirensis Wulf. 37.
patula Wallr. 34.
patula β. Wallr. 34.
petraea Lmk. 36.
planisiliqua Pers. 35.
planisiliqua Rchb. 34.
praecox Willd. 36.
procurrens W. K. 36.
pubescens Dsf. 36.
pumila Jcq. 37.
recta Vill. 34.
rugosa Mönch. 37.
sagittata DC. 35.
sagittata Wimm. 34.
saxatilis All. 34.
scabra All. 37.
serpyllifolia Vill. 36.
stolonifera DC. 37.
stricta Hds. 36.
sudetica Tsch. 35.
tenella Hst. 37.
Thaliana L. 43.
Thaliana β. hispida Whlbg. 43.
Turrita L. 37.
umbrosa Crtz. 37.
verna R. Brw. 34.
vochinensis Spr. 36.
Aracium alpinum Monn. 372.
Aracium paludosum Monn. 378.
ARALIACEAE. 276.
Arbutus L. 412.
alpina L. 412.
Unedo L. 412.
Uva ursi L. 412.
Archangelica Hoffm. 259.
littoralis Whlbg. 259.
officinalis Hoffm. 259.
sativa Mill. 259.
Arctium Bardana Willd. 346.
carduelis L. 344.
Lappa L. 346.
Lappa Willd. 345.
majus Schk. 345.
minus Schk. 346.
Personata L. 344.
tomentosum Schk. 346.
Arctostaphylos Adans. 412.
alpina Spr. 412.
officinalis Wimm. et Gr. 412.
Uva ursi Spr. 412.
Arceuthobium Oxycedri M. B. 277.
Aremonia Neck. 192.
agrimonioides Neck. 192.
Arenaria L. 100.
aretioides Portschl. 97.
austriaca Jacq. 98.
austriaca All. 98.
austriaca β. DC. 98.
bavarica L. sp. 100.
biflora L. 102.
caespitosa Ehrh. 98.
cherlerioides Vill. 97.
ciliata L. 101.
ciliata Wulf. 101.
fasciculata Jcq. 99.
fastigiata Sm. 99.
frutescens Kit. 99.
Gerardi Willd. 98.
gothica Fries. 101.
graminifolia M. B. 99.
grandiflora All. 102. 107.
grandiflora L. spec.? 98.
heteromalla Pers. 99.
juniperina Vill. 102.
lanceolata All. 97.
lanceolata β. cherlerioides DC. 97.
laricifolia L. 98.
laricifolia β. DC. 98.
liniflora Jcq. 98.
liniflora L. fil. 98.
macrocarpa Hornem. 98.
marginata DC. 96.
marina Roth. 96.
marina β. Sm. 96.
Marschlinsii Koch. 101.
media L. 96.
media Poll. 95.
mucronata DC. 99.
multicaulis L. 101.
obtusa All. 97. 100.

Arenaria peploides L. 96.
polygonoides Wulf. 100.
quadrivalvis R. Brw. 99.
recurva All. 99.
rostrata Kit. 98.
rostrata Pers. 99.
rubra *α.* campestris L. 96.
rubra *β.* marina L. 96.
saxatilis Lois. 99.
saxatilis Roth. 98.
segetalis Lmk. 96.
serpyllifolia L. 101.
serpyillifolia *β.* alpina Gaud. 101.
setacea Thuill. 99.
sphagnoides Thom. 97.
striata L.? 99.
striata Roth. 98.
tenuifolia L. 99.
trinervia L. 101.
trinervis Sm. 101.
uliginosa Schleich. 97.
verna L. 98.
Villarsii Balb. M. K. 98.
villosa Wulf. 100.
viscida Hall. fil. 101.
viscida Lois. 101.
Aretia Gaud. 506.
alpina L. 504.
alpina Wulf. 504.
brevis Hgtschw. 504.
Charpenteri Heer. 504.
glacialis Schleich. 504.
helvetica Schk. 504.
Vitaliana L. 506.
Wulfeniana Sieb. 504.
Aria nivea Hst. 206.
Chamae-Mespilus Hst. 206.

ARISTOLOCHIEAE. 541.

Aristolochia L. 541.
Clematitis L. 542.
longa L. 542.
lutea Desf. 542.
pallida W. K. 541.
rotunda L. 541.
Armeria alpina Willd. 514.
littoralis Willd. 513.
maritima Willd. 514.
plantaginea Willd. 513.
purpurea Koch b. Ztg. 514.
scorzonerifolia Willd. 513.
vulgaris Willd. 513.
vulgaris *γ.* pubescens Deth. 513.
Armoracia macrocarpa. 58.
rusticana Fl. d. Wett. 58.
Arnica L. 329.
austriaca Hopp. 328.
Bellidiastrum Vill. 302.
Bellidiastrum Willd. 302.
Clusii All. 328.
Arnica cordata Wulf. 328.
Doronicum Jcq. 328.
glacialis Wulf. 328.
lanigera Ten. 336.
montana L. 329.
scorpioides L. 328.
styriaca Vill. 328.
Arnopogon Dalechampii Willd. 362.
picroides Willd. 362.
Arnoseris Gaertn. 356.
minima Koch. syn. ed. 1. 356.
pusilla Gaertn. 356.

AROIDEAE. 592.

Aronia Pers. 204.
cretica Auct. germ.? 205.
rotundifolia Pers. 205.
Aronicum Neck. 328.
Bauhini Rchb. 328.
Clusii Koch. 328.
Clusii *δ.* glaciale Koch. 328.
Doronicum Rchb. 328.
glaciale Rchb. 328.
latifolium Rchb. 328.
scorpioides Koch. 328.
scorpioides Rchb. 329.
scorpioides *α.* latifolium DC. 329.
scorpioides *β.* medium DC. 329.
scorpioides *γ.* glaciale DC. 329.
Arrhenatherum Beauv. 688.
avenacuum Beauv. 688.
bulbosum Schlchd. 688.
elatius M. K. 688.
elatius *β.* D. fl. 688.
Artemisia L. 313.
Abrotanum L. 315.
Absinthium L. 313.
atrata Bess. 315.
atrata Lam. 315.
austriaca Jcq. 315.
balsamita Willd. 315.
Baumgartenii Bess. 314.
Biasolettiana Vis. 314.
Boccone All. 315.
caerulescens L. 317.
campestris L. 316.
campestris *β.* sericea Fries. 316.
campestris Scop. 314.
camphorata Vill. 313.
corymbosa Lmk. 313.
Dracunculus L. 316.
gallica Willd. 317.
Genipi Stoechm. 315.
glacialis L. 314.
glacialis Wulf. 314.
grandiflora Hoffm. 314.
helvetica Schleich. 316.
humilis Wulf. 314.
intermedia Hst.? 314.
laciniata Willd. 315.

Artemisia *lanata* Willd. 314.
Lobelii All. 313.
maritima L. 316.
maritima Willd. 317.
Mertensiana Wallr. 315.
mutellina Vill. 314.
nana Gaud. 316.
nivea Redowsk. 315.
orientalis Willd. 315.
pedemontana Balb. 314.
pontica L. 315.
repens Pall. 315.
rupestris Allion. 314.
rupestris L. 314.
rupestris Scop. 313.
rupestris Vill. 315.
rupestris β. L. 314.
salina Willd. 317.
saxatilis Willd. 313.
scoparia W. K. 316.
Seriphium Wallr. 317.
spicata Roch. 314.
spicata Wulf. 314.
subcanescens Willd. 313.
tanacetifolia All. 315.
tanacetifolia Lmk. 315.
umbelliformis Lmk. 314.
valesiaca All. 317.
viridifolia Ledeb. 314.
vulgaris L. 316.
Arthrocnemum fruticosum Moq. Tand. 521.
Arthrolobium scorpioides DC. 164.
Arum L. 592.
Arisarum L. 592.
italicum Mill. 592.
maculatum L. 592.
Arundo L. 683.
acutiflora Schrad. 681.
Ampelodesmos Cyrill. 684.
arenaria L. 681.
baltica Flügg. 682.
Calamagrostis Hall. fil. 681.
Calamagrostis L. 680.
Calamagrostis M. B. 680.
canescens Wigg. 680.
Clarionis Lois. 681.
collina Ten. 684.
Donax L. 683.
effusa Gmel. 680.
Epigeios L. 680.
festucoides Desf. 684.
glauca M. B. 680.
Halleriana Gaud. 681.
humilis R. S. 681.
intermedia Gmel. 680.
isiaca Sieb. 683.
Leersii Oett. 680.
littorea Schrad. 680.
mauritanica Desf. 684.
Arundo mauritanica Poir. 684.
montana Gaud. 681.
neglecta Ehrh. 681.
Phragmites L. 683.
Phragmites β. subuniflora DC. 683.
Phragmites β. flavescens Curt. 683.
Pliniana Turr. 684.
Plinii May. et Br. 683.
Plinii Vitm. 684.
Pseudophragmites Hall. fil. 680.
Pseudophragmites Lej. 683.
Pseudophragmites Schrad. 681.
speciosa Schrad. 683.
stricta Timm. 681.
sylvatica Schrad. 681.
tenax Vahl 684.
tenella D. Fl. 681.
tenella Host., Schrad. 681.
tenella β. D. Fl. 681.
varia Schrad. 681.
Asarum L. 542.
europaeum L. 542.
ASCLEPIADEAE. 418.
Asclepias Vincetoxicum L. 419.
ASPARAGEAE. 611.
Asparagus L. 611.
acutifolius L. 612.
amarus DC. 611.
Corruda Scop. 612.
marinus Rchb. 611.
officinalis L. 611.
officinalis α. β. L. 611.
scaber Brign. 611.
sylvaticus W. K. 612.
tenuifolius Lmk. 611.
Asperugo L. 430.
procumbens L. 431.
Asperula L. 280.
Aparine Schott., M. B. 281.
arvensis L. 280.
canescens Vis. 281.
cynanchica L. 281.
galioides M. B. 281.
laevigata L. 281.
longiflora W. K. 280.
molluginoides Rchb. 281.
montana Kit. 281.
odorata L. 281.
rivalis Sibth. 281.
taurina L. 280.
tinctoria L. 281.
Asphodeline liburnica Rchb. 616.
lutea Rchb. 616.
Asphodelus L. 615.
albus Mill. 616.
creticus Lam. 616.
fistulosus L. 616.
liburnicus Scop. 616.
luteus L. 616.

Asphodelus neglectus Schult. 616.
ramosus L. 616.
ramosus St. 616.
Aspidium R. Brw. 732.
aculeatum Döll. 732.
aculeatum Schltz. 732.
aculeatum St. 732.
aculeatum Sw. 732.
aculeatum *α.* vulgare Doell. 732.
aculeatum *γ.* Braunii Doell. 733.
aculeatum subtripinnatum 732.
alpinum Willd. 735.
angulare Kit. 732.
angulare Willd. 732.
Braunii Spenn. 733.
cristatum Sw. 734.
dentatum Sw. 735.
depastum Schkhr. 733.
dilatatum Godr. 734.
dilatatum Willd. 734.
dumetorum Smith. 734.
erosum Schkhr. 733.
Filix fem. Sw. 736.
Filix mas Sw. 733.
Filix mas *β.* erosum Doell. 733.
fontanum Willd. 737.
fragile St. 735.
fragile Sw. 735.
Halleri Willdw. 736.
irriguum Smith. 736.
lobatum Sw. 732.
Lonchitis Sw. 732.
montanum Sw. 736.
Oreopteris Sw. 733.
regium Sw. 735.
rhaeticum Dicks., Willd. 735.
rigidum Sw. 734.
rigidum b. remotum Alex. Br. 734.
rufidulum Sw. 731.
spinulosum Doell. 734.
spinulosum Willd. 734.
spinulosum *α.* Hartm. 734.
spinulosum *β.* Hartm. 734.
Thelypteris Sw. 733.
Asplenium L. 736.
Adianthum nigrum L. 737.
alternifolium Wulf. 737.
Breynii Retz 737.
Ceterach. L. 730.
fissum Kit. 737.
Filix femina Bernh. 736.
germanicum Weis. 737.
Halleri Rob. Brwn. 736.
Halleri Willd. 736.
Ruta muraria L. 737.
Scolopendrium L. 738.
septentrionale Sw. 737.
Serpentini Tsch. 737.
Serpentini *β.* incisum Tsch. 737.
Trichomanes L. 737.
Asplenium *viride* Huds. 737.
Asprella nardiformis Hst. 721.
oryzoides Lmk. 677.
Aster L. 300.
alpinus L. 300.
amelloides Hoffm. 301.
amelloides Rchb. 301.
Amellus L. 301.
Amellus *γ.* hispidus DC. 301.
annuus L. 303.
Bellidiastrum Scop. 302.
brumalis N. a. E. 301.
Bubonium Scop. 307.
canus W. et K. 302.
dracunculoides Willd. 302.
dysentericus Scop. 308.
ensifolius Scop. 307.
Helenium Scop. 306.
hirtus Scop. 307.
hirsutus Hst. 301.
lanceolatus Lej. 302.
leucanthemus Desf. 302.
miser Ait. 302.
Novi Belgii L. 301.
Novi Belgii Willd. 301.
pannonicus Jcq. 301.
parviflorus N. a. E. 302.
Pseudo-Amellus DC. 301.
pulicarius Scop. 308.
salicifolius Scholl. 301.
salicinus Scop. 307.
salignus Willd. 301.
serotinus Willd. 301.
tinctorius Wallr. 301.
Tripolium L. 301.
Asteriscus Tournef. 306.
aquaticus Less. 306.
Asterocephalus argenteus Spreng. 297.
Asterocephalus gramuntius Spr. 295.
suaveolens Wallr. 296.
suaveolens var. silenifolia Rb. 297.
succisa Wallr. 295.
Asterolinon stellatum Fl. Portug. 503.
Astragalus L. 159.
albidus W. K. 161.
alopecuroides L. 162.
alpinus L. 157.
arenarius L. 160.
arenarius Pall. 160.
argenteus Bertol. 160.
aristatus L'Herit. 162.
asper Jcq. 162.
austriacus Jcq. 160.
campestris L. 158.
chloranthus Pall. 162.
Cicer L. 161.
danicus Retz. 160.
dealbatus Pall. 161.
depressus L. 161.
dichopterus Pall. 160.

Astragalus epiglottis L. syst. 160.
exscapus L. 162.
foetidus Vill. 158.
glaucus M. B. 161.
glycyphyllos L. 161.
Halleri All. 158.
hamosus L. 161.
hypoglottis L. mant. 159.
incanus Wulf. L. 162.
incurvus Dsf. Rchb. 162.
leontinus Whlbg. 157.
leontinus Wulf. 157. 159.
leucophaeus Sm. 161.
microphyllus Schübl. Mart. et plurim. auct. germ. 161.
microphyllus Willd. 160.
microphyllus L. 160.
monspessulanus L. 162.
montanus L. 157. 159.
Mülleri Steud. et Hochst. 160.
Onobrychis L. 160.
Onobrychis Poll. 160.
oroboides Hornem. 157.
pilosus L. 158.
purpureus Lmk. 159.
sempervirens Lmk. 162.
sesameus L. 161.
sordidus v. Spitzel 158.
sordidus Willd. 158.
subulatus Koch bot. Ztg. 160.
sulcatus L. 160.
tyrolensis L. 158.
uralensis L. 158.
uralensis Wulf. 157.
valesiacus Thom. 158.
velutinus Sieb. 158.
vesicarius L. 161.
virgatus Rchb. 160.
Wulfenii Koch 162.
Astrantia L. 241.
carinthiaca Hopp. 241.
carniolica Wulf. 241.
Diapensia Scop. 240.
Epipactis L. fil. 241.
gracilis Bartl. 241.
major L. 241.
minor L. 241.
minor Scop. 241.
pallida Presl. 241.
pauciflora Bertol. 241.
Athamanta Koch. 255.
Cervaria L. 261.
cretensis L. 256.
cretensis β. mutellinoides DC. 256.
cretensis γ. glabra Gaud. 256.
daucifolia Hst. 254.
Golaka Hacq. 275.
Libanotis L. 254.
Matthioli Wulf. 256.
Matthioli Rchb., Sut. 256.
Athamanta Meum L. 257.
mutellinoides Lmk. 256.
Oreoselinum L. 261.
pubescens Retz. 254.
pyrenaica Jcq. 254.
rupestris Rchb. 356.
rupestris Vill. Scop. 256.
sibirica L. 255.
Athyrium Filix femina Bernh. 736.
Halleri Roth. 736.
molle Roth. 736.
ovatum Roth. 736.
raethicum Roth. 736.
trifidum Roth. 736.
Atractylis Fusus agrestis Gaertn. 349.
lanata Scop. 349.
Atragene L. 2.
alpina L. 2.
austriaca Scop. 2.
Atriplex L. 527.
acuminata W. K. 527.
alba Scop. 529.
angustifolia Sm. 528.
campestris Koch et Z. 527.
erecta Sm. 528.
deltoides Bab. 528.
hastata L., Skhr. 528.
hastata γ. calotheca Schumach. 528.
hastata Pollich. et plur. auct. 528.
Hermanni Willemet. 527.
hortensis L. 527.
laciniata L. 528.
laciniata Schk. 528.
latifolia Whlbg. 528.
littoralis L. 528.
marina auctor., Deth. 528.
microsperma W. K. 528.
nitens Rbt. 527.
oblongifolia W. K. 527.
oppositifolia DC. 528.
patula L. 528.
patula Sm. Poll. 528.
patula var. salina Wallr. 528.
patula γ. farinosa D. Fl. 528.
pedunculata L. 527.
Portulacoides L. 527.
prostrata DC. Bab. 528.
rosea L. 529.
ruderalis Wallr. 528.
Sackii Rostk. 528.
sinuata Hoffm. 529.
tatarica L. 527.
tatarica Schk. 527.
verticillata Lagasc. 529.
virgata Hoffm. 528.
Atropa L. 441.
Belladonna L. 441.
Mandragora L. 441.
Avena L. 688.
airoides Koel. 692.

Avena *alpestris* Hst. 692.
alpina Sm. Rchb. 690.
amethystina Clar. 690.
argentea Willd. 692.
atherantha Prsl. 689.
aurata All. 679.
barbata Broter. 689.
brevifolia Hst. 692.
brevis Roth. 689.
bromoides D. fl., M. et Koch. 690.
bromoides L. 690.
bulbosa Willd. 688.
calycina Vill. 693.
capillaris M. K. 693.
caryophyllea Wigg. 693.
Cavanillesii Koch. 692.
distichophylla Hst. 692.
distichophylla Vill. 692.
dubia Leers. 691.
elatior L. 688.
fallax Bert. 691.
fallax DC. 691.
fallax R. et S.? 691.
fallax Ten. 691.
fatua L. 689.
fertilis All. 691.
flavescens L. 692.
flavescens β. major Schrad. 692.
flavescens γ. variegata Gaud. 692.
flexuosa D. fl. 688.
fragilis L. 714.
hirsuta Roth. 689.
hybrida Peterm. 689.
lanata Koel. 688.
Loeflingiana Cav. 693.
mollis Koel. 688.
nervosa Lmk. 689.
nuda L. 689.
orientalis Schreb. 689.
planiculmis Schrad. 690.
praecox Beauv. 693.
praeusta Rchb. 690.
pratensis L. 690.
precatoria Thuill. 688.
pubescens L. 690.
pusilla Wigg. 693.
sativa L. 689.
Scheuchzeri All. 690.
sedinensis DC. 691.
sedinensis Salzm. 691.
sempervirens Vill. 690.
sempervirens DC., Hst. 691.
sesquitertia Hst. 692.
spicata β. Willd. 693.
sterilis L. 689.
striata Lmk. diction. 691.
striata Lmk. illustr. 691.
stricta Hst. 693.
strigosa Schreb. 689.
subspicata Clairv. 692.
Avena subspicata Gaud., Rchb. 692.
tenuis Mönch. 691.
triaristata Vill. 691.
trisperma Schübl. et Mart. 689.
versicolor Vill. 690.
Axyris ceratoides L. 526.
Azalea L. 414.
procumbens L. 414.

B.

Ballota L. sp. 494.
alba L. 494.
borealis Schweig. 495.
foetida Lmk. 494.
foetida Rchb. 495.
hirta hort. Berol. 495.
nigra Benth. 494.
nigra L. 494.
nigra Rchb. 495.
nigra Sm. 494.
ruderalis Fries. 495.
urticifolia Ortm. 495.
vulgaris Hoffmsgg. et Link. 495.

BALSAMINEAE. 123.

Balsamita major Dsf. 317.
Barbarea R. Brw. 32.
arcuata Rchb. 33.
hirsuta Weih., Rchb. 33.
iberica DC. 33.
parviflora Fries. 33.
praecox Brw. 33.
stricta Andrz. 33.
taurica DC. 33.
vulgaris Brw. 33.
vulgaris Sturm 33.
vulgaris β. D. fl. 33.
Barbula hirci Camer. 363.
Barkhausia cernua Rchb. 377.
foetida DC. 373.
hispida Link. 374.
intybacea DC. 374.
praecox Rchb. 374.
rhoeadifolia M. B. 373.
rubra Mönch. 373.
setosa DC. 374.
taraxacifolia DC., Rchb. 374.
vesicaria Spr. 374.
Bartsia L. 472.
alpina L. 472.
latifolia Sm. 472.
Odontites Sm. 473.
serotina Brt. 473.
Bellidiastrum Cass. 302.
Michelii Cass. 302.
montanum Bl. et Fgh. 302.
Bellis L. 302.
alpina major Bauh. 325.
annua L. 302.

Bellis *perennis* L. 302.
sylvestris Cyrill. 302.

BERBERIDEAE. 23.

Berberis L. 23.
vulgaris L. 23.
Berina andryaloides Brign. 376.
Berteroa incana DC. 53.
viridis Tsch. 53.
Berula Koch. 248.
angustifolia Koch. 248.
Bessera azurea Schult. 437.
Beta L. 525.
foliosa Ehrh. 526.
hortensis. Mill. 526.
maritima L. 526.
maritima M. B. 526.
vulgaris L. 526.
vulgaris Mill. 526.
vulgaris Cicla L. 526.
vulgaris maritima Koch. 526.
Betonica L. 492.
Alopecuros L. 493.
danica Mill. 493.
densiflora Benth. 493.
hirsuta L. 493.
hirta Rchb. 492.
incana Ait., Rchb. 493.
Monnieri Gouan. 493.
officinalis L. 492.
officinalis Spr., Leys., Rchb. 492.
serotina Hst. 493.
stricta Ait. 492.
Betula L. 571.
alba L. 572.
Alnobetula Ehrh. 573.
Alnus *α.* glutinosa L. 573.
aurea Borkh. 572.
carpathica Willd. 572.
fruticosa Pall. 572.
fruticosa Willd. 572.
glutinosa Wallr. 572.
humilis Schrk. 572.
hybrida Bechst. 572.
intermedia Thom. 572.
laciniata Whlbg. 572.
nana L. 572.
odorata Bechst. 572.
ovata Schrk. 573.
pendula Roth. 572.
pubescens Ehrh. 572.
verrucosa Ehrh. 572.
viridis Chaix. 573.

BETULINEAE. 571.

Biasolettia Koch. 273.
nodosa Bert. 272.
tuberosa Koch. 273.
Bidens L. 309.
bipinnata 309.
Bidens *cernua* L. 309.
minima L. 309.
tripartita L. 309.
Bifora Hoffm. 275.
flosculosa M. B. 276.
radians M. B. 276.
testiculata DC. 276.
Biscutella L. 61.
alpestris W. K. 61.
ambigua DC. 62.
ambigua Wallr. 61.
didyma Scop. 62.
hispida DC. 61.
laevigata L. 61.
laevigata *β.* glabra Gaud. 62.
longifolia Vill. 62.
lucida DC. 62.
obcordata Rchb. 62.
saxatilis Schleich. 62.
subspathulata Sut. 62.
Blechnum L. 738.
boreale Sw. 738.
crispum Hrtm. 739.
septentrionale Wallr. 738.
Spicant Roth. 738.
Blitum L. 525.
Bonus Henricus C. A. Meyer. 525.
Bonus Henricus Moquin - Tand. 525.
capitatum L. 525.
capitatum Sturm. 525.
glaucum Koch. 525.
polymorphum C. A. Meyer. 525.
rubrum Rchb. 525.
virgatum L. 525.
Blysmus compressus Panz. 645.
rufus Link. 646.
Bonarota chamaedrifolia Scop. 460.
Bonjeania Rchb. 154.
hirsuta Rchb. 154.
Bootia vulgaris Neck. 86.
Borkhausenia lutea Fl. d. Wett. 28.
Borkhausia apargioides Host. 367.
hispida Link. 374.

BORAGINEAE. 430.

Borago L. 432.
officinalis L. 432.
Botrychium Swtz. 729.
Lunaria Swtz. 729.
Lunaria *β.* rutaceum Whlbg. 729.
Lunaria *δ.* rutaefolia Roep. 729.
matricariaefolium Alex. Br. 729.
matricarioides Wlld. 729.
rutaceum Swtz. 729.
rutaceum Whlbg. 729.
rutaceum Wlld. 729.
rutaefolium Alex. Br. 729.
Botrydium aromaticum Spach. 525.
Brachylobus amphibius All. 31.

Brachypodium Beauv. 709.
caespitosum R. S. 709.
distachyon R. S. 710.
Halleri R. S. 703.
loliaceum R. S. 695.
pinnatum Beauv. 709.
pinnatum *α.* vulgare Rchb. 709.
pinnatum *β.* Gaud. 709.
Plukenetii Link. 709.
Poa R. S. 703.
psilanthum Link. 703.
ramosum R. S. 709.
rupestre R. S. 709.
sylvaticum R. S. 709.
tenellum Schult. 703.
tenuiflorum R. S. 703.
Brassica L. 47.
alpina L. 34.
austriaca Jcq. 47.
campestris L. 48.
campestris Koch. 48.
campestris oleifera praecox DC. 48.
campestris pabularia DC. 48.
cheiranthiflora DC. 49.
Cheiranthus Vill. 49.
Eruca L. 50.
Erucastrum *α.* Gaud. 49.
Erucastrum *β.* ochroleuca Gaud. 50.
Erucastrum DC. et L. 49.
Erucastrum Poll. 49.
montana DC. 49.
muralis Hds. 50.
Napus L. 48.
Napus oleifera (biennis) DC. 48.
Napus rapifera Metzg. 48.
Napus *β.* esculenta DC. 48.
nigra Koch. 48.
oleracea L. 47.
oleracea *z.* Napobrassica L. 48.
orientalis L. 47.
praecox W. K.? 48.
Rapa L. 48.
Rapa oleifera annua Metzg. 48.
Rapa C. oleifera DC. 48.
Rapa rapifera Metzg. 48.
Braya Stbg. Hopp. 44.
alpina Stbg. Hopp. 44.
pinnatifida (Sisymbrium) L. 44.
supina (Sisymbr.) L. 44.
Briza L. 694.
Eragrostis L. 695.
maxima L. 694.
media L. 694.
minor L. 694.
Bromus L. 710.
agrestis All. 713.
alopecuroides Moris. 711.
ambiguus Cyrill. 704.
angustifolius Schrk. 713.
arduennensis Kunth. 710.
Bromus arundinaceus Roth. 708.
arvensis L. 712.
arvensis Poll. 713.
asper Gmel. 712.
asper Murr. 712.
badensis Gmel. 712.
brachystachys Hornung. 711.
caespitosus Hst. 709.
commutatus Koch. et Z. 712.
commutatus Schrad. 711. 712.
confertus M. B., Rchb. 711.
corniculatus Lmk. 709.
dertonensis All. 704.
diandrus Curt. 713.
diandrus Smth. 713.
distachyos L. 710.
dumosus Vill. 709.
elatior Koel. 709.
elatior Spr. 708.
elongatus Gaud. 710.
erectus Hds. 712.
erectus Moris. 711.
giganteus L. 708.
glomeratus Scop. 702.
gracilis Weig. 709.
grossus DC. 710.
grossus *α*, *β*, *γ*. D. fl. 710.
grossus *α*, *β*. Gaud. 710.
gynandrus Roth. 713.
hirsutus Curt. 712.
hirsutus Schrk. 712.
hordaceus Fries. 711.
hordaceus Gmel. 710.
inermis Leyss. 713.
inermis L. 713.
inermis Schrb. 713.
intermedius Guss. 711.
littoreus Retz. 708.
madritensis L. 713.
maximus Babgt. 713.
maximus Desf. 713.
mollis L. 711.
montanus Gmel. 712.
montanus Fl. d. Wett. 713.
montanus Poll. 712.
multiflorus Hst. 712.
multiflorus Roth. 711.
multiflorus Smith. 710.
multiflorus Weig. 712.
multiflorus *β.* Rchb. 710.
nanus Weig. 711.
nemoralis Huds. 712.
nemorosus Vill. 712.
patulus M. K. 712.
patulus *β.* M. K. 712.
perennis Vill. 712. 713.
pinnatus L. 709.
pinnatus *β.* L. 709.
pratensis Ehrh. 711.
Plukenetii All. 709.

Bromus pseudoarvensis Koel. 713.
racemosus L. 711.
ramosus L. 709.
ramosus Murr. 712.
rigidus Roth. 713.
rubens Hst. 713.
rupestris Hst. 709.
scaberrimus Bert. 713.
secalinus L. 710.
secalinus Schrad. 710.
simplex Gaud. 711.
squarrosus Hst. 712.
squarrosus L. 712.
squarrosus *β.* D. fl. 712.
sterilis L. 713.
strictus Scop. 702.
sylvaticus Poll. 709.
tectorum L. 713.
triflorus Ehrh. 707.
triflorus L. 708.
triflorus Poll. 691.
trivialis Sav. 686.
velutinus Schrad. 710.
versicolor Poll. 712.
villosus Gmel. 712.
Bryonia L. 216.
alba L. 216.
dioica Jacq. 216.
Buffonia L. 93.
tenuifolia L. 93.
Buglossum angustifolium Tsch. 433.
italicum Tsch. 433.
paniculatum Tsch. 433.
vulgare Tsch. 433.
Bulbocodium L. 628.
vernum L. 628.
Bulliarda DC. 221.
aquatica DC. 221.
prostrata D. fl. 221.
Vaillantii DC. 221.
Bunias L. 66.
aspera Retz. 66.
Cakile L. 66.
Erucago L. 66.
orientalis L. 66.
syriaca Gaertn. 65.
Bunium Koch. 246.
Bulbocastanum L. 246.
cynapioides. Bert. 273.
divaricatum Bert., Ces. 246.
montanum Koch. 246.
Buphthalmum L. 305.
aquaticum L. 306.
cordifolium W. K. 305.
grandiflorum L. 306.
speciosissimum Ard. 305.
speciosum Schreb. 305.
spinosum L. 306.
salicifolium L. 305.
Bupleurum L. 248.
Bupleurum *affine* Sadl. 249.
aristatum Bartl. 249.
angulosum Spr., Rchb. 250.
baldense M. B. 250.
baldense W. K. 249.
Burserianum Schleich. 250.
caricifolium Rchb. 250.
caricifolium Willd. 250.
caricinum DC. 250.
exaltatum M. B. 250.
falcatum L. 249.
Gerardi Jcq. 249.
Gerardi Fl. d. Wett. 249.
Gerardi var. *β.* Sadl. 249.
gramineum Vill. 250.
graminifolium Vahl. 250.
junceum Gmel. 248.
junceum L. 249.
junceum Poll. Gmel. 248.
junceum M. B. 249.
longifolium L. 250.
Odontites L. sp., D. fl. 249.
Odontites Rchb., DC. 249.
perfoliatum Lmk. 251.
petraeum Wulf., Rchb. 250.
Pollichii Gmel. 248.
protractum Link. et Hoffmsgg. 250.
ranunculoides L. 250.
ranunculoides Rchb. ic. 250.
rotundifolium L. 251.
scorzonerifolium Willd. 250.
semicompositum L. 249.
stellatum L. 250.
subovatum Link 251.
tenuissimum L. 248.
tenuissimum *β.* nanum DC. 248.
BUTOMEAE. 581.
Butomus L. 581.
umbellatus L. 581.
Buxus L. 542.
sempervirens L. 543.
suffruticosa Lmk. 543.

C.

Cacalia L. fil., Sturm. 298.
alliariaefolia Lmk. 298.
alpina L. 298.
glabra Vill. 298.
hirsuta Vill. 298.
leucophylla Willd. 299.
Petasites Lmk. 298.
saracenica L. 335.
tomentosa Jcq. 298.
tomentosa Vill. 299.
tomentosa *β.* hybrida Vill. 298.
Cachrys maritima Spr. 257.
CACTEAE. 227.
Cactus Opuntia L. 228.

CAESALPINIEAE. 178.
Cakile Tournef. 66.
aegyptiaca Willd. 66.
latifolia Poir. 66.
maritima Scop. 66.
maritima *β.* sinuatifolia DC. 66.
rugosa L'Herit. 67.
Serapionis Gaertn. 66.
Calamagrostis Roth. 680.
acutiflora DC. 681.
alpina Hst. 681.
arenaria Roth. 681.
argentea DC. 683.
arundinacea Roth. 681.
Clarionis Lois. 681.
epigeios Roth. 680.
Gaudiniana Rchb. 680.
glauca Rchb. 680.
Halleriana DC. 680.
Hübneriana Rchb. 680.
lanceolata Roth. 680.
laxa Hst. 680.
littorea DC. 680.
littorea Rchb. 680.
montana Hst. 681.
nigricans Merat. 683.
nutans Saut. 681.
Pseudophragmites Rchb. 680—681.
pulchella Saut. 681.
pyramidalis Hst. 681.
ramosa Hst. 680.
Schwabii Spr. 682.
speciosa Hst. 683.
stricta Spr. 681.
sylvatica DC., Hst. 681.
tenella Hst. 681.
varia Hst. 681.
Calamintha Mönch. 484.
Acinos Clairv. 484.
alpina Lmk. 484.
arvensis Lmk. 484.
grandiflora Mönch. 484.
hederacea Scop. 487.
menthaefolia Hst. 484.
montana *α.* Lmk. 484.
Nepeta Clairv. 484.
obliqua Hst. 484.
officinalis Mönch. 484.
parviflora Lmk. 484.
rotundifolia Hst. 484.
rupestris Hst. 485.
thymifolia Rchb. 485.
trichotoma Mönch. 484.
umbrosa Rchb. 484.
Calendula L. 337.
arvensis L. 337.
officinalis L. 337.
Calepina Dsv. 66.
Corvini Dsv. 66.
Calla L. 592.
Calla *palustris* L. 592.
Callianthemum coriandrifolium Rchb. 11.
rutaefolium Meyer. 11.
rutaefolium Rchb. 11.
Callitriche L. 212.
angustifolia Hopp. 212.
aquatica Hds. 212.
autumnalis Kützing. 212.
autumnalis L. 212.
caespitosa Schultz. 212.
hamulata Ktzg. 212. 213.
intermedia Hopp. 212.
minima Hopp. 212.
pallens M. B. 212.
pedunculata DC. 212.
platycarpa Kützg. 212. 213.
stagnalis Scop. 212.
stellata Hopp. 212.
verna Kütz. 212.
verna L. 212.
CALLITRICHINEAE. 212.
Calluna Salisb. 413.
vulgaris Salisb. 413.
Calotheca bromoidea Lej. 710.
littoralis Spr. 702.
Caltha L. 17.
palustris L. 17.
Camelina Crtz. 58.
austriaca Pers. 31.
dentata Pers. 59.
microcarpa Andrz. 58.
pinnatifida Hornm. 59.
sativa Crtz. 58.
sativa *β.* glabrata DC. 58.
sativa var. *β.* Fries. 58.
saxatilis Pers. 58.
sylvestris Fries. 58.
sylvestris Wallr. 58.
Campanula L. 404.
aggregata Willd. 409.
aggregata *α.* farinosa Rchb. 409.
Allionii Vill. 409.
alpina Jacq. 409.
Alpini L. 410.
barbata L. 409.
Baumgartenii Beck. 406.
bononiensis. L. 406.
caespitosa Scop. 405.
caespitosa Vill. 405.
capitata Rchb. 409.
carnica Schied. 406.
cenisia L. 408.
cervicaria L. 408.
congesta R. S. 409.
cordata. Vis. 410.
crenata Link. 406.
Elatines All. 407.
Elatines L. 407.

Campanula Elatines Morettii Hst. 407.
Elatines Ten. 407.
elliptica Kit. 409.
elliptica Rchb. 409.
Erinus L. 407.
excisa Schleich. 405.
farinosa Andrz., Bess. 409.
filiformis Morett. 407.
Fischeri Schult. 410.
garganica Ten. 407.
glomerata L. 409.
glomerata β. farinosa Rchb. 409.
glomerata β. salviaefolia Wallr. 409.
graminifolia Hst. L. 410.
hederacea L. 411.
hispida Lej. 408.
Hostii Bmg. 406.
hybrida L. 410.
intermedia Schult. 410.
latifolia L. 407.
ligulata Rchb. 409.
ligulata W. K. 409.
lilifolia L., D. fl. 410.
linifolia DC. 406.
linifolia Lmk. 406.
linifolia Scop. 406.
Medium L. 409.
Morettiana Rchb. 407.
neglecta R. S. 408.
patula L. 408.
patula β. punctata Wallr. 408.
patula γ. flaccida Wallr. 408.
persicifolia L. 408.
persicifolia β. grandiflora DC. 408.
petraea Schmidt. 409.
pubescens Schmidt. 405.
pulla L. 405.
pulla Pollin. 407.
pusilla Haenk. 405.
pyramidalis L. 407.
Raineri Perpent. 407.
rapunculoides L. 406.
Rapunculus L. 408.
rhomboidalis L. 406.
rhomboidea Willd. 406.
rotundifolia L. 405.
rotundifolia β. L. 405.
rotundifolia γ. L. 406.
rotundifolia δ. lancifolia D. fl. 406.
rotundifolia β. reniformis Pers. 406.
rotundifolia β. velutina DC. 406.
ruthenica M. B. 406.
Scheuchzeri Vill. 406.
sibirica L. 409.
simplex DC. 406.
speciosa Hornem. 409.
Speculum L. 410.
spicata L. 408.
suaveolens Willd. 410.
Campanula tenuifolia Hoffm. 406.
tenuifolia W. K. 410.
Thaliana Rchb. 406.
Thaliana Wallr. 406.
thyrsoidea L. 408.
trachelioides M. B. 406.
trachelioides Rchb. 406.
Trachelium L. 406.
ucranica Spr. 406.
uniflora Vill. 406.
urticifolia Schm. 407.
valdensis All. 406.
Zoisii Wulf. 404.

CAMPANULACEAE. 402.
Camphorosma L. 526.
acuta Poll. 523.
monspeliaca L. 526.
monspeliaca Poll. 623.
Cannabis L. 551.
sativa L. 551.

CAPPARIDEAE. 68.
Capparis L. 68.
Fontanesii DC. 68.
herbacea Willd. 68.
ovata Dsf. 68.
ovata M. B. 68.
rupestris Sibth. 68.
spinosa L. 68.
spinosa β. L. 68.
spinosa γ. Lmk. 68.
Capraria gratioloides L. 461.

CAPRIFOLIACEAE. 277.
Caprifolium italicum R. S. 279.
Capsella Medik. 63.
Bursa pastoris Mönch. 63.
ellyptica Mey. 64.
elliptica var. integrifolia St. 64.
integrifolia DC. 64.
pauciflora Koch. 64.
petraea Fries. 63.
procumbens Fries. 64.
Cardamine L. 38.
alpina Willd. 38.
amara L. 39.
amara β. hirta Wimm. et Gr. 39.
amara γ. pubescens. Lej. et Court. 39.
amara γ. umbrosa Wimm. et Gr. 39.
amara γ. umbrosa DC. 39.
asarifolia L. 38.
bellidifolia L. 38.
bellidifolia β. alpina DC. 38.
dentata Schult. 39.
diversifolia Sternb. 37.
feroensis Fl. Dan. 36.
graeca L. 39.
hastulata Engl. Bot. 36.

Cardamine heterophylla Hst. 38.
hirsuta Fl. Dan. 39.
hirsuta L. 39.
hirsuta *α. β.* D. fl. 39.
hirsuta *α.* campestris Fries. 39.
hirsuta *β.* D. fl. 38.
hirsuta *β.* sylvestris Fries. 38.
hirsuta *β.* micrantha Gaud. 39.
hirsuta v. clandestina Fries. 38.
impatiens L. 38.
intermedia Hornem. 39.
Libertiana Lej. 39.
maritima Portschl. 39.
maritima var. Rchb. 40.
multicaulis Hopp. 39.
Opicii Presl. 39.
parviflora L. 38.
petiolaris DC. 40.
petraea L. 36.
pratensis L. 39.
pratensis *β.* dentata Rchb. 39.
Plumieri Vill. 39.
resedifolia L. 38.
stolonifera Scop. 44.
sylvatica Bess. 39.
sylvatica Hoffm., Hartm. 39.
sylvatica Link. 38.
thalictroides All. 39.
trifolia L. 40.
umbrosa Andrz. 39.
umbrosa Lej. 39.
Cardaminum Nasturtium Moench. 31.
Cardaria Draba Dsv. 62.
Cardiolepis dentata Wallr. 62.
Carduus L. 342.
acanthifolius Lmk. 340. 748.
acanthoides L. 343.
acanthoides Schkr. 343.
acanthoides v. canescens Schl. 343.
acanthoidi-nutans 345.
acaulis 341. 746.
acuminatus Gaud. 343.
alpestris Schleich. 343.
alpestris W. K. 344. 345.
anglicus Lmk. 341. 745.
arctioides Schleich. 343.
arctioides Vill. 344.
arctioides Willd. 344.
Argemone Lmk. 344.
Argemone Schleich. 344.
autareticus Vill. 756. 757.
candicans Koch., W. K. 344.
canus L. 338. 745.
carlinaefolius Koch., Lmk. 344.
carlinaefolius DC. 345.
centauroides Hopp. 344.
cerinthaefolius Vill. 348.
cerinthoides Willd. 348.
cirsioides Vill. 344.
cellinus W. Kit. 344.
Carduus crassifolius Koch. 344.
crassifolius Willd. 344.
crispo-nutans 345.
crispus Huds. 343.
crispus L. 343.
crispus *β.* DC. 343.
cyanoides M. B. 349.
cyanoides *α.* monoclonos L. 349.
defloratus L. 344.
defloratus *β.* alpestris DC. 344.
defloratus *δ.* rhaeticus DC. 344.
dissectus Huds. 341. 745.
eriophorus L. 338. 743.
Erisithales Jacq. Lmk. 339. 747.
Erisithales Vill. 340. 746.
glaucus Baumg. 344.
glaucus Cavan. 348.
hamulosus Ehrh. 344.
hamulosus W. K. 344.
helenioides L. 340. 746.
helenioides Sut. 340. 746.
heterophyllus L. 340. 746.
lanceolatus L. 338. 743.
leptophyllus Gaud. 344.
leucographus L. 342.
lycopifolius Vill. 348.
marianus L. 342.
medius Gouan. 344.
microcephalus Gaud. 343.
mollis L. 348.
mollis Pollich. 349.
montosus Pollin. 345.
multiflorus Gaud. 343.
nitidus W. K. 348.
nutans L. 345.
nutans *β.* Bert. 345.
nutanti-acanthoides 345.
orthocephalus Wllrth. 345.
palustris L. 338. 744.
pannonicus L. fil. 339. 744.
Personata L. 343.
platylepis Saut. 345.
polyacanthos Schreb. 343.
polyanthemos Doell. 345.
polyanthemos Schleich. 343. 345.
pratensis Huds. 341. 745.
pycnocephalus DC. 343.
pycnocephalus Dub. 342.
pycnocephalus Jacq. 342.
pycnocephalus L. 342.
radiatus W. K. 348.
rivularis Jacq. 340. 745.
Roseni Vill. 341. 746.
semipectinatus Lmk. 758.
serratuloides Jacq., Scop. 339. 744.
serratuloides L., Gmel. 339. 744.
Stangii Bueck. 345.
summanus Pollin. Spr. 344.
syncephalus Rchb. 343.
tataricus L. 752.

Carduus *tenuiflorus* Curt. 343.
tenuiflorus Rostk. 342.
tenuiflorus DC. 342. 343.
tenuiflorus Schleich. 343.
tenuiflorus Sm. 342. 343.
tenuiflorus δ. elongatus Dub. 343.
tenuifolius Thom. 752.
transalpinus Sut. 344.
tuberosus Jacq. 338. 745.
tuberosus α. β. L. 341. 745.
tuberosus Pollich. 341. 745.
Carex L. 648.
acuminata Willd. 661.
acuta Curt. 667.
acuta L. 656.
acuta α. nigra L. 656.
acuta β. ruffa L. 656.
acutiformis Ehrh. 667.
agastachys Ehrh. 661.
alba Scop. 660.
alpestris All. 660.
alpina Whlbg. 657.
ampullacea Good. 666.
androgyna Balb. 657.
approximata All. 659.
approximata Hopp. 654.
approximata Willd. 659.
arenaria Leers. 650.
arenaria L. 651.
argyroglochin Hornem. 654.
aterrima Hopp. 657.
atrata L. 658.
atrata α. varia Gaud. 658.
atrata β. dubia Gaud. 657.
atrata γ. nigra Gaud. 657.
atrofusca Hopp. 662.
atrofusca Schk. 662.
austriaca Schk. 650.
axillaris Fries. 653.
axillaris Good. 653.
baldensis L. 649.
Bellardi All. 647.
bicolor All. 657.
biformis α. sterilis Schltz. 665.
biformis β. fertilis Schltz. 665.
biligularis DC. 666.
binervis Sm. 665.
binervis Whlbg. 665.
bipartita All. 654.
Boenninghausiana Knth. 653.
Boenninghauseniana Weih. 653.
bohemica Schb. 649.
brachystachys Schrk. 664.
brizoides L. 653.
Buxbaumii Whlb. 657.
caespitosa L. Autor. 656.
caespitosa Good. 656.
caespitosa L. fl. suec. 656.
campestris Hst. 658.
canescens Leers. 651.
Carex *canescens* L. 654.
canescens Poll. 654.
canescens β. alpicola Whlb. 655.
canescens β. brunnescens Koch Syn. I. 655.
capillaris Leers. 666.
capillaris L. 662.
capitata L. 648.
chordorrhiza Ehrh. 650.
ciliata Willd. 559.
cinerea Poll. 654.
clandestina Good. 660.
clavaeformis Hopp. 661.
collina Willd. 659.
contigua Hopp. 651.
crassa Ehrh. 667.
curta Good. 654.
curvula All. 650.
cuspidata Hst. 661.
cyperoides L. 649.
Davalliana Sm. 648.
decumbens Ehrh. 658.
depauperata Good. 664.
diandra Roth. 652.
digitata L. 660.
dioica L. 648.
dioica Hst. 648.
dioica isogyna Fries. 648.
distachya Dsf. 649.
distans Fl. Dan. 665.
distans L. 665.
disticha Huds. 650.
diversiflora Hst. 660.
divisa Huds. 650.
divulsa Gaud. 651.
divulsa Good. 651.
Dreyeri Lang. 656.
Drymeia Ehrh. 666.
Dufourii Lapeyr. 647.
echinata Murr. 653.
elongata Leers. 654.
elongata L. 654.
elongata Pollich. 655.
erecta DC. 663.
Ehrhartiana Hoppe. 652.
ericetorum Pollich. 659.
erythrostachys Hoppe 661.
evoluta Hartm. 667.
extensa Good. 665.
ferruginea Schk. 663.
ferruginea Scop. 663.
filiformis Leers. 659.
filiformis L. 667.
filiformis Poll. 658.
fimbriata Schk. 663.
firma Hst. 663.
flacca Schreb. 661.
flava L. 664.
flava β. Gaud. 664.
flava γ. et δ. Willd. 665.

Carex *foetida* All. 651.
foliosa Gaud. 664.
frigida All. 662.
frigida Whlbg. 662.
fuliginosa Hst. 662. 663.
fuliginosa Schk. Stb. Hopp. 662.
fuliginosa Whlbg. 662.
fulva Good. 665.
funiformis Clairv. 650.
Gaudiniana Guthn. 655.
Gebhardi Hopp. 655.
Gebhardi Willd. Schk. 654.
geniculata Hst. 663.
glauca Scop. 661.
glomerata Hst. 650.
Goodnenowii Gay. 656.
gracilis Curt. 656.
Grassmanniana Rabnh. 659.
grypos Lang. 654.
grypos Schk. 653.
grypus St. 654.
guestphalica Bugh. 652.
guestphalica Lang. 652.
gynomane Bertol. 649.
gynobasis Vill. 660.
Heleonastes Ehrh. 654.
hirta L. 667.
hispidula Gaud. 663.
hordeiformis Whlbg. 664.
hordeistichos Vill. 664.
Hornschuchiana Hopp. 665.
Hosteana DC. 665.
humilis Leyss. 659.
incurva Lightf. 650.
inflata Hds. 666.
intermedia Good. 650.
irrigua Sm. 658.
juncifolia All. 650.
juncifolia Hst. 650.
Kochiana DC. 667.
Kochiana Schübl. et Mart. 667.
laevigata Sm. 666.
Lachenalii Schk. 654.
lasiocarpa Ehrh. 667.
lagopina Whlbg. 654.
lepidocarpa Tsch. 664.
leporina L., Leers. 654.
leporina L. herb., Good. 654.
leptostachys Ehrh. 662.
leucoglochin L. 649.
limosa L. 658.
limosa Scop. 662.
limosa *γ.* irrigua Whlbg. 658.
Linkii Schk. 649.
Linnaeana Hst. 648.
lobata All. 651.
lobata Schlch. 651.
loliacea L. 655.
loliacea Schreb. 651.
longifolia Hst. 659.

Carex *maxima* Scop. 661.
membranacea Hopp. 659.
Metteniana Lehm. 648.
Michelii Hst. 664.
microglochin Whlbg. 649.
microstachya Ehrh. 655.
microstyla Gay. 651.
Mielichhoferi Schk. 663.
mirabilis Hst. 648.
mollis Hst. 659.
montana Leers. 659.
montana L. 659.
montana Poll. 659.
montana *β.* procerior Gaud. 659.
mucronata All. 655.
multiculmis Ehrh. 654.
muricata Hopp. 651.
muricata L. 651.
muricata Poll. 653.
muricata v. loliacea Weih. 651.
myosuroides Vill. 647.
nemorosa Lumn. 651.
nemorosa Schrk. 660.
nemorosa Willd. 651.
nervosa Dsf. 665.
nigra All. 657.
nitida Hst. 660.
nutans Hst. 667.
obtusangula Ehrh. 666.
obtusata Liljbd. 648.
Oederi Retz. 664.
Ohmülleriana Lang. 653.
ornithopoda Willd. 660.
ovalis Good. 654.
pacifica Drej. 656.
pallescens L. 662.
paludosa Good. 666.
panicea L. 660.
panicea microcarpa Sond. 661.
paniculata L. 652.
paniculata Hartm. 652.
paniculata Whlbg. 652.
paniculata *β.* Poll. 652.
paniculata *β.* teretiuscula Whlbg. 652.
paradoxa Willd. 652.
parallela Lästd. 648.
parviflora Hst. 657.
patula Hds. 649.
patula Schk. 666.
patula Scop. 666.
pauciflora Lightf. 649.
pendula Good. 661.
pendula Schreb. 661.
Persoonii Lang. 655.
Persoonii Sieb. 655.
petraea Schk. 649.
phaeostachya Sm. 661.
pilosa Scop. 660.
pilulifera L. 658.

Carex polygama Schk. 657.
polyrrhiza Wallr. 659.
praecox Jcq. 659.
praecox Schreb. 653.
prostrata All. 660.
Pseudo-Cyperus L. 666.
psyllophora L. 648.
pulicaris L. 648.
pulla Good. 657.
punctata Gaud. 665.
recurva Hds. 661.
reflexa Hopp. 659.
refracta Rth. 659.
remota L. 653.
rigida Good. 656. 657.
riparia Curt. 667.
rupestris All. 649.
rupestris Schk. 649.
salina Don. 661.
saxatilis L. 657.
saxatilis Willd., Whlbg. 657.
schoenoides Hst. 650.
schoenoides Koch Syn. ed. I. 650.
Schreberi Schk. 652.
Scopoliana Willd.? 663.
Scopolii Gaud. 663.
Scopolii *β.* Gaud. 663.
secalina Whlbg. 664.
secalina Willd.? 664.
sempervirens Vill. 663.
sempervirens Dub. 663.
Sieberiana Optz. 648.
spadicea DC. 663.
spadicea Rth. 667.
speirostachya Sm. 665.
sphaerocarpa Ehrh. 659.
spicata Hds. 651.
spicata Poll. 650.
spicata Skhr. 648.
spicata Sprg. 648.
splendida Willd. 667.
stellulata Good. 653.
stenophylla Whlbg. 650.
stolonifera Ehrh. 659.
stolonifera Hopp. 656.
stricta Good. 655.
strigosa Hds. 661.
subspathacea Wormsk. 661.
subulata Schumach. 657.
supina Whlbg. 658.
sylvatica Hds. 666.
tenuis Hst. 664.
teretiuscula Good. 652.
teretiuscula *α.* et *β.* cylindrica Hartm. 652.
tetanica Schk. 661.
tetanica Rbch. 661.
thuringiaca Schk.? 659.
thuringiaca Willd. 659.
Carex *tomentosa* L. 658.
triflora Schrk. 664.
tuberosa DC. 649.
uetliaca Sut. 664.
uliginosa L. spec. 645.
umbrosa Hopp. 659.
umbrosa Hst. 659.
ustulata Whlbg. 662.
vaginata Tsch. 661.
Vahlii Skhr. 657.
varia Hst. 663.
ventricosa Curt. 664.
verna Schk. 660.
vesicaria Hds. 666.
vesicaria L. 666.
vesicaria *α. β.* L. 666.
virens Lmk. 651.
vulgaris Fries. 656.
vulpina L. 651.
Carlina L. 346.
acanthifolia All. 346.
acanthifolia *α.* DC. 346.
acaulis L. 346.
aggregata Willd. 346.
alpina Jcq. 346.
Biebersteinii Bernh. 347.
caulescens Lmk. 346.
Chamaeleon Vill. 346.
corymbosa L. 346.
lanata L. 346.
longifolia Rchb. 347.
nebrodensis Suss. 347.
Pola Hacq. 346.
simplex W. K. 346.
subacaulis DC. 346.
Utzka Hacq. 346.
vulgaris L. 347.
Carpesium L. 310.
abrotanoides L. 310.
cernuum L. 310.
Carpinus L. 555.
Betulus L. 555.
Carpinizza Hst.? 555.
duinensis Scop. 555.
incisa Schimp. 555.
orientalis Lmk. 555.
Ostrya L. 555.
Carthamus L. 349.
lanatus L. 349.
tinctorius L. 349.
Carum L. 245.
Bulbocastanum Koch. 246.
Bunius L. 244.
Carvi L. 246.
divaricatum Koch. 246.
verticillatum Koch. 246.
Caryophyllata aquatica Lmk. 183.
montana Scop. 183.
officinalis Mönch. 182.

Caryophyllata rivalis Scop. 183.
urbana Scop. 182.
Cassandra calyculata Don. 413.
Castanea L. 553.
sativa Mill. 554.
vulgaris Lmk. 554.
Catabrosa aquatica Beauv. 701.
Catapodium loliaceum Lk. 695.
Caucalis Hoffm. 268.
aequicolorum All. 272.
arvensis Hds. 270.
daucoides L. 269.
grandiflora L. 268.
helvetica Jcq. 270.
infesta Curt., Smith. 270.
latifolia L. syst. 269.
leptophylla L. 269.
leptophylla Poll. 269.
muricata Bisch. 269.
nodiflora All. 270.
nodosa Scop. 270.
platycarpos L. 268.
scandicina Roth. 272.
Scandix Scop. 272.
Caulinia flexilis Willd. 589.
fragilis Willd. 589.

CELASTRINEAE. 126.

Celtis L. 552.
australis L. 552.
Cenchrus racemosus L. 670.
capitatus L. 684.
Centaurea L. 349.
acutiloba DC. 354.
adonidifolia Rchb. 354.
alba DC. 349.
alba L. 349.
alpestris Hgtschw. et Heer. 353.
amara L. 350.
ambigua Thom. 351. 352.
austriaca DC. 351.
austriaca Roch. 351.
austriaca Willd. 351.
austriaca γ. ambigua DC. 351.
axillaris Willd. 352.
badensis Tratt. 353.
Berini Sieb. 351.
Calcitrapa L. 355.
carniolica Hst. 352.
cirrhata Rchb. 351.
collina L. 354.
collina Scop. 354.
collino-scabiosa Schied. 353.
coriacea W. K. 353.
cristata Bartl. 354.
Crupina L. 355.
Cyanus L. 352.
decipiens Thuill., Rchb. 350.
deusta Ten. 349.
flosculosa Balb. 351.
Centaurea Grafiana DC. 354.
Jacea L. 350.
Jacea c. capitata Koch. et Z. 350.
Karschiana Wulf. 354.
Kartschiana Scop. 354.
Kotschyana Heuffl. 353.
lanata DC. 349.
maculosa Lmk. 354.
maculosa DC. 354.
melitensis L. 355.
mollis W. K. 352.
montana L. 352.
nervosa Willd. 351.
nigra L. 352.
nigra β. DC. 350.
nigrescens Florar. cisalpinar. et DC. 350.
nigrescens γ. Koch. 350.
nigrescens Willd. 350.
nudicaulis L. 348.
paniculata DC., Jacq. 354.
paniculata Lmk. 354.
paniculata L. 354.
phrygia DC. 351.
phrygia L. 351.
phrygia Rchb. 351.
phrygia Willd. 351.
phrygia β. helvetica Gaud. 351.
pratensis Thuill. 350.
pubescens Willd. 353.
Rhapontica L. 348.
rupestris L. 354.
rupestris Rchb. 354.
salicifolia DC. 350.
Scabiosa L. 352.
seusana Vill. 352.
solstitialis L. 355.
sordida Willd. 353. 354.
spinoso-ciliata Bernh. 354.
spinulosa Roch., DC. 353.
splendens L. 349.
stereophylla Bess. 353.
Stoebe Herb. Willd. 353.
stricta W. K. 352.
transalpina Schleich. 350.
Triumfetti All. 352.
uniflora L. 352.
variabilis α. et β. Bartl. 354.
variabilis γ. sordida Bartl. 353.
variegata Lmk. 352.
vochinensis Bernh. 350.
Centhranthus DC. 290.
angustifolius DC. 290.
ruber DC. 290.
Centunculus L. 503.
alpinus Scop. 107.
minimus L. 503.
Cephalanthera Richard. 602.
ensifolia Rich. 602.

Cephalanthera *pallens* Rich. 602.
rubra Rich. 602.
Cephalaria Schrad. 293.
alpina Schrad. 293.
appendiculata Schrad. 293.
leucantha Schrad. 293.
transsylvanica Schrad. 293.
Cerastium L. 104.
alpinum L. 106.
alpinum β. glabratum Whlbg. 107.
alpinum Wulf. 107.
anomalum W. K. 102.
apetalum Dumort. 105.
aquaticum L. 104.
arvense L. 107.
barbulatum Whlbg. 105.
Biebersteinii DC. 107.
brachypetalum Dsport. 105.
brachypetalum Lois. DC. 105.
campanulatum Viv. 106.
carinthiacum Vest. 107.
filifolium Vest. 100.
filiforme Schleich. 106.
flexuosum Hegetschw. 106.
glabratum Hartm. 107.
glaciale Gaud. 106.
glaciale Sturm. 106.
glomeratum Thuill. 104.
glutinosum Fries. 105.
grandiflorum W. K. 108.
grandiflorum β. bannaticum Roch. 108.
Grenieri Schltz. 105.
Grenieri α. Schltz. 105.
Grenieri β. Schltz. 105.
lanatum Lmk. 107.
laricifolium Vill. 107.
latifolium L. 106.
latifolium γ. intermedium Gaud. 106.
latifolium δ. subacaule Gaud. 106.
litigiosum De Lens. 105.
macilentum Aspegr. 105.
manticum L. 104.
obscurum Chaub. 105.
ovale Bess. 105.
ovale Pers. 104.
ovatum Hopp. 107.
pedunculatum Gaud. 106.
pellucidum Chaub. 105.
praecox Ten. 106.
pumilum D. fl. 105.
refractum All. 102.
repens M. B. 107.
repens L. 107.
rotundifolium Denkschr. d. Reg. bot. Ges. 104.
semidecandrum L. 105.
semidecandrum Pers. 105.
Soleirolii Ser. 107.
Cerastium stellarioides Hartm. 102.
strictum Haenk., L. 107.
strigosum Fries. 105.
suffruticosum L. 107.
sylvaticum W. K. 106.
tetrandrum Curt. 105.
tomentosum Lej. 107.
tomentosum L. 107.
trigynum Vill. 102.
triviale Link. 105.
uniflorum Murr. 106.
viscidum Link. 105.
viscosum Fries. 104.
viscosum L. Herb. 106.
viscosum Pers. 105.
viscosum Poll. 105.
viscosum β. glandulosum v. Bönning. 106.
vulgatum Whlbg. 106.
vulgatum L. Herb. 104.
vulgatum β. holosteoides Fries. 106.
Cerasus acida Fl. d. Wett. 180.
Caproniana DC. 180.
Caproniana α. Montmorencyana DC. 180.
Chamaecerasus Hst. 180.
Duracina DC. 180.
dulcis Fl. d. Wett. 179.
effusa Hst. 180.
humilis Hst. 180.
intermedia Hst. 180.
Juliana DC. 180.
marasca Hst. 180.
Padus DC. 180.
Ceratocephalus Mönch. 9.
falcatus Fieb. 9.
falcatus Pers. 9.
orthoceras DC. 9.
spicatus Mönch. 9.
Ceratonia L. 178.
Siliqua L. 178.

CERATOPHYLLEAE. 213.
Ceratophyllum L. 213.
apiculatum Cham. 213.
demersum L. 213.
muticum Cham. 213.
oxyacanthum Cham. 213.
platyacanthum Cham. 213.
submersum L. 213.
Ceratospermum papposum Pers. 256.
Cercis L. 178.
Siliquastrum L. 178.
Cerefolium sativum Bess. 271.
Cerinthe L. 435.
alpina Kit. 435.
aspera 435.
echioides Scop. 434.
glabra Gaud. 435.

Cerinthe glabra Scop. 435.
maculata Rchb. 435.
maculata M. B. 435.
major L. 435.
minor L. 435.
minor *β.* L. 435.
quinquemaculata Whlbg. 435.
strigosa 435.
suevica Mart. 435.
Cervaria alsatica Gaud. 262.
glauca Gaud. 261.
rigida Mönch. 261.
Rivini Gaertn. 261.
Ceterach alpinum DC. 731.
Marantae DC. 739.
officinarum Willd. 730.
Chaerophyllum L. 272.
alpinum Vill. 271.
aromaticum L. 273.
aureum L. 272.
bulbosum L. 272.
Cicutaria Vill., Rchb. 273.
Cicutaria B. Vill. 273.
elegans Gaud. 273.
hirsutum L. 273.
hirsutum Vill. 273.
Hladnikianum Rchb. 271.
maculatum Willd. 272.
monogonum Kit. 273.
nemorosum M. B. 271.
nodosum Lmk. 272.
odoratum Lmk. 274.
palustre Lmk. 273.
rostratum Lmk. 270.
sativum Lmk. 271.
sylvestre L. 270. 271.
temulum L. 272.
trichospermum Schult., Lmk. 271.
Villarsii Koch. 273.
Chaiturus Hst. 495.
Marrubiastrum Rchb. 495.
Chamaecyparissus Tabernm. 728.
Chamaeledon procumbens Lk. 414.
Chamaemelum Triumfetti All. 322.
Chamaenerion angustifolium Scop. 207.
obscurum Rb. 209.
palustre Scop. 207.
ramosissimum Mönch. 209.
Chamaeorchis Rich. 600.
alpina Rich. 600.
Chamaeplium officinale Wallr. 42.
Chamaerepes alpina Spr. 600.
Chamagrostis Borkh. 676.
minima Borkh. 676.
Cheiranthus DC. 30.
alpinus Jcq. 46.
alpinus Lmk. 46.
Boccone All. 46.
canus Pill. et Mitterb. 47.
Cheiranthus *Cheiri* L. 30.
decumbens Schlch. 47.
erysimoides Jcq. 46.
erysimoides L. 45.
firmus Schleich. 45.
fruticulosus L'Herit. herb. 47.
fruticulosus L. mant. 31. 47.
helveticus Jcq. 47.
helveticus Schlch. 47.
hieracifolius Lmk. 46.
maritimus L. 41.
ochroleucus Hall. fil. 47.
pallens Hall. fil. 46.
pumilus Schlch. 46.
rhaeticus Schlch. 46.
scapigerus Willd. 44.
sinuatus L. 30.
sylvestris Lmk. 44.
tristis Suffren. 30.
turritoides Lmk. 45.
varius Sibth. 30.
virgatus Poir. 47.
Chelidonium L. 26.
corniculatum L. 26.
Glaucium L. 26.
laciniatum Mill. 26.
laciniatum *β.* fumareaefolium DC. 26.
majus L. 26.
quercifolium Willem. 26.

CHENOPODEAE. 520.

Chenopodium L. 523.
acutifolium Kit. 524.
album Sm. 524.
album L. 524.
album var. concatenatum Thuill. 524.
ambrosioides L. 524.
arenarium Fl. d. Wtt. 523.
augustanum All. 523.
blitoides Lej. 525.
Bonus Henricus L. 525.
botryoides Sm. 525.
Botrys L. 524.
chrysomelanospermum Balb. 523.
concatenatum Thuill. 524.
ficifolium Sm. 524.
foetidum Lmk. 524.
fruticosum All. 520.
glaucum L. 525.
glomerulosum Rchb. 524.
hirsutum Whlbg. 523.
hybridum L. 523.
intermedium D. fl. 523.
lanceolatum Mer. 524.
leiospermum DC. 524.
maritimum L. 521.
melanospermum Wallr. 523.
murale L. 524.

Chenopodium olidum Curt. 524.
opulifolium Schrad. 524.
paganum Rchb. 524.
polyspermum L. 524.
rhombifolium Mühlb. 523.
rubrum L. 525.
Scoparia L. 523.
serotinum hort. bot. et L. amoen. 524.
serotinum Hds. 524.
urbicum D. fl. 523.
urbicum Engl. Bot. 523.
urbicum L. 523.
viride Curt. 524.
viride L. 524.
Vulvaria L. 524.
Cherleria L. 100.
imbricata Ser. 97.
octandra Sieb. 97.
sedoides L. 100.
Chilochloa arenaria Beauv. 675.
aspera Beauv. 675.
Boehmeri Bv. 675.
cuspidata Bv. 675.
Michelii Rchb. 675.
Chimaphila umbellata Nutt. 416.
Chironia Centaurium Schmidt. 427.
Gerardi Schm. 428.
inaperta Willd. 428.
lutea Bert. 428.
maritima Bert. 428.
uliginosa W. K. 427.
Vaillantii Schm. 428.
Chlora L. 421.
acuminata Koch. et Z. 421.
perfoliata L. 421.
serotina Koch. 421.
Chondrilla L. 368.
acanthophylla Borkh. Wallr. 368.
juncea L. 368.
latifolia M. B. 368.
muralis Lmk. 370.
prenanthoides Vill. 368.
pulchre Lmk. 377.
purpurea Lmk. 369.
rigens Rchb. 368.
stipitata Schltz. 367.
Chrysanthemum L. 324.
alpinum L. 325.
alpinum β. minimum Gaud. 325.
atratum Gaud. 324.
atratum L. 325.
atratum α. L. 325.
ceratophylloides All. 325.
coronarium L. 327.
coronopifolium Vill. 325.
corymbosum L. 326.
graminifolium 325.
Halleri Sut. 325.
heterophyllum Willd. 325.
Chrysanthemum inodorum L. 326.
inodorum β. maritimum 326.
lanceolatum Pers. 325.
Leucanthemum L. 324.
leucanthemum II. alpin. Gaud. 325.
macrophyllum W. et Kit. 326.
minimum Vill. 325.
montanum L. 324. 325.
Parthenium Pers. 326.
segetum L. 326.
tomentosum Lois. 326.
Chrysocoma Linosyris L. 300.
Chrysopogon Gryllus Trin. 669.
Chrysosplenium L. 239.
alternifolium L. 239.
oppositifolium L. 239.
Chrysurus aureus Beauv. 687.
cynosuroides Pers., Host. 687.
Cicendia Adans. 427.
filiformis Rchb. 427.
Cicer L. 166.
arietinum L. 166.
ervoides Brign. 172.
Lens Willd. 172.
physodes Rchb. 166.
sativum Rchb. 166.
Cicerbita alpina Wallr. 372.
corymbosa Wallr. 370.
muralis Wallr. 370.
Cichorium L. 357.
Endivia L. 357.
Intybus L. 357.
Cicuta L. 242.
angustifolia Kit. 242.
maculata Lmk. 274.
major L. 274.
tenuifolia Frl. 242.
virosa L. 242.
virosa β. stricta Schultz. 242.
Cimicifuga L. 22.
foetida L. 22.
Cineraria L. 329.
alpestris Hopp. 330.
alpestris Koch. 330.
alpina Hst. 334.
alpina Hds. 330.
alpina β. alata L. 334.
alpina γ. integrifolia L. 330.
arachnoidea Rchb. 336.
aurantiaca Hopp. 331.
aurantiaca Willd. 331.
campestris DC. 330.
campestris Retz., Spreng. 330.
capitata Koch. Rchb. 331.
capitata Hopp. u. Hornsch. 330.
capitata Whlbg. 331.
Clusiana Hst. 330.
cordifolia Gouan. 334.
cordifolia auriculata Jcq. 33 4.

Cineraria crassifolia Kit. 330.
crispa Jcq. 329.
crocea Tratt. 329.
discoidea Hopp. 330.
integrifolia Skhr. 329.
integrifolia Sm. 330.
integrifolia Wallr. 330.
integrifolia alpina Jcq. 330.
integrifolia *β.* pratensis Jcq. 330.
longifolia Jcq. 330.
longifolia Rch. St. 330.
ovirensis Koch. 330.
palustris L. 331.
papposa Rchb. 331.
pratensis Hpp. 329.
rivularis W. K. 329.
rivularis Koch., Rchb. 329.
Schkuhrii Rb. 329. 331.
sibirica L. 331.
spathulaefolia Gmel. 330.
spathulaefolia Koch. 330.
tenuifolia Gaud. 330.
Zahlbruckneri Hst. 334.
Circaea L. 210.
alpina L. 210.
alpina *β.* intermedia DC. 210.
intermedia Ehrh. 210.
lutetiana L. 210.
Cirsium Trnf. 337. 741-59.
Acarna DC. 748.
Acarna DC., Mönch. 342. 748.
acaule All. 341. 746.
acauli-oleraceum Näg. 759.
acauli-spinosissimum Näg. 756.
affine Tsch. 758.
alpestre Näg. 754.
ambiguum Koch. 755.
ambiguum *γ.* albidum DC. 756.
anglicum Lmk. 340.
anglicum Lobel. 745.
argenteum Vest. 341. 748.
arctioides Scp. 344.
arvense Scop. 341. 748.
arvensi-palustre Näg. 751.
autareticum Mutel. 756.
bulbosum DC. 341. 745.
bulbosum *β.* pallens Wallr. 757.
bulboso-acaule Näg. 753.
bulboso-oleraceum Näg. 757.
bulboso-palustre Näg. 749.
Candolleanum Näg. 760.
canum All. 338. 745.
canum M. B. 338. 745.
cano-oleraceum Rchb., Näg. 752.
carniolicum Scop. 339.
carniolicum All. 340. 746.
carpiolicum Scop. 339. 747.
Cervini Koch. 756.
Chailleti Gaud. 338. 744. 752.
Chailleti Koch. 744. 752.
Cirsium controversum DC. 756.
decoloratum Koch. 759.
defloratum Scp. 344.
criophorum Scp. 338. 743.
Erisithales Scp. 339. 747.
Erisithali-heterophyllum Näg. 755.
Erisithali-oleraceum Näg. 760.
Erisithali-pannonicum Heer. 752.
erucagineum DC. 756. 757.
flavescens Koch. 759.
Freyerianum Koch. 339. 752.
glutinosum DC., Lmk. 339. 340. 747.
gregarium Boiss. 746.
Hallerianum Gaud. 756.
Heerianum Näg. 754.
helenioides All. 746.
heterophyllo All. 340. 746.
heterophyllo-acaule Näg. 754.
heterophyllo-oleraceum Näg. 758.
heterophyllo - spinosissimum Näg. 756.
hybridum Koch. 751.
inerme Rchb. 757.
incanum Fisch. 748.
Kirschlegeri C. H. Schltz. 750.
Kocheanum Löhr. 749.
Lachenalii Koch. 757. 759.
laciniatum Doell. 749.
lacteum Koch. 751.
lanceolatum Scp. 388. 743.
lanceolato-acaule Näg. 749.
lanceolato-palustre Näg. 748.
lanigerum Näg. 338. 744.
medium All. 753.
molle Scop. 348.
nemorale Rchb. 338. 744.
ochroleucum All. 747.
ochroleucum DC. fl. fr. suppl. 339. 340.
ochroleucum Koch. 339. 340.
ochroleucum Näg. 340.
ochroleucum *α. β.* DC. fl. fr. 747. 758.
ochroleucum *γ.* mixtum DC. prodr. 758.
oleraceum Scop. 340. 747. 748.
oleraceo-acaule Hmp., Näg. 759.
oleraceo-arvense Näg. 753.
oleraceo - bulbosum Näg. 757.
oleraceo-heterophyllum Näg. 758.
oleraceo-lanceolatum Schltz. 757.
oleraceo-palustre Näg. 751.
oleraceo-ramosum Näg. 757.
oleraceo-rivulare DC. 757.
pallens DC. 757.
palustre Scop. 338. 744.
palustre *β.* putatum Näg. 744.
palustri-acaule Hmp. 750.
palustri-bulbosum DC., Näg. 749.

Cirsium *palustri-Erisithales* Näg. 750.
palustri-oleraceum Näg. 751.
palustri-rivulare Näg. 750.
pannonicum Gaud. 338. 744.
pannonico-acaule Näg. 752.
pannonico-Erisithales Näg. 752.
pannonico-palustre Koch. 752.
parviflorum DC. 751.
pauciflorum Koch. 755.
pauciflorum Rchb. 755.
pauciflorum Sprg. 339. 755.
praemorsum Mich. 758.
pratense DC. 341. 745.
purpureum All. 756.
pygmaeum Scop. 347.
ramosum Näg. 341. 745.
rigens Wallr. 759.
rigens var. laevigatum Gaud. 756.
rivulare Link. 340.
rivulare All. 745.
rivulari-acaule Näg. 754.
rivulari-heterophyllum Näg. 755.
rivulari-palustre Näg. 750.
rivulari-spinosissimum. Näg. 755.
rufescens Ram. 339. 747.
semidecurrens Richt., Rb. 749.
semipectinatum DC. 758.
semipectinatum Rchb. 758.
serratuloides Scop. 339. 744.
setosum MB. 748.
spathulatum Gaud. 338. 743.
spinosissimo-acaule Näg. 756.
spinosissimo-alpestre Näg. 756.
spinosissimo-Erisithales Koch. 759.
spinosissimo - heterophyllum Näg. 756.
spinosissimo-oleraceum Näg. 760.
spinosissimo-rivulare Näg. 755.
spinosissimum Scop. 340. 747.
subalatum Thom. 751.
subalpinum Gaud. 750.
subalpinum β. lacteum Gaud. 751.
tataricum DC. 759.
tataricum Wim. et Grab. 752.
Thomasii Näg. 760.
tricephaloides Lmk. 340. 746.
tuberosum All. 341. 745.
Zizianum Koch. 753.

CISTINEAE. 68.

Cistus L. 68.
anglicus L. 69.
apenninus L. 70.
canus Jcq. 69.
creticus L. 68.
grandiflorus Scop. 70.
helianthemoides Crtz. 70.
Helianthemum L. 70.
hirsutus Hds. 69.
hirsutus Lej. 70.
Cistus linearis Lej. 70.
marifolius Sm. 69.
monspeliensis L. 68.
mutabilis Jcq. 70.
plantagineus Willd. 69.
pilosus α. L. 70.
polyfolius L. 70.
pulverulentus Lej. 70.
quartus Clus. 70.
salicifolius L. 69.
salvifolius L. 68.
Seguieri Crtz. 69.
serpyllifolius Crtz. 70.
serpyllifolius L. 70.
serratus Cav. 69.
serratus Dsf. 69.
surrejanus L. 70.
tomentosus Scop. 70.
villosus Wulf. 68.
vinealis Willd. 69.
Cladium Patrick. Brw. 640.
germanicum D. fl. 640.
Mariscus R. Brw. 640.
Clematis L. 1.
alpina Lmk. 2.
caespitosa Scop. 2.
erecta All. 2.
Flammula Brkh. 2.
Flammula L. 2.
fragrans Ten. 2.
inclinata Scop. 2.
integrifolia L. 2.
maritima Lmk. 2.
recta L. 2.
scandens Borkh. 2.
sepium Lmk. 2.
Vitalba L. 2.
Viticella L. 2.
Clinopodium L. 485.
aegyptiacum Lmk. 485.
vulgare L. 485.
Clypeola L. 53.
Jonthlaspi L. 53.
maritima L. 53.
Cnicus Acarna L. 342.
acaulis Willd. 341. 746.
acauli-oleraceus Schied. 759.
acauli-tuberosus Schied. 753.
ambiguus Schleich. 755.
autareticus Lois. 756.
Cervini Thom. 756.
dubius Willd. 341. 746.
eriophorus Rth. 338. 743.
Erisithales L. 339. 746.
heterophyllus Willd. 340. 746.
hybridus Schlch. 758.
Lachenalii Gmel. 757.
lacteus Schlch. 751.
lanceolatus Willd. 338. 743.
nudiflorus Schlch. 751.

Cnicus oleraceus L. 340. 747.
oleraceo-rivularis Schied. 757.
palustris Willd. 338. 744.
palustri-oleraceus Schied. 751.
palustri-rivularis Schied. 750.
palustri-tuberosus Schied. 749.
parviflorus Heller. 751.
pauciflorus W. K. 339. 755.
pratensis Willd. 341. 745.
pygmaeus L. 347.
rigens Ait. 759.
rivularis Willd. 340. 746.
saanensis Schlch. 758.
salisburgensis Willd. 340. 746.
semipectinatus Schlch. 758.
setosus Bess. 341.
spathulatus Morett. 743.
spinosissimus L. 747.
spurius Hoffm. 341. 745.
tataricus Bess. 752.
tuberosus Willd. 341. 745.
tuberoso-oleraceus Schied. 757.
Cnidium Cuss. 255.
alsaticum Spr. 262.
apioides Spr. 255.
confertum Moench. 255.
Monnieri Cuss. 255.
palustre Rchb. 255.
Silaus Spr. 257.
venosum Koch. 255.
Cochlearia L. 57.
anglica L. 57.
Armoracia L. 58.
auriculata Lmk. 58. 66.
brevicaulis Facch. 58.
Coronopus L. 64.
danica L. 57.
Draba L. 62.
groenlandica Hst. 57.
groenlandica L. 57.
officinalis L. 57.
pyrenaica DC. 57.
rusticana Lmk. 58.
saxatilis Lmk. 58.
Coeloglossum Hrtm. 598.
viride Hrtm. 598.

COLCHICACEAE. 628.

Colchicum L. 628.
alpinum DC. 628.
arenarium W. K. 629.
autumnale L. 628.
autumnale γ. Bert. 628.
montanum All. 628.
patens Schultz 628.
vernale Hoffm. 628.
Coleanthus Seid. 677.
subtilis Seid. 677.
Colpodium aquaticum Trin. 701.
Colutea L. 156.
Colutea alpina Lmk. 157.
arborescens L. 156.
australis Lmk. 157.
frigida Poir. 157.
hirsuta Roth. 156.
orientalis Du Roi. 156.
Comarum L. 185.
fragarioides Roth. 191.
palustre L. 185.

COMPOSITAE. 297.

Condylocarpus apulus Hoffm. 265.

CONIFERAE. 574.

Conioselinum Fisch. 257.
Fischeri Wimm. et Gr. 257.
tataricum Fisch. 257.
Conium L. 274.
croaticum W. K. 274.
maculatum L. 274.
Conringia orientalis Andrz. 47.
Thaliana Rchb. 43.
Convallaria L. 612.
bifolia L. 613.
bracteata Thm. 612.
latifolia Jacq. 612.
majalis L. 613.
multiflora L. 612.
Polygonatum L. 612.
verticillata L. 612.

CONVOLVULACEAE. 428.

Convolvulus L. 429.
althaeoides L. 429.
argyreus DC. 429.
arvensis L. 429.
cantabrica L. 429.
sepium L. 429.
Soldanella L. 429.
sylvaticus W. Kit. 429.
sylvestris Willd. 429.
tenuissimus Sibth. 429.
villosus Lej. 429.
Conyza squarrosa L. 307.
Corallorrhiza Hall. 604.
Halleri Rich. 604.
innata R. Brw. 604.
Coreopsis Bidens L. 309.
Coriandrum L. 276.
Cicuta Crtz. 274.
sativum L. 276.
testiculatum L. 276.
Corispermum L. 522.
canescens Kit. 522.
hyssopifolium L. 522.
intermedium Schweig. 522.
Marschallii Stev. 522.
nitidum Kit. 522.
purpurascens Hst. 522.
squarrosum 522.

CORNEAE. 276.

Cornus L. 276.
mas L. 277.
sanguinea L. 276.
suecica L. 277.
Coronilla L. 163.
coronata Jacq. 164.
coronata L. 164.
coronata minor Rchb. 163.
cretica L. 164.
Emerus L. 163.
minima DC. et L. mant. 163.
minima Jacq. 163.
minima L. 165.
minima *α. β.* Lmk. 163.
montana Scop. 163.
parviflora Moench. 164.
scorpioides Koch. 163.
Securidaca L. 165.
vaginalis Lmk. 163.
varia L. 164.
Coronopus depressus Moench. 64.
didymus Sm. 65.
pinnatus Horn. 65.
Ruellii All. 64.
vulgaris Dsf. 64.
Corrigiola L. 218.
littoralis L. 218.
Cortusa L. 511.
Matthioli L. 511.
Corydalis DC. 27.
acaulis Pers. 28.
acaulis *β.* Rchb. 28.
bulbosa DC. 27.
capnoides L. 28.
capnoides *α.* DC. 28.
capnoides *β.* lutea DC. syst. 28.
cava Schweig. et Kört. 27.
claviculata Pers. 28.
digitata Pers. 27.
fabacea Pers. 27.
intermedia Mer. 27.
Lobelii Tsch. 27.
lutea DC. Fl. franc. 27.
ochroleuca Koch. 28.
pumila Hst. 27.
solida Sm. 27.
tuberosa DC. 27.
Corylus L. 555.
Avellana L. 555.
Colurna 555.
tubulosa Willd. 555.
Corynephorus Beauv. 688.
canescens Beauv. 688.
Cotinus Coggyria 129.
Cotoneaster Medik. 203.
tomentosa Lindl. 203.
vulgaris Lindl. 203.
Cotula L. 317.
Cotula *coronopifolia* L. 317.
Cotyledon Umbilicus Huds. 227.
Umbilicus *β.* L. 227.
Craepalia temulenta Schrk. 457.
Crambe L. 67.
Corvini All. 66.
laciniata Lmk. 67.
maritima L. 67.
Tataria Jacq. 67.
tatarica Willd. 67.
Crassula L. 221.
caespitosa Cav. 221.
Magnolii DC. 221.
rubens L. 221. 225.
rubens Sturm. 223.

CRASSULACEAE. 220.

Crataegus L. 202.
Aria L. 205.
Aria *α.* L. 206.
Aria *β.* fl. suec. 206.
Aria *β.* Gaud. 205.
Azarolus L. 203.
dentata Thuill. 206.
kyrtostyla Fgh. 203.
latifolia Lmk. 206.
monogyna Fgh. 203.
monogyna Jacq. 203.
Oxyacantha L. 203.
Scandicina L. 205.
torminalis L. 206.
Crepis L. 373.
Adonis Spr. 376.
agrestis Fries. 376.
agrestis W. K. 377.
albida Vill. 372.
alpestris Tsch. 375.
apargioides Willd. 367.
aurea Cass. 375.
austriaca Jacq. 378.
biennis L. 376.
biennis *α.* Wimm. et Gr. 376.
biennis var. bannat. Roch. 376.
blattarioides Vill. 378. 379.
bulbosa Cass. 375.
cernua Ten. 377.
chondrilloides Jacq. 375.
chrysantha Froel. DC. 375.
cinerea Dsf. 374.
diffusa DC. 377.
Dioscoridis DC. 379.
Dioscoridis Poll. 376.
foeniculacea Froel. 376.
foetida Engl. bot. 373.
foetida L. 373.
frigida Schltz. 375.
Froelichiana DC. 375.
globifera Hall. fil. 379.
grandiflora Willd. 379.
grandiflora Link. 379.

Crepis *grandiflora* Tsch. 378.
graveolens Bernh. 373.
hieracioides W. K. 378.
hispida W. K. 374.
hispidissima Bartl. 361.
hyoseridifolia Tsch. 379.
Jacquini Tsch. 377.
incarnata Tsch. 375.
incarnata Vis. 373.
jubata Koch. 375.
Lachenalii Gmel. 374.
Lachenalii Gochn. 376.
lodomiriensis Bess. 376.
montana Tsch. 379.
neglecta L. 377.
neglecta L. Sm. Bert. 377.
nicaeensis Balb. 376.
paludosa Moench. 378.
pinnatifida Willd. 377.
polymorpha Wallr. DC. 377.
praecox Balb. 374.
praemorsa Tsch. 374.
pulchra L. 377.
pygmaea L. 378.
rhoeadifolia M. B. 373.
rubra L. 373.
scabra DC. 376.
scabra Willd. 374.
scariosa Willd. 374.
setosa Hall. fil. 374.
sibirica L. 379.
sibirica Gouan. 378.
stricta Schultz 370.
stricta Scop. 377.
succisaefolia Tsch. 378.
taraxacifolia Thuill. 374.
taurinensis Willd. 374.
tectorum L. 376.
tectorum Poll. 377.
tectorum Vill. 374.
tectorum β. segetalis Roth. 376.
vesicaria Balb. 374.
vesicaria L. 374.
vesicaria Willd. 374.
virens DC., Gaud., L. 377.
virens Vill. 376.
virens Willd. 377.
Critamus agrestis Bess. 245.
heterophyllus D. fl. 244.
Crithmum L. 257.
maritimum L. 257.
pyrenaicum L. 254.
Crocus L. 605.
albiflorus Hopp. et Hsch. 605.
biflorus Mill. 605.
luteus Lmk. 605.
reticulatus β. M. B. 605.
sativus All. 605.
sativus Scop. 605.
sativus β. vernus L. 605.
Crocus *variegatus* Hopp. et Hsch. 605.
vernus All. 605.
vernus, grandiflorus Gay. 605.
vernus, parviflorus Gay. 605.
vernus var. β. Sturm. 605.
Crucianella L. 281.
angustifolia L. 282.
latifolia L. 282.
molluginoides M. B. 282.

CRUCIFERAE. 30.

Crupina Pers. 355.
vulgaris Pers. 355.
Crypsis Ait. 674.
aculeata Ait. 674.
alopecuroides Ait. 674.
schoenoides Ait. 674.
Cryptogramma crispa R. Brown. 739.
Cucubalus L. 86.
alpinus Lmk. 89.
Antilopum Vst. 89.
baccifer Grtn. 86.
bacciferus L. 86.
Behen L. 89.
chloranthus Willd. 88.
glaucus Willd. 89.
horizontalis Moench. 86.
italicus L. 87.
mollissimus W. K. 88.
Otites L. 88.
parviflorus Ehrh. 88.
parviflorus Lmk. 88.
petraeus Fries. 89.
Pumilio L. 89.
silenoides Vill. 87.
tataricus L. 88.
viscosus L. 87.
Cucumis L. 216.
Melo L. 216.
sativus L. 216.
Cucurbita L. 216.
Melopepo L. 216.
Pepo L. 216.

CUCURBITACEAE. 216.

Cupressus L. 575.
sempervirens L. 575.

CUPULIFERAE. 553.

Cuscuta L. 429.
Epilinum Weih. 430.
Epithymum L. syst. 429.
europaea L. 429.
europaea γ. Epithymum L. spec. pl. 430.
hassica Pfeif. 430.
lupiformis Krock. 430.
major DC. 429.

Cuscuta major Koch. et Z. 430.
minor DC. 430.
monogyna Vhl. 430.
paniflora Ten. 430.
tubulosa Presl. 429.
vulgaris Pers. 429.
vulgaris Presl. 430.
Cuviera europaea Koel. 717.
Cyathea anthriscifolia Rth. 735.
cynapifolia Rth. 735.
dentata Sm. 735.
fragilis Roth. 735.
fragilis Sm. 735.
incisa Engl. bot. 735.
montana Rth. 736.
regia Rth. 735.
regia Sm. 735.
Cyclamen L. 511.
coum Mill. 512.
europaeum Mill. 511.
hederifolium Ait. 512.
hederifolium Ten. 512.
neapolitanum Ten. 512.
repandum Sibth. 512.
vernum Bert. 512.
Cydonia Tournef. 203.
lusitanica Mill. 203.
maliformis Mill. 203.
oblonga Mill. 203.
vulgaris Pers. 203.
Cymbalaria muralis Fl. d. Wett. 451.
Cynanchum R. Brw. 419.
acutum L. 419.
contiguum Koch. 419.
fuscatum Link. 419.
laxum Bartl. 419.
medium Koch. 419.
nigrum Hst. 419.
Vincetoxicum R. Brown. 419.
Cynara L. 342.
Cardunculus L. 342.
Scolymus L. 342.
Cynodon Rich. 676.
Dactylon Pers. 676.
Cynoglossum L. 431.
bicolor Willd. 431.
cheirifolium Scop. 431.
creticum Vill. 431.
Dioscoridis Vill. 431.
Lappula Scop. 431.
montanum Lmk. 431.
officinale L. 431.
officinale γ. L. 431.
omphalodes L. 432.
pictum Ait. 431.
scorpioides Haenk. 432.
sylvaticum Haenk. 431.
Cynosurus L. 702.
aureus L. 687.
caeruleus L. 685.
Cynosorus *cristatus* L. 702.
distichus Hoffm. 685.
durus L. 695.
echinatus L. 702.
microcephalus Hoffm. 685.
ovatus Hopp. 685.
sphaerocephalus Wulf. 685.
CYPERACEAE. 638.
Cyperus L. 638.
australis Schrd. 639.
badius Dsf. 639.
esculentus L. 638.
flavescens L. 638.
fuscus L. 638.
glaber L. 638.
glaber Sturm. 638.
glomeratus L. 639.
longus L. 639.
longus β. Bert. 639.
Monti L. 639.
pannonicus L. 639.
pictus Ten. 638.
serotinus Rttb. 639.
tenuiflorus Rttb. 639.
thermalis Dum. 639.
virescens Hffm. 638.
Cypripedium L. 605.
Calceolus L. 605.
Cystea angustata Sm. 735.
dentata Sm. 735.
fragilis Sm. 735.
regia Sm. 735.
Cystopteris Bernh. 735.
alpina Link. 735.
fragilis Bernh. 735.
montana Link. 735.
regia Presl. 735.
CYTINEAE. 541.
Cytinus L. 541.
Hypocystis L. 541.
Cytisus L. 132.
alpinus Mill. 132.
argenteus L. 135.
argyreus Rchb. 135.
austriacus L. 133.
biflorus L'Herit. 135.
biflorus W. K. 135.
bisflorens Hst. 134.
canescens Presl. 134.
capitatus Jacq. 134.
ciliatus Whlbg. 134.
cinereus Hst. 135.
elongatus W. K. 134.
emerifolius Rchb. 133.
falcatus W. K. 134.
glabrescens Sart. 133.
hirsutus L., Scop., Hst. 134.
holopetalus Flschm. 135.
Laburnum L. 132.

Cytisus lanigerus DC. 133.
leucanthus W. K. 134.
nigricans L. 133.
polytrichus M. B. 134.
prostratus Scop. 134.
purpureus Scop. 135.
V. (quintus) Clus. 134.
V. spec. alt. 134.
radiatus (Spartium) L. 135.
ramentaceus Sieb. 132.
ramosissimus Ten. 135.
ratisbonensis Schff. 135.
VII. (septimus) Clus. 135.
sagittalis D. fl. 135.
VII. spec. alt. (septimus) Clus. 134.
sessilifolius L. 133.
spinescens Sb. 135.
spinosus Lmk. 133.
supinus Bertol. 134.
supinus DC. 134.
supinus Jacq. 135.
supinus α. L. 134.
supinus *β.* L. 135.
supinus *β.* Whlbg. 135.
tener Jacq. 131.
virgatus Vest. 134.
Weldeni Visian. 133.
Czackia Liliastrum Andrz. 617.

D.

Dactylis L. 702.
altaica Bess. 702.
cristata M. B. 686.
distichophylla Brign. 702.
glaucescens Willd. 702.
glomerata L. 702.
hispanica Rth. 702.
littoralis Willd. 702.
maritima Schrd. 702.
memphitica Spr. 703.
stricta Ait. 676.
Dactylon officinale Vill. 676.
sanguinale Vill. 670.
Danthonia DC. 693.
alpina Vest. 693.
calycina Rchb. 693.
decumbens DC. 693.
provincialis DC. 693.
strigosa Beauv. 689.
Daphne L. 537.
alpina L. 537.
Blagayana Frey. 537.
Cneorum L. 538.
Cneorum Whlbg. 537.
Cneorum *γ.* D. fl. 537.
collina Sm. 537.
Laureola L. 537.
Mezereum L. 537.
Daphne *striata* Tratt. 537.
Datura L. 441.
Stramonium L. 442.
Tatula L. 442.
Daucus L. 268.
Carota L. 268.
platycarpos Sc. 269.
Delphinium L. 19.
Ajacis L. 20.
alpinum W. K. 20.
Clusianum Hst. 20.
Consolida L. 19.
cuneatum Stev. DC. 20.
divaricatum Ledeb. 20.
elatum All. 20.
elatum L. 20.
fissum W. K. 20.
hirsutum Rth. 20.
hybridum L. Herb. 20.
hybridum Willd. 20.
hybridum M. B. 20.
intermedium Ait. 20.
intermedium DC. 20.
montanum DC. 20.
palmatifidum DC. 20.
paniculatum Hst. 20.
speciosum M. B. 20.
Staphysagria L. 20.
urceolatum Jacq. 20.
Dentaria L. 40.
bulbifera L. 40.
digitata Lmk. 40.
enneaphyllos L. 40.
glandulosa W. K. 40.
heptaphyllos Vill. 40.
ochroleuca Gaud. 40.
pentaphyllos Scop. 40.
pentaphyllos *β. γ.* L. 40.
pinnata Lmk. 40.
polyphylla Gaud. 40.
polyphylla W. K. 40.
trifolia W. K. 40.
Deschampsia caespitosa Beauv. 687.
Deyeuxia acutiflora Kunth. 681.
neglecta Kunth. 681.
sylvatica Kunth. 681.
varia Kunth. 681.
Dianthus L. 82.
acuminatus Tsch. 86.
alpestris Balb. 83.
alpestris Hopp. Stb. 86.
alpinus L. 83.
alpinus DC. 83.
alpinus Sturm. 84.
arenarius L. 85.
arenarius Thor. 85.
Armeria L. 82.
asper Lej. 83.
asper Rchb. 83.
asper Willd. 83.

Dianthus *atrorubens* All. 82.
atrorubens Gd. 82.
atrorubens M. B. 82.
Balbisii Ser. 83.
barbatus L. 82.
caesius Sm. 85.
capitatus DC. 82.
Carthusianorum All. 83.
Carthusianorum L. 82.
Carthusianorum *β.* atrorubens DC. 82.
caryophylloides Rchb. 84.
Caryophyllus L. 85.
Caryophyllus *ε.* inodorus L. 84.
ciliatus Guss. 84.
ciliatus Ten. 84.
collinus Balb. 83.
collinus Gaud. 83.
collinus W. K. 83.
controversus Gd. 83.
Courtoisii Rchb. 83.
deltoides L. 84.
deltoides *β.* Sm. 84.
diminutus L. 82.
diutinus Kit. 83.
diutinus Rb. 82.
erubescens Trv. 86.
Fischeri Spr. 83.
frigidus bot. Ztg. 84.
furcatus Hrnm. 86.
gallicus Pers. 85.
geminiflorus Ls. 83.
glacialis DC. 83.
glacialis Haenk. 84.
glaucophyllus Hornem. 83.
glaucus Hds. 85.
glaucus L. 84.
hirtus Lmk. 82.
Hornemanni Ser. 86.
hortensis Schrd. 85.
liburnicus Bartl. 83.
litoralis Hst. 84.
monspeliacus L. 86.
monspessulanus L. 85.
montanus M. B. 83.
moschatus Mey. 85.
neglectus Lois. 83.
odoratus Vest. 85.
plumarius L. 85.
plumosus Spr. 86.
polymorphus M. B. 83.
prolifer L. 82.
racemosus Vis. 84.
scaber Schleich. 83.
Scheuchzeri Rb. 84.
Seguieri Rb. 83.
Seguieri Vill. 83.
Seguieri Wulf. 83.
serotinus W. K. 85.
Sternbergii Schleich. 83.

Dianthus *superbus* L. 85.
supinus Lmk. 84.
sylvaticus Hpp. 83.
sylvestris Wulf. 84.
tener Balb. 83.
vaginatus Rb. 82.
vaginatus Vill. 82.
velutinus Guss. 82.
virgineus Hst. 84.
virgineus Jcq. 84.
virgineus L. 84.
virgineus *β.* L. 85.
Waldsteinii Stbg. 86.
Diapensia helvetica L. 504.
Dichostylis fluitans Rchb. 642.
Micheliana N. ab E. 645.
Dictamnus L. 125.
albus L. et Link. 125.
Fraxinella Pers. 125.
Fraxinella *β.* obtusiflorus. Koch. Tschb. 125.
obtusiflorus Koch. 125.
Digitalis L. 448.
ambigua Lindl. 449.
ambigua Murr. 449.
ambigua Sturm. 449.
ambiguo-lutea Mey. 449.
ferruginea L. 450.
fucata Ehrh. 450.
fuscescens W. K. 450.
grandiflora Lmk., Rchb. 449.
intermedia Prs. 449.
laevigata W. K. 450.
lanato- (laevigato-) ambigua Mey. 450.
longiflora Lej. 449.
lutea L. 449.
lutea Poll. 449.
lutea *γ.* hybrida Lindl. 449.
lutescens Link. 450.
media Roth. 449.
ochroleuca Jcq., Rchb. 449.
ochroleuca Lindl. 449.
purpurascens Lej. 449.
purpurascens Roth. 449.
purpurea L. 449.
purpureo-lutea Mey. 449.
Digitaria ciliaris Koel. 670.
filiformis Koel. 670.
sanguinalis Scp. 670.
stolonifera Schrad. 676.

DIOSCOREAE. 613.

Diospyros L. 416.
Lotus L. 417.
Diotis atriplicina Spr. 527.
Atriplicoides M. B. 527.
ceratoides Willd. 526.
Diplachne serotina Link. 702.
Diplopappus annuus Bl. Fgh. 303.

Diplopappus dubius Gaud. 303.
dysentericus Bl. Fgh. 308.
pulicarius Bl. Fgh. 308.
Diplotaxis DC. 50.
brevicaulis Bl. Fgh. 50.
muralis DC. 50.
tenuifolia DC. 50.
viminea DC. 50.

DIPSACEAE. 292.

Dipsacus L. 292.
ferox 293.
Fullonum Mill. 293.
fullonum Poll. 293.
fullonum *α.* L. 293.
laciniatus L. 293.
pilosus L. 293.
sylvestris Mill. 292.
sylvestris *β.* pinnatifidus D. fl. 293.
vulgaris Gmel. 293.
Donax arundinaceus Beauv. 684.
borealis Trin. 708.
festucaceus Bv. 708.
Dondia Epipactis Spr. 241.
Dondisia Epipactis Rb., Mösl. 241.
Doronicum L. 327.
austriacum Jcq. 328.
austriacum III. Clus. 328.
Bauhini Saut. 328.
Bellidiastrum L. 302.
caucasicum Roch. 328.
Clusii Tsch. 328.
Clusii *γ.* Tsch. 328.
Columnae Ten. 328.
Columnae DC. 328.
cordifolium Stbg. 327.
Halleri Tsch. 329.
Jacquini Tsch. 328.
latifolium Clus. 327.
longifolium Rb. 328.
macrophyllum Fisch. 327.
Matthioli Tsch. 327.
orientale Adms. 328.
Pardalianches L. 327.
Pardalianches Tsch., Rchb. 327.
Pardalianches *α.* L. 328.
styriacum IV. Clus. 328.
scorpioides Willd. 327.
scorpioides Wimm. et Grab. 328.
Dorycnium Trnf. 153.
herbaceum Vill. 154.
hirsutum DC. 154.
intermedium Ledeb. 154.
monspeliense Willd. 154.
pentaphyllum Rb. 154.
pentaphyllum Scop. 154.
sabaudum Rb. 154.
suffruticosum Vill. 153.

Draba L. 54.
affinis Hst. 54.
aizoides L. 54.
aizoides St. 54.
aizoon Whlbg. 54.
androsacea Whlbg. 56.
androsacea Willd. 56.
arabiformis Hohenw. 36.
austriaca Crtz. 55.
carinthiaca Hpp. 55.
ciliaris Whlbg. 56.
ciliata Scop. 56.
confusa D. fl. 57.
confusa Ehrh. 57.
contorta Ehrh. 56.
dubia Sut. 55.
elongata Hst. 54.
fladnizensis DC. 56.
fladnizensis Gaud. 56.
fladnizensis Wulf. 56.
frigida Saut. 55.
glacialis Hopp. et Hsch. 54.
helvetica Schleh. 56.
hirta Gaud. 55.
hirta Jcq. 55.
Hoppeana Rb. 54.
Hoppeana Rdlph. 55.
Hoppii Trachs. 55.
incana L. 56.
Johannis Hopp. 55.
Johannis Hst. 55.
lactea Adam. 56.
laevigata Hpp. 56.
lapponica Willd. hrb. 56.
lasiocarpa Roch. 54.
Liljebladii Wallm. 55.
mollis Scop.? 36.
mollis St. 36.
muralis L. 56.
muricella Whlbg. 55.
nemoralis Ehrh. 56.
nemorosa All. 56.
nivalis DC. 55.
nivalis Liljebl. 55.
nivalis Ser. 56.
pyrenaica L. 53.
rubra Crtz. 53.
ruderalis Bmg. 62.
saxatilis Koch. 55.
Sauteri Hopp. 54.
sclerophylla Gd. 56.
spathulata Lang. 57.
Spitzelii Hopp. 55.
stellata Jcq. 55.
stellata Saut. 55.
stellata Koch. 55.
stellata *β* hebecarpa DC. 55.
Thomasii Koch. 57.
tomentosa Whlbg. 55.
Traunsteineri Hopp. 55.

Draba *verna* L. 57.
Wahlenbergii Hartm. 56.
Zahlbruckneri Hst. 54.
Dracocephalum L. 487.
austriacum L. 487.
Moldavica L. 487.
Ruyschiana L. 487.
Drepanophyllum agreste Hffm. 245.
sioides Wib. 245.
Drosera L. 78.
anglica Hds. 78.
intermedia Hayn. 78.
longifolia L. 78.
longifolia Sm. 78.
obovata M. K. 78.
rotundifolia L. 78.
rotundifolio-anglica Schied. 78.

DROSERACEAE. 78.

Dryas L. 182.
octopetala L. 182.
Drypis L. 93.
spinosa L. 93.

E.

EBENACEAE. 416.

Ecballion Rich. 217.
agreste Rchb. 217.
Elaterium Rich. 217.
Echinaria Dsf. 684.
capitata Dsf. 684.
Echinochloa Crus galli Beauv. 670.
Echinophora L. 274.
spinosa L. 274.
Echinops L. 337.
exaltatus Schr. 337.
Ritro L. 337.
sphaerocephalus L. 337.
Echinopsilon hirsutum Moq. Tand. 523.
Echinospermum Swartz. 431.
deflexum Lehm. 431.
Lappula Lehm. 431.
squarrosum Rb. 431.
Echium L. 435.
altissimum Jcq. 436.
asperrimum M. B. 436.
italicum L. 436.
pustulatum Sibth. 435.
rubrum Jcq. 436.
violaceum L. 436.
vulgare L. 435.
Wierzbickii Haberl. 435.
Edraianthus A. DC. 409.
Kitaibelii A. DC. 410.
tenuifolius A. DC. 410.
Ehrharta clandestina Wigg. 677.

ELAEAGNEAE. 540.

Elaeagnus L. 540.
angustifolia L. 541.
Elaterium cordifolium Mönch. 217.
Elatine L. 108.
alata Fl. sedin. 108.
Alsinastrum L. 108.
hexandra DC. 108.
Hydropiper DC. 108.
Hydropiper L. 108.
Hydropiper *β.* L. 108.
major Braun. 108.
Schkuhriana Drev. et Hayn. 108.
triandra Schk. 108.
tripetala Sm. 108.

ELATINEAE. 108.

Eleocharis atropurpurea Knth. 641.
Eleogenus ovatus Nees ab Esb. 641.
Eleogiton fluitans Link. 642.
Eleusine dura Lmk. 695.
Elodea canadensis Michx. 580.
Elodes palustris Spach. 117.
Elsholzia Willd. 475.
cristata Willd. 475.
Elymus L. 717.
arenarius L. 717.
caninus Leers. 716.
caninus L. 716.
crinitus Schrb. 717.
europaeus L. 717.
intermedius M. B. 717.
Elyna Schrad. 647.
caricina D. fl. 647.
spicata Schrad. 647.

EMPETREAE. 542.

Empetrum L. 542.
nigrum L. 542.
Endymion Dumort. 627.
nutans Dum. 627.
Enodium caeruleum Gaud. 701.
Ephedra L. 574.
distachya L. 574.
Epilobium L. 207.
alpestre Rb. 209.
alpestre Schm. 209.
alpinum L. 209.
alsinefolium Vill. 209.
amplexicaule Lmk. 207.
anagallidifolium Lmk. 209.
angustifolium Lmk. 207.
angustifolium L. 207.
angustifolium *β. γ.* 207.
angustissimum Ait. 207.
angustissimum Rb. ic.? 207.
aquaticum Thuill. 207.
collinum Gmel. 208.
denticulatum Wender. 207.

Epilobium Dodonaei *α.* Gaud. 207.
Dodonaei Vill. 207.
Fleischeri Hochst. 207.
Gesneri Vill. 207.
grandiflorum All. 207.
hirsutum All. 208.
hirsutum L. 207.
hirsutum *β.* L. 208.
hirsutum *β.* intermedium DC. 207.
hypericifolium Tsch. 208.
intermedium Merat. 207.
latifolium Rth. 207.
lanceolatum Sebast. 208.
molle Lmk. 208.
montanum L. 208.
montanum *β.* alpestre Jcq. 209.
montanum *β.* ramosissimum DC. 208.
montanum *β.* minus Wimm. et Grab. 208.
nitidum Hst. 208.
nudum Schumach. 209.
nutans Hrnem. 209.
nutans Lej. 208.
nutans Tsch. 209.
obscurum Rchb. Fl. exsc. 209.
obscurum Rchb. ic. 209.
origanifolium Lmk. 209.
palustre L. 208.
parviflorum Schrb. 207.
pubescens Rth. 208.
ramosum Hds. 207.
rivulare Rchb. 208.
rivulare Whlbg. 208.
roseum Fries. 209.
roseum Schreb. 209.
roseum *γ.* trigonum DC. 209.
rosmarinifolium Haenk. 207.
Schmidtianum Rostk. 208.
simplex Tratt. 208.
spicatum Lmk. 207.
tetragonum L. 209.
tetragonum Rchb. ic. 209.
trigonum Schrk. 209.
villosum Ait. 208.
Epimedium L. 23.
alpinum L. 23.
Epipactis Rich. 602.
cordata All. 603.
ensifolia Swrtz. 602.
grandiflora Sm. 602.
latifolia All. 602.
latifolia *β.* rubiginosa Gaud. 602.
media Fries. 602.
microphylla Ehrh. 602.
Nidus avis All. 603.
ovata All. 603.
pallens Swartz. 602.
palustris Crtz. 603.
rubiginosa Gaud. 602.
Epipactis rubra All. 602.
Epipogium Gmel. 601.
aphyllum Bl. Fgh. 601.
Gmelini Rich. 601.

EQUISETACEAE. 722.

Equisetum L. 722.
amphibolium Rtz. 723.
arvense L. 722.
arvense *β.* Schltz. 723.
arvense *β.* alpestre Whlbg. 723.
arvense a. serotinum Mey. 723.
arvense c. decumbens Mey. 723.
arvense c. nemorosum Alex. Br. Doell. 723.
campestre Schltz. 723.
Drummondii Hook. 723.
eburneum Rth. 723.
Ehrharti Mey. 723.
elongatum Willd. 724.
fluviatile L. 723.
fluviatile Sm. 723.
fluviatile Whlbg. 724.
hyemale L. 724.
hyemale A. vulgare Doell. 725.
hyemale C. elongatum Doell. 724.
illyricum Hpp. 724.
limosum L. 724.
limosum L. suec., Whlbg. 724.
Makaii Newman. 725.
paleaceum Schlch. 725.
pannonicum Willd. 724.
palustre L. 724.
pratense Ehrh. 723.
pratense Roth. 723.
procerum Pollin. 724.
prostratum Hpp. 724.
ramosissimum Desf. 724.
ramosissimum Humb. et Bonpl. 724.
ramosum DC. 724.
ramosum Schlch. 724.
reptans *α.* Whlbg. 725.
reptans *β.* variegatum Whlbg. 725.
scirpoides Mich. 725.
sylvaticum L. 723.
sylvaticum *β.* minus Whlbg. 723.
Telmateja Ehrh. 723.
tenue Hpp. 725.
trachyodon Alex. Br. 725.
uliginosum Mühlbg. 724.
umbrosum Mey. 723.
variegatum Schlch. 725.
Eragrostis Beauv. 694.
major Hst. 695.
megastachya Link. 694.
minor Hst. 695.
pilosa Beauv. 695.
poaeformis Link. 695.
poaeoides Bv. 695.

Eranthis Salisb. 17.
hyemalis Salisb. 17.
Erianthus Rich. 668.
Ravennae Bv. 668.
Erica L. 413.
arborea L. 413.
carnea L. 413.
ciliaris Hds. 413.
cinerea L. 413.
herbacea L. St. 413.
humilis Neck. 413.
lusitanica Rth. 414.
multiflora 413.
mutabilis Slsb. 413.
scoparia Wulf. 413.
Tetralix L. 413.
vagans L. mant. 413.
vulgaris L. 413.

ERICINEAE. 412.

Erigeron L. 303.
acre droebachense Schleich. 303.
acris L. 303.
acris Weih. 303.
acris *β.* angustatus Hartm. 303.
alpinus L. 304.
angulosus Gd. 303.
annuum Pers. 303.
atticum Vill. 303.
bellidioides Spenn. 303.
canadensis L. 303.
corymbosus Wallr. 303.
droebachensis Mill. 303.
elongatus Ledeb. 303.
glabratus Hpp. 304.
grandiflorus Hpp. 304.
graveolens L. 308.
intermedius Trchs. 304.
podolicus Bess. 303.
podolicus Rb. 303.
rupestris Bl. Fgh. Hpp. 303.
serotinus Weih. 303.
uniflorus L. 304.
Villarsii Bllrd. 303.
viscosum L. 309.
Erinus L. 453.
alpinus L. 454.
Eriophorum L. 646.
alpinum L. 646.
angustifolium Rth. 647.
angustifolium Sm. 647.
angustifolium *α.* congestum D. fl. 647.
angustifolium *β.* laxum M. et K. 647.
angustifolium *β.* longifolium Hpp. 647.
angustifolium *γ.* alpinum Gaud. 647.
caespitosum Hst. 646.
capitatum Hst. 646.
Eriophorum *gracile* Koch. 647.
gracile Sm. 647.
latifolium Hpp. 646.
polystachium *α, β,* L. 647.
polystachyum *β.* Vaillantii Dub. 647.
polystachyum *γ.* L. 647.
polystachyum Sm.? 647.
pubescens Sm. 647.
Scheuchzeri Hpp. 646.
triquetrum Hpp. 647.
vaginatum L. 646.
Vaillantii Koch Tschb. 647.
Vaillantii Poit. et Turp. 647.
Eritrichium Schrad. 439.
Hacquetii Koch. 439.
nanum Schrad. 439.
Erodium L'Herit. 122.
ciconium Willd. 122.
cicutarium L'Herit. 122.
cicutarium *α. γ.* Sm. 122.
malacoides Willd. 123.
moschatum L'Herit. 122.
Erophila americana DC. 57.
praecox Rb. Stev.? 57.
vulgaris DC. 57.
Eruca DC. 50.
Erucastrum Fl. d. Wett. 49.
sativa Lmk. 50.
Erucago aspera Hornem. 66.
glandulosa Rhl. 66.
runcinata Hrnm. 66.
Erucastrum Schmp. et Spn. 49.
incanum Koch. 50.
inodorum Rchb. 49.
obtusangulum Reich. 49.
Pollichii Schimp. et Spen. 49.
Ervum L. 171.
cassubicum Peterm. 166.
Ervilia L. 172.
gracile DC. 171.
hirsutum L. 171.
Lens L. 172.
Lenticula Schreb. 172.
longifolium Ten. 171.
monanthos L. 171.
nigricans M. B. 172.
pisiforme Peterm. 166.
soloniense L. 172.
sylvaticum Peterm. 166.
tenuifolium Lagasc. 171.
tenuissimum Pers. 171.
tetraspermum L. 171.
uniflorum Ten. 172.
Eryngium L. 241.
alpinum L. 242.
amethystinum L. 242.
campestre L. 241.
maritimum L. 242.
planum L. 242.

rysimum L. 44.
Alliaria L. 43.
altissimum Lej. 44.
angustifolium Ehrh. 47.
arcuatum Optz. 33.
austriacum Bmg. 47.
Barbarea L. 33.
campestre Scop. 47.
canescens Roth. 46.
carniolicum Dollin. 45.
cheiranthoides L. 44.
Cheiranthus Pers. 46.
Cheiranthus Presl. 46.
Cheiranthus firmus Rb., Schlch. 45.
cheiriflorum Wallr. 45.
crepidifolium Rb. 45.
diffusum Ehrh. 46.
durum Presl. 44.
helveticum Gd., DC. 46.
helveticum DC. 46.
hieracifolium Jcq. 45.
hieracifolium Herb. L., DC. 45.
hieracifolium Ehrh. 45.
hieracifolium L. suec. 45.
lanceolatum DC., Gd. 45.
lanceolatum R. Brw. 46.
lanceolatum Rchb. 45.
longisiliquosum Rchb. 44.
longisiliquosum Schleich. 44.
micranthum Buek. 44.
murale Dsf. 46.
ochroleucum DC. 47.
odoratum Ehrh. 45.
odoratum Koch. et Z. 46.
odoratum R. Brwn. 45.
officinale L. 42.
orientale R. Brw. 47.
pallens Koch. 46.
pallens Wallr. 46.
pannonicum Crtz. 45.
perfoliatum Crtz. 47.
pumilum Gaud. 46.
ramosissimum Crtz. 45.
repandum L. 45.
rhaeticum DC. 46.
strictum DC. 45.
strictum Fl. d. Wett. 45.
strictum *β.* odoratum DC. 45.
suffruticosum Spr. 47.
suffruticosum DC. 47.
virgatum DC. 45.
virgatum Lej. 47.
virgatum Rth. 44.
virgatum Schlch. 44.
virgatum juranum Gaud. 45.
Erythraea Rich., Pers. 427.
angustifolia Wallr. 427.
capitata R. S. 427.
Centaurium Pers. 427.
compressa Hayn. 427.
Erythraea grandiflora 427.
inaperta Schld. 427.
linariaefolia Pers. 427.
littoralis Frs. 427.
maritima Frs. 428.
pulchella Pers. 427.
ramosissima Pers. 428.
spicata Pers. 428.
Erythronium L. 615.
Dens canis L. 615.
Esmarchia cerastoides Rchb. 105.
Euclidium R. B. 65.
syriacum R. B. 65.
Eufragia linifolia Colum. 474.
Eupatorium L. 298.
cannabinum L. 298.
Euphorbia L. 543.
acuminata Lmk. 549.
amygdaloides 547.
angulata Jcq. 545.
arvensis Schleich. 549.
caespitosa Tn. 549.
Cajogala Ehrh. 546.
canescens L. 543.
carniolica Jcq. 545.
Chamaesyce L. 543.
Characias L. 547.
Characias Wulf. 547.
coralloides L. 546.
coccinosperma Rchb. 549.
Cyparissias L. 547.
diffusa Jcq. 550.
dubia Dierbach. 544.
dulcis Jcq. 544.
dulcis L. 544.
dulcis Rchb. 545.
dulcis Sm. 545.
epithymoides Jacq. 544. 545.
epithymoides L. 545.
Esula L. 547.
Esula Poll. 546.
exigua L. 549.
exigua *β.* retusa Roth. 550.
exigua *γ.* Lois. 550.
falcata L. 549.
flavicoma DC. 545.
foetida Hpp. 544.
fragifera Jan. 545.
fragifera Rchb. 546.
Gerardiana Jcq. 546.
glareosa M. B. 548.
helioscopia L. 544.
Lathyris L. 550.
linariaefolia Lmk. 546.
linifolia Ten. 549.
literata Jcq. 544.
lucida W. K. 548.
lucida *α.* latifolia Wimm. et Gr. 548.
lucida *β.* salicifolia Wimm. et Gr. 548.

Euphorbia lucida γ. linarifolia Wimm. et Gr. 548.
massiliensis DC. 543.
micrantha M. B. 544.
mollis Gmel. 546.
multicaulis Thuill. 548.
Myrsinites L. 548.
nicaeensis All. 548.
obscura Lois. 549.
oleaefolia Gouan. 548.
palustris L. 546.
pannonica Hst. 546.
paralia Sm. 548.
Paralias L. 548.
Peplis L. 543.
peploides Gouan. 549.
Peplus L. 549.
pilosa Bert. 544.
pilosa M. B. 546.
pinea L. 549.
pinea Bert. Guss. 549.
platyphylla L. 544.
platyphyllos K. 544.
portlandica Hds. 548.
procera M. B. 546.
procera Rchb. 546.
pubescens Vahl. 544.
pulverulenta Rit. 546.
purpurata Thuill. 544.
ragusana Rchb. 549.
rotundifolia Lois. 549.
rubra Cav. 550.
rubra DC. 550.
salicifolia Hst. 547.
saxatilis Jcq. 548.
segetalis L. 549.
serotina Hst. 548.
solisequa Rb. 544.
spinosa Wulf. 545.
stricta L. 544.
sylvatica Jcq. 547.
sylvatica Ten. 547.
tricuspidata Lpr. 550.
uralensis Fisch. 548.
verrucosa DC. 545.
verrucosa Lmk. 544. 545.
verrucosa L. 545.
veneta Willd. 547.
villosa W. K. 546.
virgata W. K. 548.
Wulfenii Hpp. 547.

EUPHORBIACEAE. 542.

Euphrasia L. 472.
alpina DC. 473.
caerulea Tsch. 473.
lanceolata Gd. 474.
latifolia L. 472.
linifolia L. α, β. Brot. 474.
lutea L. 473.
Euphrasia micrantha Rb. 473.
minima Schlch. 473.
nemorosa Rb. 473.
nemorosa β. pectinata Rchb. 472.
Odontites L. 473.
Odontites β. L. 473.
officinalis Hayn. 472.
officinalis var. A. pratensis Frs. 472.
officinalis L. 472.
officinalis alpestris Wimm. et Gr. 473.
officinalis β. nemorosa Pers. 472.
officinalis β. neglecta Wimm. et Gr. 472.
pratensis Rb. 472.
pratensis α. Rb. 473.
Rostkoviana Hayn. 472.
salisburgensis Funk. 473.
serotina Lmk. 473.
stricta Hst. 472.
tenuifolia Pers. 474.
tricuspidata L. 473.
verna Bellard. 473.
viscosa L. 474.
Eurotia Adans. 526.
ceratoides Mey. 526.
Evax Grtn. 305.
pygmaea Pers. 305.
umbellata Grtn. 305.
Evonymus L. 126.
europaeus L. 126.
latifolius Scop. 126.
verrucosus Scop. 126.
vulgaris Scop. 126.
Exactum filiforme Willd. 427.

F.

Facchinia Rchb. 96.
lanceolata Rchb. 97.
Fagopyrum dumetorum v. Bngh. 536.
Fagus L. 553.
Castanea L. 554.
sylvatica L. 553.
sylvatica β. Willd. 553.
Falcaria Hst. 244.
latifolia Hst. 245.
Rivini Hst., DC. 245.
Farsetia R. Brwn. 53.
clypeata R. Brwn. 53.
incana R. Brwn. 53.
Fedia Auricula DC. 292.
auricula β. dasycarpa Rb. ic. 292.
campanulata Presl. 291.
carinata D. fl. 291.
coronata Vahl. 292.
dasycarpa Stv. 291.
dentata D. fl., Vahl. 291.

Fedia dentata M. B. et plurim. auct. 291.
dentata β. D. fl. 291.
dentata β. dasycarpa Rb. ic. 291.
discoidea Rb. 292.
echinata Vahl. 291.
eriocarpa D. fl. 291.
laxiflora R. S. 292.
Locusta Rb. ic. 291.
Locusta β. lasiocarpa Rb. 291.
microcarpa Rb. 291.
Morisonii Spr. 291.
muricata R. S. 291.
olitoria Gärtn. 292.
olitoria Vahl. 291.
puberula Bert. 291.
pumila Rb. 292.
rugulosa Stev. 291.
striata Stev. 291.
tridentata Rb. ic. 292.
tridentata Stev., M. B. 292.
Ferula campestris Bess. 260.
Ferulago L. 260.
galbanifera Lobel. 260.
nodiflora Jacq. 260.
rablensis Wulf. 262.
sulcata Desf. 260.
sulcata β. DC. 260.
Ferulago Kch. 259.
galbanifera Koch. 260.
nodiflora Koch. 260.
Festuca L. 702.
acuminata Gaud. 706.
adscendens Retz. 709.
alpina Gaud. 705.
alpina Hst. 706.
alpina St., Sut. 704.
amethystina Hst. 705.
arenaria Osbck. 706.
arundinacea Liljbl. 708.
arundinacea Schrb. 708.
baltica Hohm. 706.
barbata Schrk. 706.
borealis M. K. 708.
bromoides Auct. plurim., D. fl. 704.
caerulea DC. 701.
caespitosa Dsf. 709.
calamaria Sm., Hst. 707.
calamaria β. Hock. 707.
ciliata Dant. 704.
ciliata auct. 704.
ciliata Gouan. 710.
capillata Lmk. 705.
cinerea DC. 706.
cristata L. 686.
cristata Vill. 686.
curvula Gaud. 705.
decidua Sm. 707.
decolorans M. K. 708.
decumbens L. 693.
Festuca diandra Moench. 710.
distans Kunth. 701.
divaricata Dsf. 703.
donacina Whlbg. 708.
drymeia M. K. 707. 708.
dumetorum L. 706.
dumetorum Rafin. 706.
dura Vill. 695.
dura Host. 705.
duriuscula Bert. 704.
duriuscula Hst. 705.
duriuscula L. spec. 705.
duriuscula L. syst. 706.
duriuscula α. Schrd. 706.
duriuscula β. curvula Gaud. 705.
duriuscula γ. laevigata Gaud. 705.
elatior L. suec. 708.
elatior Sm. 708.
elongata Ehrh. 709.
Eskia Ramond. 706.
exaltata Presl. 708.
flavescens Bellard. 706.
fluitans L. 700.
Gaudini Kunth. 705.
gigantea Vill. 708.
glauca Lmk. 705.
glauca Schrad. 705.
glomerata All. 702.
gracilis Moench. 709.
Halleri All. 704.
heterophylla Lmk. Haenk. 705.
hirsuta DC. 686.
hirsuta Hst. 705.
Hostii Kunth. 701.
inermis DC. 713.
Lachenalii Spenn. 703.
laevigata Clrv. 705.
latifolia Hst. 707.
laxa Hst. 707.
Leysseri Moench. 713.
loliacea Hds. 709.
monostachya Poir. 710.
montana Rb. 708.
montana Sav. 713.
montana Stb., Hopp. 699. 708.
myuros auct. 704.
myuros Ehrh. et Auct. 704.
myuros L. 704.
myuros Soy. Will. 704.
nemorum Leys. 706.
nigrescens Lmk. 706.
nigricans Schleich. 706.
nutans Hst. 708.
nutans Whlbg. 708.
ovina D. fl. 705.
ovina L. 704.
ovina Schrad. 705.
ovina var. vivipara 705.
pallens Hst. 705.
paludosa Gaud. 705.

Festuca palustris Seen. 701.
pannonica Hst. 705.
phalaroides Lmk. 702.
phleoides Vill. 686.
Phoenix Thll. 709.
pilosa Hall. fil. 706.
pinnata Moench. 709.
Poa Kunth. 703.
poaeformis Hst. 707.
pratensis Hds. 709.
Pseudo-Myros Soy. Will. 704.
pulchella Schrad. 708.
pumila Vill. 706.
pungens R. S. 705.
rhaetica Sut. 707.
rigida Kunth. 703.
rottboelloides Kunth. 695.
rubra L. 706.
rubra *β.* arenaria Fries. 706.
rubra *γ.* lanuginosa Koch. 706.
Scheuchzeri Gaud. 708.
sciuroides Roth. 704.
serotina L. 702.
spadicea L. 707.
spadicea Moench. 708.
spadicea *β.* nemorosa Pollin. 707.
speciosa Schrb. 713.
spectabilis Jan. 707.
splendens Pourret. 686.
stricta Hst. 705.
sylvatica Hst. 708.
sylvatica Hds. 709.
sylvatica Poll. 707.
sylvatica Stbg. 707.
sylvatica Vill. 707.
tenuicula Kunth. 703.
tenuiflora Schrad. 702.
tenuifolia Sibth. 705.
thalassica Kunth. 701.
triflora Engl. Bot. 708.
uniglumis Soland. 703.
uniglumis Soy. Will. 703.
vaginata Willd. 705.
valesiaca Schleich. 705.
varia Haenk., Gaud. 706.
violacea Gaud. 705.
xanthina R. S. 706.
Ficaria ranunculoides Roth. 14.
verna Hds. 14.
Ficus L. 552.
Carica L. 552.
Filago L. 310.
acaulis All. 305.
arvensis L. 310.
arvensis Whlbg. 311.
arvensis DC. 310.
gallica L. 311.
germanica L. 310.
germanica *β.* pyramidata DC. 310.
Leontopodium L. 312.
Filago *minima* Fries. 310.
montana DC. 311.
montana Gaud. et mult. auct. 311.
montana L. 310. 311.
montana Whlb. 310.
pygmaea L. 305.
pyramidata L. 310.

FILICES. 729.

Filicula regia Fumariae pinnulis Vaill. 735.
Fimbristylis Vahl. 646.
annua R. S. 646.
dichotoma Vahl. 646.
Foeniculum Hoffm. 252.
officinale All. 252.
vulgare Gaertn. 252.
Fosselina Jonthlaspi All. 53.
Fragaria L. 184.
chiloensis Ehrh. 185.
collina Ehrh. 184.
efflagellis Duchesn. 184.
elatior Ehrh. 184.
grandiflora Ehrh. 185.
Hagenbachiana Lang. 185.
Majaufea Ser. 185.
monophylla Dschn. 184.
sterilis L. 191.
sylvestris Duchesn. 184.
vesca L. 184.
vesca *β.* L. suec. 185.
vesca *β.* pratensis L. spec. 184.
vesca *γ.* L. suec. 184.
villosa Crtz. 189.
virginiana Ehrh. 185.
Frangula vulgaris Rchb. 128.
Wulfenii Rchb. 128.
Fraxinus L. 418.
atrovirens Dsf. 418.
aurea Willd. 418.
excelsior L. 418.
florifera Scop. 418.
heterophylla Vahl. 418.
Ornus L. 418.
oxyphylla M. B. 418.
simplicifolia Willd. 418.
Fritillaria L. 614.
Meleagris L. 614.
montana Hopp. 614.
involucrata All. 614.
pyrenaica DC. 614.
tenella M. B. 614.
tenella Rchb. 614.
Fumaria L. 28.
acaulis Wulf. 28.
agraria Lag. 29.
bulbosa *α.* L. 27.
bulbosa *β. γ.* L. 27.
calycina Babingt. 29.
capnoides L. 28.

Fumaria capnoides Scop. 28.
capreolata L. 28.
cava Mill. 27.
densiflora DC. 29.
fabacea Retz. 27.
Halleri Willd. 27.
intermedia Ehrh. 27.
lutea L. 28.
major Badar. 29.
media auct. bot. 29.
media DC. 29.
media Lois. 29.
micrantha Lagsc. 29.
muralis Sond. 28.
officinalis L. 29.
officinalis tenuifolia Fries. 29.
parviflora Lmk. 30.
Petteri Rchb. 28.
solida L. m., Sm., Ehrh. 27.
tenuifolia Fl. d. Wett. 30.
Vaillantii Lois. 29.
Wirtgeni Koch. 29.

FUMARIACEAE. 27.

G.

Gagea Salisb. 619.
arvensis Schlt. 619.
arvensis subuniflora Rchb. 620.
bohemica Schult. 619.
Clusiana Tsch. 620.
Liottardi Schult. 620.
lutea Schult. 620.
minima Schult. 620.
pratensis Koch. 619.
pratensis R. S. 619.
pratensis γ. R. S. 619.
pusilla Schult. 620.
saxatilis Koch. 619.
Schreberi Rchb. 619.
spathacea Schult. 620.
stenopetala Rchb. 619.
Galanthus L. 611.
nivalis L. 611.
Galasia Cass. 365.
villosa Cass. 366.
Galatella Cass. 302.
cana Nees ab Esb. 302.
canescens Cass. 302.
Galega L. 156.
officinalis L. 156.
Galeobdolon Hds. 489.
luteum Hds. 489.
vulgare Pers. 489.
vulgare β. montanum Pers. 489.
Galeopsis L. 489.
angustifolia Ehrh. 489.
bifida a Bngh. 490.
canescens Schlt. 489.
Galeopsis cannabina Gmel. 490.
cannabina Poll. 490.
cannabina Rth. 490.
dubia Leers. 490.
Galeobdolon L. 489.
grandiflora Bl. Fgh. 489.
grandiflora Roth. 490.
intermedia Vill. 489.
Ladanum L. 489.
Ladanum Rb. 489.
Ladanum α. latifolia Wimm. et Gr. 489.
Ladanum β. angustifolia Wimm. et Gr. 489.
latifolia Hffm. 489.
mollis Tsch. 490.
ochroleuca Lmk. 489.
parviflora Lmk. 489.
prostrata Vill. 490.
pubescens Bess. 490.
segetum Rchard. 490.
Tetrahit L. 490.
Tetrahit β. L. 490.
versicolor Curt. 490.
versicolor Spenn. 490.
villosa Hds. 490.
Walterina Schld. 490.
Galinsoga Ruiz. 309.
parviflora Cav. 309.
parviflora DC. 309.
quinqueradiata Ruiz. 309.
Galinsogea parviflora Willd. 309.
Galium L. 282.
agreste α. echinospermum Wallr. 283.
agreste β. leiospermum Wallr. 284.
alpestre R. S. 287.
anglicum Hds. 284.
anglicum α. Koch. 284.
anglicum β. litigosum Koch. 284.
anisophyllum Vill. 287.
Aparine L. 283.
argenteum Vill. 287.
aristatum Gaud. 285.
aristatum L. 285.
aristatum Trev. 285.
aristatum Sm. 286.
asperum Schrb. 287.
austriacum Jacq. 287.
baldense Spr. 288.
Bauhini R. S. 282.
Boccone All. 287.
Bocconi DC. 287.
boreale L. 284.
boreale β, γ. D. fl. 285.
campanulatum Vill. 281.
cinereum All. 286.
cinereum Schleich. 286.
cinereum Sm. 286.
corrudaefolium Vill. 286.

Galium *Cruciata* Scop. 282.
cruciatum Sm. 282.
divaricatum Lmk. 284.
erectum Sm. 286.
glaucum L. 281.
gracile D. fl. 284.
gracile Wallr. 284.
Halleri R. S. 282.
helveticum Weig. 287.
hercynicum Weig. 286.
hispidum Roth. 284.
hyssopifolium Hoffm. 285.
hypnoides Vill. 287.
infestum W. K. 283.
insubricum Gaud. 286.
Jussieui Vill. 287.
laeve Thuill. 287.
laevigatum L. 285.
laevigatum Vill. 285.
linifolium Lmk. 285.
litigiosum DC. 284.
lucidum All. 286.
minimum R. et S. 288.
minutiflorum Brot. 284.
Mollugo L. 286.
montanum Hds. 286.
montanum Pollich. 281.
montanum Vill. 287.
montanum Wth. 284.
mucronatum Lmk. 286.
multicaule Wallr. 287.
multicaule *α.* polyphyllum Wallr. 287.
multicaule eriophyllum Wallr. 287.
murale DC. 288.
nitidulum Thll. 287.
obliquum Vill. 286.
obliquum Wulf. 286.
ochroleucum Kit. 286.
ochroleucum Wolf. 285.
palustre L. 284.
parisiense L. 284.
parisiense Tausch. 284.
parisiense *α.* trichocarpum Tausch. 284.
parisiense *β.* lejocarpum Tausch. 284.
pedemontanum All. 282.
pedemontanum DC. 283.
pumilum Lmk. 287.
pumilum *β.* laxius D. fl. 287.
pumilum *β.* caespitosum DC. 287.
pumilum *γ.* hirtum D. fl. 287.
pumilum *δ.* pubescens DC. 287.
pumilum *β.* hirtellum Gaud. 287.
purpureum L. 285.
pusillum L. 287.
pyrenaicum L. 287.
retrorsum DC. 283.
rigidum Vill. 286.
Galium *rotundifolium* L. 284.
rubioides L. 285.
rubioides Pollich. 285.
rubrum L. 286.
rubrum Pollich. 284.
rupicola Bert. 288.
saccharatum All. 283.
saxatile L. 286.
saxatile Sm. 286.
saxatile Sut. 288.
scabrum Jacq. 287.
scabrum Pers. 287.
spurium L. 283.
spurium Roth. 283.
supinum Lmk. 287.
sylvaticum L. 285.
sylvaticum Vill. 286.
sylvaticum *β.* pubescens DC. 285.
sylvestre Pollich. 286.
sylvestre hirtum D. fl. 287.
sylvestre virens Gaud. 287.
sylvestre vulgatum Gaud. 287.
sylvestre 1. glabrum Schrad. 287.
sylvestre 2. alpestre Gaud. 287.
sylvestre 2. hispidum Schrad. 287.
sylvestre 3. Bocconi Gaud. 287.
sylvestre 3. pubescens Schrad. 287.
sylvestre 4. supinum Gaud. 287.
sylvestre *δ.* D. fl. 287.
sylvestre *ζ.* supinum D. fl. 287.
tenerum Schleich. 283.
tenuifolium All. 286.
tenuifolium Wulf. 286.
trichophyllum All., Wlf. 287.
tricorne With. 283.
trifidum L. 283.
tyrolense Willd. 286.
uliginosum L. 284.
umbellatum *α.* et *β.* Lmk. 287.
Vaillantii DC. 283.
Valantia Wigg. 283.
vernum Scop. 282.
verosimile R. S. 285.
verrucosum Sm. 283.
verum L. 285.
Villarsii Req. 288.
Witheringii Sm. 284.
Gastridium Bv. 682.
australe Bv. 682.
lentigerum Gaud. 682.
muticum Spreng. 682.
scabrum Presl. 682.
Gatyona globulifera Cass. 379.
Gaudinia Bv. 714.
fragilis Bv. 714.
Gaya Gaud. 257.
simplex Gaud. 257.
Genista L. 130.
anglica L. 132.
anxantica Ten. 131.

Genista *arcuata* Koch. 132.
dalmatica Bartl. 132.
decumbens Willd. 130.
decumbens Willd. herb. 131.
diffusa Willd. 130. 131.
elatior Koch. 131.
genuensis Pers. 131.
germanica L. 132.
Halleri Reyn. 130. 131.
hirsuta Vahl. 132.
hispanica L. 132.
hispanica Wlf. 132.
holopetala Rchb. 135.
humifusa Wlf. 130.
januensis Vivn. 131.
nervata Kit. 131.
ovata W. K. 131. 132.
pedunculata L'Her. 130.
pilosa L. 131.
procumbens W. K. 131.
prostrata Lmk. 130.
pubescens Lang. 131.
radiata Scop. 135.
sagittalis L. 135.
scariosa Viv. 131.
sericea Wulf. 131.
sibirica L. 131.
sibirica Rchb. 131.
sylvestris Scop. 132.
tinctoria L. 131.
triangularis Willd. 131.
triquetra W. K. 131.
virgata DC. 131.
virgata Willd. 131.
Gentiana L. 422.
acaulis L. 424.
acaulis α, β. L. 424.
acaulis Vill. 424.
aestiva R. S. 425.
alpina Vill. 424.
Amarella L. 426.
Amarella Pollich. 426.
Amarella Willd. 426.
angulosa M. B. 425.
angustifolia Rb. 423.
angustifolia Vill. 424.
asclepiadea L. 423.
axillaris Rb. 426.
bavarica L. 424.
brachyphylla Vill. 424.
campanulata Jacq. 423.
campestris L. 426.
carinthiaca Froel. 422.
carnica Welw. 423.
Centaurium L. 427.
Centaurium β. L. 428.
Charpentieri Thom. 422.
chloraefolia Nees. ab Es. 426.
ciliata L. 427.
cruciata L. 423.
Gentiana *excisa* Presl. 424.
filiformis L. 427.
frigida Hke. 423.
Froelichii Jan. 423.
Froelichii Hladn. 423.
Gaudiniana Thom. 422.
germanica Willd. 426.
glacialis Abr. Thom. 426.
Hladnikiana Hst. 423.
hybrida Schleich. 422.
imbricata Frl. 425.
imbricata Schleich. 424.
Koenigii Gunn. 426.
linariaefolia Lmk. 427.
lutea L. 422.
maritima L. 428.
montana Nees ab Es. 426.
nana Wulf. 426.
nivalis L. 425.
obtusifolia Rb. ic. 426.
obtusifolia Willd. 426.
pannonica Gaud. 422.
pannonica Scop. 423.
perfoliata L. 421
Pneumonanthe L. 423.
prostrata Hke. 425.
prostrata Whlbg. 424.
pulchella Swartz. 428.
pumila Jacq. 425.
punctata L. 423.
punctatae-lutea Grseb. 422.
punctatae-purpurea Grseb. 422.
purpureae-lutea Grseb. 422.
purpurea L. 422.
purpurea Schrk. 423.
pyramidalis N. ab Es. 426.
rotundifolia Hopp. 424.
rubra Clairv. 422.
spathulata Bartl. 426.
spicata L. 428.
tenella Rottb. 426.
tergloviensis Hacq. 425.
tetragona Rth. 426.
Thomasii Hall. fil., Gillab. 422.
uliginosa Willd. 426.
uniflora Willd. 426.
utriculosa L. 425.
utriculosa Whlbg. 425.
verna L. 424.
verna β. angulosa Whlbg. 425.
verna γ. imbricata D. fl. 425.

GENTIANEAE. 420.

Geracium aureum Rb. 375.
chendrilloides Rb. 378.
croaticum Rb. 378.
incarnatum Rb. 375.
paludosum Rb. 378.
parviflorum Rb. 375.

Geracium praemorsum Rb. 375.
succisaefolium Rb. 378.

GERANIACEAE. 118.

Geranium L. 119.
aconitifolium L'H. 120.
argenteum L. 120.
bohemicum Krock. 122.
bohemicum L. 121.
chaerophyllum Cav. 122.
ciconium L. spec. 123.
cicutarium L., Sm., Roth. 122.
columbinum L. 121.
dissectum L. 121.
divaricatum L. 122.
lividum L'Hrit. 119.
lucidum L. 121.
macrorrhizum L. 119.
malacoides L. 123.
malvaceum Whlbg. 121.
malvaefolium Scop. 121.
molle Fl. d. Wett. 120.
molle L. 121.
moschatum L. 122.
nodosum L. 119.
palustre L. 120.
parviflorum Curt. 121.
phaeum L. 119.
pratense L. 119.
purpureum Vill. 122.
pusillum Fl. d. Wett. 121.
pusillum L. 121.
pyrenaicum L. 120.
robertianum L. 122.
robertianum δ. Gaud. 122.
rivulare Vill. 120.
rotundifolium L. 121.
rotundifolium Pollich. 121.
sanguineum L. 120.
sibiricum L. 120.
sylvaticum L. 119.
umbrosum W. K. 120.
viscidulum Frs. 121.
Winterli Roth. 122.

Geum L. 182.
chamaedrifolium Crtz. 182.
hybridum Wlf. 183.
inclinatum Schlch. 183.
intermedium Ehrh. 182.
intermedium Schlch. 183.
montanum L. 183.
pyrenaicum DC., Wlldw. 183.
reptans L. 183.
rivale L. 183.
rubifolium Lej. 183.
Tournefortii Lap. 183.
urbanum L. 182.
Gifola vulgaris Cass. 310.
Githago segetum Dsf. 93.

Gladiolus L. 606.

Gladiolus Boucheanus v. Schld. 606.
communis L. 606.
communis Sibth. Sm. 607.
communis Wim. 606.
galiciensis Bess. 607.
illyricus Koch. 606.
imbricatus L. 606.
italicus Gaud. 607.
Ludovicae Jan. 607.
neglectus Schlt. 607.
palustris Gaud. 606.
pratensis Dietr. 606.
rossicus Pers. 607.
segetum Gawl. 607.
tenuis M. B. 606.

Glaucium Tournef. 26.
corniculatum L. 26.
flavum Crtz. 26.
fulvum Sm.? 26.
luteum Scop. 26.
phoeniceum Gärtn. 26.
rubrum Rchb. 26.
rubrum bicolor Rchb. 26.
tricolor Bernh. Rb. 26.

Glaux L. 512.
maritima L. 512.

Glechoma L. 486.
hederacea L. 486.
hederacea β. major. Gaud. 487.
heterophylla Opitz. 487.
hirsuta W. K. 487.
Marrubiastrum Vill. 491.

Globularia L. 512.
cordifolia L. 512.
nudicaulis L. 512.
vulgaris L. 512.

GLOBULARIEAE. 512.

Glyceria R. Brw. 700.
airoides Rb. 701.
aquatica Prsl. 701.
aquatica Wbg. 700.
arundinacea Fries. 708.
capillaris D. fl. 701.
capillaris Whlbg. 701.
distans Whlbg. 700.
festucaeformis Haynh. 701.
fluitans M. K. 700.
maritima M. K. 701.
plicata Fries. 700.
rigida Sm. 703.
spectabilis M. K. 700.

Glyzirrhiza L. 156.
glabra L. 156.

Gnaphalium L. 311.
alpinum Sturm. 312.
alpinum Sturm., Gaud. et plur. auct. 312.
angustifolium Lmk. 313.
arenarium L. 313.

Gnaphalium arenarium β. aurantiacum Pers. 313.
arvense Lmk. 310.
carpaticum Wbg. 312.
dioicum L. 312.
fuscatum Pers. 311.
fuscum Lmk. 311.
fuscum Scop. 312.
fuscum Willd. 312.
gallicum Hds. 311.
germanicum Hds. 310.
Hoppeanum Koch. 311.
italicum Roth. 313.
Leontopodium Scop. 312.
luteo-album L. 312.
margaritaceum L. 313.
minimum Sm. 311.
minimum Willd. 311.
montanum Huds. 311.
montanum Willd. 311.
norvegicum Gunn. 311.
nudum Hoffm. 312.
pilulare Whlbg. 312.
pilulare β. nudum DC. 312.
pusillum Hke. 312.
pusillum Willd. 312.
pusillum β. fuscum Hartm. 312.
pusillum γ. fuscum Pers. 312.
rectum Sm. 311.
supinum Hopp. 311.
supinum L. 311.
supinum Willd. 312.
supinum α. Whlbg. 312.
supinum β. pusillum Pers. 312.
sylvaticum L. 311.
sylvaticum Sm. 311.
sylvaticum α. Whlbg. 311.
sylvaticum β. fuscatum Whlbg. 311.
uliginosum L. 312.
Goodyera R. Brw. 603.
repens R. Brw. 603.
Gorinkia orientalis Prsl. 47.

GRAMINEAE. 667.

Grammarthron biligulatum Cass. 328.
scorpioides Bl. Fgh. 328.
Grammitis Swartz 730.
Ceterach Sw. 730.

GRANATEAE. 206.

Gratiola L. 448.
officinalis L. 448.

GROSSULARIEAE. 228.

Guepinia nudicaulis Bast. 60.
Gymnadenia R. Brw. 597.
albida Rich. 597.
conopsea R. Brw. 597.
odoratissima Rich. 597.
viridis Rich. 598.
Gymnocline leucocephala Cass. 326.
macrophylla Bl. Fgh. 326.
Gymnogramma Ceterach. Sprg. 730.
Gypsophila L. 81.
acutifolia Fisch. 81.
arenaria W. K. 81.
fastigiata L. 81.
muralis L. 81.
paniculata L. 81.
prostrata All. 81.
repens L. 81.
rigida L. 82.
Saxifraga L. 81.
serotina Hayn. 81.
Vaccaria Sm. 86.

H.

Habenaria albida R. Brw. 598.
bifolia R. Br. 598.
viridis R. Brw. 598.
Hacquetia Neck. 240.
Epipactis DC. 241.
Halianthus Fries. 96.
peploides Fries. 96.
Halimus Wallr. 527.
pedunculatus Wallr. 527.
Portulacoides Wallr. 527.

HALORAGEAE. 211.

Hebelia allemannica Gm. 629.
collina Gmel. 629.
Hedera L. 276.
Helix L. 276.
quinquefolia L. 118.
Hedypnois Tournef. 357.
autumnalis Hds. 358.
elavata Ten. 357.
cretica Willd. 357.
hirta Sm. brit. 358.
hispida Sm. 359.
paludosa Scop. 367.
pyrenaica Vill. 359.
Taraxaci Vill. 359.
Hedysarum L. 165.
alpinum Jcq. 165.
angustifolium Thm. 165.
arenarium Kit. 165.
controversum Crtz. 165.
obscurum L. 165.
Onobrychis L. 165.
pallidum Schleich. 165.
petraeum Biberst. 166.
saxatile Vill. 166.
supinum Vill. 166.
Heleocharis R. Brwn. 640.
acicularis R. Brwn. 641.
atropurpurea Knth. 641.
carniolica Koch. 641.
multicaulis Sm. 641.

Heleocharis *ovata* Brwn. 641.
palustris Brwn. 640.
uniglumis Link. 641.
Heleochloa alopecuroides Hst. 674.
diandra Hst. 674.
schoenoides Hst. 674.
Heleogiton trigonum Rchb. 644.
triquetrum Rb. 644.
Helianthemum Tournef. 69.
alpestre Rchb. 69.
apenninum DC. 70.
apenninum Gaud. 70.
apenninum Schlch. 70.
Chamaecistus Mill. 70.
denticulatum Thib. 69.
Fumana Mill. 69.
grandiflorum DC. 70.
guttatum Mill. 69.
intermedium Thib. 69.
obscurum Pers. 70.
oelandicum Whlbg. 69.
oelandicum Rb. 69.
oelandicum *α*. Gaud. 69.
oelandicum *α*. Whlbg. 69.
oelandicum *β*. Gaud. 69.
oelandicum *β*. ciliatum Whlbg. 69.
oelandicum *γ*. canens Whlbg. 69.
polifolium (Cistus) L. 70.
punctatum Willd. 69.
salicifolium Prsl. 69. 70.
sanguineum Hst. 69.
surrejanum Mill. 70.
vulgare DC. 70.
vulgare Gaertn. 70.
vulgare *β*. obscurum Whlbg. 70.
Helianthus L. 309.
annuus L. 309.
tuberosus L. 309.
Helichrysum Gaertn. 313.
angustifolium DC. 313.
arenarium DC. 313.
Heliotropium L. 430.
europaeum L. 430.
Helleborus L. 21.
altifolius Auct. 17.
atrorubens W. K. 18.
dumetorum W. K. 18.
foetidus L. 18.
hyemalis L. 17.
niger L. 17.
odorus W. K. 17.
viridis L. 17.
Helminthia Juss. 361.
echioides Gärtn. 361.
Helonias borealis Willd. 629.
Helosciadium Koch. 244.
inundatum Koch. 244.
nodiflorum Koch. 244.
repens Koch. 244.
Hemerocallis L. 627.
Hemerocallis *flava* L. 627.
fulva L. 627.
Liliastrum L. 617.
Hepatica triloba DC. 6.
Heracleum L. 264.
alpinum L. 265.
angustifolium L. 264.
asperum M. B. 264.
austriacum L. 265.
elegans Jcq. 264.
flavescens Bss. 264.
longifolium Jcq. 264.
montanum Schlch. 264.
palmatum Bmgt. 264.
Panaces Bertol. 264.
Panaces Koch. 264.
Panaces L. 264.
Panaces Rb. 264.
pyrenaicum Lmk. 264.
sibiricum L. 264.
siifolium Rchb. 265.
Sphondylium L. 264.
Heriteria anthericoides Schrk. 629.
Herminium R. Br. 600.
Monorchis R. Br. 600.
Herniaria L. 218.
alpina Vill. 219.
glabra L. 219.
hirsuta L. 219.
incana L. 219.
Hesperis L. 41.
Allaria Lmk. 43.
bituminosa Sav. 41.
inodora L. 41.
laciniata All. 41.
matronalis L. 41.
runcinata W. K. 41.
tristis L. 41.
verna L. 34.
Heteropogon Pers. 669.
Allionii R. S. 669.
glaber Pers. 669.
Hibiscus L. 113.
pentacarpus L. 114.
syriacus L. 114.
Trionum L. 113.
Hieracium L. 379.
affine Tsch. 395.
albidum Vill. 393.
Allionii Monn. 386.
alpestre Jcq. 375.
alpicola Schlch. 381.
alpinum L. 392.
alpinum Willd. 387.
alpinum 4. sudeticum Wimm. et Gr. 392.
alpinum 5. nigrescens Wimm. et Gr. 392.
ambiguum Ehrh. 384.
amplexicaule L. 391.

Hieracium amplexicaule β. et γ. Froel. DC. 392.
andryaloides Vill. 391.
angustifolium Gmel. 389.
angustifolium Hpp. Tschb. 381.
angustifolium Hopp. Sturm. 381.
angustifolium Willd. 381.
arvense Scop. 371.
atricapillum Hopp. 392.
aurantiacum L. 384.
aurantiacum β. bicolor Cust. ap. Gaud. 385.
aurantiacum δ. flavum Gaud. 385.
aurantiacum ζ. fuscum Froel. 385.
aureum Scop. 375.
Auricula L. spec. 381.
Auricula Sm. 381.
Auricula Vill. 381.
Auricula Willd. 383.
Auricula γ. angustifolium Dub. 381.
auriculaefolium Tsch. 381.
Bauhini Schlt. 383.
bifidum Kit. 390.
bifurcum M. B. 380. 381.
blattaroides L. 378.
boreale Fries. 394.
brachiatum Bertol. 381.
breviscapum DC. 381.
bulbosum Willd. 375.
bupleuroides Gmel. 386.
caeruleum Scop. 372.
calodon Tausch. 383.
Candollii Monn. 381.
cerinthoides Gn. 388. 391.
cerinthoides Auct. bot. germ. et Sm. 388. 391.
cerinthoides Kirschleg. 388.
cerinthoides ξ. decipiens Mon. 388.
cerinthoides vogesianum Kirschl. 388.
chondrilloides L. 378.
chrysanthum Ledeb. 375.
cinereum Tsch. 384.
collinum Bess. 381.
collinum Goch., DC. 384.
collinum Tsch. 383.
conyzaefolium Gouan. 379.
coronopifolium Bernh. 396.
cotoneifolium Froel. 394.
croaticum Fl. sedin. 395.
croaticum W. K. 378.
cydoniaefolium Tsch. 393.
cydoniaefolium Vill. 392.
cymigerum Rb. 383.
cymosum L. 384.
cymosum Froel. in litt. 384.
cymosum Pollich. 383.
cymosum Spreng. fl. hal. 383.
cymosum St. 384.

Hieracium cymosum Willd. 384.
cymosum Vill. 385.
cymosum laxum Mey. 383.
cymosum α. Columnae Rb. ic. 384.
cymosum α. conglomeratum Meyer. 384.
cymosum β. longifolium Rb. ic. 383. 384.
cymosum c. setosum Mey. 383.
danubiale Pollich. 359.
decipiens Froel. 388.
dentatum Hpp. 386.
denticulatum Sm. 394.
diaphanum Frs. 389.
dubium L. spec. 384.
dubium Monn. 380.
dubium Sm. 382.
dubium Tsch. 380.
echioides Lumn. 383.
echioides W. K. 383.
eriophyllum Link., Schlch. 387.
fallax DC. 383.
fallax I. Gaud. 383.
fallax II. Gaud. 383.
fallax Koch. ap. DC. 383.
fallax Willd. 383.
filiferum Tsch. 383.
flagellare Froel. 381.
flagellare Willdw. 380.
flexuosum DC. 387.
flexuosum Gaud. 387.
flexuosum γ. Gaud. 388
flexuosum W. K. 387.
florentinum Sturm. 382.
florentinum Willd. 382.
florentinum I. praealtum Gd. 382.
florentinum II. piloselloides Gd. 382.
frigidum Stev. 375.
furcatum Hpp. 381.
fuscum Vill. 385.
glabratum Hopp. 387.
glabratum Schleich. 387.
glaciale Lachen. 381.
glanduliferum Hopp. 387.
glaucescens Bess. 383.
glaucum All. DC. 386.
glaucum Schleich. 386.
glaucum Whlbg. 386.
graminifolium β. linearifolium Froel. 386.
grandiflorum All. 379.
Halleri Vill. 392.
helveticum Sut. 388.
Hoppeanum Schult. 380.
humile Hst. 391.
hybridum Chx. 381. 392.
hybridum Gaud. 381.
hybridum Vill. 392.

Hieracium hyoseridifolium Vill. 379.
Jacquinii Vill. 390.
incanum L. 360.
incanum Pollich. 359.
incarnatum Wulf. 375.
incisum Hpp. 390.
integrifolium Hpp. 378.
intybaceum Hpp. 392.
intybaceum Jcq., Wulf. 393.
Lachenalii Gmel. 389.
Lactaris Bert. 396.
Lactucella Wallr. 382.
laevigatum Koch., Willd., Fries. 395.
lanatum Vill. 391.
lanceolatum Schleich. 394.
lanceolatum Vill., Tsch. 394. 395.
lasiophyllum Koch. 389.
latifolium Froel. 395.
Lawsonii Vill., Sm. 388.
Liottardi Vill. 391.
longifolium Schlch. 388.
longifolium *β.* Mougeoti Froel. 388.
lycopifolium Froel. 393.
maculatum Sm. 389.
Mertini Gmel. 389.
Michelii Tsch. 382.
molle Jcq. 378.
montanum Jcq. 379.
montanum Scp. 375.
Mougeoti Froel. 388.
multiflorum Schlch. 385.
murorum L. 390.
murorum Vill. Fries. 390.
murorum pilosissimum L. 390.
murorum *α.* Pollich. 390.
murorum *β.* sylvaticum L. 390.
murorum *γ.* L. 389.
murorum *γ.* villosum Froel. 390.
murorum rotundatum Koch. 390.
murorum II. sylvaticum Gd. 389.
nemorosum Dierb. 395.
Nestleri Vill. 384.
nigrescens Willd. 392.
obscurum Rb. 383.
ochroleucum Schlch. 394.
oleraceum Scp. 371.
pallescens W. K. 389.
paludosum L. 378.
pappoleucum Vill. 379.
parviflorum Schlch. 375.
Peleterianum Mer. 380.
pellucidum *α.* Wbg. 390.
pellucidum *β.* Wbg. 389.
perfoliatum Froel. 394.
petraeum Hpp. 392.
picroides Vill., Froel. 394.
pictum Pers. 391.
pilocephalum Willd., Link. 387.

Hieracium *Pilosella* L. 379.
Pilosella *α.* vulgare Monn. 380.
Pilosella B. alpestre Monn. 380.
Pilosella *β.* Pollich. 380.
Pilosella *β.* farinaceum Hornung. herbar. 380.
Pilosella *β.* incanum DC. 380.
Pilosella *β.* pilosissimum Wallr. 380.
Pilosella C. Peleterianum Mon. 380.
Pilosella *γ.* grandiflorum DC. 380.
pilosellaeforme Hopp. 380.
piloselloides DC. Fl. franc. 382.
piloselloides Vill. DC. 382.
piloselloides Wallr. 383.
polyphyllum Schleich. 388.
polyphyllum Willd. 386.
porrifolium L. 385.
porrifolium Ser. 386.
porrifolium *α.* armerifolium Froel. 385.
porrifolium *δ.* dentatum Froel. 385.
praealtum Koch. 382.
praealtum Tsch. 382.
praealtum Vill. 382.
praemorsum L. 375.
praemorsum II. corymbosum Gaud. 375.
pratense Tsch. 384.
prenanthoides Sm., DC. 394.
prenanthoides Vill. 393.
prunellaefolium Gn., DC. 378.
Pseudo-Cerinthe Gaud. 391.
pulmonarioides Presl. 393.
pulmonarioides Vill. 392.
pumilum Hpp. 392.
pumilum Jcq. 391.
pumilum Lpr. 381.
pumilum L. 378.
pusillum Hpp. 381.
pyrenaicum L. 378.
racemosum W. K. 394.
ramosum W. Kit. 389.
rigidum Fries. 389. 395.
rigidum Hrtm. 395.
Rothianum Wallr. 383.
rotundatum Kit. 390.
rupestre All. 390.
sabaudum L. spec. 394.
sabaudum L. suec. 395.
sabaudum nigrescens Ser. 395.
sabinum Sebast. Maur. 385.
sanctum L. 373.
saxatile Jcq. 386.
saxatile Vill. 388. 390.
Schmidtii Tsch. 389.
Schraderi Gd. 387.
Schraderi Schlch. 387.
Schraderi III. glabratum Gd. 388.

Hieracium scorzonerifolium Vill. 386.
setigerum Tsch. 383.
simplex Tsch. 383.
speciosissimum Willd. 386.
speciosum Hornem. 386.
sphaerocephalum Froel. 381.
spicatum All. 394.
staticefolium Vill. 385.
stellatum Tsch. 382.
Sternbergii Hrnem. 378.
stipitatum Jcq. 367.
stoloniflorum W. K. 380.
strictissimum Froel. 394.
succisaefolium All. 378.
sudeticum Froel. Stbg. 392. 393.
sylvaticum Gn. 389. 390. 396.
sylvaticum Lmk. 389.
sylvaticum Whlbg. 395.
sylvestre Tsch. 394.
Taraxaci L. 358.
tomentosum All. 391.
trichocephalum Willd. 387.
umbellatum L. 396.
undulatum Willd. 391.
uniflorum Hpp. 381.
Vaillantii Tsch. 384.
valde pilosum Vill. 387.
velutinum Hgtschw. 380.
verbascifolium Prs. 391.
villosum Jcq. L. 387.
virescens Sond. 395.
viscidulum Tsch. 383.
vulgare Tsch. 383.
vulgatum Koch., Fries. 388.
vulgatum tridentatum Fries. 395.
Wildenowii Monn. 386.
Zizianum Tsch. 383.
Hierochloa Gmel. 672.
australis R. S. 672.
borealis R. S. 672.
odorata Whlbg. 672.
Himantoglossum Spr. 598.
hircinum Spr. 598.
Hippion aestivum Schmidt. 425.
axillare Schm. 426.
Gentianella Schm. 426.
longe pedunculatum Schm. 426.
nanum Schm. 427.
obtusifolium Schm. 426.
HIPPOCASTANEAE. 118.
Hippocrepis L. 164.
comosa L. 164.
unisiliquosa L. 165.
Hippomarathrum pelviforme Fl. d. Wett. 253.
Hippophaë L. 541.
rhamnoides L. 541.
HIPPURIDEAE. 211.
Hippuris L. 211.
Hippuris lanceolata Retz. 212.
maritima Hellen. 212.
tetraphylla L. 212.
vulgaris L. 211.
vulgaris *β.* maritima Whlbg. 212.
Hirschfeldia adpressa Mönch. 50.
Hladnikia golacensis Koch. 275.
pastinacifolia Rchb. 245.
Holcus L. 688.
avenaceus Scp. 688.
avenaceus L. 669.
australis Schrad. 672.
biaristatus Wigg. 691.
borealis Schrd. 672.
bulbosus Schrd. 688.
lanatus L. 688.
mollis L. 688.
odoratus Hst. 672.
repens Hst. 672.
saccharatus L. 669.
Sorghum L. 669.
Holoschoenus australis Rb. 645.
exserens Rb. 645.
filiformis Rb. 645.
Linnaei Rb. 645.
vulgaris Link. 645.
Holosteum L. 102.
umbellatum L. 102.
Homalocenchrus orizoides Poll. 677.
Homogyne Cass. 299.
alpina Cass. 299.
discolor Cass. 299.
sylvestris Cass. 299.
Honkenya peploides Ehrh. 96.
Hoppea sibirica Rb. 331.
Hordeum L. 717.
bulbosum Bert. 718.
bulbosum L. 718.
crinitum Desf. 717.
cylindricum Murr. 717.
distichum L. 717.
europaeum All. 717.
geniculatum All. 718.
hexastichon L. 717.
maritimum Wthr., Rth. 718.
montanum Schrk. 717.
murinum L. 718.
murinum *β.* L. 718.
nodosum M. B. 718.
nodosum L., Sav. 718.
pratense Hds. 718.
pseudo-murinum Tapp. 718.
rigidum Roth. 718.
secalinum Schreb. 718.
strictum Desf. 718.
sylvaticum Hds. 717.
vulgare L. 717.
vulgare L. *β.* coeleste 717.
zeocriton L. 717.
Horminum L. 485.

Horminum *pyrenaicum* L. 485.
Hottonia L. 510.
palustris L. 511.
Hugueninia Rb. 43.
tanacetifolia Rb. 43.
Humulus L. 551.
Lupulus L. 551.
Hutchinsia R. Br. 63.
alpina R. Br. 63.
brevicaulis Hpp. 63.
corymbosa Gay. 60.
petraea R. Br. 63.
procumbens Dsv. 64.
rotundifolia R. Br. 60.
Hyacinthus botryoides L. 627.
comosus L. 627.
non scriptus L. 627.
racemosus L. 627.

HYDROCHARIDEAE. 579.

Hydrocharis L. 579.
Morsus ranae L. 580.
Hydrochloa airoides Hartm. 701.
aquatica Hrtm. 700.
caerulea Hrtm. 701.
fluitans Hrtm. 700.
maritima Hrtm. 701.
Hydrocotyle L. 240.
inundata Sm. 244.
Schkuhriana Rb. 240.
vulgaris L. 240.
Hymenocarpus circinatus Savi. 139.
Hyoscyamus L. 441.
agrestis Kit. 441.
albus L. 441.
bohemicus Schm. 441.
niger L. 441.
pallidus Kit. 441.
Scopolia L. 441.
verviensis F. d. Spa. 441.
Hyoseris L. 357.
adspersa Mnch. 357.
foetida L. 356.
microcephala Cass. 357.
minima L., Schrk. 356.
scabra L. 357.
taraxacoides Lmk., Wlf. 358.
taraxacoides Vill. 358.
Hypecoum L. 26.
littorale Wulf. 27.
pendulum L. 26.

HYPERICINEAE. 115.

Hypericum L. 115.
alpinum W. K. 116.
androsaemifolium Vill. 116.
Androsaemum L. 115.
barbatum Jcq. 116.
ciliatum Lmk. 116.
commutatum Nlte. 115.
Hypericum *Coris* L. 116.
delphinense Vill. 115.
dubium Leers. 115.
elegans Steph. 116.
elodes L. 117.
fimbriatum Lmk. 116.
hirsutum L. 116.
humifusum L. 115.
humifusum *β.* Liottardi Vill. 115.
Kohlianum Spr. 116.
Leersii Gmel. 115.
maculatum Crtz. 115.
medium Petrm. 115.
montanum L. 116.
perforatum L. 115.
perforatum *β.* Gaud. 115.
pulchrum L. 116.
quadrangulum L. 115.
quadrangulare Sm. 116.
quadrialatum Wbg. 116.
Richeri Vill. 116.
tetrapterum Fries. 115.
veronense Schrk. 115.
Hypochoeris L. 366.
Balbisii Koch. Lois. 366.
glabra L. 366.
helvetica Jcq. 366.
intermedia Richt. 366.
maculata L. 366.
pontana L. 379.
radicata L. 366.
uniflora Vill. 366.
Hypopitys glabra DC. 416.
multiflora Scop. 416.
Hyssopus L. 485.
ocymifolius Lmk. 475.
officinalis L. 486.

I.

Jasione L. 402.
humilis Pers. 402.
montana L. 402.
montana *β.* littoralis Fries. 402.
perennis L. 402.
perennis *β.* humilis Koch. 402.

JASMINEAE. 418.

Jasminum L. 418.
fructicans 418.
officinale L. 418.
Iberis L. 60.
amara L. 61.
amara Scop. 61.
amara *β.* Comp. Fl. Belg. 61.
campestris Wallr. 62.
cepeaefolia DC. 60.
divaricata Tausch. 61.
intermedia Guers. 61.
linifolia 61.

Iberis nudicaulis L. 60.
pinnata L. 61.
rotundifolia L. 60.
ruficaulis Lej. 61.
saxatilis L. 61.
umbellata L. 61.
Jirasekia alpina Schmidt. 503.
tenella Rchb. 503.
Ilex L. 417.
Aquifolium L. 417.
Coccifera Tbernm. 555.
Illecebrum L. 219.
capitatum L. 219.
cephalotes M. B. 219.
serpyllifolium Vill. 219.
verticillatum L. 219.
Impatiens L. 123.
Noli tangere L. 123.
Imperata Cyrill. 673.
arundinacea Cyrill. 673.
cylindrica P. d. Beauv. 673.
Imperatoria L. 263.
angustifolia Bellrd. 263.
Chabraei Spr. 261.
montana DC. 259.
Ostruthium L. 263.
palustris Bess. 258.
pimpinelloides a Bngh. 261.
Seguieri Spr. 256.
sylvestris DC. 258.
verticillaris DC. 262.
Impia germanica Bl. Fgh. 310.
Intybellia incarnata Monn. 375.
praemorsa Monn. 375.
pulchra Monn. 377.
Intybus praemorsus Fries. 375.
Inula L. 306.
Britannica L. 308.
Bubonium Jcq. 307.
campestris Bess. 308.
cinerea Lmk. 307.
Conyza DC. 307.
crithmifolia Willd. 308.
crithmoides L. 308.
dysenterica L. 308.
ensifolia L. 307.
germanica L. 306.
germanica Vill. 307.
graveolens Desf. 308.
Helenium L. 306.
hirta L. 307.
hirta Pollich. 308.
hybrida Bmg. 306.
media M. B. 306.
montana L. 308.
montana Pollich. 307.
Oculus Christi L. 308.
Oculus Christi M. B. 308.
Oetteliana Rb. 308.
pulicaria L. 308.
Inula *salicina* L. 307.
spiraeaefolia L. 307.
squarrosa Bernh. 307.
squarrosa L. 307.
suaveolens Jcq. 307.
Vaillantii Vill. 307.
viscosa Ait. 309.

IRIDEAE. 605.

Iris L. 607.
biflora L.? 608.
biflora Schaur. 608.
bisflorens Hst. 608.
bohemica Schm. 608.
bohemica Fieb. Strm. 608.
Fieberi Seidl. 608.
Fieberi Fieb. 608.
florentina L. 607.
foetidissima L. 609.
germanica L. 607.
graminea L. 609.
hungarica Sturm. 608.
lutescens Lmk.? 609.
nudicaulis Schaur. 608.
nudicaulis Wimm. 608.
nudicaulis Lmk. 608.
pallida Lmk. 607.
pratensis Lmk. 609.
Pseud-Acorus L. 609.
pumila L. 609.
sambucina L. 607.
sibirica L. 609.
spathulata Lmk. 609.
spuria L. 609.
squalens L. 608.
variegata L. 609.
Isatis L. 65.
alpina All. 65.
campestris Stv. 65.
praecox Kit. DC. 65.
tinctoria L. 65.
Villarsii Gaud. 65.
Isnardia L. 210.
palustris L. 210.
Isoëtes L. 726.
lacustris L. 726.
Isolepis fluitans Brwn. 642.
Holoschoenus R. S. 644.
Micheliana R. S. 645.
setacea R. Br. 643.
supina R. Br. 643.
Isopyrum L. 18.
thalictroides L. 18.
Ittnera minor Gmel. 589.
Najas Gmel. 589.

JUGLANDEAE. 553.

Juglans L. 553.
regia L. 553.

JUNCACEAE. 630.

JUNCAGINEAE. 581.

Juncus L. 630.
acuminatus Balb. 631.
acutiflorus Ehrh. 633.
acutiflorus β. D. fl. 633.
acutiflorus β. multiflorus Whlbg. 633.
acutiflorus γ. Mey. 633.
acutus L. 630.
adscendens Hst. 633.
albidus Hoffm. 636.
alpestris Hrtm. 634.
alpinus Vill. 634.
angustifolius Wulf. 636.
aquaticus Rth. 633.
arcticus Willd. 631.
articulatus α, β L. 633.
articulatus γ. L. 633.
atratus Krok. 633.
balticus Willd. 631.
bifolius Hopp. 633.
bottnicus Wbg. 635.
brevirostris Nees. ab Es. 633.
bufonius L. 635.
bufonius δ. Schult. 635.
bulbosus L. spec. ed. I. 634.
bulbosus L. spec. ed. II. 634.
bulbosus β. Whlbg. 635.
campestris D. fl. 637.
campestris α. L. 637.
campestris ε. L. 637.
capitatus Weig. 633.
capitatus Skhr. 634.
castaneus Sm. 632.
coenosus Bichen. 635.
compressus Jcq. 634.
congestus Thuill. 637.
conglomeratus L. 630.
diffusus Hpp. 631.
consanguineus Koch. et Z. 635.
divergens Koch. et Z. 633.
effusus L. 631.
effusus Pollich. 631.
effusus β. L. 631.
erectus Pers. 637.
ericetorum Pollich. 633.
fasciculatus Schrk. 634.
filiformis L. 631.
flavescens Hst. 635.
fluitans Lmk. 634.
foliatus minimus Bauh. 633.
Forsteri Sm. 636.
fusco-ater Schreb. 634.
geniculatus Schrk. 634.
Gerardi Lois. 634. 635.
glabratus Hpp. 636.
glaucus Ehrh. 631.
glaucus β. littoralis Whlbg. 631.
Juncus gracilis Roth. 633.
gracilis Lej. 635.
helodes Link. 631.
heptangulus Peterm. 634.
Hostii Tsch. 632.
hybridus Brot. 635.
Jacquini L. 630.
inflexus Leers. et Auct. 631.
intermedius Hst. 636.
intermedius Thuill. 637.
latifolius Wulf. 636.
lamprocarpus Ehrh. 633.
lamprocarpus γ. ε. Mey. 633.
luteus Allion. 637.
Luzula Krock. 636.
luzulinus Vill. 636.
luzuloides Lmk. 636.
maritimus Lmk. 630.
maximus Ehrh. 636.
melananthos Rb. 634.
monanthos Jcq. 632.
montanus Lmk. 636.
multiflorus Ehrh. 637.
mutabilis Sav. 635.
Neesii Heller. 633.
nemorosus Hst. 637.
nemorosus Pollich. 636.
nemorosus β. Pollich. 636.
nigritellus Koch. 634.
niveus L. 636.
nodulosus Whlbg. 634.
obtusiflorus Ehrh. 633.
paniculatus Hopp. 631.
paniculatus Schult. 631.
parviflorus Ehrh. 636.
pilosus α. L. 636.
pilosus β, δ, ε. L. 636.
pygmaeus 635.
rariflorus Hrtm. 634.
retroflexus Rafin. 633.
setifolius Ehrh. 634.
spadiceus All. 636.
sphaerocarpus N. ab E. 635.
spicatus L. 637.
Sprengelii Schld. 634.
squarrosus L. 634.
stygius L. 632.
subnodulosus Schrk. 633.
subverticillatus Wulf. 634.
sudeticus Willd. 637.
supinus Mönch. 634.
sylvaticus Reich. 633.
sylvaticus Sm. 636.
Tenageia Ehrh. 635.
Tenageia β. Mey. 635.
tenax Poir. 631.
tenuis Willd. 635.
triandrus Guan. 632.
triceps Rstk. 632.
trifidus L. 632.

Juncus *triglumis* L. 632.
uliginosus Rth. 634.
uliginosus *α.* Mey. 634.
ustulatus Hpp. 634.
Vaillantii Thuill. 635.
vernalis Ehrh. 636.
verticillatus Pers. 634.
Juniperus L. 575.
communis L. 575.
communis *γ.* L. 575.
communis *γ.* alpina Gaud. 575.
communis *γ.* montana Ait. 575.
lycia L. 575.
macrocarpa Sibth. 575.
nana Willd. 575.
Oxycedrus L. 575.
phoenicea L. 575.
Sabina L. 575.
sibirica Burgsdorf. 575.
Jurinea Cass. 348.
cyanoides Rchb. 348.
mollis Rchb. 348.
Ixia Bulbocodium L. 606.

K.

Kali Soda Scp. 521.
Tragus Scp. 521.
Kentrophyllum Neck. 349.
lanatum DC. 349.
Kernera auriculata Rb. 58.
myagroides Rb. 58.
myagroides Med. 58.
saxatilis Rb. 58.
Ketmia Trionum Scp. 114.
Knappia argrostidea Sm. 676.
verna Trin. 676.
Knautia Coult. 294.
arvensis Coult. 294.
hybrida Coult. 294.
longifolia Kch. 294.
sylvatica Dub. 294.
Kobresia Willd. 647.
caricina Willd. 647.
scirpina Willd. 647.
Kochia Roth. 522.
arenaria Rth. 523.
hirsuta Nolt. 523.
prostrata Schrad. 523.
Scoparia Schrad. 523.
Koeleria Pers. 685.
avenacea Tsch. 686.
cristata Pers. 685.
cristata *β, γ.* D. fl. 686.
cristata *γ.* DC. 686.
glauca DC. 686.
gracilis Guss. 686.
grandiflora Bertol. 686.
hirsuta Gd. 686.
phleoides Pers. 686.
Koeleria setacea DC. 686.
setacea Pers. 686.
splendens Prsl. 686.
subspicata Rb. 692.
tuberosa Pers. 686.
valesiaca Gd. 686.
valesiaca Rb. 686.
Koellea hyemalis Bir. 17.
Krockeria oligoceratos Mnch. 155.

L.

LABIATAE. 474.

Lactuca L. 369.
augustana All. 369.
augustana Rchb. 370.
caerulea Saut. 371.
muralis Mey. 370.
perennis L. 370.
prenanthoides Scp. 368.
quercina Koch. 370.
quercina L. 370.
quercina hort. bot.? 370.
quercina Willd. herb. 370.
sagittata W. K. 370.
saligna L. 369.
sativa L. 369.
Scariola L. 369.
stricta W. K. 370.
viminea Schltz. 370.
virosa L. 369.
virosa Schk. 369.
Laelia cochlearioides Pers. 66.
orientalis Dsv. 66.
Lagoseris bifida Koch. 373.
nemausensis 373.
Lagurostemon pygmaeus Cass. 347.
Lagurus L. 680.
cylindricus L. 673.
ovatus L. 680.
Lamarckia Mönch. 686.
aurea Mönch. 687.
Lamium L. 487.
album L. 489.
album *β.* Pollich. 488.
amplexicaule L. 488.
dissectum Rb. 488.
dissectum With. 488.
Galeobdolon Crtz. 489.
hybridum DC. 488.
hybridum Rb. 488.
incisum Willd. 488.
intermedium Fries. 488.
laevigatum L. 489.
laevigatum Rb. 489.
maculatum L. 488.
maculatum Rb. 489.
Orvala L. 488.
pannonicum Scop. 488.

Lamium *purpureum* L. 488.
purpureum *β.* decipiens Sond. 488.
purpureum *β.* hybridum Vill. 488.
rubrum Wallr. 488.
rugosum Ait., Rchb. 488.
vulgatum *α.* rubrum Beth. 488.
vulgatum *β.* album Benth. 489.
westphalicum Weih. 488.
Lappa Tournef. 345.
maior Gaertn. 345.
minor DC. 346.
officinalis All. 345.
tomentosa Lmk. 346.
Lappago racemosa Schreb. 670.
Lappula Myosotis Mönch. 431.
Lapsana L. 356.
communis L. 356.
foetida Willd. Scop. 356.
pulchra Vill. 377.
pusilla Willd. 356.
stellata L. 356-357.
Rhagadiolus L. 357.
Zacyntha L. 372.
Larbrea aquatica Ser. 104.
aquatica St. Hilair. 104.
Larix europaea Hort. Paris. 578.
Laserpitium L. 266.
alpinum W. K. 266.
aquilegifolium DC. 266.
aquilegifolium Jcq. 266.
aquilegifolium Schleich. 267.
Archangelica Wlf. 268.
asperum Crtz. 266.
Cervaria Gml. 266.
Chironium Scp. 268.
dauricum Jcq. 256.
gallicum Scp. 267.
Gaudinii Morett. 267.
glabrum Crtz. 266.
Halleri All. 267.
hirsutum Lmk. 267.
hirtellum Gaud. 267.
latifolium Gmel. 266.
latifolium L. 266.
Libanotis Lmk. 266.
luteolum Gd. 267.
marginatum DC. 267.
marginatum W. K. 266.
nitidum Zant. 267.
Panax Gouan. 267.
peucedanoides L. 267.
prutenicum L. 267.
selinoides Crtz. 267.
selinoides Scp. 258.
silaifolium Jcq. 255.
Siler L. 267.
simplex All. 257.
trilobum L. 266.
verticillatum W. K. 267.
verticillatum W. K. 255.
Lasiagrostis Link. 683.
Calamagrostis Link. 683.
variegata Mey. 683.
Lastraea cristata Prsl. 734.
dilatata Prsl. 734.
Filix mas Prsl. 733.
Oreopteris Prsl. 733.
rigida Prsl. 734.
spinulosa Prsl. 734.
Thelypteris Prsl. 733.
Lathraea L. 466.
Squamaria L. 466.
Lathyrus L. 173.
angulatus L. 174.
annuus L. 174.
Aphaca L. 173.
auriculatus Bert. 173.
axillaris Lmk. 174.
bithynicus Lmk. 168.
Cicera L. 174.
coccineus All. 174.
ensifolius Badarr. 175.
Halersteinii Bmg. 175.
heterophyllus L. 175.
hirsutus L. 174.
inconspicuus L. 173.
inconspicuus Jcq. 174.
incurvus Hochst. 176.
intermedius Wallr. 176.
latifolius fl. suec. 175.
latifolius L. 175.
monanthos Willd. 172.
Nissolia L. 173.
Ochrus DC. 173.
palustris L. 176.
parviflorus Roth. 173.
platyphyllos Retz. 175. 176.
pratensis L. 175.
purpureus Desf. 173.
sativus L. 174.
sepium 175.
setifolius L. 174.
sphaericus Retz. 174.
spurius Willd. 173.
stans Vis. 173.
sylvestris L. 175.
sylvestris *α.* ensifolius DC. 175.
tuberosus L. 174.
tumidus Willd. 168.
turgidus Lmk. 168.

LAURINEAE. 538.

Laurus L. 538.
nobilis L. 538.
Lavandula L. 475.
officinalis Chx. 475.
Spica D. fl. 475.
Spica *α.* L. 475.
vera DC. 475.
Lavatera L. 113.

Lavatera *Thuringiaca* L. 113.
Ledum L. 414.
palustre L. 414.
Leersia Soland. 676.
orizoides Sw. 676.
Lemna L. 590.
arrhiza L. 590.
gibba L. 590.
minor L. 590.
polyrrhiza L. 590.
trisulca L. 590.

LEMNACEAE. 589.

LENTIBULARIEAE. 500.

Leontodon L. 358.
alpinum Jcq. 359.
alpinus Hopp. 367.
aureum L. 375.
autumnalis L. 358.
Berinii Roth. 360.
bulbosum L. 375.
caucasicus M. B.? 360.
caucasicus Stv. 367.
caucasicus Rchb. 360.
corniculatus Kit. 367.
crispus Vill. 360.
croceum Hnk. 359.
danubiale Jcq. 359.
dentatum L. 378.
erectum Schrk. 367.
erectus Hopp. 367.
glaucescens M. B. 367.
hastile L., Jcq. 359.
hastilis L. 359.
hirtum Vill. 360.
hirtum L. 358. 360.
hispidum L. 359.
hispidum Pollich. 358.
hispidum Scp. 361.
incanus Schrk. 360.
laevigatus Willd. 367.
leptocephalus Rb. 367.
lividus W. K. 367.
montanum Lmk. 359.
nigricans Kit. 367.
officinalis With. 367.
palustre Sm. 367.
protheiforme Vill. 359.
pyrenaicus Gouan. 359.
Raii Gouan. 367.
salinus Pollich. 367.
saxatile Lmk. 358.
saxatilis Rb. 361.
serotinum W. K. 368.
squamosum Lmk. 359.
Taraxaci Lois. 358.
taraxacoides Hpp. 367.
Taraxacum L. Pollich. 367.
Taraxacum 1. palustre Fries. 367.
Leontodon Taraxacum 3. obliquus Frs. 367.
Taraxacum β. palustre Wim. et Gr. 367.
tenuiflorus DC. 369.
tenuifolius Hopp. 368.
terglouensis Hacq. 379.
tuberosus L. 358.
umbellatum Schrk. 361.
Villarsii Lois. 358. 360.
Leontopodium alpinum Cass. 312.
Leonurus L. 495.
Cardiaca L. 495.
Galeobdolon Scop. 489.
Marrubiastrum L. 495.
Lepidium L. 62.
alpinum L. 63.
anglicum Hds. 65.
campestre R. Brw. 62.
didymum L. 65.
Draba L. 62.
graminifolium L. 63.
Halleri Crtz. 63.
Iberis L. 63.
Iberis Pollich. 63.
incisum Roth. 63.
latifolium L. 63.
Linnaei Crtz. 63.
perfoliatum L. 62.
petraeum L. 63.
Pollichii Roth. 63.
procumbens L. 64.
ruderale L. 62.
sativum L. 62.
sativum β. crispum L. 62.
sativum latifolium DC. 62.
scapiferum Wallr. 60.
Lepigonum Whlbg. 96.
marginatum D. fl. 96.
marinum Whlbg. 96.
medium Whlbg. 96.
rubrum Whlbg. 96.
segetale D. fl. 96.
Leptocarpaea Loeselii DC. 42.
Lepturus R. Brwn. 720.
cylindricus Trin. 720.
filiformis Trin. 720.
incurvatus Trin. 720.
Leucanthemum atratum DC. 324. 325.
heterophyllum DC. 325.
montanum DC. 325.
vulgare DC. 324.
Leucoium L. 611.
aestivum L. 611.
vernum L. 611.
Levisticum Kch. 258.
officinale Kch. 258.
vulgare Rb. 258.
Libanotis Crtz. 254.

Libanotis athamantica Fl. d. Wett. 254.
athamantoides DC. 254.
cretensis Scp. 256.
daucoides Scp. 254.
gracilis Rchb. 255.
montana All. 254.
Riviniana Scp. 254.
rupestris Scp. 256.
sibirica Koch. 254.
vulgaris DC. 254.
vulgaris β. pubescens DC. 254.
vulgaris γ. daucifolia DC. 254.
vulgaris ε. sibirica DC. 254.
Libertia arduennensis Lej. 710.
Ligularia Cass. 331.
sibirica Cass. 331.
Ligusticum L. 256.
apioides Lmk. 255.
athamantoides Spr. 254.
austriacum L. 275.
capillaceum Link. 257.
carniolicum Hst. 275.
Corvi Roth. 246.
Cervaria Spr. 261.
cicutaefolium Vill. 255.
cicutarium Lmk. 274.
ferulaceum All. 256.
Gmelini Cham. 257.
Gmelini Vill. 275.
Levisticum L. 258.
Meum Crtz. 257.
minus Lmk. 255.
Mutellina Crtz. 257.
nodiflorum Vill. 255. 267.
peloponnesiacum L. 274.
pyrenaeum L. 256.
Seguieri Koch 256.
simplex All. 257.
vaginatum L., Spr. 257.
Ligustrum B. 418.
vulgare L. 418.

LILIACEAE. 614.

Lilium L. 614.
bulbiferum L. 615.
carniolicum Bernh. 615.
chalcedonicum D. fl. Host. Jcq. 615.
chalcedonicum L. 615.
Martagon L. 615.
pomponium L. 615.
Limnanthemum Gmel. 421.
Nymphoides Link. 421.
peltatum Gmel. 421.
Limnetis pungens Rich. 676.
Limnochloa acicularis Rb. 642.
Braeothryon Rb. 642.
caespitosa Rb. 642.
parvula Rb. 642.
Limodorum Trnf., Rich. 602.
abortivum Swartz. 602.
Epigogium Sw. 602.
Limosella L. 461.
aquatica L. 461.
Linaria Trnf. 451.
alba Moench. 453.
alpina Mill. 452.
angustifolia Rb. 453.
arvensis (α) Dsf. 452.
chalepensis Mill. 452.
chloraefolia Rb. 453.
commutata Bernh. 451.
Cymbalaria Mill. 451.
decumbens Moench. 452.
Elatine Mill. 451.
genistifolia DC. 453.
genistifolia Mill. 453.
italica Trev. 453.
juncea Rb. 453.
linifolia Roch. 453.
littoralis Bartl. 451.
Loeselii Schwgg. 453.
maritima Rb. 453.
minor Dsf. 451.
paniculata Peyer. et Vest. 453.
pelisseriana Mill. 452.
simplex DC. 452.
spuria Mill. 451.
striata DC. 452.
triphylla Mill. 451.
viscida Moench. 451.
vulgaris Mill. 453.
Lindernia L. 460.
pyxidaria All. 460.

LINEAE. 108.

Linnaea Gronov. 280.
borealis L. 280.
Linosyris DC. 300.
vulgaris Cass. 300.
Linum L. 109.
alpinum Jcq. 110.
alpinum β. Bertol. 111.
angustifolium Hds. 110.
aureum DC. 109.
aureum W. K. 109.
austriacum L. 111.
austriacum Pollich. 110.
bavaricum Schltz. 111.
campanulatum M. B. 109.
campanulatum L. 109.
catharticum L. 111.
corymbulosum Rb. 109.
flavum L. 109.
gallicum L. 109.
hirsutum L. 109.
laeve Rchb. 110.
laeve Scop. 111.
liburnicum Scop. 109.

Linum *maritimum* L. 109.
narbonense L. 110.
nodiflorum L. sp. 109.
perenne All. 111.
perenne L. 110.
Radiola L. 111.
strictum L. 109.
sylvestre Scp. 110.
tauricum Willd. 109.
tenuifolium L. 110.
tenuifolium ζ. L. 110.
usitatissimum L. 110.
usitatissimum α. vulgare Schübl. et Mart. 110.
usitatissimum β. crepitans Schübl. et Mart. 110.
viscosum L. 110.
Liparis Loeselii Rich. 604.
Listera R. Brwn. 603.
ovata R. Brwn. 603.
cordata R. Brwn. 603.
Lithospermum L. 437.
apulum Vahl. 437.
arvense L. 437.
deflexum Lhm. 431.
maritimum Lhm. 437.
officinale L. 437.
purpureo-caeruleum L. 437.
Littorella L. 515.
lacustris L. 515.
Lloydia Salisb. 615.
serotina Sal. 615.
Lobelia L. 401.
Dortmanna L. 401.
LOBELIACEAE. 401.
Lobularia Dsv. 53.
maritima Dsv. 53.
Loiseleuria procumbens Dsv. 414.
Lolium L. 718.
arvense Sm. 719.
arvense With., Schrd. 719.
Boucheanum Knth. 719.
complanatum Schrd. 719.
festucaceum Link. 709.
italicum Alx. Br. 718.
linicola Sond. 719.
multiflorum Poir. 719.
multiflorum Lmk., Gaud. 719.
perenne L. 718.
remotum Hfffm. 719.
rigidum Gaud. 719.
robustum Rb. 719.
speciosum Stv. 719.
speciosum scabrum Koch. 719.
speciosum var. culmo glabro Koch. 719.
strictum Presl. 719.
temulentum L. 719.
temulentum β. arvense Bbgt. 719.
tenue L. 718.
Lomaria Spicant., Dsv. 738.
Lomatogonium Alx. Braun. 421.
carinthiacum Al. Br. 422.
Lonicera L. 279.
alpigena L. 280.
balearica Vivn. 279.
caerulea L. 279.
Caprifolium L. 279.
etrusca Lej. 279.
etrusca Sant. viagg. 279.
implexa Ait. 279.
nigra L. 279.
pallida Hst. 279.
Periclymenum L. 279.
Periclymenum quericifolium Ait. 279.
pyrenaica L. 279.
Xylosteum L. 279.
LORANTHACEAE. 277.
Loranthus L. 277.
europaeus L. 277.
Loroglossum anthophorum Rich. 600.
hircinum Rich. 598.
Lotus L. 154.
angustissimus L. 155.
arvensis Schk. 154.
ciliatus Ten. 154.
corniculatus L. 154.
corniculatus γ. Pollich. 155.
corniculatus γ. tenuifolius L. 155.
corniculatus C. villosus Ten. 154.
cytisoides L. 154.
decumbens Forst. 155.
diffusus Sm. 155.
Dorycnium L. 154.
edulis L. 155.
hirsutus L. 154.
major Scop. 155.
major Sm. 155.
maritimus L. 155.
ornithopodioides L. 154.
sericeus DC. 154.
siliquosus L. 155.
tenuifolius Rchb. 155.
tenuis Kit. 155.
tetragonolobus L. 155.
tomentosus Rohd. 154.
uliginosus Schk. 155.
villosus Thuill. 154.
vindicatus Bgh. 155.
Luciola Forsteri Sm. 636.
Lunaria L. 53.
annua L. 53.
biennis Moench. 53.
canescens Willd. 53.
perennis Gmel. 53.
rediviva L. 53.
Lunaria racemosa minor Matricariae folio Breyn. 729.

Lupinus L. 135.
angustifolius L. 136.
hirsutus L. 135.
Luzula DC. 635.
albida DC. 636.
albida β. cuprina Roch. 636.
alpina Hopp. 637.
campestris DC. 637.
campestris α. β. D. fl. 637.
campestris β. nemorosa Mey. 637.
campestris β. pallescens Whlbg. 637.
campestris γ. Mey., ε. D. fl. 637.
campestris γ. nivalis Whlbg. 637.
campestris δ. alpina Mey. 637.
campestris δ. nigricans D. fl. 637.
congesta Lej. 637.
conglomerata Mlchhf. 637.
erecta Dsv. 637.
flavescens Gaud. 635.
Forsteri DC. 635.
glabrata Hopp. 636.
Hostii Dsv. 635.
intermedia Spenn. 637.
lutea DC. 637.
maxima DC. 636.
multiflora Lej. 637.
nigricans DC. 637.
nigricans Dsv. 637.
nivea DC. 636.
pallescens Bess. 637.
pallescens Hopp. 637.
parviflora Dsv. 636.
pediformis L. 637.
pilosa St. 636.
pilosa Willd. 636.
pubescens Bot. Ztg. 635.
rubella Hopp. 636.
spadicea DC. 636.
spadicea α., γ. D. fl. 636.
spicata DC. 637.
sylvatica Gaud. 636.
vernalis DC. 636.
Lychnanthus scandens Gmel. 86.
Lychnis L. 92.
Agrostemma Spr. 93.
alba Mill. 92.
alpina L. 92.
arvensis Schrk. 92.
baccifera Scop. 86.
coronaria Lmk. 92.
dioica α. et β. L. 92.
diurna Sibth. 92.
Flos Cuculi L. 92.
Flos Jovis Lmk. 92.
Githago Lmk. 93.
pratensis Spr. 92.
Pumilio Scop. 89.
sylvestris Hopp. 92.
vespertina Sibth. 92.
Lychnis *Viscaria* L. 92.
Lycium L. 439.
barbarum L. 439.
europaeum L. 439.

LYCOPODIACEAE. 727.

Lycopodioides denticulatum Dill. 728.
Lycopodium L. 727.
alpinum L. 727.
annotinum L. 727.
Chamaecyparissus Alx. Br. 727.
clavatum L. 728.
complanatum L. 728.
complanatum Pollich. 728.
denticulatum L. 728.
helveticum L. 728.
inundatum L. 727.
radicans Schrk. 728.
recurvum Kit. 727.
Selaginoides L. 728.
Selago L. 727.
Lycopsis L. 433.
arvensis L. 433.
bullata Cyrill. 433.
orientalis L. 433.
pulla L. 433.
variegata L. 433.
Lycopus L. 478.
europaeus L. 479.
exaltatus L. 479.
Lyonia calyculata Rb. 413.
Lysimachia L. 502.
ciliata L. 502.
Linum stellatum L. 503.
nemorum L. 503.
Nummularia L. 503.
paludosa Bmg. 502.
punctata L. 502.
thyrsiflora L. 502.
verticillata M. B. 502.
villosa Schm. 502.
vulgaris L. 502.
westphalica Weih. 502.

LYTHRARIEAE. 213.

Lythrum L. 213.
acuminatum Willd. 214.
Hyssopifolia L. 214.
Salicaria L. 213.
Salicaria β. gracile DC. 214.
Salicaria γ. tomentosum DC. 214.
tomentosum Mill. 214.
virgatum L. 214.

M.

Majanthemum Wigg. 613.
bifolium DC. 613.
Convallaria Wigg. 613.

Majorana hortensis Moench. 482.
Malabaila Tsch. 275.
Haquetii Tsch. 275.
Malachium Fries. 104.
aquaticum Fries. 104.
manticum Rchb., Koch. 104.
Malacochaete littoralis N. ab Es. 644.
Malaxis Sw. 604.
monophyllos Sw. 604.
paludosa Sw. 604.
Malcolmia R. Br. 41.
maritima R. Br. 41.
Malus acerba Mer. 204.
Malva L. 111.
Alcea L. 111.
Bismalva Bernh. 112.
borealis Wllm. 112.
decumbens Hst. 112.
fastigiata Cav. 112.
Henningii Gldb. 112. 113.
italica Pollin. 112.
mauritiana L. 112.
moschata L. 112.
Morenii Pollich. 112.
neglecta Wllr. 112.
nicaeensis All. 112.
parviflora Hds. 112.
pusilla With. 112.
rotundifolia Fries. 113.
rotundifolia Auctor. 112.
setigera Spenn. 113.
sylvestris L. 112.
vulgaris Frs. 112.

MALVACEAE. 111.

Mandragora officinalis Mill. 441.
Margarita Bellidiastrum Gd. 302.
Mariscus mucronatus Presl. 639.
Marsilea L. 726.
natans L. 726.
quadrifolia L. 726.

MARSILEACEAE. 725.

Marrubium L. 494.
affine Hst. 494.
apulum Ten. 494.
candidissimum L. 494.
creticum Mill. 494..
incanum Desr. 494.
paniculatum Desr. 494.
pannonicum Rchb., Benth. 494.
pauciflorum Wallr. 494.
peregrinum Jcq. 494.
peregrinum L. (α et β.) 494.
peregrinum Rb. 494.
peregrinum Willd. 494.
remotum Kit. 494.
supinum Scp. 494.
vulgare L. 494.
Maruta Cotula DC. 323.
foetida Cass. 323.
vulgaris Bl. et Fgh. 323.
Matricaria L. 324.
Chamomilla L. 324.
coronata Gay. 324.
Courrantiana DC. 324.
Kochiana C. H. Schltz. 324.
maritima L. 326.
Parthenium L. 326.
suaveolens L. 324.
suaveolens Sm., DC. 324.
Matthiola Brw. 30.
incana L. 41.
sinuata R. Brw. 30.
varia DC. 30.
Mays Zea Gaertn. 668.
Medicago L. 138.
annularis Bss. 138.
arabica All. 141.
apiculata Willd. 142.
carstiensis Jcq. 142.
catalonica Schk. 142.
circinata L. 139.
confinis Koch. 142.
conica Schk. 142.
coronata Lmk. 141.
corymbifera Schm. 139.
denticulata Willd. 142.
disciformis DC. 141.
falcata L. 138.
falcata β. versicolor Wallr. 138.
falcata β. hybrida Gaud. 138.
falcata δ. D. fl. 138.
Gerardi W. K. 140.
glomerata Blb. 138.
graeca Hrnm. 141.
hirsuta All. 141.
hirsuta Thuill. 141.
Hornemanniana DC. 140.
intermedia Schult. 138.
lappacea DC. 142.
littoralis Rohde. 140.
lunata Rchb. 139.
lupulina L. 139.
maculata Willd. 141.
marginata Willd. 139.
marina L. 138.
media Pers. 138.
minima Lmk. 141.
minima γ. longiseta DC. 141.
mollissima Spr. 141.
muricata Lej. 142.
orbicularis All. 139.
polymorpha α. L. 139.
polymorpha β. L. 139.
polymorpha η. arabica L. 141.
polymorpha ϑ. coronata L. 141.
polymorpha ι. rigidula L. 140.
polymorpha μ. minima L. 141.

Medicago procumbens Bess. 138.
prostrata Jcq. 138.
pubescens Hornem. 140.
radiata L. 139.
rigida Lmk. 140.
rigidula Roth. 141.
rigidula Thuill. 141.
rigidula Willd. 140.
sativa L. 138.
scutellata All. 139.
tentaculata Willd. 140.
Terebellum Willd. 142.
tribuloides Lmk. 140.
truncatula Gaertn. 140.
tuberculata Willd. 140.
villosa DC. 141.
villosa β. DC. 141.
Willdenowii a Bngh. 139.
Willdenowii Merat. 139.
Megastachya rigida Beauv. 703.
Melampyrum L. 467.
arvense L. 467.
barbatum W. K. 467.
commutatum Tsch. 467.
cristatum L. 467.
nemorosum L. 467.
pratense L. 467.
pratense Tsch. 467.
sylvaticum L. 467.
vulgatum Pers. 467.
Melandrium pratense Roehl. 92.
sylvestre Roehl. 92.
Melanthium sativum Tabern. 18.
Melica L. 693.
Bauhini All. 694.
caerulea L. 701.
ciliata L. 694.
Lobelii Vill. 694.
montana Hds. 694.
nodosa Pill. et Mitterb. 702.
nutans L. 694.
nutans Pollich. 694.
pyramidata Dsf. 694.
rigida Wib. 693.
uniflora Retz. 694.
Melilotus Trnf. 143.
alba Dsrx. 144.
alba Thuill. 144.
arvensis Wallr. 144.
caerulea Lmk. 144.
dentata Willd. 143.
diffusa Koch. 144.
gracilis DC. 144.
leucantha Kch. 144.
macorrhiza DC. 143.
mauritanica Willd. 144.
officinalis Dsf. 144.
officinalis Dsrx. 144.
officinalis DC. 143.
officinalis Willd. 143.
Melilotus *parviflora* Dsf. 144.
Petitpierreana Rchb., Willd. 144.
sulcata Dsf. 144.
vulgaris Willd. 144.
Melissa L. 485.
Acinos Benth. 484.
alba W. K. 485.
altissima Sibth. 485.
Calamintha L. 484.
Clinopodium Benth. 485.
cordifolia Prs. 485.
grandiflora L. 484.
graveolens Hst. 485.
hirsuta Horn. 485.
Nepeta L. 484.
Nepeta β. athonica (β. villosa) Benth. 484.
officinalis L. 485.
officinalis β. villosa Benth. 485.
pyrenaica Jcq. 485.
romana Mill. 485.
Melittis L. 487.
grandiflora Sm. 487.
Melissophyllum L. 487.
Mentha L. 475.
acutifolia Rabh. 478.
adspersa Moench. 477.
Agardhiana Fries. 478.
agrestis Sol. 478.
alata Hst. 477.
aquatica L. 477.
aquatica sylvestris Mey. 476.
aquatica γ. crispa Benth. 477.
arvensis Bnth. 478.
arvensis L. 478.
arvensis Sol. 478.
arvensis δ. rubra Benth. 477.
arvensis η. Benth. 478.
arvensis ζ. vulgaris Benth. 478.
atrovirens Hst. 478.
austriaca Hst. 478.
austriaca Jcq. 477.
balsamea Willd. 476.
candicans Crtz. 476.
candicans Opitz. 476.
canescens Rth. 476.
carinthiaca Hst. 478.
carniolica Hst. 477.
chalepensis Mill. 476.
citrata Ehrh. 477.
crispa L. 477.
crispa Ten. 476.
crispata Schrd. 476.
dentata Moench. 477.
dentata Roth. 477.
divaricata Hst. 478.
dubia Vill. 477.
fragrans Prsl. 475.
gentilis Fries. 478.
gentilis Hst. 478.

Mentha *gentilis* L. 477. 478.
gentilis Mey. 478.
gentilis Sm. 478.
gentilis Host. 478.
glabrata Vahl. 477.
gracilis *α.* Sm. 478.
gracilis *γ.* Sm. 478.
grata Hst. 478.
gratissima Lej. 476.
Halleri Gmel. 476.
hercynica Roehl. 476.
hirsuta L. 477.
hirta Willd. 476.
hortensis Tsch. 478.
hybrida Schleich. 476.
intermedia Hst. 477.
laevigata Willd. 476.
Langii Steud. 477.
laxa Hst. 478.
longifolia Hst. 477.
macrostachya Ten. 475.
maculata Hst. 477.
mollissima Borkh. 476.
montana Hst. 477.
multiflora Hst. 478.
nemorosa Beck. 476.
nemorosa Hst. 477.
nemorosa Willd. 476.
nepetoides Lej. 476.
niliaca Jcq. 476.
niliaca Willd. 476.
nitida Hst. 477.
odorata Sol. 477.
origanifolia Hst. 477.
ovata Cav. 475.
palustris Mill. 477.
palustris Mönch. 477.
Patrini Lepech. 475.
parviflora Hst. 478.
parviflora Schultz. 477.
piperita L. 476.
polymorpha Hst. 478.
praecox Sol. 478.
pratensis Sol. 478.
pratensis *β.* crispa Benth. 478.
prostrata Hst. 478.
pubescens Willd. 476.
pulchella Hst. 478.
Pulegium L. 478.
purpurea Hst. 477.
pyramidalis Benth. 477.
pyramidalis Ten. 476. 477.
reflexifolia Opitz. 476.
rotundifolia L. 475.
rubra Hst. 478.
rubra Hds. 478.
rubra Sm. 477. 478.
rugosa Lmk. 475.
sativa L. 477.
sativa (Agardhiana) Fries. 477.
Mentha sativa Tsch. 477.
serotina Hst. 477.
serotina Ten. 476.
stachyoides Hst. 478.
suaveolens Ehrh. 475.
suaveolens Hst. 478.
suavis Guss. 477.
sylvatica Hst. 477.
sylvestris Beck. 476.
sylvestris L. 475.
sylvestris Willd. 476.
sylvestris *α.* mollissima Bnth. 476
sylvestris *η.* crispa Bnth. 476.
sylvestris nemorosa Rchb. 476.
tenuifolia Hst. 478.
tomentosa Drv. 476.
tortuosa Hst. 477.
undulata Willd. 476.
varians Hst. 478.
velutina Lej. 476.
verticillata Rth. 477.
viridis Auct. germ. 476.
viridis Fries. 476.
viridis L. 476.
viridula Hst. 477.
Menyanthes L. 421.
Nymphoides L. 421.
trifoliata L. 421.
Menziesia caerulea Sw. 414.
Mercurialis L. 550.
annua L. 550.
Cynocrampe Scop. 550.
longifolia Hst. 550.
ovata Stbg. 550.
perennis L. 550.
Mespilus L. 203.
Amelanchier L. 203.
Chamaemespilus L. 206.
Cotoneaster L. 203.
germanica L. 203
monogyna Willd. 203.
Oxyacantha Grtn. 203.
Oxyacantha Scop. 203.
oxyacanthoides Thuill. 203.
vulgaris Rb. 203.
Meum Tournef. 257.
athamanticum Jcq. 257.
Foeniculum Spr. 253.
heterophyllum Moench. 244.
inundatum Spr. 244.
Mutellina Gaertn. 257.
Mibora verna Beauv. 676.
Michelaria bromoides Dum. 710.
Micromeria Bnth. 483.
graeca Benth. 484.
Juliana Bnth. 483.
montana Rb. 483.
pygmaea Rb. 483.
variegata Rb. 483.
Micropus Benth. 304.

Micropus *erectus* L. 305.
Microstylis monophylla Lindl. 604.
Milium L. 682.
confertum Mill. 682.
effusum L. 682.
effusum β. Gaud. 682.
frutescens Sb. 682.
lendigerum L. 682.
multiflorum Cv. 682.
paradoxum L. 682.
scabrum R. u. S. 682.
Mimulus Alectorolophus Scop. 471.
Moehringia L. 100.
diversifolia Doll. 101.
muscosa L. 100.
polygonoides M. K. 100.
Ponae Fenzl. 100.
trinervia Clrv. 101.
villosa Fenzl. 100.
Mönchia Ehrh. 104.
erecta Fl. d. Wett. 104.
glauca Pers. 104.
mantica Bartl. 104.
octandra 104.
quaternella Ehrh. 104.
Molinia Schrk. 701.
altissima Link. 701.
aquatica Wib. 701.
arundinacea Schrk. 701. 702.
coerulea Moench. 701.
distans Hrtm. 701.
littoralis Hst. 702.
maritima Hrtm. 701.
maxima Hrtm. 700.
serotina M. R. 702.
variabilis Wib. 701.
Molopospermum Koch. 274.
cicutarium DC. 274.
peloponnesiacum Koch. 274.
Momordica Elaterium L. 217.
Monerma monandra Beauv. 721.
subulata Bv. 720.
Monesia grandiflora Salsb. 415.
Monotropa L. 416.
Hypophegea Wallr. 416.
Hypopitys L. 416.
Hypopitys Wallr. 416.
hypopitys α. Rth. 416.
hypopitys β hirsuta Roth. 416.
Hypoxya Spr. 416.

MONOTROPEAE. 416.

Montia L. 217.
aquatica major Mich. 218.
aquatica minor Mich. 218.
arvensis Wllr. 218.
fontana L. fl. suec. 218.
fontana β. erecta Pers. 218.
fontana β. major Koch. 218.
fontana β. repens Pers. 218.
Montia *minor* Gm. 217. 218.
minor Koch. 218.
repens Gm. 217.
rivularis Gm. 218.
Morus L. 552.
alba L. 552.
nigra L. 552.
Mulgedium Cass. 372.
alpinum DC. 372.
alpinum Less. 372.
Plumieri DC. 372.
Muscari Tournef. 627.
botryoides Mill. 627.
comosum Mill. 627.
racemosum Mill. 627.
Myagrum L. 65.
alpinum Lap. 58.
aquaticum Lmk. 31.
auriculatum DC. 58.
austriacum Jcq. 31.
Bauhini Gmel. 59.
clavatum Lmk. 66.
Crantzii Vitm. 31.
dentatum Willd. 59.
erucaefolium Vill. 66.
littorale Scop. 65.
perenne L. 67.
perfoliatum L. 65.
pinnatifidum Ehrh. 59.
rostratum Scp. 65.
rugosum L. 66.
rugosum Vill. 67.
sativum L. 58.
sativum γ. L. 59.
saxatile L. 58.
taraxacifolium Lmk. 66.
Mycelis angulosa Cass. 370.
Mycelis muralis Rb. 370.
Mygalurus caudatus Link. 704.
uniglumis Link. 703.
Mylinum Carvifolia Gaud. 258.
Myosotis L. 437.
alpestris Schm. 438.
apula L. 437.
arenaria Schrd. 439.
arvensis Lehm. 438.
arvensis Link. 438.
arvensis Rb. 439.
arvensis β. sylvatica Pers. 438.
arvensis γ. versicolor Pers. 438.
caespitosa Schultz. 438.
collina Rb. 438.
decumbens Hst. 438.
deflexa Whlbg. 431.
hispida Schld. 438.
intermedia Link. 438.
lactea v. Bgh. 438.
Lappula L. 431.
laxiflora Rb. 438.
lingulata R. S. 438.

Myosotis lithospermifolia Hornem. 438.
montana M. B. 438.
nana Vill. 439.
nana Wulf. 439.
odorata Poir. 438.
palustris Rb. 437.
palustris With. 437.
perennis Mnch. 437.
repens Rb. 437.
rupicola Engl. Bot. 438.
scorpioides Willd. 437.
scorpioides α. arvensis L. 438.
scorpioides β. palustris L. 437.
scorpioides collina Ehrh. 439.
scorpioides palustris Ehrh. 437.
scorpioides sylvatica Ehrh. 438.
sparsiflora Mik. 439.
strigulosa Rb. 437.
stricta Link. 439.
suaveolens Kit. 438.
sylvatica Hoffm. 438.
sylvatica, var. lactea a Bngh. 438.
tergluensis Hacq. 439.
uliginosa Schrad. 438.
variabilis Angl. 438.
versicolor Prs. 438.
Myosurus L. 9.
minimus L. 9.
Myrica L. 574.
Gale L. 574.
Myricaria Dsv. 214.
germanica Dsv. 215.
squamosa Rb. 215.

MYRICEAE. 573.

Myriophyllum L. 211.
alterniflorum DC. 211.
pectinatum DC. 211.
spicatum L. 211.
verticillatum L. 211.
verticillatum β. pinnatum Wallr. 211.
verticillatum γ. pinnatifidum Wllr. 211.
verticillatum γ. Wallr. 211.
Myrrhis Scp. 274.
aromatica Spr. 273.
aurea Spr. 272.
australis All. 270.
bulbosa Spr. 272.
Bunium α. Ten. 273.
cynapioides Guss. 273.
hirsuta Spr. 273.
odorata Spr. 274.
Pecten ven. All. 270.
temula Spr. 272.
MYRTACEAE. 215.
Myrtus L. 215.
communis L. 216.

N.

NAJADEAE. 589.

Najas L. 589.
flexilis Rostk. et Schm. 589.
fluvialis Lmk. 589.
fragilis Rostk. et Schm. 589.
major Roth. 589.
marina α. L. 589.
minor All. 589.
monosperma Willd. 589.
Napus Agriasinapis Spenn. 49.
Leucosinapis Spenn. 49.
Rapa Spenn. 48.
Narcissus L. 610.
biflorus Curt. 610.
incomparabilis Mill. 611.
poëticus L. 610.
Pseudo-Narcissus L. 611.
radii florus Salsb. 610.
Tazetta L. 610.
Nardus L. 721.
aristata L. 720.
stricta L. 721.
Narthecium Mhr. 628.
anthericoides Hpp. 628.
iridifolium Vill. 629.
ossifragum Hds. 628.
ossifragum L. 628.
Nasturtium R. Br. 31.
amphibium R. Br. 31.
anceps DC. 32.
anceps Rchb. 32.
aquaticum Wallr. 31.
armoracioides Tsch. 31.
austriacum Crtz. 31.
barbaraeoides Tsch. 32.
lippicense DC. 32.
microphyllum Rb. 31.
Morisoni Tsch. 32.
officinale R. Br. 31.
palustre DC. 32.
pyrenaicum R. Br. 32.
riparium Wallr. 31.
rivulare Rb. 32.
ruderale Scp. 63.
silifolium Rb. 31.
sylvestre Brw. 32.
sylvestre St. 32.
sylvestre Rb. 32.
terrestre Br. 32.
terrestre Tsch. 32.
Wulfenianum Hst. 32.
Naumburgia guttata Mönch. 502.
Neottia L. 603.
aestivalis DC. 604.
Nidus avis Rich. 603.

Neottia repens Swartz. 603.
spiralis Sw. 604.
Neottidium Nidus avis a Schl. 603.
Nepeta L. 486.
amethystina Poir. 486.
angustifolia Vahl. 486.
arragonensis Lmk. 486.
austriaca Hst. 486.
Cataria L. 486.
citriodora Bck. 486.
croatica Spr. 485.
Glechoma Benth. 487.
Glechoma β. hirsuta Benth. 487.
graveolens Vill. 486.
lanceolata Mill., Lmk., Rchb. 486.
Nepetella L. 486.
nuda L. 486.
paniculata Crtz. 486.
paniculata Mill. 486.
pannonica Jcq. 486.
pannonica L. 486.
pumila Spr. 485.
ucranica M. B. 486.
violacea L., Vill. 486.
Nephrodium rufidulum Mich. 731.
spinulosum Strmp. 734.
Nerium L. 420.
Oleander L. 420.
Neslia Dsv. 65.
paniculata Dsv. 65.
Nicotiana L. 441.
latissima Mill. 441.
macrophylla Spr. 441.
rustica L. 441.
Tabacum L. 441.
Nigella L. 18.
arvensis L. 18.
damascena L. 18.
sativa L. 18.
Nigritella Rich. 599.
angustifolia Rich. 599.
fragrans Saut. 599.
globosa Rb. 595.
suaveolens Kch. 599.
Noccaea alpina Rb. 63.
brevicaulis Rb. 63.
cepeaefolia DC. 60.
procumbens Rb. 64.
rotundifolia Mnch. 60.
Nonnea Medic. 433.
pulla DC. 433.
Notholaena R. Brwn. 738.
Marantae R. Brwn. 739.
Marantae Desv. 739.
Nuphar Sm. 24.
intermedium Ldb. 24.
luteum Sm. 24.
minimum Spenn. 25.
pumilum Sm. 24.
sericeum Lang. 24.
Nuphar *Spennerianum* Gd. 24.
Nymphaea Sm. 24.
alba L. 24.
alba β. minor DC. 24.
biradiata Sommerauer 24.
candida Presl. 24.
kalmiana Hook. 24.
lutea L. 24.
minima Sm. 24.
pumila Hoffm. 24.

NYMPHAEACEAE. 24.

O.

Obione pedunculata Mcq. Tand. 527.
portulacoides Mcq. Tand. 527.
Ochrus pallida Pers. 173.
Ocymum L. 474.
Basilicum L. 475.
Odontites lutea Rb. 474.
luteola Hffm. 249.
luteola Spr. 249.
semicomposita Spr. 249.
serotina Rb. 473.
tenuissima Spr. 249.
verna Rb. 473.
Oenanthe L. 251.
approximata Mrt. 251.
chaerophylloides Pourr. 252.
filipendulоides Thuill. 251.
fistulosa L. 251.
gymnorrhiza Brign. 251.
Karsthiae Hacq. 261.
Lachenalii Gmel. 251.
megapolitana Willd. 251.
michelfeldensis Lachen. 251.
peucedanifolia Pollich. 251.
Phellandrium Lmk. 252.
pimpinelloides L. 252.
pimpinelloides Pollich. 251.
pimpinelloides α. chaerophylloides DC. 252.
pimpinelloides β. pimpinellaefolia DC. 252.
Pollichii Gmel. 251.
prolifera Hst., L. 252.
rhenana DC. 251.
silaifolia Bieb. 252.
Tabernaemontani Gmel. 251.
virgata hortorum et Koch. ap. DC. 252.
virgata Poir. 252.
Oenothera L. 210.
biennis L. 210.
muricata L. 210.
parviflora Gm. 210.
Oglifa arvensis Cass. 310.
Olea L. 417.

Olea *europaea* L. 417.

OLEACEAE. 417.

Oligosporus condimentarius Cass. 316.
Omalocline prunellifolia Cass. 378.
succisaefolia Monn. 378.
Omalotheca supina Cass. 312.
Omphalodes Tournef. 431.
repens Schrk. 432.
scorpioides Lehm. 432.
verna Mönch. 432.
Onagra biennis Scp. 210.

ONAGRARIEAE. 206.

Onobrychis Tournef. 165.
arenaria DC. 165.
Caput galli Lmk. 166.
carnea Schlch. 165.
gracilis Bess. 165.
montana DC. 165.
petraea Dsv. 166.
sativa Lmk. 165.
sativa *γ.* D. fl. 165.
saxatilis DC. 166.
supina DC. 166.
supina Gd. 165.
viciaefoliae Scp. 165.
Onoclea crispa L. 739.
Spicant Hffm. 738.
Struthiopteris Hffm. 739.
Ononis L. 136.
altissima Lmk. 136.
antiquorum L. 136.
arvensis L. syst. 136.
arvensis *α.* inermis Sm. 136.
arvensis *β. γ.* Sm. 136.
campestris Koch. et Z. 136.
Cherleri Koch. 137.
Cherleri L. 137.
Columnae All. 136.
foetens All. 136.
hircina Jcq. 136.
minutissima Jcq. 137.
mitis Gmel. 136.
mollis Lgsc. 137.
Natrix Lmk. 137.
parviflora Lmk. 136.
pilosa Brtl. 137.
pinguis L. 137.
pinguis DC. 137.
procurrens Wallr. 136.
reclinata L. 137.
repens L., Rb. 136.
rotundifolia L. 137.
spinosa L., DC. 136.
spinosa *α.* mitis L. 136.
spinosa *β.* L. 136.
subocculta Vill. 136.
Onopordum L. 345.
Onopordum *Acanthium* L. 345.
elongatum Lmk., DC. 345.
illyricum L. 345.
Schultesii Britting. 345.
Onosma L. 434.
angustifolium Lehm. 435.
arenarium W. K. 434.
echioides L. 434.
echioides *α.* L. 435.
montanum Sibth. et Sm. 435.
montana *β.* Bert. 435.
stellulatum W. K. 435.
stellulata *β.* M. B. 435.
Ophioglossum L. 729.
lusitanicum L. 730.
vulgatum L. 730.
Ophiurus filiformis R. S. 720.
incurvatus Bv. 720.
Ophrys L. 599.
aestiva Balb. 604.
aestivalis Lmk. 604.
alpina L. 600.
andrachnitis Rb. ic. 600.
anthropophora L. 600.
arachnites Reichard. 600.
Arachnites Scop. 600.
aranifera Hds. 599.
apifera Hds. 600.
atrata Lindl. 599.
Bertolonii Morett. 599.
corallorrhiza L. 604.
cordata L. 603.
fucifera Curt. 599.
fuciflora Rb. 600.
insectifera *α.* myodes L. 599.
insectifera *γ.* L. 600.
insectifera *ι.* L. 600.
Loeselii L. 604.
lilifolia Lmk. 604.
monophyllos L. 604.
Monorchis L. 601.
muscifera Hds. 599.
myodes Jacq., Sw. 599.
Nidus avis L. 603.
oestrifera Rb. 600.
ovata L. 603.
paludosa L. 604.
Pseudospeculum DC. 600.
Speculum Bert. 600.
spiralis L. 604.
Oplismenus undulatifolius Kunth. 671.
Oporina autumnalis Don. 358.
pratensis Less. 358.
Opuntia Trnf. 228.
vulgaris Mill. 228.

ORCHIDEAE. 593.

Orchis L. 593.
abortiva L. 602.

Orchis acuminata Dsf. 594.
albida Scp. 598.
angustifolia Fries. 597.
angustifolia Rb. 597.
angustifolia Wimm. et Gr. 596.
Arachnites Scop. 600.
bifolia L. 598.
bifolia *α.* macroglossa Wallr. 598.
β. brachyglossa Wallr. 598.
β. elatior Gd. 599.
comosa Scp. 596.
conopsea L. 597.
coriophora L. 594.
divaricata Rich. 597.
fusca Jcq. 593.
globosa L. 594.
haematodes Rb. 597.
hircina Swrtz. 598.
incarnata Fries. 596. 597.
incarnata L. 596.
incarnata Willd. 596.
incarnata Wimm. auct. germ. 596.
latifolia L. 596.
latifolia Rchb. 597.
latifolia Scop., St., Frs., 596.
laxiflora Lmk. 595. 596.
Lingua Scp. 601.
macra Lindl. 594.
macrophylla Column. 601.
maculata L. 596.
majalis Rb. 596.
mascula Jcq. 595.
mascula L. 595.
militaris L. 593.
militaris *β. γ.* L. 593.
militaris *ε.* L. 594.
moravica Jcq. 593.
Morio L. 595.
muscaria Scop. 599.
nigra Scop. 599.
odoratissima L., Jcq. 597.
ornithis Jcq. 597.
pallens L. 595.
palustris Jcq. 596.
papilionacea L. 596.
provincialis Balb. 595.
pyramidalis L. 597.
rubra Jcq. 596.
sambucina L. 596.
sambucina incarnata var. subalpina Rb. 597.
Simia Lmk. 594.
Simia Vill. 594.
speciosa Hst. 595.
Spitzelii Saut. 595.
suaveolens Vill. 599.
Tabernaemontani Gmel. 596.
tephrosanthos Vill. 594.
Traunsteineri Saut. 597.
tridentata Mühlenb., Scp. 594.

Orchis *ustulata* L. 594.
variegata All. 594.
virescens Zollik. 599.
viridis L., Sw. 598.
Oreoselinum legitimum M. B. 261.
rablense Hffm. 262.
Origanum L. 481.
creticum DC. 481.
creticum Hayn. 481.
creticum Sieb. 481.
creticum *β.* L. 481.
heracleoticum Benth. 481.
hirtum Link. 481.
macrostachyum Link. 481.
Majorana L. 482.
majoranoides Willd. 482.
megastachyum Link. 481.
monspeliense Tabern. 481.
paniculatum Koch. 481.
virens Hffmgg., Link. 481.
vulgare L. 481.
vulgare *β.* prismaticum Gd. 481.
Orlaya Hffm. 268.
grandiflora Hffm. 268.
platycarpos Koch. 268.
Ornithogalum L. 617.
arcuatum Stev. 618.
arvense Pers. 619.
bohemicum Gd. 620.
bohemicum Zauschn. 619.
bohemicum *β.* saxatile D. fl. 619.
chloranthum Sauth. 618.
collinum Bert. 618.
collinum Guss. 618.
comosum L. 618.
exscapum 618.
fistulosum Wallr. 620.
fistulosum Ramond. 620.
garganicum Ten. 618.
gracile Hagen. 620.
Gussonii Ten. 618.
Haynii Roth. 620.
Liottardi Stbg. 620.
luteum Hoffm. et mult. auct. 619.
luteum *β.* L. 620.
luteum *β.* sylvaticum Willd. 620.
minimum L. 620.
minimum Rth. 619.
minimum *β.* Whlbg. 620.
montanum Cyrill. 618.
narbonense Dod. 617.
narbonense L. 617.
nutans L. 618.
orthophyllum Ten. 618.
pannonicum albo flore Clus. 618.
Personii Hpp. 620.
pratense Prs.? 619.
pratense Whlbg. 619.
pusillum Schm. 620.
pyrenaicum Bertol., Gouan. 617.

Ornithogalum pyrenaicum γ. stachyoides DC. 617.
pyrenaicum L., DC. 617.
refractum W. et Kit. 618.
saxatile Vis. 618.
spathaceum Hayn. 620.
stachyoides Ait. 617.
stachyoides Hst. 617.
stachyoides Schlt. 617.
stenopetalum Fries. 619.
stenopetalum γ. D. fl. 619.
Sternbergii Hopp. 620.
striatum MB. 615.
sulphureum R. S. 617.
sylvaticum Pers. 620.
tenuifolium Guss. 618.
tunicatum Prsl. 620.
umbellatum L. 618.
villosum M. B. 619.
Ornithorhyngium syriacum Rhl. 65.
Ornithopus L. 164.
intermedius Roth. 164.
perpusillus L. 164.
roseus Dufour. 164.
sativus Brot. 164.
scorpioides L. 164.
Ornus europaea Pers. 418.
Orobanche L. 461.
amethystea Thuill. 465.
arenaria Brkh. 466.
Artemisiae campestris Gd. 464.
barbata Poir. 465.
bipontina Schultz. 463.
Buekii Dietr. 463.
Buekiana Koch. 466.
caerulea Vill. 466.
caerulescens Steph. 466.
caryophyllacea Rb., Sm. 463.
caryophyllacea Schultz. 461.
cruenta Bertol. 461.
elatior Koch. et Z. 463.
elatior Dietr. 466.
elatior Sutt. 462.
elatior Schlch. 464.
elatior β. microglossa Wallr. 465.
Epithymum DC. 462.
Eryngii Dub. 465.
flava Mart. 464.
fragrans Kch. 466.
Galii Dub. 463.
Galii Rchb. 463.
gracilis Sm. 461.
Hederae Dub. 465.
laxiflora Rb. 463.
loricata Rb. 464. 465.
lucorum Alx. Braun. 464.
major DC. 461.
major L., Sm. 461.
major Pollich. 463.
Medicaginis Schltz. 463.
Orobanche *minor* Sutt. 465.
pallidiflora Wimm. et Gr. 462.
Picridis Fr. W. Schultz. 464.
procera Koch. 462.
pruinosa Lpr. 462.
purpurea Jcq. 466.
ramosa L. 466.
Rapum Thuill. 461.
rubens Wallr. 463. 466.
rubra Engl. Bot. 463.
rubra Smith. 463.
Salviae Fr. W. Schultz. 465.
Scabiosae Koch. 462.
sparsiflora Wallr. 463.
speciosa DC.? 462.
speciosa Dietr. 462.
stigmatotes Wim. 463.
strobiligena Rb. 463.
Teucrii Schltz. 463.
vulgaris DC. 463.
vulgaris Gd. 461.
vulgaris Rb. 463.
OROBANCHEAE. 461.
Orobus L. 176.
albus L. fil. 176.
alpestris W. K. 177.
asphodeloides Gn. 177.
austricus Crtz. 177.
canescens L. fil. 177.
Clusii Spreng. 169.
filiformis Lmk. 177.
flaccidus Rad. 176.
gracilis Gaud. 176.
lacteus M. B. 177.
laevigatus W. K. 177.
linifolius Reichard. 176.
luteus L. 177.
montanus Scp. 177.
multiflorus Sb. 176.
niger L. 177.
pallescens M. B. 177.
pannonicus Kram. 177.
prostratus Host. 176.
pyrenaicus Scp. 176.
rigidus Lang. 176.
setiformis Schl. 176.
sylvaticus L. 167.
tenuifolius Rth. 176.
tristis Lang. 177.
tuberosus L. 176.
variegatus Ten. 176.
varius Sims. 177.
venetus Mill., Rb. 176.
vernus L. 176.
vernus β. latifolius Roch. 176.
versicolor Gmel. 177.
vicioides DC. 169.
Orthopogon Burmanni R. Br. 671.
undulatifolius Spr. 671.

Orvala garganica L. 488.
lamioides DC. 488.
Osmunda L. 730.
crispa L. 739.
Lunaria L. 729.
matricariae Schrk. 729.
regalis L. 730.
Spicant. L. 736.
Struthiopteris L. 739.
Ostericum Hoffm. 258.
palustre Bess. 258.
pratense Hffm. 258.
verticillare Rb. 262.
Ostrya Michel. 555.
carpinifolia Scop. 555.
italica carpini folio Mich. 555.
Osyris L. 540.
alba L. 540.

OXALIDEAE. 123.

Oxalis L. 123.
Acetosella L. 123.
Acetolla β. parviflora DC. 124.
corniculata L. 124.
corniculata Sturm. 124.
parviflora Lej. 124.
stricta L. 124.
Oxycoccos palustris Pers. 411.
Oxyria Hill. 534.
digyna Cambd. 534.
reniformis Hk. 534.
Oxys Acetosella Scp. 123.
Oxytropis DC. 157.
campestris DC. 158.
cyanea M. B. 159.
foetida DC. 158.
Halleri Bung. 157.
lapponica Gd. 158.
montana DC. 158.
montana Spr. 160.
pilosa DC. 158.
sordida Gaud. 158.
triflora Hopp. 159.

P.

Pachypleurum Ledeb. 257.
Pachypleurum simplex Rb. 257.
Paederota L. 460.
Ageria L. 460.
Ageria β. Bert. 460.
Bonarota Jcq. 460.
Bonarota L., Suffr. 460.
Bonarota β. Bert. 460.
caerulea L. fil. 460.
chamaedrifolia Suffren., R. et S., Brign., Mich. 460.
lutea L. fil. 460.
urticifolia Brign. 460.
Zanichellii Brign. 460.
Paeonia L. 22.
albiflora 23.
bannatica Roch. 23.
corallina Retz. 22.
festiva Tsch. 23.
humilis Retz. 23.
officinalis D. fl. 23.
officinalis hort. 23.
officinalis β. L. 22.
officinalis Retz. 23.
paradoxa And. 23.
paradoxa β. lejocarpa DC. 23.
peregrina Mill. 23.
peregrina β. DC. 23.
peregrina D. fl. 23.
pubens Sms. 23.
rosea Host. 23.
Russi Biv. 22.
Palimbia Chabraei DC. 261.
Paliurus Trnf. 127.
aculeatus Lmk. 127.
australis Grtn. 127.
Pallenis Cass. 306.
spinosa Cass. 306.
Panicum L. 670.
bicolor Mönch. 671.
Burmanni M. B., Retz. 671.
capillare L. 670.
ciliare Retz. 670.
Crus Galli L. 670.
Dactylon L. 676.
flavescens Mönch. 671.
germanicum Roth. 671.
glabrum Gd. 670.
glaucum L. 671.
hirtellum Wulf., All. 671.
humifusum Kunth. 670.
Ischaemum Schrb. 670.
lineare Krock. 670.
miliaceum L. 670.
Milium Pers. 670.
reclinatum Vill. 671.
sanguinale L. 670.
sanguinale Poll. 670.
sibiricum hortor. 671.
undulatifolium Ard. 671.
viride L. 671.
verticillatum L. 671.
viride β. majus Gd. 671.
Weinmanni R. S. 671.
Papaver L. 25.
alpinum Jcq. 25.
alpinum Hopp. 25.
alpinum L. 25.
Argemone L. 25.
arvense Borkh. 25.
aurantiacum Lois. 25.
Burseri Crtz. 25.
clavigerum Lmk. 25.
dubium L. 26.

Papaver *hybridum* L. 25.
intermedium Beck. 25.
laevigatum M. B. 26.
maritimum With. 25.
officinale Gmel. 26.
pyrenaicum *α.* luteum DC. 25.
Rhoeas L. 25.
Rhoeas *β.* strigosum a Bngh. 25.
Roubiaei Vig. 25.
setigerum DC. 26.
somniferum Gmel. 26.
somniferum L. 26.
trilobum Wallr. 26.

PAPAVERACEAE. 25.

Papia Michel. 488.

PAPILIONACEAE. 129.

Paradisia Mzg. 616.
hemeroanthericoides Mzg. 617.
Liliastrum Bert. 616.
Parietaria L. 551.
diffusa M. K. 551.
erecta M. K. 551.
judaica Hoffm. 551.
judaica L. 551.
lusitanica *β.* M. B. 551.
lusitanica DC. L. 551.
ocymi folio Bocc. 551.
officinalis Pollich. 551.
officinalis Willd. 551.
Paris L. 612.
quadrifolia L. 612.
Parnassia L. 78.
palustris L. 78.
Paronychia Trnf. 219.
capitata Lmk. 219.
serpyllifolia DC. D. fl. 219.

PARONYCHIAE. 218.

Paspalum ambiguum DC. 670.
ciliare DC. 670.
sanguinale Lmk. 670.
umbellatum Lmk. 676.
Passerina L. 537.
annua Wickstr. 537.
hirsuta L. 537.
Pastinaca L. 263.
Anethum Spr. 263.
Fleischmanni Hldn. 264.
glauca Scop.? 261.
opaca Bernh. 263.
sativa L. 263.
sativa *α.* sylvestris DC. 263.
Pedicularis L. 467.
acaulis Scop. 470.
adscendens Gd. 469.
adscendens Hopp. et Sternb. 468.
asplenifolia Floerk. 468.
atrorubens Schlch. 469.
Pedicularis *Barelierii* Rb. 468.
comosa L. 469.
fasciculata Bellard. 468.
flammea L. 470.
flammea Wulf. 470.
foliosa L. 470.
Friederici Augusti Tomm. 469.
gyroflexa b. Vill. 468.
gyroflexa Gaud. 468.
Hacquetii Grf. 470.
Jacquinii Kch. 467.
incarnata Jcq. 469.
Oederi Vahl. 470.
palustris L. 469.
Portenschlagii Saut. 468.
recutita L. 470.
rosea Jcq. 470.
rostrata Jcq. 468.
rostrata L. 468.
Sceptrum Carolinum L. 471.
sudetica Willd. 469.
sylvatica L. 469.
tuberosa L. 468.
versicolor Whlbg. 470.
verticillata L. 471.
Peltaria L. 53.
alliacea L. 54.
Peltidium apargioides Zollik. 367.
Pennisetum verticillatum R. Br. 671.
Peplis L. 214.
Portula L. 214.
Periclymenum italicum Mill. 279.
vulgare Mill. 279.
Peristylus albidus Lindl. 598.
viridis Lindl. 598.
Persica Trnf. 178.
laevis DC. 179.
vulgaris DC. 179.
vulgaris Mill. 178.
Pervinca major Scp. 420.
minor Scop. 420.
Petasites Gaertn. 299.
albus Gaertn. 300.
niveus Baumg. 300.
officinalis Mönch. 299.
officinalis Fl. d. Wett. 300.
spurius Rchb. 300.
vulgaris Dsf. 299. 300.
Petrocallis R. Brw. 54.
pyrenaica Brw. 54.
Petroselinum Hoffm. 243.
sativum Hoffm. 243.
sativum *β.* crispum DC. 243.
segetum Koch. 243.
Peucedanum L. 260.
alsaticum L. 261.
alsaticum *β.* D. fl. 262.
austriacum Koch. 262.
carvifolium Vill. 261.
Cervaria Lpr. 261.

Peucedanum *Chabraei* Rb., Gaud. 261.
gallicum Pers. 260.
montanum Kch. 262.
officinale L. 260.
officinale Thuill. 260.
Oreoselinum Mnch. 261.
Ostruthium K. 263.
palustre Mnch. 263.
parisiense DC. 260.
Petteri 260. 261.
pratense Lmk. 257.
rablense Kch. 262.
ruthenicum 260.
Schottii Bess., DC. 261.
Schottii *β.* petraeum Noe. 261.
Silaus L. 256.
sylvestre DC. 263.
venetum Kch. 262.
verticillare Koch. 262.
Phaca L. 156.
alpina Jcq. 157.
alpina L. 156.
astragalina DC. 157.
australis L. 157.
campestris Whlbg. 158.
campestris *β.* sordida Whlbg. 158.
frigida L. 156.
glabra Clar. 157.
Halleri Vill. 157.
lapponica Whlbg. 158.
minima All. 157.
montana Crtz. 159.
montana Whlbg. 159.
ochreata Crtz. 157.
oroboides DC. 157.
Tragacantha All. 162.
uralensis Whlbg. 157.
Phaecasium lampsanoides Css. 377.
Phalacrodiscus lanceolatus Lss. 325.
Phalangium Liliago Schreb. 616.
ramosum Lmk. 616.
serotinum Lmk. 615.
Phalaris L. 671.
alpina Haenk. 675.
aquatica Ait. 672.
aquatica L. 672.
arenaria Willd. 675.
arundinacea L. 672.
arundinacea picta L. 672.
aspera Retz. 675.
bulbosa L. 674.
bulbosa Presl. 672.
canariensis L. 672.
caerulescens Dsf. 672.
cylindrica DC. 674.
minor Retz. 672.
oryzoides 677.
paradoxa L. 672.
phleoides L. 675.
Phalaris sativa Pers. 674.
subulata Sav. 674.
tenuis Hst. 674.
variegata Spr. 672.
Phaseolus L. 177.
coccineus Lmk. 177.
multiflorus Willd. 177.
nanus L. 178.
vulgaris L. 177.
vulgaris *α.* L. 178.
vulgaris *β.* coccineus L. 177.
Phellandrium aquaticum L. 252.
Mutellina L. 257.

PHILADELPHEAE. 215.

Philadelphus L. 215.
coronarius L. 215.
Phillyrea L. 417.
angustifolia L. 417.
latifolia L. 417.
media L. 417.
Phleum L. 674.
Aegylops Rth. 720.
alpinum L. 675.
arenarium L. 674.
asperum Vill. 675.
autumnale Scop. 685.
Bellardi Willd. 674.
Bertolonii DC. 675.
Boehmeri Wib. 675.
bulbosum Hst. 675.
capitatum Scp. 675.
commutatum Gaud. 675.
crinitum Schrb. 677.
cristatum Scp. 702.
echinatum Hst. 675.
felinum Sm. 675.
Gerardi Panz. 675.
glabrum Bernh. 675.
hirsutum Sut. 675.
Hostii hort. Vind. 675.
laeve M. B. 675.
Michelii All. 675.
nodosum L. 675.
paniculatum Huds. 675.
phalaroides Koel. 675.
pratense L. 675.
schoenoides Jcq. 674.
schoenoides L. 674.
tenue Schrd. 674.
trigynum Hst. 675.
ventricosum Mnch. 675.
viride All. 675.
Phlomis L. 495.
tuberosa L. 495.
Phoenixopus decurrens Cass. 370.
muralis Kch. 370.
vimineus Rb. 370.
Phragmites Trin. 683.
communis Trin. 683.

Phragmites communis b. repens Mey. 683.
communis var. flavescens Cust. 683.
Physalis L. 440.
Alkekengi L. 440.
Physocaulus Tsch. 272.
nodosus Tsch. 272.
Phyteuma L. 402.
betonicifolium Vill. 403.
canescens W. K. 404.
Carestiae Bir. 403.
Charmelii DC. 403.
Charmelii Sieb. 403.
Charmelii Vill. 403.
Charmelii varietas Vill. 403.
comosum L. 404.
cordata Vill. 403.
corniculatum Clrv. 403.
fistulosum Rb. 403.
globulariaefolium Hpp., Stbg. 402.
globulariaefolium Rb. 402.
graminifolium Sieb. 402.
Halleri All. 404.
hemisphaericum L. 402.
humile Schlch. 402.
lanceolata Vill. 403.
Michelii Bert. 403.
Michelii Hgtschw., All. 404.
nigrum Schm. 404.
orbiculare L. 403.
ovale Hopp. 404.
ovatum Schm. 404.
pauciflorum L. 402.
pauciflorum Rb. 402.
persicifolia Hopp. 403.
Scheuchzeri All. 403.
Scheuchzeri DC. 403.
scorzonerifolium Vill. 404.
Sieberi Spr. 403.
spicatum L. 404.
spicatum β. Rapunculus Pers. 404.
urticifolium Clrv. 404.
Phytolacca L. 520.
decandra L. 520.

PHYTOLACCEAE. 520.

Picea excelsa Link. 578.
vulgaris Link. 578.
Picnomon Cass. 342.
Acarna Cass. 342. 748.
Picotia verna R. S. 432.
Picreus flavescens Rb. 638.
Monti Rb. 639.
Picridium Dsf. 372.
albidum DC. 372.
vulgare Dsf. 372.
Picris L. 361.
crepoides Saut. 361.
echioides L. 361.
Picris *hieracioides* L. 361.
hispidissima Bartl. 361.
laciniata Vis. 361.
paleacea Vest. 361.
ruderalis Schm. 361.
saxatilis All. 359.
Taraxaci All. 359.
umbellata Nees ab Es. 361.
Pilularia L. 725.
globulifera L. 726.
Pimpinella L. 247.
alpina Hst. 247.
angelicaefolia Lmk. 245.
Anisum L. 248.
dissecta Retz. 247.
genevensis Vill. 244.
glabra Rostk. 247.
glauca L. 243.
glauca W. et Kit. 243.
hircina Leers. 247.
magna L. 247.
magna γ. laciniata Wallr. 247.
magna δ. Wallr. 247.
media Hoffm. 247.
nigra Willd. 247.
orientalis Gn. 247.
peregrina L. 247.
pumila Jcq. 243.
rubra Hopp. 247.
saxifraga L. 247.
saxifraga A. minor, poteriifolia Wllr. 247.
saxifraga B. major Wallr. 247.
saxifraga γ. alpestris Spr. 247.
saxifraga ε. nigra Koch. 247.
saxifraga dissectifolia Wallr. 247.
Tragium Rchb. 247.
Pimpinella Sanguisorba Grtn. 202.
Pinardia Css. 327.
coronaria Less. 327.
Pinaster Pumilio Clus. 577.
Pinguicula L. 500.
alba Kuchl. 500.
alpina L. 500.
flavescens Flk. 500.
grandiflora Lmk. 500.
gypsophila Wllr. 500.
leptoceras Rb. 500.
longifolia Ramond. 500.
purpurea Willd. 500.
vulgaris L. 500.
vulgaris macrantha Tsch. 500.
vulgaris β. alpicola Rb. 500.
Pinus L. 576.
Abies L. 578.
Abies Du Roi. 578.
austriaca Höss. 577.
Cembra L. 578.
excelsa Lmk. 578.
halepensis M. B. 577.

Pinus *Laricio* Poir. 577.
Laricio Santi. 577.
Laricio *α.* Poiretiana Ant. 577.
Laricio *β.* austriaca Ant. 577.
Laricio *γ.* Pallasiana Ant. 577.
Larix Ant. 578.
Larix L. 578.
maritima Ait. Koch. 577.
maritima Lmk. 577.
maritima Pallas. 577.
maritima B. minor Duh. 577.
maritima major Duh. 577.
Mughus Jcq. 576. 577.
Mughus Poir. 577.
Mughus Scp. 576.
nigra Link. 577.
nigricans Hst. 577.
obliqua Saut. 577.
Pallasiana Lamb. 577.
Picea Ant. 578.
Picea Du Roi. 578.
Picea L. 578.
Pinaster Ait. 577.
Pinaster Roch. 577.
Pinea L. 578.
Pumilio Haenk., Ant. 577.
rotundata Link. 577.
rubra Mill. 576.
sylvestris Mill. 576. 577.
sylvestris L. 576.
sylvestris *γ.* L. 577.
uliginosa Autor. 576.
uliginosa Neum. 577.
uncinata Ant. 577.
uncinata Ram. 577.
vulgaris Link. 578.
Piptatherum Bv. 682.
multiflorum Bv. 682.
paradoxum Bv. 682.
Pistacia L. 129.
Lentiscus L. 129.
Terebinthus L. 129.
Pisum L. 172.
arvense L. Schübl. et Mart. 172.
elatius M. B. 172.
elatum DC. 172.
maritimum L. 173.
Ochrus L. 173.
sativum L. 172.

PLANTAGINEAE. 515.

Plantago L. 515.
alpina L. 517.
alpina Sieb. 518.
alpina Vill. 517.
altissima L. 516.
arenaria W. K. 518.
argentea Lmk., Vill. 516.
aspera Gaud. 517.
atrata Hopp. 517.
Plantago Bellardi All. 517.
bidentata Murith. 517.
capitata Hpp. 516.
carinata Schrd. 518.
Cornuti Gn. 516.
Coronopus L. 518.
Cynops DC. 519.
Cynops L. 519.
decumbens Rb. 516.
dentata Roth. 517.
genevensis DC. 519.
Gerardi Schlt. 518.
graminea Lam., DC. 517.
graminea Schleich. 518.
Gouani Spr. 516.
holostea Lmk. 517.
Holosteum Scop. 518.
hungarica W. K. 516.
incurvata Murr. 518.
integralis Gaud. 518.
Lagopus L. 517.
lanata Poir. 517.
lanata Prtschl. 516.
lanceolata L. 516.
lanceolata Rb. 516.
lanceolata *β.* DC. 516.
lanceolata *ε.* DC. 516.
lanceolata *γ.* sphaerostachya D. fl. 516.
lanceolata *δ.* D. fl. 516.
lanceolata var. capitellata Sond. 516.
lanceolata *η.* alpina Gaud. 516.
limosa Kit. 516.
major L. 515.
maritima DC. 518.
maritima L. 517.
maritima Rth. 517.
media L. 516.
media procera Sond. 516.
minima DC. 516.
montana Lmk. 517.
montana *β.* holosericea Gd. 517.
pilosa Pourr. 517.
pilosa Roth. 517.
Psyllium L. 518.
Psyllium Strm. 519.
recurvata L. 518.
saxatilis M. B. 517.
sericea W. K. 516.
serpentina Lmk. 518.
serpentina Rb. 518.
subulata Wulf. 518.
Tabernaemontani Bmg. 516.
ungarica W. K. 516.
Victorialis Poir. 516.
Victorialis DC. 516.
Wulfeni Bernh. 517.
Wulfeni M. K. 517.
Wulfeni Schrb. 518.

Plantago Wulfeni Willd. Spreng. 517.
Platanthera Rich. 598.
bifolia Rich. 598.
brachyglossa Rb. 598.
chlorantha Cust. 598.
Platyspermum grandiflorum D. fl. 268.
Pleurogyne carinthiaca Grieseb. 422.
Pleurospermum Hoffm. 274.
austriacum Hoffm. 275.
Golaka Rb. 275.

PLUMBAGINEAE. 513.

Plumbago L. 515.
europaea L. 515.
Poa L. 695.
airoides Koel. 701.
alpina L. 697.
alpina II. brevifolia Gaud. 697.
alpina γ. Gaud. 697.
alpina vivipara L. 697.
altissima Moench. 700.
angustifolia L.?, Sm. 698. 700.
angustifolia Pollich. 699.
angustifolia Rb. 698.
annua L. 695.
annua II. varia Gd. 696.
aquatica L. 700.
arenaria α, β, γ. Trin. 701.
aspera Gaud. 697.
badensis Hnk. 697.
badensis Strm. 697.
brevifolia DC. 697.
brizoides Wahlnb. 697.
bulbosa L. 696.
bulbosa β. vivipara L. 697.
caesia Sm. 697.
caespitosa Pres. 698.
capillata Merat. 705.
cenisia All. 700.
cenisia Bert. 700.
cenisia Hst. 697.
cenisia Rb. 697.
coarctata Hall. fil. 698.
collina Hst. 697.
compressa L. 700.
compressa Wib. 700.
compressa β. effusa Tsch. 700.
concinna Gd. 696.
cristata L. 686.
curvata Koel. 709.
decumbens Scop. 693.
depressa Presl. 699.
distans L. 701.
disticha Wulf. 685.
distichophylla Gd. 700.
dubia Leers. 699.
dubia Sut. 698.
dura Scop. 695.
Poa effusa Kit. 698.
elegans DC. 696.
Eragrostis L. 695.
fertilis Hst. 698.
festucaeformis Hst. 701.
flavescens Thom. 696.
flexuosa Sm. 696.
flexuosa Whlbg. 700.
fluitans Scp. 700.
Gaudini R. S. 697.
Gerardi All. 707.
glabra Ehrh. 699.
glauca Schk. 686.
glauca Sm. 697.
Halleridis R. S. 700.
humilis Ehrh. 699.
hybrida Gd. 699.
hybrida Rchb. 699.
Koeleri DC. 697.
Langeana Rchb. 700.
laxa Haenk. 696.
littoralis Gn. 702.
loliaceae Huds. 695.
maritima Hds. 701.
megastachya Koel. 695.
minor Gaud. 696.
Molinerii Balb. 697.
muralis Wib. 700.
nemoralis L. 698.
nemoralis β, δ, η. glauca ϑ. caesia D. fl. 698.
nemoralis vulgaris Gaud. 698.
nemoralis vulgaris β. Gaud. 698.
nemoralis II. firmula Gd. 698.
nemoralis III. montana Gd. 698.
nemoralis VI. coarctata Gd. 698.
pallens Gd. 700.
palustris DC. 698.
palustris Rth. 698.
pectinata Lmk. 686.
Phoenix Scp. 708.
pilosa L. 695.
polymorpha Wib. 698.
pratensis Lrs. 698.
pratensis L. 699.
pratensis Pollich. 699.
pratensis angustifolia Sm. 700.
pratensis IV. anceps Gd. 700.
pratensis β. angustifolia Sm. 700.
pratensis γ. Sm. 699.
pumila Hst. 696.
pungens M. B. 702.
pyramidata Lmk. 686.
quadripedalis Ehrh. 699.
retroflexa Crt. 701.
rigida L. 703.
rubens Moench. 699.
salina Pollich. 701.
scabra Ehrh. 699.

Poa Scheuchzeri Sut. 698.
serotina Gd., Ehrh. 698.
serotina Schrd. 698.
seslerioides All. 685.
setacea Koel. 705.
stolonifera Bellard. 700.
subcaerulea Engl. Bot. 699.
sudetica Hnk. 699.
sudetica *β.* remota Fries. 699.
supina Panz. 696.
supina Schrd. 696.
sylvatica Pollich. 707.
sylvatica Vill. 699.
thermalis Prs. 697.
trinervata DC. 699.
trinervata Schrad. 707.
trivialis Leers. 698.
trivialis L. 699.
trivialis Pollich., Koel. 697.
variegata Hall. fil. 696.
violacea Bellard. 707.
Podospermum DC. 365.
calcitrapifolium DC. 365.
Jacquinianum Kch. 365.
laciniatum DC. 365.
muricatum DC. 365.
octangulare DC. 365.
resedifolium DC. 365.

POLEMONIACEAE. 428.

Polemonium L. 428.
caeruleum L. 428.
Pollichia Galeobdolon Willd. 489.
Pollinia distachyos Spreng. 669.
Polycarpon L. 219.
alsinefolium DC. 220.
tetraphyllum L. fil. 219.
Polycnemum L. 522.
arvense L. 522.
inundatum Schk. 522.
majus Alx. Br. 522.
pumilum Hpp. 522.
Polygala L. 78.
alpestris Rb. 80.
amara Jcq. 80.
amara L. 80.
amara Rchb. 80.
amarella Crtz. 80.
amblyptera *α.* Rb. 80.
amblyptera *β.* pubescens Rb. 79.
austriaca Rb. 80.
buxifolia Rchb. 80.
buxifolia *β.* Rb. 79.
Buxi min. fol. Vaill. 80.
calcarea Schltz. 79. 80.
Chamaebuxus L. 80.
comosa Schk. 79.
depressa Wndr. 79.
major Jcq. 79.
monspeliaca 79.
Polygala multicaulis Tsch. 79.
myrtifolia Frs. 80.
nicaeensis Risso. 79.
oxyptera Rb. 79.
pyxophylla Av. Lall. 80.
serpyllacea Weihe. 79.
uliginosa Rb. 80.
vulgaris L. 79.
vulgaris densiflora Tsch. 79.
vulgaris depressa Fries. 79.

POLYGALEAE. 78.

POLYGONEAE. 529.

Polygonum L. 534.
alpinum All. 536.
amphibium L. 534.
amphibium *α.* natans Mnch. 534.
amphibium *β.* D. fl. 535.
amphibium *β.* terrestre Lrs. 535.
angustifolium Rth. 535.
aviculare L. 535.
aviculare *β.* erectum Roth. 536.
Bellardi All. 536.
biforme Wbg. 535.
Bistorta L. 534.
Braunii Bl. Fgh. 535.
Convolvulus L. 536.
dubium Stein. 535.
dumetorum L. 536.
Fagopyrum L. 536.
Hydropiper L. 535.
hydropiperoides Michx. 535.
incanum Schm. 535.
lapathifolium L., Whlb. 535.
lapathifolium *α.* Roth. 535.
laxiflorum Weih. 535.
littorale Link. 536.
maritimum L. 536.
minus Hds. 535.
mite Schrk. Mey. Pers. 535.
nodosum Prs. 535.
patulum M. B. 536.
Persicaria L. 535.
Persicaria *β.* angustifolium L. 535.
Persicaria *γ.* L. 535.
pusillum Lmk. 535.
rivulare Rth. 535.
strictum All. 535.
tataricum L. 536.
tomentosum Schrk. 535.
viviparum L. 534.
Polypodium L. 730.
aculeatum L. 732.
alpestre Hpp. 731. 736.
alpestre Spenn. 731.
alpinum Wulf. 735.
anthriscifolium Hffm. 735.
arvonicum Wthrg. 731.
calcareum Sm. 731.

Polypodium Callipteris Ehrh. 734.
cambricum L. 730.
cristatum L. 734.
cynapifolium Hffm. 735.
dentatum Dicks. 735.
dentatum St. 736.
dilatatum Hffm. 734.
Dryopteris Bolt. 731.
Dryopteris L. 731.
Filix femina L. 736.
Filix mas L. 733.
fontanum L. 736.
fragile L. 735.
fragile angustatum Hffm. 735.
fragrans Vill. 734.
Heleopteris Brkh. 733.
hyperboreum Sw. 731.
hyperboreum Whlb. 731.
ilvense Sw. 731.
limbospermum All. 733.
lobatum Hds. 732.
Lonchitis L. 732.
Marantae Hffm. 731.
molle All. 731.
montanum Hnk. 735—736.
montanum Vogl. 733.
myrrhidifolium Vill. 736.
Oreopteris Ehrh. 733.
pedicularifolium L. 736.
Phegopteris L. 730.
Plukenetii Lois. 732.
pterioides Vill. 733.
regium L. 735.
rhaeticum DC. 731.
rhaeticum Dicks. 735.
rhaeticum L. 731.
rhaeticum Sm. 731.
rigidum Hffm. 734.
robertianum Hffm. 731.
tenue Hffm. 735.
Thelipteris L. 733.
Villarsii Bell. 734.
vulgare L. 730.
vulgare β, γ, ε, Willd. 730.
Polypogon Dsf. 677.
littoralis Sm. 677.
maritimus Willd. 677.
monspeliensis Dsf. 677.
Polystichum Roth. 733.
aculeatum Prsl. 732.
aculeatum Roth. 732.
angulare Prsl. 732.
cristatum Roth. 733.
Filix mas Roth. 733.
lobatum Prsl. 732.
Lonchitis Roth. 732.
Marantae Roth. 731. 739.
montanum Roth. 733.
multiflorum Roth. 734.
Oreopteris DC. 733.
Polystichum Plukenetii DC. 732.
rigidum DC. 734.
spinosum Roth. 734.
spinulosum DC. 734.
spinulosum γ. muticum Alx. Br. 734.
strigosum Roth. 734.
Thelypteris Roth. 733.

POMACEAE. 202.

Populus L. 571.
alba L. 571.
alba Willd. 571.
canescens Sm. 571.
dilatata Ait. 571.
fastigiata Poir. 571.
monilifera Ait. 571.
nigra L. 571.
nivea Willd. 571.
pyramidalis Rozier 571.
tremula L. 571.
villosa Lang. 571.
Portulaca L. 217.
latifolia Hrnm. 217.
oleracea L. 217.
oleracea α. sylvestris DC. 217.
oleracea β. L. 217.
oleracea β. sativa DC. 217.
sativa Haw. 217.

PORTULACEAE. 217.

POTAMEAE. 582.

Potamogeton L. 582.
acuminatum Schum. 586.
acuminatum Whlbg. 586.
acutifolius Link. 586.
alpinum Balb. 584.
annulatum Bellard. 584.
augustanum Balb. 585.
coloratus Hornem. 584.
complanatum Willd. 586.
compressum Roth. 587.
compressus D. fl. 587.
compressus L. 586.
crassipes Kit. 585.
crispus L. 586.
curvifolius Hartm. 585.
cuspidatus Schrad. 586.
decipiens Nlte. 586.
densus L. 588.
distachyum Bellrd. 585.
flexicaulis Dth. 586.
flexuosum Schlch. 586.
filiformis Pers. 587.
fluitans Roth. 583.
fluitans Sm. 584.
gracilis Frs. 587.
gramineum L. suec. 585.
gramineum Sm. 587.

Potamogeton gramineum Whlbg. 585.
gramineus Gd. 587.
gramineus L. spec. 584.
gramineus a. fluvialis Fries. 585.
gramineus b. lacustris Fries. 585.
gramineus *α.* graminifolius Fries. 585.
gramineus *β.* heterophyllus Fries. 585.
heterophyllus Schreb. 584.
heterophyllus lacustris Chmss. 585.
heterophyllus *α.* foliosus D. fl. 585.
heterophyllus *γ.* elongatus D. fl. 585.
heterophyllus *δ.* latifolius D. fl. 585.
Hornemanni Mey. 584.
hybridum Thll. 585.
Loeselii R. S. 586.
longifolius Gay. 586.
lucens L. 585.
lucens Web. 586.
lucens *β.* heterophyllus Frs. 585.
lucens *γ.* amphibius Frs. 585.
lucens *δ.* coriaceus D. fl. 585.
macrophyllus Wolfgang. 586.
marinus L. 587.
marinus Fries. 587.
natans L. 582.
natans intermedius D. fl. 583.
natans lacustris Fries. 583.
natans vulgaris D. fl. 583.
natans *α.* vulgaris D. fl. 583.
natans *β.* explanatus D. fl. 583.
natans *γ.* angustatus D. fl. 583.
natans *ε.* minor D. fl. 583.
nitens Web., Fries. 585.
nitens *α.* salicifolius Fries. 585.
nitens *β.* heterophyllus Frs. 585.
oblongus Mey. 583.
oblongus Viv. 583.
obscurum DC. 584.
obtusus Ducr. 584.
obtusifolius M. K. 587.
oppositifolium DC. 588.
oppositifolium *β.* lancifolium DC. 588.
parnassifolius Schrad. 583.
pectinatus L. 587.
pectinatus D. fl. 587.
perfoliatus L. 586.
plantagineus Ducr. 584.
plantagineus rotundifolius D. fl. 584.
praelongus Wulf. 586.
Proteus curvifolius Cham. et Schld. 585.
Potamogeton Proteus heterophyllus Cham. et Schld. 585.
Proteus A. lucens Cham. et Schld. 586.
Proteus B. Zizii Cham. et Schld. 585.
purpurascens Seid. 584.
pusillus L. 587.
pusillus A. Cham. et Schld. 587.
pusillus a. major. Fries. 587.
pusillus *α.* major D. fl. 587.
pusillus b. vulgaris Fries. 587.
pusillus *β.* tenuissimus D. fl. 587.
rufescens Schrad. 584.
semipellucidum Koch. u. Z. 584.
serotinus Schrd. 583.
serratum L. 588.
serratum Web. 586.
serratum Roth. 584.
setaceum Schum. 587.
setaceum L. 588.
sparganifolius Laestad. 584.
spathulatus Schrd. 584.
trichoides Cham. et Schld. 587.
variifolius Thr. 584.
Zizii 585.
zosteraceus Fries. 587.
zosteraefolius Schumach. 586.
Potentilla L. 185.
adscendens Willd. 187.
affinis Hst. 189.
alba L. 191.
alpestris Hall. fil. 189.
alpestris Hst. 189.
alpestris Sm. 189.
alpestris var. Hall. fil. 189.
ambigua Gaud. 189.
angustifolia DC. 186.
anserina L. 186.
anserina *β.* Nestl. 186.
anserina *γ.* concolor Ser. 186.
arenaria Brkh. 190.
argentea L. 187.
argentea *β.* Lehm. 187.
aurea L. 189.
aurea Sm. 189.
aurea *α.* crocea Gaud. 189.
aurea *β.* firma Gd. 189.
aurea *γ.* pectinata Ser. 189.
brauniana Hopp. 190.
breviscapa Vst. 191.
canescens Bss. 187.
caulescens L. 191.
caulescens *β.* petiolulata Ser. 191.
chrysantha Trev. 188.
cinerea Chaix. 190.
Clusiana Mrr. 192.
collina Wib. 187.
Comarum Nstl. 185.
crocea Hall. fil. 189.

Potentilla dichotoma Mönch. 185.
diffusa Willd. 185.
dubia Sut. 189.
filiformis DC. 189.
frigida Vill. 191.
Fragaria Sm. 191.
fragariaefolia Gml. 191.
Fragariastrum Ehrh. 191.
fragarioides Vill. 191.
geranioides Schl. 189.
glacialis Hall. fil. 191.
grandiflora L. 190.
Guentheri Phl. 187.
Halleri Ser. 189.
helvetica Schlch. 191.
heptaphylla Mill. 188.
hirta L. 186.
hybrida Wallr. 191.
impolita Whlbg. 187.
incana Mönch. 190.
inclinata Vill. 187.
intermedia Hegetschw. 189.
intermedia L. 187.
intermedia Nestl. 188.
intermedia Whlbg. 187.
laciniosa Kit., Lehm. 186.
Lindackeri Tausch. 187.
micrantha Rmnd. 191.
minima Hal. fil. 190.
mixta Nlte. 188.
multifida L. 186.
nemoralis Nestl. 188.
nitida L. 192.
nitida Scp. 191.
nivea L. 190.
norvegica L. 185.
obscura Willd. 186.
opaca L. 190.
opaca Vill. 190.
ovata Poir. 190.
palustris Scp. 185.
parviflora Gd. 188.
patula W. K. 187.
pedata Willd. 186.
petiolulata Gd. 191.
pilosa DC. 186.
pilosa Willd. 186.
procumbens Sibth. 188.
pusilla Hst. 190.
recta Jcq. 187.
recta L. 186.
reptans L. 188.
rubens All. 186.
rubens Vill. 189.
rupestris L. 186.
ruthenica Willd. 185.
sabauda DC. 189.
salisburgensis Haenk. 189.
sordida Fries. 187.
splendens Ram. 191.

Potentilla subacaulis L. 190.
subacaulis Wulf. 190.
supina L. 185.
sylvestris Neck. 189.
tetrapetala Hall. fil. 189.
thuringiaca Bernh. 188.
Tormentilla Sibth. 188.
Vaillantii Nestl. 191.
velutina Lehm. 190.
verna L. 190.
verna aestiva Gd. 190.
verna *α.* alpestris Wallr. 190.
verna *β.* D. fl. 190.
Wiemanniana Gnth. 187.
Poterium L. 202.
glaucescens Rb. 202.
guestphalicum a Bngh. 202.
polygamum W. K. 202.
Sanguisorba L. 202.
Prasium L. 497.
majus L. 497.
minus L. 497.
Prenanthes L. 369.
bulbosa DC. 375.
chondrilloides L. 368.
hieracifolia Willd. 377.
muralis L. 370.
pulchra DC. 377.
purpurea L. 369.
ramosissima All. 370.
tenuifolia L. 369.
viminea L. 370.
viscosa Bmg. 377.
Primula L. 506.
acaulis Jcq. 506.
Allionii Lois. 510.
alpina Rchb. ic. 508.
Auricula L. 507.
calycina Dub. 510.
calycina Rb. 509.
Candolleana Rb. 510.
carniolica Jacq. 509.
ciliata Morett. 508.
ciliata var. Rb. 509.
ciliata Schrk. 508.
Clusiana Tsch. 509.
Columnae Ten. 507.
crenata Lmk. 508.
Dinyana Lagg. 510.
elatior Jcq. 507.
farinosa L. 506.
Floerkeana Schrd. 510.
glutinosa All., L. fil. 510.
glutinosa Wulf. 510.
grandiflora Lmk. 507.
graveolens Heget. 509.
helvetica Schlch. 508.
hirsuta All. 509.
hirsuta DC. 508.
hybrida Schrk. 507.

Primula integrifolia Jcq. 509.
integrifolia L. 510.
integrifolia L. ex cit. Clus. 509.
integrifolia Scop. 509.
integrifolia Sturm. 509.
integrifolia Tsch. 509.
latifolia Lpr. 509.
longiflora All. 506.
marginata Curt. 508.
minima L. 510.
minima β. pubescens Bl. et Fingh. 510.
Mureti Charp. 510.
Muretiana Moritzi. 510.
nivea Hortor. 509.
officinalis Jcq. 507.
pedemontana Thm. 508.
pubescens Jacq. 508.
rhaetica Gaud. 508.
Sauteri Schltz. 510.
spectabilis Tratt. 509.
stricta Hornem. 506.
sylvestris Scp. 507.
suaveolens Bertol. 507.
truncata Lehm. 510.
uniflora Gmel. 507.
venusta Hst. 509.
veris Lehm. 507.
veris α. officinalis L. 507.
veris β. elatior L. 507.
veris γ. acaulis L. 507.
villosa Jcq. 508.
villosa M. et K. 509.
villosa Rchb. 509.
villosa Willd. 508.
villosa, var. nivea Bot. Mag. 509.
viscosa DC. 509.
viscosa Gd. 509.
viscosa Rb. 509.
viscosa Vill. 509.
Vitaliana L. spec. 506.
vulgaris Sm. 507.

PRIMULACEAE. 501.

Prismatocarpus hybridus L'Herit. DC. 410.
Speculum L'Herit. 410.
Prunella L. 496.
alba Pall. 496.
grandiflora Jcq. 496.
grandiflora β. pinnatifida Koch. et Z. 496.
intermedia Lnk. 496.
laciniata Gd. 496.
laciniata L. 497.
laciniata β. L. 496.
laciniata γ. L. 496.
parviflora Pr. 496.
pinnatifida Prs. 496.
vulgaris L. 496.
Prunella vulgaris b. intermedia Koch. et Z. 496.
vulgaris β. grandiflora L. 496.
vulgaris β. pinnatifida Rb. 496.
Prunus L. 179.
acida Ehrh. 180.
Armeniaca L. 179.
austera Ehrh. 180.
avium L. 179.
cerasifera Ehrh. 179.
Cerasus L. 180.
Cerasus Pollich. 180.
Cerasus γ. aproniana Schübl. Mart. 180.
Cerasus semperflorens 184.
Chamaecerasus Jcq. 180.
domestica L. 179.
fruticans Weih. 179.
insititia L. 179.
Mahaleb L. 180.
nigricans Ehrh. 180.
Padus L., DC. 180.
petraea Tausch. 180.
semperflorens Ehrh. 180.
serotina Roth. 180.
spinosa L. 179.
spinosa β. coaetanea Wimm. et Gr. 179.
varia Ehrh. 180.
Psamma Pal. 681.
arenaria R. S. 681.
baltica R. S. 682.
Pseudo-Ruta Mich. 125.
Psilurus Trin. 720.
nardoides Trin. 720.
Ptarmica alpina DC. 318.
atrata α, β, γ. DC. 319.
Clavenae DC. 318.
macrophylla DC. 318.
moschata DC. 319.
moschata β. hybrida DC. 319.
nana DC. 319.
oxyloba DC. 323.
Thomasiana DC. 318.
valesiaca DC. 318.
vulgaris DC. 318.
Pteris L. 738.
aquilina L. 738.
crispa All. 739.
Pterocephalus palaestinus γ. dalmaticus DC. 297.
Pteroneurum bipinnatum Rchb. 40.
Pteroselinum alsaticum Rb. 262.
austriacum Rb. 262.
Chabraei Rb. 261.
glaucum Rb. 261.
rablense Rb. 262.
Pterotheca Cass. 373.
nemausensis Cass. 373.
Ptychotis Koch. 244.

Ptychotis *ammoides* Kch. 244.
Bunius Rb. 244.
heterophylla Kch. 244.
verticillata Dub. 244.
Pulegium Mill. 478.
vulgare Mill. 478.
vulgare Rchb. 478.
Pulicaria Gaertn. 308.
annua Grtn. 303.
bellidiflora Wallr. 303.
dysenterica Grtn. 308.
viscosa Cass. 308.
vulgaris Grtn. 308.
Pulmonaria L. 436.
angustifolia L. 436.
angustifolia Schrk. 437.
azurea Bess. 437.
Clusii Bmg. 437.
gallica mas et femina Tbrnm. 390.
gallica tenuifolia Tbrnm. 389.
grandiflora DC. 436.
maritima L. 437.
media Hst. 436.
media Rb. 437.
mollis Wolff. 436.
montana Lej. 437.
oblongata Schrd. 437.
officinalis L. 436.
saccharata Mill. 436.
tuberosa Schrk. 437.
Pulsatilla Bogenhardiana Rb. 7.
media Bghd. 7.
patens Mill. 7.
pratensis Mill. 7.
vernalis Mill. 6.
vulgaris Mill. 6.
Punica L. 206.
Granatum L. 206.
Pyrethrum alpinum Willd. 325.
alpinum β. pubescens Dub. 325.
ceratophylloides Willd. 325.
corymbosum Willd. 326.
Clusii Fisch. 326.
Halleri Willd. 325.
inodorum Sm. 326.
inodorum β. salinum Wallr. 326.
macrophyllum Willd. 326.
maritimum Sm. 326.
Parthenium Sm. 325.
Pyrola L. 415.
asarifolia Rad. 415.
chlorantha Swartz. 415.
media Hayn. 415.
media Swartz. 415.
minor L. 415.
rosea Engl. Bot. 415.
rotundifolia L. 415.
rotundifolia Sturm. 415.
secunda L. 415.
umbellata L. 416.
Pyrola *uniflora* L. 415.
virens Schweig. et Koert. 415.

PYROLACEAE. 415.

Pyrus L. 203.
acerba DC. 204.
Achras Gaertn. 204.
Amelanchier Willd. 205.
amygdaliformis Vill. 204.
arguta Tsch. 206.
aucuparia Gaertn. 205.
Bollwylleriana DC. 204.
Chamaemespilus DC. 206.
communis L. 204.
communis α. Achras Wallr. 204.
communis β. Pyraster Wallr. 204.
communis γ. dasyphylla Tsch. 204.
communis γ. sativa DC. 204.
Cydonia L. 203.
domestica Sm. 205.
hybrida Sm. 205.
intermedia Ehrh. 205.
Malus L. 204.
Malus DC.? 204.
Malus α. austera Wallr. 204.
Malus β. mitis Wallr. 204.
nivalis Jcq. 204.
pinnatifida Sm. 205.
Pollveria Lej. 204.
Pollveria L. 204.
Pollvilla Gmel. 204.
Sorbus Gaertn. 205.
sudetica Tsch. 206.
terminalis Ehrh. 206.

Q.

Quercus L. 554.
Aegylops Scp. 554.
apennina Lmk.? 554.
austriaca Willd. 554.
Cerris L. 554.
Cerris Willd. 554.
collina Schlch. 554.
coccifera L. 555.
crinita Lmk. 554.
faginea Rohr. et Mey. 554.
feminea Fl. Dan. 554.
Ilex L. 554.
lanuginosa Thuill. 554.
pedunculata Ehrh. 554.
pedunculata Schk. 554.
pubescens Willd. 554.
racemosa Lmk. 554.
Robur α. L. suec. 554.
Robur β. L. Fl. suec. 554.
Robur δ. Lmk. 554.
Robur Roth. tentam. 554.
Robur Sm. 554.
sessiliflora Sm. 554.

Quercus sessilis Ehrh. 554.
Suber L. 554.

R.

Radiola Gmel. 111.
linoides Gmel. 111.
millegrana Sm. 111.

RANUNCULACEAE. 1.

Ranunculus L. 10.
aconitifolius L. 12.
acris L. 15.
agrarius All. 16.
alpestris L. 12.
anemonoides Zahlbr. 11.
aquatilis L. 10.
aquatilis *β.* L. 11.
aquatilis *β.* paltatus DC. 10.
aquatilis *δ.* tripartitus Koch. 10.
aquatilis *δ.* L. 11.
aquatilis *ε.* pantothrix Koch. 11.
arvensis L. 16.
arvensis *γ.* inermis N. v. E. 16.
aureus Rb. 16.
aureus Schleb. 16.
auricomus L. 14.
auricomus *ε.* fallax Wimm. et Gr. 14.
auricomus St. 14.
Baudotii Godr. 11.
Breyninus Crtz. 16.
bulbosus L. 16.
bupleurifolius Lpr. 13.
carinthiacus Hopp. 15.
cassubicus L. 14.
cassubicus St. 14.
circinatus Sibth. 11.
Columnae All. 12.
cochlearifolius Hornem. 13.
cordifolius Bst. 13.
crenatus W. K. 12.
divaricatus Schrk. 11.
falcatus L. 9.
Flammula L. 13.
Ficaria L. 14.
fistulosus Brign. 13.
fluitans Lmk. 11.
fluviatilis Wigg. 11.
glacialis L. 12.
Gouani Willd. 15.
gracilis Schl. 15.
gramineus L. 13.
hederaceus L. 10.
heterophyllus Wigg. 10.
hirsutus Curt. 16.
Hornschuchii Hopp. 15.
hybridus Bir. 14.
illyricus L. 14.
intermedius Poir. 16.

Ranunculus lacerus Bellard. 13.
lanuginosus L. 15.
lapponicus Vill. 15.
Lenormandi F. W. Schultz. 10.
Lingua L. 13.
montanus Willd. 14.
muricatus L. 16.
myosurus Afzel. 9.
napellifolius Crtz. 15.
nemorosus DC. 15.
nivalis Jcq. 15.
ophioglossifolius Vill. 13.
ophioglossoides Willd. 13.
oreophilus M. B. 15.
pallidior Vill. 16.
pantothrix *α. γ.* DC. 11.
parnassifolius L. 13.
parviflorus L. 16.
parvulus L. 16.
paucistamineus Tsch. 10.
peltatus Schrk. 10.
Petiveri Koch. 10.
peucedanifolius All. 11.
peucedanoides Desf. 11.
Philonotis Ehrh. 16.
Ptora Crtz. 14.
plantagineus All. 13.
platanifolius L. 12.
polyanthemus L. 15.
polyanthemus Schleich. 16.
polymorphus All. 14.
Pseudo-Thora Hst. 14.
pumilus Thuill. 16.
pyrenaeus Gn. 15.
pyrenaeus L. 13.
repens L. 16.
reptans L. 13.
rigidus Hoffm. 11.
rutaefolius L. 11.
sardous Crtz. 16.
sceleratus L. 16.
scutatus W. K. 14.
Sequieri Vill. 12.
sericeus Willd. 14.
stagnatilis Wallr. 11.
Steveni Andrz. 15.
tenuifolius Schleh. 15.
testiculatus Crtz. 9.
Thora Jcq. 14.
Thora L. 14.
Thora *β.* L. 14.
tomentosus Mönch. 14.
Traunfellneri Hpp. 12.
tripartitus DC. 10.
tripartitus Nolt. 10.
tripartitus *β.* obtusiflorus DC. 10.
tripartitus *α.* micranthus DC. 10.
triphyllos Wallr. 10.
tuberculatus DC. 16.
uliginosus Willd. 13.

Ranunculus vaginatus Sommerr. 12.
velutinus Ten. 15.
vernus Spenn. 14.
verrucosus Strnb. 16.
verrucosus Tomm. 16.
Villarsii DC. 15.
Raphanis magna Mönch. 58.
Raphanistrum arvense Wallr., Rb. 67.
innocuum Medik. 67.
Lampsana Grtn. 67.
segetum Rb. 67.
Raphanus L. 67.
cheiranthiflorus Willd. 49.
Landra Moret. 67.
Raphanistrum L. 67.
sativus L. 67.
Rapistrum Boerh. 66.
arvense All. 67.
diffusum Crtz. 67.
glabrum Hst. 67.
hirsutum Grtn. 67.
paniculatum Grtn. 67.
perenne All. 67.
rugosum All. 67.
scabrum Hst. 67.
Rapunculus orbicularis Scp. 403.
spicatus Scop. 404.
Razoumovskia caucasica Hoffm. 277.
Reseda L. 77.
lutea L. 77.
luteola L. 77.
ochracea Mnch. 77.
odorata L. 77.
Phyteuma L. 77.

RESEDACEAE. 77.

Rhagadiolus Tournef. 356.
edulis Gaertn. 357.
intermedius Ten. 357.
lampsanoides Desf. 357.
scaber All. 357.
stellatus Grtn. 356. 357.
stellatus β. intermedius DC. 357.
taraxacoides All. 358.

RHAMNEAE. 127.

Rhamnus L. 127.
Alaternus L. 128.
alpina L. 128.
cathartica L. 127.
Clusii Willd. 128.
Frangula L. 128.
infectoria L. 128.
Paliurus L. 127.
pumila L. 128.
pumilus Wulf. 128.
rupestris Scp. 128.
saxatilis L. 128.
tinctoria W. K. 127.
Rhamnus Wulfenii Bot. Ztg. 128.
Zizyphus L. 127.
Rhaponticum paniculatum Scop. 354.
scariosum Lmk. 348.
Rheum digynum Whlbg. 534.

RHINANTACEAE. 467.

Rhinanthus L. 471.
Alectorolophus Pollich. 471.
alpinus Baumg. 472.
alpinus γ. angustifolius Gaud. 472.
buccalis Wallr. 472.
Crista galli Pollich. 471.
Crista galli α. L. 471.
Crista galli β. L. 472.
Crista galli γ. L. 471.
hirsutus Lmk. 471.
major Ehrh. 471.
major Sm. 472.
major var. angustifolia Fries. 471.
minor Ehrh. 471.
minor β. Rchb. 471.
minor β. fallax Wimm. et Grab. 471.
minor β. γ. alpinus Gd. 471.
villosus Pers. 471.
Rhizobotrya alpina Tsch. 58.
Rhodiola L. 221.
rosea L. 221.
Rhododendron L. 414.
Chamaecistus L. 414.
ferrugineum L. 414.
hirsutum L. 414.
intermedium Tsch. 414.
latifolium Hpp. 414.
polyfolium Scp. 412.
Rhodothamnus Chamaecistus Rb. 414.
Rhus L. 129.
Cotinus L. 129.
Toxicodendrum L. 129.
Rhynchospora Vahl. 640.
alba Vahl. 640.
fusca Vahl. 640.
Ribes L. 228.
alpinum L. 228.
Grossularia L. 228.
Hladnikianum 228.
nigrum L. 229.
petraeum Wlf. 229.
reclinatum L. 228.
rubrum L. 229.
rubrum β. sylvestre D. fl. 229.
Uva crispa L., Tsch. 228.
Rochelia deflexa R. S. 431.
Lappula R. S. 431.
Romulea Bulbocodium Sebast. 606.
Roncela Erinus Dumort., Rb. 407.
Rosa L. 193.
aciphylla Rau. 197.
affinis Rau. 197.

Rosa affinis Stbg. 194.
agrestis Gmel. 200.
agrestis Sav. 198.
agrestis Sw. 197.
alba L. 198.
alpina L. 194.
alpina *ι.* latifolia DC. 195.
alpina *π.* turbinata DC. 195.
ambigua Lej. 197.
andegavensis Bst. 197.
Andrzejowskiana Stev. 198.
arvensis Hds. 199.
arvina Rau. 200.
atrovirens Viv. 200.
austriaca Crtz. 200.
austriaca Jcq. 200.
Axmanni Gml. 200.
balearica Pers. 200.
balsamica Willd. 197.
baltica Roth. 195.
basilica Roes. 200.
bicolor Jcq. 193.
Boreykiana Bess. 197.
Borkhausenii Trtt. 199.
Borreri Woods. 197.
bractescens Wds. 197.
brevistyla DC. 199.
burgundica Roess. 200.
caesia Woods. 197.
calycina Biberst. 197.
campanulata Ehrh. 196.
campestris Sw. 197.
campestris Wallr. 193.
canina L. 197.
canina nitida Fries. 197.
canina opaca Fries. 197.
caucasica Biberst. 197.
centifolia L. 200.
centifolia simplex Auct. germ. 200.
Chamaerrhodon Wallr. 200.
Chamaerrhodon turbinata Wallr. 196.
chlorophylla Ehrh. 193.
ciliato-petala Bess. 199.
cinnamomea L. 195.
collina DC. 197.
collina Jcq. et Rau. 197.
collina Lej. 197.
collina Sm. 190.
collina Woods. 197.
colincola Ehrh. 195.
coriifolia Frs. 198.
corymbifera Borkh. 197.
cretica Vest. 199.
cuspidata Bieb. 199.
Cynorrhodon Wallr. 197.
Czackiana Bss. 200.
Devauxiana Ser. 199.
dimorpha Bess. 199.
dubia Wib. 199.
Rosa dumalis Bchst. 197.
dumetorum Lej. 197.
dumetorum Rau. 197.
dumetorum Thuill. 197.
dumetorum Woods. 197.
Eglanteria C. Bauh. 193.
Eglanteria L. 193.
Eglanteria Mill. 198.
farinosa Bchst. 199.
fastigiata Bast. 198.
fastigiata Lej. 197.
flexuosa Rau. 198.
fluvialis Fl. Dan. 195.
foecundissima Münchh. 195.
foetida Herm. 193.
Forsteri Sm. 197.
francofurtana Münchh. 196.
fruticetorum Bess. 197.
gallica L. 200.
gallica sylvestre autor. 200.
geminata Rau. 200.
gentilis Stbg. 194.
germanica Merkl. 200.
glabrata Vest. 196.
glandulosa Bellard. 196.
glandulosa Bess. 198.
glauca Dsf. 196.
glauca Dierb. 200.
glauca Schott. 197.
glaucescens Lej. 197.
glaucescens Wulf. 196.
glutinosa Schultz. 198.
gutensteinensis cat. hort. Vindob. 196.
herporrhodon Ehrh. 200.
heterophylla Wds. 199.
hibernica Wds. 197.
hispida Borkh. 199.
humilis Bess. 197.
hybrida Koch et Z. 200.
hybrida Schlch. 200.
inermis Mill. 195.
involuta Sm. 194.
Jundzilliana Bess. 198.
Kluckii Bess. 198.
leucantha Lej. 197.
leucantha M. B. 198.
leucochroa Dsv. 199.
Libertiana Tratt. 198.
livida Host. 196.
lucida Ehrh. 195.
lutea Mill. 193.
lutea *β.* bicolor Willd. 193.
majalis Herrm. 195.
malmundariensis Lej. 197.
marginata Wallr. 199.
melanocarpa Link. 194.
micrantha DC. 198.
micrantha Sm. 198.
microcarpa Bess. 194.

Rosa mitissima Gml. 194.
mollis Sm. 199.
mollissima Willd. 199.
monspeliaca Goun. 195.
montana Vill. Murr. 196.
mutica Fl. Dan. 195.
myriacantha DC. 194.
myrtifolia Hall. fil. 198.
nemorosa Lib. 198.
nitens Merat. 197.
nitidula Bess. 198.
nuda Woods. 197.
parvifolia Ehrh. 200.
pendulina Ait. 195.
pimpinellifolia DC. 193.
pimpinellifolia L. 194.
pimpinellifolia Willd. 194.
platyphylla Rau. 197.
pomifera Hrrm. 199.
poteriifolia Bess. 194.
provincialis Ait. 201.
prostrata Dsv. 200.
pseudo-rubiginosa Lej. 199.
psilophylla Rau. 197.
pulchella Wds. 199.
punicea Mill. 193.
pyrenaica Gn. 195.
Ratomsciana Bess. 197.
Ravi Tratt. 197.
remensis DC. 200.
repens Wib. 200.
resinosa Lej. 198.
reversa Presl. 195.
reversa W. K. 194.
Reynieri Hall. fil. 196.
rubella Lindl. 194.
rubicunda Hall. fil. 196.
rubiginosa L. 198.
rubiginosa γ. parvifolia Willd. 198.
rubiginosa μ. spinulifolia 197.
rubiginosa o. sepium DC. 198.
rubrifolia Jcq. 196.
rubrifolia Vill. 196.
rubrifolia β. montana Gaud. 196.
rubrifolia ϱ. glandulosa Ser. 196.
rupestris Crtz. 195.
sanguisorbifolia Donn. 194.
sarmentacea Sw. 197.
sarmentacea Wds. 197.
saxatilis Stev. 197.
scabriuscula Wds. 199.
scandens Mill. 200.
scandens Wallr. 200.
scandens, var. Wallr. 200.
sempervirens L. 200.
sempervirens Rau. 197.
sempervirens Roth. 198.
sempervirens β. microphylla DC. 200.
senticosa Achr. 197.
Rosa sepium Rau. 197.
sepium Sw. 197.
sepium Thuill. 198.
solstitialis Bess. 197.
spinosissima L. spec. 194.
spinosissima Sm. 193.
spinosissima Whlbg. 195.
spinosissima β. Lindl. 194.
spinosissima β. ciphiana Sm. 194.
spinulifolia Dmtr. 196.
stylosa Dsv. 199.
stylosa γ. glandulosa DC. 198.
suavifolia Lightf. 198.
subglobosa Sm. 199.
surculosa Wds. 197.
sylvestris Herrm. 200.
sylvestris Schultz. 197.
systyla Bast. 199.
tenuiglandulosa Merat. 198.
terebinthacea Bss. 199.
tomentosa Smith. 198.
tomentosa Woods. 199.
trachyphylla Rau. 197.
turbinata Ait. 195.
umbellata Lrs. 198.
umbellata Lej. 197.
uncinella Bess. 197.
venosa Sw. 197.
venusta Waitz. 195.
villosa L. 199.
villosa Pollich. 199.
villosa Woods. 199.
villosa Wulf., Lindl., DC. 199.
vulpina Wallr. 193.

ROSACEAE. 181.

Rose multiflore Reyn. 196.
Rosmarinus L. 479.
officinalis L. 479.
Rottboellia cylindrica Willd. 720.
erecta Sav. 720.
filiformis Roth. 720.
incurvata L. fil. 720.
incurvata Nolt. 720.
monandra Cav. 720-721.
subulata Sav. 720.
Rubia L. 282.
anglica Huds. 282.
peregrina L. 282.
tinctorum Scop. 282.
tinctorum L. 282.
Rubus L. 183.
amoenus Portschl. 184.
caesius L. 184.
Chamaemorus L. 184.
corylifolius Sm. 184.
fruticosus L. 184.
glandulosus Bllrd. 184.
hybridus Vill. 184.
Idaeus L. 183.

Rubus *saxatilis* L. 184.
tomentosus Borckh. 184.
Rumex L. 529.
Acetosa L. 533.
Acetosa β. auriculatus Wallr. 533.
Acetosa Bert. 533.
Acetosa β. L. 533.
Acetosa β. Smth. 535.
Acetosa γ. fissus Koch. 533.
Acetosa γ. L. 533.
Acetosa δ. et ε. L. 533.
Acetosella L. 534.
Acetosella δ. L. 534.
Acetosella δ. lacerus Wallr. 534.
Acetosella γ. multifidus Wallr. 534.
acutus Hartm. 532.
acutus Koch. et Z. et alior. 531.
acutus L. 530.
acutus Pollich. 529.
acutus Sm. 530.
acutus Tsch. 531.
alpinus L. 532.
Anthoxanthum Murr. 529.
aquaticus L. 532.
aquaticus Pollich. 531.
aquaticus α. heterophyllus Murr. 532.
arifolius All. 532. 533.
aureus With. 529.
conglomeratus Murr. 530.
crispus L. 531.
crispus β. Pollich. 530.
cristatus Wallr. 531.
digynus L. 534.
divaricatus L. 530. 531.
domesticus Hrtm. 531.
glaucus Jcq. 532.
glomeratus Rb. ic. 530.
glomeratus Schreb. 530.
hastifolius M. B. 532.
heterophyllus Schultz. 531-532.
Hippolapathum β. Fries. 532.
hispanica Gml. 533.
hispanicus Munt. 533.
Hydrolapathum Hds. 531.
intermedius DC., Sturm. 533.
latifolius Mey. 532.
limosus Thuill. 529.
maritimus Hoffm. 529.
maritimus L. 529.
maximus Schreb. 531.
montanus Poir. 532.
multifidus L. 534.
Nemolapathum DC. 530.
Nemolapathum Ehrh. 530.
Nemolapathum Rb. excurs. 530.
Nemolapathum Rb. ic.? 530.
Nemolapathum Wallr. 530.
Nemolapathum α. exsanguis Wallr. 530.
Rumex Nemolapathum β. sanguineus Wallr. 530.
nemorosus DC. 530.
nemorosus Mey. 530.
nemorosus Schrad. 530.
nivalis Hgtschw. 532.
obtusifolius L. 530. 531.
obtusifolius β. discolor Wallr. 531.
paludosus With. 530.
palustris Sm. 529.
Patientia L. 531.
pratensis M. K. 531.
Pseudo-Acetosa Bert. 533.
Pseudo-Acetosa β. Bert. 533.
pulcher L. 530.
purpureus Poir. 531.
sanguineus L. 530.
sanguineus Gaud., Smth. 530.
sanguineus I. Gd. 530.
sanguineus β. viridis Sm. 530.
scutatus L. 532.
Steinii Beck. 529.
sylvestris Wallr. 531.
thyrsoides Desf. 533.
triangularis DC. 533.
tuberosus 533.
undulatus Schrk. 530.
Ruppia L. 588.
maritima L. 588.
maritima α. β. D. fl. 588.
obliqua G. F. Meyer. 588.
rostellata Kch. 588.
Ruscus L. 613.
aculeatus L. 613.
Hypoglossum L. 613.
Ruta L. 125.
angustifolia Pers. 125.
bracteosa DC. 125.
crithmifolia Moric. 125.
divaricata DC. 125.
divaricata Ten. 125.
graveolens L. 125.
graveolens α. L. 125.
montana L. 125.
patavina L. 125.
RUTACEAE. 124.

S.

Sabulina austriaca Rchb. 98.
biflora L. sp. 97.
caespitosa Rb. 98.
fastigiata Rb. 99.
Gerardi Rb. 98.
lanceolata Rb. 97.
obtusa Rb. 97.
polygonoides Rb. 100.
Ponae Rb. 100.
recurva Rb. 99.

Sabulina rostrata Rb. 99.
setacea Rb. 99.
stricta Rb. 97.
tenuifolia Rb. 99.
verna Rb. 98.
Villarsii Rb. 98.
viscosa Rb. 100.
Saccharum cylindricum Lmk. 673.
Ravennae L. 668.
Sagina L. 93.
apetala L. 94.
bryoides Froel. 93.
cerastoides Engl. Bot. 105.
ciliata Fries. 93.
decandra Rb. 98.
depressa Schultz. 93.
erecta L. 104.
glabra Koch. 95.
glandulosa Bess. 95.
maritima Don. 94.
nodosa E. Meyer. 95.
procumbens L. 93.
saxatilis Wm. 94.
stricta Fries. 94.
subulata Wm. 95.
Sagittaria L. 581.
heterophylla Schrb. 581.
sagittaefolia L. 581.

SALICINEAE. 556.

Salicornia L. 521.
acetaria Pall. 521.
annua Engl. Bot. 521.
fruticosa L. 521.
herbacea L. 521.
macrostachya Moric. 521.
procumbens Engl. Bot. 521.
radicans Sm. 521.
Salix L. 556.
acuminata Hoffm. 563.
acuminata Sm. Mey. 561. 562.
acuminata *α.* virescens Mey. 562.
acutifolia Willd. 559.
adscendens Sm. 567.
alba L. 557.
alba Willd. 557.
albida Schlch. 569.
alopecuroides Tsch. 558.
alpina Scop. 570.
alpina Sut. 569.
Amaniana Willd. 563.
ambigua Ehrh. 566. 567.
ambigua Willd. 566.
amygdalina L. 558.
amygdalina Vill. 558.
Andersoniana Sm. 563.
angustifolia Fries. 567.
angustifolia Poir. 562.
angustifolia Wulf. 566. 567.
appendiculata Vahl. 569.
Salix aquatica Sm. 563.
arbuscula Jcq. 569.
arbuscula Koch. 565.
arbuscula L. 568.
arbuscula Whlbg. 564. 565.
arbuscula *γ.* L. 565.
arbutifolia Willd. 570.
arenaria L. 567.
arenaria Willd. 569.
arenaria *β.* denudata Tsch. 569.
argentea Sm. 567.
aurigerana Lapeyr. 564.
aurita L. 564.
aurita Willd. 564.
aurita Hst. 563.
aurito-repens Wm. 566.
austriaca Hst. 560.
bicolor Ehrh. 565. 568.
bicolor Fries., Mey 565.
bicolor Sm. 565.
caerulea Sm. 557.
caesia Vill. 570.
campestris Frs. 567.
canescens Willd., Fries. 562.
Caprea L. 564.
Caprea *β.* sphacelata Wbg. 564.
carinata Sm. 569.
carniolica Hst. 560.
cinerascens Willd. 564.
cinerea L. 562.
cinerea Wahl., Sm. 563.
cinerea Willd. 559.
cinereo-repens Wm. 566.
cladostemma Hayn. 564.
concolor Hst. 560.
coruscans Sturm. 569.
coruscans Willd. 565.
cotinifolia Sm. 563.
cuspidata Koch. 557.
cuspidata Schultz. 556.
daphnoides Vill. 559.
decipiens Hffm. 557.
depressa Hffm. 567.
depressa L. 564.
Diksoniana Sm. 565.
discolor Hst. 560.
Doniana Sm. 568.
dubia Sut. 570.
Ehrhartiana Mey. 557.
Elaeagnos Scp. 562.
elaeagnifolia Tsch. 560.
elaeagnoides Schleich. 569.
elegans Bess. 566.
elegans Hst. 566.
excelsa Tsch. 557.
excelsior Hst. 557.
fagifolia Willd. 564.
finmarchia Willd. 567.
fissa Ehrh. 560.
Flüggeana Willd. 562.

Salix foetida Schlch. 569.
foliolosa Afzel. 565.
Forbyana Sm. 560.
formosa Willd. 569.
Forsteriana Sm. 563.
fragilior Hst. 557.
fragilis Hst. 557.
fragilis L. 557.
fragilis Sturm. 557.
fragilis Sm. 557.
fragilis Wargiana Lej. 557.
fragilissima Hst. 557.
fusca Jcq. 570.
fusca L. 566. 567.
fusca Sm. 567.
fusca Willd. 567.
fusca Meyer. 567.
fusca e. longifolia Mey. 567.
fusca a. lejocarpa Mey. 567.
glabra Scop. 565.
glauca Fries., Hrtm. 569.
glauca L., Sm. 569.
glauca *β.* appendiculata Whlbg. 569.
glauca *γ.* Lapponum Whlbg. 569.
glaucophylla Willd. 569.
gracilenta Tsch. 557.
grandifolia Ser. 564.
Halleri Ser. 563.
hastata Hopp. 563.
hastata L., Koch. 566.
hastata Willd. 566.
Hegetschweileri Heer. 566.
Helix L., Sm. 560.
helvetica Vill. 569.
herbacea L 570.
hermaphrodita L. 556.
heterophylla Hst. 564.
hexandra Ehrh. 557.
hippophaëfolia Thuill. 558. 559.
hirta Sm. 563.
Hoffmanniana Bl. Fgh. 563.
holosericea Sr. 562.
holosericea Willd. 562.
Hoppeana Willd. 558.
Jacquiniana St. 570.
Jacquiniana Willd. 570.
Jacquinii Hst. Synops. 570.
incana Schrk. 562.
incubacea L.? 566.
incubacea Thuill. 567.
incubacea Willd. et Herh. L. 567. 568.
intermedia Hst. 562.
Kanderiana Sr. 562.
Kitaibeliana Willd. 570.
lactea Bray. 569.
laeta Schultz. 567.
Lambertiana Sm. 560.
lanata Thuill. 567.

Salix lanceolata Frs. 561.
lanceolata Ser. 562.
lanceolata Sm. 558.
Lapponum L. 569.
laurina Sm. 565.
lavandulaefolia Lapeyr. 562.
ligustrina Hst. 558.
limosa Whlbg. 569.
littoralis Hst. 568.
livida Whlbg. 565.
livida *α.* Whlbg. 565.
livida *β.* cinerascens Whlbg. 565.
longifolia Hst. 562.
longifolia Schleich. 562.
longifolia fem. Hst. 561.
Ludwigii Schk. 566.
majalis Whlbg. 565.
malifolia Sm. 566.
membranacea Thuill. 560.
menthaefolia Hst. 563.
Meyeriana Willd. 557.
mirabilis Hst. 560.
mollissima Koch. Bot. Ztg. 561.
mollissima Ehrh. 560. 561.
mollissima Sm. 561.
mollissima Willd. 561.
monandra Hoffm. 560.
monandra, sericea Ser. 560.
mutabilis Hst. 560.
myrsinites L. 570.
myrsinites Willd. 570.
myrtilloides L. 566.
myrtilloides Willd. 570.
nigricans Frs. 563.
nigricans Whlbg. 563.
nigricans *γ.* punctata Hrtm. 563.
nivea Ser. 569.
oleaefolia Vill. 562.
oleifolia Ser. 562.
olivacea Thuill. 560.
onusta Bess. 567.
oppositifolia Hst. 560.
ovata Host. 563.
ovata Ser. 569.
palustris Hst. 557.
parietariaefolia Hst. 563.
parviflora Hst. 568.
parvifolia Sm. 567.
patula Ser. 562.
pendula Ser. 557.
pentandra L. 556.
pentandra *α, β.* L. 556.
pentandra latifolia Hartm. 556.
petraea Anders. 565.
phylicifolia Fries. 563. 564.
phylicifolia Koch. 563.
phylicifolia L., Sm. 565.
phylicifolia Whlbg. 563.
plicata Fries. 566.
polyandra Bray. 556.

Salix polyandra Schrk. 556.
polymorpha Hst. 563.
pomeranica Willd. 559.
Pontederana Schleich. 559.
Pontederana Wlld. 559.
praecox Hpp. 559.
praecox gemmata Ser. 559.
pratensis Hst. 567.
prostrata Ehrh. 570.
prostrata Sm. 566.
prunifolia Hst. 563.
prunifolia Ser., Koch. 569.
prunifolia Sm. 568. 569.
pubera Koch. 561.
punctata Whlbg. 563.
purpurea L. 560.
purpurea Sm. 560.
purpurea var. monadelpha Koch. comm. 560.
radicans Sm. 565.
repens Koch. 567.
repens L. 567.
repens Sm. 567.
repens Willd. 567.
reticulata L. 570.
retusa L. 570.
riparia Willd. 562.
rivalis Hst. 563.
rosmarinifolia Gouan. 562.
rosmarinifolia Koch. comm. 568.
rosmarinifolia L. 568.
rosmarinifolia *β.* incubacea Koch. comm. 567. 568.
rostrata Thll. 567.
rubra Hds. 560.
rubra Sm. 560.
rugosa Ser. 564.
rupestris Sm. 563.
Russeliana Sm. 557.
salviaefolia Link. 562.
sempervirens Hst. 558.
sericea Vill. 569.
Seringeana Gaud. 562.
serpyllifolia Jcq. 570.
serpyllifolia Scp. 570.
serrulata Willd. 566.
silesiaca Willd. 563. 564.
Smithiana Koch. Regensb. bot. Ztg. 561.
Smithiana Willd. 561.
speciosa Hst. 558.
spathulata Willd. 566.
sphacelata Sm. 565.
sphacelata Willd. 564.
Starkeana Willd. 565.
stipularis Ser. 564.
stipularis Sm., Kch. 561.
Stuartiana Sm. 569.
stylaris Ser. 563.
tenuiflora Hst. 558.
Salix tenuifolia L., Sm. 565.
tenuis Hst. 568.
tetrandra L. 557.
Timmii Schk. 563.
tinctoria Sm. 556.
tomentosa Ser. 564.
triandra L. 558.
uliginosa Willd. 564.
ulmifolia Thll. 564.
undulata Ehrh. 558.
undulata hort. Goetting. 558. 559.
vaccinifolia Engl. bot. 569.
vaccinifolia hort. bot. 569.
velutina Schrd. 562.
venulosa Sm. 569.
versifolia Ser. 566.
versifolia Whlbg. 566. 567.
Villarsiana Willd. 558.
viminalis L. 561.
violacea Sm., Hollandr. 559.
virescens Vill. 560.
viridis Vill. 560.
viridis Fries. 557.
vitellina L. sec. Fries. 557.
vitellina L. spec. 558.
Waldsteiniana Willd. 568. 569.
Wargiana Lej. 557.
Weigeliana Willd. 565.
Wulfeniana Host., Willd. 563. 565.
Salsola L. 521.
arenaria W. K. 523.
fruticosa L. 520.
hirsuta L. 523.
Kali L. 521.
prostrata L. 523.
Soda L. 521.
Tragus L. 521.
Salvia L. 479.
Aethiopis L. 479.
austriaca Jcq. 480.
clandestina L. 480.
clandestina Vahl. 481.
deserta Schang. 480.
elata Hst. 480.
glutinosa L. 479.
multifida Sibth. 480.
nemorosa L. 480.
oblongata Rb. 480.
officinalis L. 479.
polymorpha Hoffm. 480.
praecox Sav. 480.
pratensis L. 480.
Sclarea L. 480.
Simsiana R. S. 480.
sylvestris L., Spreng. 480.
valentina Vahl. 480.
variegata Kit. 480.
verbenaca D. fl., Vahl. 480.
verticillata L. 481.
Salvinia Mich. 726.

Salvinia *natans* Hffm. 726.
Salzwedelia sagittalis Fl. d. Wett. 135.
Sambucus L. 278.
Ebulus L. 278.
laciniata Mill. 278.
nigra L. 278.
racemosa L. 278.
virescens Dsf. 278.
Samolus L. 512.
Valerandi L. 512.
Sanguisorba L. 202.
auriculata Scp. 202.
dodecandra Mortt. 202.
officinalis L. 202.

SANGUISORBEAE. 201.

Sanicula L. 240.
europaea L. 240.
officinalis Gn. 240.
vulgaris Koch. 240.

SANTALACEAE. 538.

Santia plumosa Sav. 677.
Santolina L. 317.
Chamae-Cyparissus L. 317.
Saponaria L. 86.
lutea L. 86.
ocymoides L. 86.
officinalis L. 86.
rubra Lmk. 86.
Vaccaria L. 86.
Sarothamnus Wimm. 130.
scoparius Koch. 130.
vulgaris Wim. 130.
Satureja L. 483.
graeca L. 484.
hortensis L. 483.
illyrica Hst. 483.
Juliana L. 484.
micrantha Hffmg. et Lnk. 484.
montana L. 483.
pygmaea Sieb. 483.
rupestris Wlf. 485.
subspicata Vis. 483.
thymifolia Scop. 485.
variegata Hst. 483.
Satyrium albidum L. 598.
Epipogium L. 602.
hircinum L. 598.
nigrum L. 599.
repens L. 603.
viride L. 598.
Saussurea DC. 347.
alpina DC. 347.
discolor DC. 347.
pygmaea Spr. 347.
Saxifraga L. 229.
acaulis Gaud. 234.
adscendens L. 237.
aggregata Lej. 236.
Saxifraga *aizoides* L. 233.
Aizoon Jcq. 230.
Aizoon Lpr. 230.
Aizoon *β.* minor brevifolia Stbg. 230.
androsacea L. 237.
apennina Bert. 234.
aphylla Stbg. 236.
arachnoidea Stbg. 238.
arenarioides Brign. 233.
aretioides Lpr. 231.
aspera L. 232.
aspera *β.* bryoides DC. 232.
atropurpurea Stbg. 234.
atrorubens Bertol. 233.
autumnalis L. 233.
autumnalis St. 233.
Bellardi All. 238.
biflora All. 232.
bohemica Pnz. 236.
bryoides L. 232.
bulbifera L. 238.
Burseriana L. 230.
caerulea Pers. 232.
caesia L. 231.
caesia Scp. 231.
caespitosa Gd. 235.
caespitosa Helvetiorum 235.
caespitosa L. 235. 236.
caespitosa Sm. 235.
caespitosa Scp. 234. 235.
caespitosa Whlbg. Helv. 235.
cernua L. 238.
Clusii Gouan. 233.
condensata Gmel. 236.
confusa Lej. 236.
controversa Stbg. 237.
Cotyledon L. 229.
Cotyledon *ε.* L. 230.
crocea Gd. 235.
crustata Vest. 230.
cuneifolia L. 233.
cymosa W. K. 234.
decipiens Ehrh. 235.
diapensioides Bell. 231.
elatior M. K. 230.
exarata All. 235.
exarata DC. 235.
exarata Gd. 235.
exarata Vill. 235.
Fachinii Koch. 237.
flavescens Stbg. 236.
geranioides Hst. 238.
Geum L. 234.
Geum Scp. 234.
granulata L. 238.
groenlandica L. 236.
heterophylla Stbg. 234.
hieracifolia W. K. 239.
Hirculus L. 233.

Saxifraga hirsuta L. 234.
Hohenwartii Stbg. 237.
Hostii Tsch.? 230.
hypnoides All. 235.
hypnoides L. 236.
hypnoides β. DC. 236.
imbricata Bert. 231.
intacta Willd. 230.
intermedia Gd. 235.
intricata Lpr. 235.
Kochii Hrnung. 232.
leucanthemifolia Lapeyr. 233.
longifolia Hst. 230.
longifolia Lpr. 230.
longifolia Strm. 230.
longifolia β. media Stbg. 230.
longifolia γ. minor Stbg. 230.
media Tsch. 236.
mixta Lapeyr. 235.
minuta Pollin. 238.
moschata Wlf. 234.
muscoides All. 237.
muscoides Wlf. 234.
mutata L. 230.
nervosa Lpr. 235.
nervosa major Stbg. 235.
nervosa minor Stbg. 235.
nivalis L. 239.
oppositifolia L. 232.
palmata Lej. 236.
palmata Panz. 236.
palmata Sm. 235.
paradoxa Stbg. 239.
patens Gd. 231.
Pedemontana All. 234.
petraea Gunn. 237.
petraea L. 238.
petraea Roth. 235.
planifolia Lpr. 237.
planifolia γ. Seguierii Spr. 237.
Ponae Stbg. 238.
pubescens Prr. 235.
pygmaea Hw. 234.
pyramidalis Lapr. 230.
pyrenaica Vill. 234.
pyrenaica Scp. 234.
recta Lapeyr. 230.
recurvifolia Lpr. 231.
repanda Willd. 238.
retusa Gouan. 231.
retusa Stbg. 232.
rotundifolia L. 238.
Rudolphiana Hornsch. 232.
rupestris Willd. 238.
sedoides L. 236.
sedoides α. flavida DC. 236.
sedoides Hohenwartiana DC. 237.
Seguieri Spr. 237.
sponhemica Gmel. 236.
sponhemica Panz. 236.

Saxifraga *squarrosa* Sb. 231.
Steinmanni Tsch. 236.
stenopetala Gaud. 236.
Sternbergii Willd. 236.
stellaris L. 233.
striata Hall. fil., Gaud. 235.
tenella Wulf. 233.
tenera Sut. 237.
trichodes Scop. 236.
tridactylites L. 238.
umbrosa L. 234.
uniflora Stbg. 236.
Vandelli Stbg. 230.
villosa Willd. 236.

SAXIFRAGEAE. 229.

Scabiosa R. S. 295.
agrestis Rb. 295.
agrestis W. K. 295.
alba Scop. 297.
alpina L. 293.
argentea L. 297.
arvensis L. 294.
australis Wlf. 295.
campestris Bss. 294.
canescens W. K. 296.
capillata R. S. 295.
ciliata Spr. 294.
columbaria Bertol. 296.
columbaria L. 296.
columbaria α, δ. D. fl. 295.
columbaria ε. gramuntia DC. 295.
columbaria Rb. 296.
dispacifolia Hst. 294.
glabrata Schott. 295.
graminifolia L. 297.
gramuntia L. 295.
Hladnikiana Hst. 296.
holosericea Bertol. 296.
holosericea DC. 296.
hybrida All. 294.
integrifolia L. 294.
leiocephala D. fl. 295.
leucantha L. 293.
longifolia W. K. 294.
lucida Vill. 296.
lucida β. D. fl. 296.
lyrata Lmk. 294.
maritima L., Wlf. 297.
mollis Willd. 295.
mollissima DC. 295.
multiseta Vis. 297.
norica Vest. 296.
ochroleuca L. 295.
polymorpha α. Weig. 296.
pyrenaica Brtl. 295.
pyrenaica DC. 295.
repens Brign. 295.
silenifolia W. et Kit. 296.
stricta W. K. 296.

Scabiosa styriaca Vest. 295.
suaveolens Dsf. 296.
Succisa L. 295.
sylvatica L. 294.
sylvatica *β.* longifolia D. fl. 294.
tenuifolia *α.* Roth. 295.
transsylvanica L. 293.
Trenta Hacq. 293.
ucranica L. 297.
vestina Facch. 297.
Scandix L. 270.
Anthriscus L. 272.
australis L. 270.
Cerefolium L. 271.
fumarioides W. K. 271.
hirsuta Scop. 273.
infesta Jcq., L. 269.
infesta Rb. 272.
nodosa L. 272.
odorata L. 274.
Pecten Veneris L. 270.
Schelhammeria capitata Mönch. 649.
Scheuchzeria L. 581.
palustris L. 581.
Pseudoasphodelus Scop. 627.
Schmidtia subtilis Tratt. 677.
utriculosa Stbg. 677.
Schoberia C. A. Meyer. 520.
fruticosa C. A. Meyer. 520.
maritima C. A. Meyer. 520.
Schoenodorus divaricatus R. S. 703.
Schoenus L. 639.
aculeatus L. 674.
albus L. 640.
compressus L. 645.
ferrugineus L. 640.
fuscus L. D. fl. 640.
Mariscus L. 640.
monoicus Engl. bot. 647.
mucronatus L. 639.
nigricans L. 640.
rufus Hds. 646.
Schollera Oxycoccos Roth. 411.
Schweyckerta Nymphoides Gmel. 421.
Sciaphila convallarioides Wib. 613.
Scilla L. 620.
amoena L. 621.
autumnalis L. 621.
bifolia L. 621.
italica L. 621.
nutans Sm. 627.
patula DC. 621.
verna Koch. 621.
Scirpidium aciculare Nees ab Es. 642.
Scirpus L. 642.
alpinus Schlch. 642.
Scirpus acicularis L. 641.
annuus All. 646.
annuus Hst. 645.
annuus Thuill. 641.
atropurpureus Retz. 641.
australis L. syst. 645.
Baeothryon Ehrh. 642.
bifolius Wallr. 646.
bisumbellatus Frsk. 646.
caespitosus L. 642.
caespitosus Pollich. 642.
campestris Roth. 642.
capitatus Schreb. 641.
caricinus Schrad. 645.
Caricis Retz. 645.
carinatus Sm. 644.
compactus Krock. 645.
compressus Mönch. 641.
compressus Pers. 645.
dichotomus L. 646.
Duvalii D. fl. 643. 644.
Duvalii Hopp. 643.
filiformis Sav. 643.
fluitans L. 642.
glaucus Engl. bot. 643.
glomeratus Scp. 643.
Halleri Vill. 642.
Holoschoenus L. 644.
Hoppii Weih. 644.
humilis Wallr. 642.
intermedius Thll. 641.
lacustris L. 643.
lacustris *β.* minor bodamicus Gd. 643.
Lejeunii Weih. 644.
leptaleus Kch. syll. 643.
Lereschii Thom. 641.
littoralis Schrad. 644.
macrostachys Willd. 645.
maritimus L. 645.
maritimus Bert. 645.
Michelianus L. 645.
mucronatus L. 643.
mucronatus Pollich. 644.
mucronatus Rth. 644.
mucronatus Scp. 644.
multicaulis Gmel. 641.
multicaulis Sm. 641.
nanus Poir. 642.
nanus Spr. 642.
ovatus Rth. D. fl. 641.
palustris L. 641.
parvulus R. S. 642.
pauciflorus Lightf. 642.
pungens Vahl. 644.
radicans Schk. 645.
romanus L. spec. 645.
romanus *β.* L. spec. 645.
Rothii Hopp. 644.
rufus Schrad. 645.

Scirpus Savii Sebast. 643.
setaceus L. 643.
stolonifer Rth. 642.
supinus L. 643.
sylvaticus L. 645.
sylvaticus Nro. 5. Tabern. 643.
Tabernaemontani Gmel. 643.
tenuifolius DC. 644.
tenuis Schreb. 641.
trigonus Rth. 643. 644.
trigonus Nolt. 644.
triqueter L. 644.
triqueter Rth. 644.
triqueter *β.* Sm. 644.
tuberosus DC., Dsf. 645.
turgidus Prs. 641.
uniglumis D. fl. 641.
varius Schreb. 641.

SCLERANTHEAE. 220.

Scleranthus L. 220.
annuus L. 220.
fastigiatus Hochst. 220.
perennis L. 220.
perennis *β.* fallax a Bngh. 220.
verticillatus Tsch. 220.
Sclerochloa articulata Lmk. 703.
dura Beauv. 695.
rigida Link. 703.
Sclerophyllum pulchrum Gd. 377.
Scolochloa arundinacea D. fl. 684.
Scolopendrium Sm. 738.
Ceterach Rth. 730.
officinarum Sw. 738.
Phyllitis Rth. 738.
septentrionale Rth. 738.
Scolymus L. 356.
grandiflorus Dsf. 356.
hispanicus L. 356.
maculatus L. 356.
maculatus Scp. 356.
Scopolina Schult. 441.
atropoides Schult. 441.
Hladnikiana Frey. 441.
viridiflora Freyer. 441.
Scorodonia heteromalla Mnch. 498.
Scorpiurus L. 163.
subvillosa L. 163.
Scorzonera L. 363.
acaulis Roth. 368.
alpina Hopp. 364.
angustifolia L. 363. 366.
angustifolia Gaud. 364.
angustifolia Rchb. 363.
angustifolia Hst. 366.
angustifolia Wigg. 364.
aristata Ram. 364.
austriaca Willd. 363.
calcitrapifolia Vhl. 365.
denticulata Lmk. 364.
Scorzonera edulis Mönch. 364.
glastifolia Willd. 364.
graminifolia L. 364.
graminifolia Roth. 364.
graminifolia Tausch. 364.
grandiflora Lpr. 364.
hispanica L. 364.
hispanica *β.* sinuata Wallr. 364.
hispanica *β.* glastifolia Wallr. 364.
hispanica *γ.* asphodeloides Wallr. 364.
Hoppeana Sieb. 364.
humilis Jcq. 363.
humilis L. 364.
humilis Rb. 363.
humilis latifolia secunda Clus. 363.
laciniata Jcq. 365.
laciniata L. 365.
lanata Schrk. 364.
macrorrhiza Schl. 364.
montana Mutel. 364.
muricata Balb. 365.
nervosa *α.* Lmk. 364.
octangularis Willd. 365.
pannonica III. Clus. 363.
parviflora Jcq. 364.
picroides L. 372.
plantaginea Schlch. 364.
purpurea L. 364.
rosea W. K. 365.
resedifolia Rtz. 365.
taraxacifolia Jcq. 366.
villosa Scp. 363. 366.
Scribaea baccifera Fl. d. Wett. 86.
Scrophularia L. 446.
aquatica et omn. auct. Koch. 447.
atropurpurea Morett. 447.
auriculata Scp. 447.
Balbisii Hrnm. 447.
canina Hopp. 448.
canina L. 447.
canina Sieb. herb. 448.
canina Wydl. ex parte. 447.
canina *β*, *γ*. DC. 448.
canina *γ*, *δ*. Wydl. 448.
chrisanthemifolia M. B. 447.
Ehrharti Stev. 446.
glandulosa W. K. 447.
granidentata Ten. 447.
Hoppii Koch. 448.
laciniata W. K. 447.
latifolia Hst. 448.
lucida M. B. 447.
Neesii Wrtg. 447.
nodosa L. 446.
peregrina L. 448.
Scopolii Hopp. 447.
Scorodonia Hst. (n. L.) 447.
vernalis L. Hst. 448.

Scutellaria L. 495.
alpina L. 495.
galericulata L. 496.
hastifolia L. 496.
minor L. 496.
Secale L. 716.
Cereale L. 717.
villosum L. 714.
Securidaca legitima Gaertn. 165.
lutea Mill. 165.
Securigera DC. 165.
Coronilla DC. 165.
Sedum L. 221.
acre L. 224.
aestivum All. 224.
album L. 224.
alpestre Vill. 224.
Anacampseros L. 223.
anglicum Rb. 224.
annuum L. 223.
anopetalum DC. 225.
atratum L. 223.
boloniense Rb. ic. 224.
boloniense Lois. 224.
caespitosum DC. 221.
Cepaea All. 223.
Cepaea L. 223.
collinum Wimm. et Gr. 225.
crassicaule Link. 225.
dasyphyllum L. 224.
elegans Lej. 225.
Fabaria Koch. 222.
Forsterianum Rb. ic. 224.
galioides All. 223.
glaucum Sm. Engl. fl. 225.
glaucum Lmk. 224.
glaucum W. K. 223.
Guettardi Gml. 223.
haematotes Scp. 223.
hispanicum L. 223.
latifolium Brtl. 222.
maximum Sut. 222.
Oederi Retz. 224.
pallidum M. B. 221. 223.
paniculatum Lmk. 223.
petraeum Ponae Clus. 250.
purpureum Tsch. 223.
purpurascens Koch. 222.
recurvatum Willd. 225.
reflexum Fries. 225.
reflexum Link. 225.
reflexum L. 225.
repens Schleich. DC. 224.
Rhodiola DC. 221.
roseum Scop. 221.
rubens Haenk. 224.
rubens L. 221.
rupestre L. 225.
rupestre Oed. 224.
rupestre Sm. brit. 225.
Sedum rupestre Willd. 225.
saxatile All. 224.
saxatile Wigg., DC. 224.
saxatile Willd. 224.
schistosum Lej. 224.
sexangulare Lej. 224.
sexangulare L. 224.
sexangulare M. et K. D. fl. 224.
sexfidum M. B. 223.
spathulatum W. K. 223.
stellatum L. 223.
Telephium fl. suec. 222.
Telephium Rb. exc. 223.
Telephium Rb. ic. 222.
Telephium Sm. 222.
Telephium Sturm. 222.
Telephium *β.* purpureum L. 222.
Telephium *γ.* L. 223.
Telephium *δ*, *ε.* L. 222.
tectorum Scp. 225.
villosum L. 223.
Selaginella Spring. 728.
helvetica Spring. 728.
spinulosa Alx. Br. 728.
Selaginoides foliis spinosis Dill. 728.
Selinum L. 258.
angulatum Lmk. 258.
argenteum Crtz. 262.
austriacum Jcq. 262.
Carvifolia Crtz. 261.
Carvifolia L. 258.
Cervaria Crtz. 261.
Chabraei Jcq. 261.
Chabraei Knth. 255.
elegans Balb. 262.
Gmelini Bray. 257.
intermedium Bess. 263.
Lachenalii Gmel. 259.
lineare R. S. 262.
lineare Schumach. 255.
membranaceum Vill. 258.
Monnieri L. 255.
montanum Schlch. 262.
nigricans Gd. 262.
nigrum Lmk. 262.
odoratum Brnh. 258.
palustre L. suec., 262.
palustre Whlbg., Mönch. 255.
peregrinum Willd. 255.
Peucedanum Wigg. 260.
podolicum Bss. 261.
pratense Sprng. 255.
polymorphum Spr. 262.
Pseudo-Carvifolia All. 258.
pubescens Mönch. 258.
pyrenaeum Gn. 259.
rablense Spr. 262.
Schievereckii Bss. 263.
Seguieri L. fil. 256.
sylvestre Crtz. 258.

Selinum sylvestre Jcq. DC. 262. 263.
sylvestre L. 255.
Thysselinum Crtz. 263.
venetum Spr. 262.
Sempervivum L. 225.
arachnoideum L. 227.
arenarium Koch. 227.
Braunii Funk. 227.
Funkii Braun. 226.
globiferum L. 226.
globiferum Rb. 227.
globiferum Wulf. 226.
globiferum Kch. b. Z. 226.
hirtum L. 227.
montanum L. 226.
soboliferum Sims. 227.
tectorum L. 225.
Wulfeni Hpp. 226.
Senebiera Prs. 64.
coronopus Poir. 64.
didyma Pers. 65.
pinnatifida DC. 65.
Senecio L. 331.
abrotanifolius L. 333.
alpestris Gd. 335.
alpestris DC. 330.
alpinus DC. 334.
alpinus L. fil. 334.
alpinus Rb. 334.
alpinus β. auriculatus Rb. 334.
alpinus Scp. 334.
aquaticus Hds. 333.
aquaticus Rb. 333.
arachnoideus DC., Sieb. 336.
aurantiacus DC. 331.
aurantiacus γ. tomentosus DC. 331.
barbareaefolius Krock. 333.
barbareaefolius Rchb. 333.
bohemicus Tsch. 336.
brachychaetus DC. 336.
Cacaliaster Lmk. 334.
campestris DC. 331.
carniolicus Wlld. 334.
chrysanthemifolius Poir. 333.
cordatus Koch. 334.
cordifolius Thunbg. 334.
crispatus DC. 329.
croaticus W. K. 335.
croceus DC. 329.
denticulatus Müll. 331. 332.
denticulatus Nolte. 331.
Doria L. 336.
Doronicum L. 336.
Doronicum β. Koch. 336.
erraticus Bert. 333.
erucifolius L. 333.
erucifolius Pollich., Huds. 333.
fluviatilis Wllr. 335.
fontanus Wllr. 335.
frondosus Tsch. 335.
Senecio Fuchsii Gmel., Koch. 335.
germanicus Wallr. 335.
Jacobaea L. 333.
Jacobaea γ. Wimm. et Gr. 333.
Jacquinianus Rb. 335.
incanus L. 334.
incanus Scop. 334.
laciniatus Bert. 332.
lanatus Scop. 336.
lividus Nolt. 332.
lycopifolius Desf. 333.
lyratifolius Rb. 334.
montanus Willd. 332.
napifolius Schrad. 333.
nebrodensis L. 332.
nemorensis L. 335.
nemorensis Pollich. 330.
nemorensis Jcq., Wlld., Ledeb. Gmel., Rb. 335.
octoglossus DC. 335.
ovatus Wlld. 335.
ovirensis DC. 330.
paludosus L. 336.
palustris DC. 331.
papposus Less. 331.
paradoxus Hpp. 332.
pratensis DC. 329.
rivularis DC. 329.
rupestris W. K. 332.
rupestris Willd. 332.
Sadleri Lang. 336.
salicetorum Godr. 336.
salicifolius Wallr. 335.
saracenicus Jcq. 336.
saracenicus L. 335.
saracenicus Pollich., Wallr. 335.
saracenicus β. flosculosus DC. 335.
Schkuhrii DC. 329.
Scopolii Hopp. et Hsch. 336.
spathulaefolius DC. 330.
squalidus L. 332.
sudeticus DC. 329.
subalpinus Koch. 334.
sylvaticus L. 332.
sylvaticus α. auriculatus Meyer. 332.
sylvaticus β. lividus Hock. 332.
tenuifolius Jcq. 333.
uniflorus All. 334.
vernalis W. K. 332.
viscosus L. 332.
vulgaris L. 331.
vulgaris β. radiatus 331.
Senkenbergia ruderalis Fl. d. Wett. 63.
Serapias L. 601.
abortiva Scp. 602.
cordigera Hgtschw. et H. 601
cordigera L. 601.
ensifolia Sm. 602.
grandiflora Fl. Dan. 602.

Serapias grandiflora Scop. 602.
lancifolia Rth. 602.
latifolia atrorubens Hoffm. 602.
Lingua Bert., Gaud. 601.
Lingua DC. 601.
Lingua L. 601.
Lingua β. L. 601.
longifolia Hds. 602.
longifolia L. 603.
longipetala Pollin. 601.
oxyglottis Bert. 601.
palustris Scp. 603.
Pseudo-cordigera Moric. 601.
rubra L. 602.
triloba Viv. 601.
Serpicula verticillata Rostk. 580.
Serratula L. 348.
alpina L. 347.
alpina γ. L. 347.
arvensis L. 341.
blanda M. B. 348.
centauroides Hst. 348.
centauroides L. 348.
complicata Schwgg. 341. 748.
cyanoides Gaertn. 348.
cyanoides DC. 349.
discolor Willd. 347.
heterophylla Dsf. 348.
macrophylla Saut. 347.
mollis Koch. 348.
nudicaulis L. 348.
Pollichii DC., Koch. 349.
pygmaea Jcq. 347.
radiata M. B. 348.
Rhaponticum DC. 348.
setosa Willd. 341. 478.
simplex DC. 348.
tinctoria L. 348.
Seseli L. 253.
ammoides Gn. 244.
Amomum Scp. 245.
annuum L. 254.
articulatum Crtz. 253.
athamantoides C. A. Meyer. 254.
bienne Crtz. 254.
Bunius Vill. 244.
Carum Scop. 246.
coloratum Ehrh. 254.
corsicum Link. 244.
dioicum Vill. 243.
dubium Schk. 255.
elatum Gouan. 253.
elatum L. 253.
glaucum Jcq. 253.
Gouani Koch. 253.
graveolens Scp. 243.
Hippomarathrum L. 253.
Libanotis Kch. 254.
Libanotis β, δ. pubescens D. fl. 254.
Seseli Meum Scop. 257.
montanum L. 254.
montanum β. glaucum DC. 253.
multicaule Jcq. 254.
nodiflorum Scp. 244.
osseum Crtz. 253.
pumilum L. 243.
pusillum Brot. 244.
pyrenaeum L. 259.
saxifragum L. 244.
saxifragum Scholl. 255.
selinoides Jcq. 257.
tortuosum L. 254.
tortuosum Pollich. 254.
tortuosum Willd. 255.
varium Trvr. 253.
venosum Hffm. 255.
verticillatum Dsf. 244.
Sesleria Ard. 684.
argentea Sav. 685.
caerulea Ard. 585.
cylindrica DC. 685.
disticha Pers. 685.
dura Kunth. 695.
echinata Hst. 684.
elongata Hst. 685.
elongata Vis. 685.
juncifolia Hst. 685.
juncifolia Sffrn. 684.
leucocephala DC. 685.
microcephala DC. 685.
nitida Ten. 685.
sphaerocephala Ard. 685.
tenella Hst. 685.
tenuifolia Hst. 684.
tenuifolia Schrad. 684.
Setaria Beauv. 671.
glauca Beauv. 671.
italica Beauv. 671.
verticillata Beauv. 671.
viridis Bv. 671.
Sherardia L. 280.
arvensis L. 280.
muralis L. 288.
Sibbaldia L. 192.
procumbens L. 192.
Sida Abutilon L. 114.
Sideritis L. 493.
hyssopifolia Gaud., L. 493.
montana L. 493.
romana L. 493.
scordioides Benth. 493.
scordioides L. 493.
Siebera cherlerioides Hopp. 97.
Sieglingia decumbens Bernh. 693.
Silaus Bess. 256.
pratensis Bss. 256.
Silene L. 86.
acaulis L. 91.
alpestris Jcq. 91.

Silene anglica L. 87.
annulata Thor. 90.
Armeria L. 90.
baccifera Rth. 86.
bicolor Thor. 92.
bipartita Dsf. 87.
cerastoides DC. 87.
cerastoides L. 87.
cerastoides (Lychnis) Scop. 91.
chlorantha Ehrh. 88.
coarctata Lagasc. 87.
colorata Poir. 87.
conica L. 89.
conoidea L. 89.
Cucubalus Whlbg. 89.
dichotoma Ehrh. 87.
eranthema Wib. 90.
exscapa All. 91.
gallica L. 87.
inaperta Scop. 92.
inflata Sm. 89.
inflata *β.* D. fl. 89.
infracta W. K. 88.
insubrica Gd. 88.
italica Pers. 87.
linaecola Wib. 90.
linicola Gmel. 90.
maritima Hst., With. 89.
membranacea Poir. 87.
nemoralis W. K. 88.
noctiflora L. 90.
nutans L. 88.
nutans *β.* infracta Whlbg. 88.
Otites Sm. 88.
petraea W. K. 91.
pilosa Spr. 88.
polyphylla L. 92.
pudibunda Hffmsgg. 91.
Pumilio Wulf. 89.
pusilla W. K. 91.
quadrifida L. 91.
quinquevulnera L. 87.
reticulata Dsf. 90.
rubella Wulf. 90. 91.
rupestris L. 91.
Saxifraga L. 91.
sedoides Jcq. 90.
sedoides DC. 90.
stricta L. 90.
sylvestris Rb. 87.
tatarica Pers. 88.
uniflora Rth. 89.
uniflora *β. γ.* DC. 89.
vallesia L. 90.
vespertina Retz. 87.
viscida Spr. 91.
viscosa Pers. 87.
viscosa Schleich. 88.

SILENEAE. 80.

Siler Scop. 266.
aquilegifolium Gaertn. 266.
montanum Crtz. 267.
trilobum Scp., Crtz. 266.
Silybum Grtn. 342.
marianum Grtn. 342.
Sinapis L. 48.
alba L. 49.
arvensis L. 49.
Cheiranthus Koch. 49.
Eruca Roehl. 50.
heterophylla DC.? 50.
hispanica Lmk. 49.
incana L. 50.
maritima All. 42.
nigra L. 48.
orientalis L. 49.
orientalis Murr. 49.
pyrenaica L. 42.
recurvata All. 49.
tenuifolia Brwn. 50.
Tournefortii All. 49.
Sison L. 245.
Amomum L. 245.
Anisum Spr. 248.
inundatum L. 244.
Podagraria Spr. 245.
segetum L. 243.
verticillatum L. 246.
Sisymbrium L. 41.
acutangulum DC. 42.
acutangulum Tilleri Gaud. 42.
acutangulum hyoseridifolium Gd. 42.
Alliaria Scp. 43.
altissimum L. 43.
amphibium L. 31.
anceps Whlbg. 32.
aquaticum Pollich. 31.
arenosum L. suec. et II. 43.
arenosum L. 37.
austriacum Jcq. 42.
brevicaule Wib. 50.
bursifolium Vill. 44.
Columnae L. 42.
compressum Mönch. 42.
contortum Willd. 42.
dentatum All. 44.
eckartsbergense Willd. 42.
Erucastrum Goun. 50.
Erucastrum Pollich. 49.
Erucastrum Vill. A. B. 49.
erysimifolium Pourr. 42.
hirtum Hst. 49.
hybridum Thll. 32.
Iro L. 42.
lippicense Wlf. 32.
Loeselii L. 42.
monense Gmel. 49.
murale L. 50.

Sisymbrium multisiliquosum Hoffm. 42.
Nasturtium L. 31.
obtusangulum Schl. 49.
officinale Scp. 41.
palustre Leyss. 32.
pannonicum Jcq. 43.
parviflorum Lmk. 43.
polyceratium L. 42.
pumilum Lmk. 50.
pyrenaicum L. 32.
pyrenaicum Vill. 42.
Roripa Scop. 31.
Sinapeos Retz. 43.
Sinapistrum Crtz. 43.
Sophia L. 43.
strictissimum L. 43.
tanacetifolium L. 44.
taraxacifolium DC. 42.
tenuifolium L. 50.
Thalianum Gd. 43.
Tilleri Billard. 42.
vimineum L. 50.
Sium L. 248.
Amomum Rth. 245.
angustifolium L. 248.
Apium Roth. 243.
aromaticum Lmk. 245.
Berula Gouan. 248.
Bulbocastanum Spr. 246.
erectum Hds. 248.
Falcaria L. 245.
inundatum Roth. 244.
latifolium L. 248.
nodiflorum L. 244.
repens Jcq., L. fil. 244.
saxifragum Roth. 244.
Silaus Roth. 257.
Sisarum L. 248.
verticillatum Lmk. 246.
Smilacina bifolia Dsf. 613.
Smilax L. 613.
aspera L. 613.
Smyrnium L. 275.
Discoridis Spr. 275.
nodiflorum All. 255. 267.
Olusatrum L. 275.
perfoliatum Mill. 275.

SOLANEAE. 439.

Solanum L. 440.
alatum Mnch. 440.
atriplicifolium Dsport. 440.
Dulcamara L. 440.
humile Bernh. 440.
littorale Raab. 440.
luteo-virescens Gmel. 440.
luteum Mill. 440.
melanocerasum Willd. 440.
miniatum Brnh. 440.
Solanum *nigrum* L. 440.
nigrum Rb. ic. 440.
nigrum γ, δ. D. fl. 440.
nigrum γ. villosum L. 440.
nigrum chlorocarpum Spenn. 440.
nigrum stenopetalum Alex. Br. 440.
pterocaulon Rb. 440.
pterocaulon Dunal. 440.
puniceum Gmel. 440.
tuberosum L. 440.
villosum Lmk. 440.
villosum Mill. 440.
Soldanella L. 511.
alpina L. 511.
alpina Schmidt. 511.
Clusii Gaud. 511.
Clusii Schmidt. 511.
minima Hopp. 511.
montana Willd. 511.
pusilla Baumg. 511.
Solidago L. 304.
alpestris W. K. 304.
cambrica Hds. 304.
graveolens Lmk. 308.
Virga aurea L. 304.
Virga aurea β. angustifolia Gaud. 304.
virga aurea γ. cambrica Sm. 304.
virga aurea γ. pumila Gaud. 304.
Sommerauera quadrifida Hopp. 97.
Sonchus L. 371.
alpinus L. 372.
arvensis L. 371.
arvensis var. Schultz. 371.
asper Vill. 371.
canadensis With. 372.
caeruleus Sm. 372.
ciliatus Lmk. 371.
fallax Wallr. 371.
intermedius Brckn. 371.
lacerus Willd. 371.
laevis Vill. 371.
lapponicus Froel. 372.
littoralis Rb. 371.
maritimus L. 371.
montanus Lmk. 372.
oleraceus L. 371.
oleraceus β. triangularis Wallr. 371.
oleraceus γ. lacerus Wallr. 371.
oleraceus γ. et δ. L. 371.
palustris L. 372.
picroides All. 372.
Plumieri L. 372.
tenerrimus L. 371.
Sorbus L. 205.
Aria Crtz. 205.
aucuparia L. 205.
Chamaemespilus Crtz. 206.

Sorbus *domestica* Crtz. 205.
hybrida L. 205.
lanuginosa Kit. 205.
latifolia Pers. 206.
scandica Fries. 205.
torminalis Crtz. 206.
Sorghum Prs. 669.
halepense Prs. 669.
saccharatum Pers. 699.
vulgare Pers. 699.
Soyeria Monn. 379.
hyoseridifolia Kch. 379.
montana Mnn. 379.
Spalanzania agrimonioides Pollin. 193.
Sparganium L. 591.
erectum *α*, *β*. L. 591.
natans L. 591.
ramosum Hds. 591.
simplex Hds. 591.
Spartianthus junceus Link. 130.
Spartina Schreb. 676.
phleoides Rth. 674.
stricta Roth. 676.
Spartium L. 130.
decumbens Jcq. 130.
junceum L. 130.
lanigerum Dsf. 133.
radiatum L. 135.
scoparium L. 130.
spinosum L. 133.
villosum Poir. 133.
virgatum Ait. 131.
Specularia Hst. 410.
falcata A. DC. 410.
hybrida DC. 410.
Speculum DC. 410.
Spergella nodosa Rb. 95.
saginoides Rb. 94.
subulata Rb. 95.
Spergula L. 95.
arvensis L. 95.
glabra Willd. 95.
laricina Wulf. 95.
maxima Weih. 95.
nodosa L. 95.
pentandra L. 95.
saginoides All. 95.
saginoides L. 94.
saginoides *β*. D. fl. 95.
sativa a Bngh. 95.
stricta Sw. 97.
subulata Sw. 95.
vulgaris a Bngh. 95.
Spergularia salina Presl. 96.
Sphondylium austriacum Scop. 265.
Spinacia L. 526.
glabra Mill. 526.
inermis Mönch. 526.
oleracea Mill. 526.
Spinacia oleracea *α*. et *β*. L. 526.
spinosa Mönch. 526.
Spiraea L. 181.
Aruncus L. 182.
carpinifolia Willd. 181.
chamaedryfolia Jcq. 181.
chamaedryfolia L. 181.
crenata Gouan. 181.
decumbens Koch. 182.
denudata Hayn. 182.
Filipendula L. 182.
flexuosa Rb. 182.
glauca Schultz. 182.
hypericifolia *γ*. *δ*. DC. 181.
media Schm. 181.
oblongifolia Wldst. Kit. 181.
obovata Wldst. Kit. 181.
salicifolia L. 181.
Ulmaria L. 182.
ulmifolia Scop. 181.
Spiranthes Rich. 603.
aestivalis Rich. 603.
autumnalis Rich. 604.
Spirodela polyrrhiza Schld. 590.
Stachys L. 490.
alpina L. 491.
ambigua Sm. 491.
annua L. 491.
arvensis L. 491.
Betonica Scp. 492.
biennis Roth. 491.
bufonia Thuill. 492.
fragilis Vis. 492.
germanica L. 491.
italica Mill. 491.
lanata Crtz. 491.
maritima L. 492.
palustris L. 491.
polystachya Ten. 491.
procumbens Lmk. 492.
ramosissima Roch. 492.
recta L. 492.
salviaefolia Ten. 491.
Sideritis Vill. 492.
subcrenata Vis. 492.
sylvatica L. 491.
Staphylea L. 126.
pinnata L. 126.
Staehelina L. 347.
dubia L. 347.
Statice L. 513.
alpina Hopp. 514.
arenaria Pers. 513.
Armeria L., St., Pollich. 513.
Armeria Sm. 514.
Armeria *α*. Gd. 514.
Armeria *β*. DC. 514.
Armeria *β*. elongata DC. 513.
Armeria *γ*. alpina DC. 514.
Behen Drey. 514.

Statice bellidifolia DC. 515.
cancellata Bernh. 515.
caspia Willd. 515.
elongata Hffm. 513.
furfuracea Rb. 515.
globulariaefolia Desf. 514.
Gmelini Willd. 514.
Limonium L. 514.
maritima Mill. 514.
plantaginea All. 513.
pubescens Koch. 515.
purpurea Koch. 513.
Pseudo-Limonium Rchb. 514.
rariflora Drey. 514.
Staurogeton Rb. 590.
Stellaria L. 102.
aculeata Scp. 102.
Alsine Rchrd. 103.
aquatica Pollich. 103.
aquatica Scp. 104.
arvensis Hpp. 103.
biflora Wulf., L. spec. 98.
bulbosa Wulf. 103.
cerastoides L. 102.
ciliata Scop. 100.
crassifolia Ehrh. 104.
dichotoma Scp. 103.
dichotoma Wigg. 104.
Dilleniana Lrs. 103.
Dilleniana Mönch. 103.
elodes M. B. 104.
flaccida Peterm. 103.
fontana Wulf. 104.
Frieseana Ser. 103.
glauca With. 103.
graminea L. 103.
graminea β. L. 103.
graminea γ. L. 103.
Holostea L. 103.
hypericifolia Wigg. 104.
latifolia Pers. 102.
longifolia Frs. 103.
longifolia Mühlbg. 103.
mantica L. 104.
media Vill. 102.
multicaulis Willd. 102.
nemorum L. 102.
neglecta Weih. 103.
palustris Retz. 103.
rupestris Scp. 97.
uliginosa Murr. 103.
umbrosa Optz. 103.
viscida M. B. 102.
Stellera passerina L. 537.

STELLATAE. 280.

Stenactis Cass. 302.
annua N. ab E. 303.
bellidiflora Alx. Br. 303.
dubia Cass. 303.
Sternbergia W. K. 610.
lutea Ker., R. S. 610.
Stipa L. 683.
Aristella L. 683.
Calamagrostis Whlbg. 683.
capillata L. 683.
pinnata L. 683.
Stipularia rubra Haw. 96.
Stoebe salamantica tertia Clus. 349.
Stramonium foetidum Scop. 442.
vulgatum Grtn. 442.
Stratiotes L. 579.
aloides L. 579.
Streblidia ferruginea Link. 640.
Streptopus Mchx. 612.
amplexifolius DC. 612.
distortus Michx. 612.
Struthiopteris Willd. 739.
crispa Wallr. 739.
germanica Willd. 739.
Spicant Scop., Weis. 738.
Sturmia Rb. 604.
Loeselii Rb. 604.
Sturmia minima Hpp. 676.
verna Pers. 676.
Suaeda chenopodioides Pall. 521.
maritima Moq. Tand. 521.
Subularia L. 59.
alpina Willd. 36.
aquatica L. 59.
Succisa M. K. 294.
australis Rb. 295.
pratensis Mönch. 295.
Swertia L. 421.
carinthiaca Wulf. 422.
perennis L. 421.
Symphytum L. 433.
bohemicum Schm. 434.
bulbosum Schimp. 434.
Clusii Gmel. 434.
filipendulum Bischoff. 434.
mediterraneum Koch. 434.
officinale L. 433.
patens Sibth. 434.
punctatum Gd. 434.
tuberosum L. 434.
Syntherisma ciliare Schrad. 670.
glabrum Schrad. 670.
vulgare Schrd. 670.
Syrenia Adrz. 47.
angustifolia Rb. 47.
Ehrharti Andrz. 47.
Syringa L. 418.
vulgaris L. 418.

T.

TAMARISCINEAE. 214.
Tamariscus gallicus All. 214.
germanicus Scop. 215.

Tamariscus pentandra Lmk. 214.
Tamarix L. 214.
africana Poir. 214.
gallica L. 214.
germanica L. 215.
pentandra Pall. 214.
Tamus L. 613.
communis L. 613.
Tanacetum L. 317.
Balsamita L. 317.
vulgare L. 317.
Taraxacum Juss. 367.
Dens leonis Dsf. 367.
laevigatum 367.
lanceolatum Poir. 367.
officinale Wigg. 367.
officinale *β.* corniculatum Kch. et Z. 367.
palustre DC. 367.
serotinum Poir. 368.
tenuifolium Hpp. 368.
vulgare Schrk. 367.
Taxus L. 574.
baccata L. 574.
Teesdalia R. Brw. 60.
Iberis DC. 60.
nudicaulis R. Brw. 60.
petraea Rchb. 63.
Telekia Bmg. 305.
cordifolia DC. 305.
speciosa Bmg. 305.
speciosissima Lss. 305.
Telephium L. 218.
Imperati L. 218.
purpurascens Fuchs. 222.
purpureum majus C. Bauh. 222.
purpureum minus C. Bauh. 223.
Telmatophace gibba Schld. 590.

TEREBINTHACEAE. 129.

Tetragonolobus Scop. 155.
purpureus Mönch. 155.
siliquosus Roth. 155.
Teucrium L. 498.
album Poir. 499.
Belion Schreb. 499.
Botrys L. 498.
capitatum L. 499.
Chamaedrys L. 498.
Chamaepitys L. 498.
flavescens Schreb. 499.
flavum L. 498.
montanum L. 499.
Polium L. 499.
Pseudo-Hyssopus Schreb. 499.
scordioides Schrb. 498.
Scordium L. 498.
Scorodonia L. 498.
supinum Jcq. 499.
supinum L. 499.
Teucrium Teuthrion Schreb. 499.
valentinum Schreb. 499.
Thalictrum L. 2.
acutilobum DC. 3.
alpestre Gaud. 3.
alpinum L. 3.
angustifolium Jcq. 5.
angustifolium L. 5.
angustifolium Pollich. 5.
angustifolium heterophyllum Wimm. et Gr. 5.
angustifolium stenophyllum Wimm. et Gr. 5.
anonymon Wallr. 5.
aquilegifolium L. 3.
atropurpureum Jcq. 3.
Bauhini Spr. 5.
Bauhinianum Wallr. 5.
dumosum v. Schlchtd. 4.
elatum Jcq. 4.
exaltatum Gaud. 6.
flavum L. 5.
flexuosum Bernh. 4.
flexuosum Rb. 4.
foetidum L. 3.
galioides Nestl. 5.
heterophyllum Lej. 5.
Jacquinianum Koch. 4.
laserpitiifolium Willd. 5.
lucidum DC. 5.
lucidum L. 5.
majus Jcq. 4.
majus Crntz., Jcq., Sm., Rchb. 4.
medium Jcq. 5.
minus DC. 4.
minus Jcq. 4.
minus L 3. 4.
minus Pollich. 3.
minus Fl. dan. 5.
minus *δ.* strictum Koch. 3.
montanum Wallr. 3.
montanum glandulosum Wallr. 4.
montanum roridum Wallr. 4.
montanum *α.* virens Wallr. 4.
Morisonii Gmel. 5.
nigricans DC. 5.
nigricans Gaud. 5.
nigricans Lej. et Curt. 5.
nigricans Jcq. 5.
pubescens Schl. 4.
roridum Wallr. 4.
rufinerve Lej. 6.
saxatile DC. 4.
saxatile Rchb. 3.
saxatile Schleich. 3.
simplex L. 5.
sylvaticum Koch. 3.
virens Wallr. 4.
Theligonum L. 529.
Cynocrambe L. 529.

Thesium L. 538.
alpinum L. 540.
divaricatum Jan. 539.
ebracteatum Hayn. 540.
fulvipes Griessel. 539.
humifusum DC. 539.
humile Vahl. 539.
intermedium Schr. 539.
linophyllum L. 539.
linophyllum Pollich. 539.
montanum Ehrh. 538.
palatinum Rth. 539.
pratense Ehrh. 539.
ramosum Hn. 539.
ramosum fl. cech. 539.
rostratum M. K. 540.
tenuifolium Saut. 540.
Thlaspi L. 59.
alliaceum L. 59.
alpestre Comp. Fl. Belg. 59.
alpestre Gmel. 59.
alpestre L. 59.
alpinum Jcq. 60.
alpinum Schleich. 60.
arvense L. 59.
Bursa pastoris L. 63.
caerulescens Presl. 59.
calaminare Comp. Fl. Belg. 59.
campestre L. 62.
cepeaefolium Koch. 60.
montanum γ. DC. 60.
montanum L. 60.
montanum Pollich. 59.
montanum Scop. 60.
montanum β. praecox DC. 60.
peregrinum L. 64.
peregrinum Scop. 64.
perfoliatum L. 59.
praecox Fl. de Spaa. 59.
praecox Wulf. 59.
procumbens Wallr. 64.
rotundifolium Gd. 60.
saxatile L. 64.
sylvium Gaud. 60.
Thrincia Rth. 358.
hirta DC., Rchb. 358.
hirta Roth. 358.
hispida DC., Rchb. 358.
hispida Roth. 358.
Leysseri DC., Wallr. 358.
maroccana Pers. 358.
tuberosa DC. 358.
Thymelea candida Scop. 537.

THYMELEAE. 536.

Thymus L. 482.
Acinos L. 484.
alpinus L. 484.
angustifolius Pers. 482.
athonicus Bernh. 484.
Thymus Calamintha DC. 484.
Calamintha Scop. 484.
Chamaedrys Fries. 482.
citriodorus Link. 482.
citriodorus Schreb. 482.
collinus M. B. 482.
glabrescens Willd. 482.
grandiflorus Scop. 484.
hirsutus M. B. 483.
inodorus Lej. 482.
lanuginosus Link. 482.
lanuginosus Schk. 482.
Marschallianus Willd. 482.
montanus W. K. 482.
Nepeta Sm. 484.
nummularius M. B. 482.
odoratissimus M. B. 483.
pannonicus All. 482.
pulegioides Lang. 482.
reflexus Lej. 482.
Serpyllum Frs. 482.
Serpyllum L. 482.
Serpyllum Pers. 482.
Serpyllum Rb. 482.
Serpyllum Schreb. 482.
Serpyllum β, γ, δ. L. 482.
subcitratus Schreb. 482.
sylvestris Schreb. 482.
vulgaris L. 482.
Thyrsanthus palustris Schrk. 502.
Thysselinum Hoffm. 262.
angustifolium Rb. 263.
palustre Hffm. 262.
palustre Rb. 263.
Plinii Spreng. 263.
sylvestre Rb. 263.
Tilia L. 114.
corallina Hst. 115.
cordata Mill. 114.
cordifolia Bss. 114.
corylifolia Hst. 115.
europaea Hst. 115.
europaea Sm. 114.
europaea β, γ, δ, ε. L. 114.
grandifolia Ehrh. 114.
grandifolia Hst. 115.
intermedia DC. 114.
intermedia Hst. 115.
latebracteata Hst. 115.
microphylla Willd. 114.
mutabilis Hst. 115.
obliqua Hst. 115.
parviflora Hayn. 114.
parviflora Hst. 115.
pauciflora Hayn. 114.
parvifolia Ehrh. 114.
platyphyllos Scop. 114.
praecox Hst. 115.
pyramidalis Hst. 115.
tenuifolia Hst. 115.

Tilia ulmifolia Scop. 114.
vitifolia Hst. 115.
vulgaris Hayn. 114.

TILIACEAE. 114.

Tillaea L. 220.
aquatica Lmk. 221.
aquatica L. 221.
erecta Sauv. 221.
muscosa L. 220.
prostrata Schk. 221.
rubra Gouan. 221.
Vaillantii Willd. 221.
Tinus tertius Clus. 278.
Tithymalus dulcis Scop. 544.
pilosus Jcq. 545.
Pithyusa Scop. 545. 546.
verrucosus Scp. 545.
Tofieldia Hds. 629.
alpina Hpp. et Stbg. 629.
alpina Sm. 629.
borealis Whlbg. 629.
calyculata Whlbg. 629.
glacialis Gaud. 629.
palustris Sm. 629.
palustris Hds. 629.
palustris Hpp. et Sternb. 629.
palustris *γ.* capitata Hpp. 629.
ramosa Hpp. 629.
sparsiflora Sond. 629.
Tommasinia Bert. 262.
verticillaris Bert. 262.
Tordylium L. 265.
Anthriscus (Jcq.) L. 269.
apulum L. 265.
grandiflorum Mnch. 265.
humile Dsf. 265.
latifolium L. 269.
maximum L. 265.
nodosum L. 270.
officinale Rb. 265.
officinale L. sp. 265.
siifolium Scp. 265.
Torilis Adans. 269.
Anthriscus Gmel. 269.
Anthriscus Gaertn. 272.
helvetica Gmel. 269.
helvetica DC. 270.
heterophylla Guss. 270.
infesta D. fl. 270.
infesta Hoffm. 270.
infesta Rchb. 269.
infesta var. Un. itin. 270.
macrocarpa Grtn. 272.
neglecta R. S. 269.
nodosa Grtn. 270.
trichosperma Sprg. 271.
Tormentilla erecta L. 189.
officinalis Sm. 189.
reptans L. 188.
Tozzia L. 467.
alpina L. 467.
Trachynia distachya Link. 710.
Trachynotia stricta DC. 676.
Trachypogon avenaceus Nees ab Es. 669.
Tragopogon L. 362.
crocifolius L. 363.
Dalechampii L. 362.
floccosus W. K. 363.
hetorospermus Schweig. 363.
major Jcq. 362.
minor Fries. 362.
orientalis L. 363.
picroides L. 362.
porrifolius L. 362.
pratensis L. 362.
pratensis *α.* tortilis Mey. 362.
pratensis *β.* micranthes Wim. 362.
revolutus Schweig. 363.
undulatus Jcq. 362.
undulatus Rb. 363.
undulatum *β.* orientale DC. 363.
Tragus Dsf. 670.
raçemosus Dsf. 670.
Trapa L. 210.
natans L. 211.
Tribulus L. 124.
terrestris L. 124.
Trichera mutabilis Schrad. 294.
Trichodium caninum Schrad. 679.
rupestre Schrd. 679.
Trichocrepis bifida Vis. 373.
Trichonema Ker. 606.
Bulbocodium Ker. 606.
Trientalis L. 501.
europaea L. 501.
Trifolium L. 145.
agrarium Gmel. 153.
agrarium L. 152.
agrarium Pollich. 153.
albidum Retz. 147.
album Lois. 144.
alexandrinum L. 146.
alpestre L. 146.
alpestre *β.* bicolor Rb. 146.
alpinum L. 149.
altissimum Lois. 143.
angulatum W. K. 152.
angustifolium L. 147.
arvense L. 148.
aureum Pollich. 153.
aureum Thuill. 153.
badium Schrb. 152.
Biasolettianum Steud. et Hochst. 150.
Bocconii Savi 148.
Brittingeri Wtwb. 148.
campestre Gm. 153.
campestre Schreb. 153.

Trifolium *cespitosum* Reyn. 151.
cespitosum Sturm. 151.
Cherleri L. 147.
chrysanthum Gd. 153.
dentatum W. K. 143.
elegans Rchb. exc. 151.
elegans Sav. 151.
expansum Kit. 145.
expansum *β.* Rchb. 145.
filiforme L. 153.
filiforme Sm., St. 153.
filiforme *β.* minimum Gaud. 153.
flexuosum Jcq. 146.
fragiferum L. 149.
glareosum Schlch. 151.
glomeratum L. 150.
gracile fl. g. exs. 148.
heterophyllum Lej. 145.
hybridum L. 151.
hybridum Sav. 151.
hybridum *α.* L. 151.
incarnatum L. 147.
irregulare Pour. 147.
Kochianum Hayn. 143.
lappaceum L. 147.
macrorrhizum W. Kit. 143.
maritimum Hds. 147.
medium L. 145.
Melilotus altissimum Gmel. 143.
Melilotus caerulea L. 145.
Melilotus dentata Strm. 143.
Melilotus indica L. 144.
Melilotus indica *γ.* L. 144.
Melilotus indica *δ.* L. 144.
Melilotus officinalis *α.* L. 144.
Melilotus officinalis *β.* L. 144.
Melilotus officinalis *γ.* L. 143.
Michelianum Gaud. 151. 152.
Michelianum Sav. 152.
micranthum Viv. 153.
microphyllum Dsv. 145.
minus Sm. 153.
Molinieri Balb. 147.
montanum L. 150.
multistriatum Koch. 149.
nigrescens Viv. 151.
nivale Sieb. 145.
noricum Wulf. 146.
ochroleucum L. 146.
pallescens Schreb. 151.
pallidum W. K. 145.
palustre W. K. 144.
pannonicum Jcq. 146.
parisiense DC. 153.
parviflorum Ehrh. 150.
patens Schrb. 153.
pensylvanicum Willd. 145.
Petitpierreanum Hayn. 144.
polyanthemum Ten. 151.
pratense L. 145.
Trifolium pratense alpinum Hopp. 145.
pratense sativum Schr. et Hopp. 145.
procumbens L. 153.
procumbens Pollich. 153.
procumbens *β.* Gmel. 153.
procumbens Schreb. 153.
prostratum Bias. 150.
pseudo-procumbens Gmel. 153.
repens L. 150.
resupinatum L. 149.
rigidum Savi. 147.
rubens L. 146.
sativum Rchb. 145.
saxatile All. 148.
scabrum L. 148.
scabrum Schrb. 148.
spadiceum L. 152.
spadiceum Vill. 152.
squarrosum M. B. 147.
squarrosum Sav. 147.
stellatum L. 147.
striatum L. 148.
striatum Strm. 148.
strictum L. 150.
strictum Schreb. 150.
strictum W. K. 150.
subterraneum L. 149.
suffocatum L. 150.
tenuiflorum Ten. 148.
tomentosum L. 149.
vesiculosum Sav. 149.
Triglochin L. 582.
Barrelieri Ls. 582.
maritimum L. 582.
palustre L. 582.
Trigonella L. 142.
caerulea Ser. 145.
corniculata L. 143.
elatior Sm. 143.
Foenum graecum L. 142.
Foenum graecum *β.* L. 143.
gladiata Stev. 143.
monspeliaca L. 143.
prostrata DC. 143.
Trinia Hoffm. 243.
elatior Gaud. 244.
glauca Rchb. 243.
Henningii M. K. 243.
Henningii Hffm. 243.
Hoffmanni M. B. 243.
Kitaibelii M. B. 243.
pumila Rchb. 243.
vulgaris DC. 243.
Triodia R. Br. 693.
decumbens Bv. 693.
Tripleurospermum C. H. Schltz. 326.
inodorum C. H. Schltz. 326.
maritimum Koch. 326.

Tripolium vulgare Nees ab Es. 301.
Trisetum airoides R. S. 692.
alpestre Bv. 692.
Cavanillesii Trin. 693.
distichophyllum Beauv. 692.
flavescens Bv. 692.
phleoides Trin. 686.
praecox Dmrt. 693.
pratense Pers. 692.
splendens Prsl. 692.
tenue R. S. 691.
Triticum L. 714.
acutum DC. 715.
acutum δ. strictum D. fl. 715.
aestivum L. 714.
affine 715.
amyleum Ser. 714.
biflorum Brign. 716.
biunciale All. 703.
bromoides Wahlb. 709.
caespitosum DC. 709.
caninum Schreb. 716.
ciliatum DC. 710.
compositum L. 714.
dicoccum Schreb. 714.
durum Dsf. 714.
elongatum Hst. 715.
farctum Viv. 715.
Festuca DC. 703.
festucoides Bertol. 703.
glaucum Dsf. 715.
gracile DC. 709.
Halleri Viv. 703.
hispanicum Viv. 703.
hordeiforme Hst. 714.
hybernum L. 714.
imbricatum M. B. 716.
intermedium Hst. 715.
junceum Hst. 715.
junceum L. 715.
junceum β. giganteum Roth. 715.
Lachenalii Gmel. 703.
laxum Fries. 715.
littorale Hst. 716.
loliaceum Sm. 695.
monococcum L. 714.
Nardus DC. 703.
phoenicoides DC. 710.
pinnatum β, γ. DC. 709.
pinnatum Moench. 709.
Poa DC. 703.
Poa β. Dub. 703.
polonicum L. 714.
pungens Pers. 716.
repens L. 715.
repens b. maritimum Koch. et Z. 716.
rigidum Schrd. 715.
Rottboella DC. 695.
Spelta L. 714.
Triticum *strictum* Deth. 715.
sylvaticum Mönch. 709.
sylvaticum Salisb. 717.
tenellum L. 703.
tenellum α. Lmk. 703.
tenuiculum Lois. 703.
teretiflorum Wib. 709.
tricoccum Schübl. 714.
turgidum L. 714.
unilaterale L. 703.
unilaterale Vill. 695.
villosum M. B. 714.
violaceum Hrnm. 716.
vulgare Vill. 714.
Trixago Link. 472.
cordifolia Mönch. 491.
latifolia Rb. 472.
Trochiscanthes Koch. 255.
nodiflorus Kch. 255. 267.
Trollius L. 17.
europaeus L. 17.
humilis Crtz. 17.
medius Wender. 17.
minimus Wend. 17.
napellifolius Rp. 17.
Tulipa L. 614.
acutiflora Poir. 614.
Gesneriana 614.
Oculus solis St. Am. 614.
sylvestris L. 614.
Tunica Scop. 81.
arenaria Scop. 86.
prolifera Scop. 82.
Saxifraga Scop. 81.
Turgenia Hoffm. 269.
latifolia Hffm. 269.
multiflora DC. 269.
Turritis L. 33.
alpestris Schlch. 35.
alpina L. 35.
Brassica Leers. 34.
ciliata Schlch. 35.
ciliata Whlbg. 35.
Gerardi Bess. 34.
glabra L. 33.
hirsuta L. Whlbg. 35.
hirsuta c. minor. Vill. 36.
humilis Schlch. 36.
major Wallr. 37.
minor Schlch. 36.
nemorensis Wolf. 34.
patula Ehrh. 34.
pauciflora Prsl. 34.
purpurea Lmk. 34.
Raji Presl. 35.
Raji Vill. 36.
rupestris Hopp. 35.
sagittata Bert. 35.
verna Lmk. 34.
Tussilago L. 299.

Tussilago alba Hopp. 300.
alba L. 300.
alpina L. 299.
alpina β. L. 299.
Cacalia Scop. 298.
discolor Jcq. 299.
Farfara L. 299.
frigida Vill. 300.
hybrida L. 300.
nivea Vill. 300.
paradoxa Rtz. 300.
Petasites Hpp. 299.
Petasites L. 300.
ramosa Hopp. 300.
spuria Retz. 300.
sylvestris Scp. 299.
tomentosa Ehrh. 300.
Typha L. 590.
angustifolia L. 591.
angustifolia Rb. 591.
angustifolia β. L. 591.
elatior a Bngh., Rb. 591.
latifolia L. 591.
minima Hopp. 591.
minor Sm. 591.
Shutleworthii Koch. et Sond. 591.
TYPHACEAE. 590.
Tyrimnus Cass. 342
leucographus Cass. 342.

U.

Udora Nutt. 580.
lithuanica Bss. 580.
occidentalis Pursh. 580.
verticillata Spr. 580.
Ulex L. 130.
europaeus L. 130.
nanus Sm. 130.
provincialis Ls. 130.
Ulmus L. 552.
campestris L. 552.
campestris Sm. 552.
campestris α. latifolia Mey. 552.
campestris β. carpinifolia Mey. 552.
ciliata Ehrh. 553.
effusa Borkh. 553.
effusa Willd. 552.
excelsa Borkh. 552.
glabra Mill. 552.
hollandica Mill. 552.
major Sm. 552.
montana Sm. 552.
nuda Ehrh. 552.
octandra Schk. 553.
racemosa Brkh. 553.
suberosa Ehrh. 552.
tetrandra Schk. 552.
UMBELLIFERAE. 239.
Umbilicus DC. 227.
pendulinus DC. 227.
Urachne parviflora Trin. 682.
virescens Trin. 682.
Urospermum Jss. 362.
Dalechampii Dsf. 362.
picroides Dsf. 362.
Urtica L. 550.
dioica L. 551.
pilulifera L. 550.
urens L. 551.
URTICEAE. 550.
Utricularia L. 500.
Bremii Heer. 501.
intermedia Hayn. 501.
media Schmch. 501.
minor L. 501.
neglecta Lehm. 501.
pulchella Lehm. 501.
vulgaris L. 500.
Uvularia amplexifolia L. 612.

V.

Vaccaria pyramidata Fl. d. Wett. 86.
vulgaris Hst. 86.
VACCINEAE. 411.
Vaccinium L. 411.
intermedium Ruth. 411.
Myrtillus L. 411.
Oxycoccos L. 411.
uliginosum L. 411.
Vitis Idaea L. 411.
Vaillantia DC. 288.
muralis L. 288.
Valantia Aparine L. 283.
Aparine Pollich. 283.
chersonensis Willd. 282.
ciliata Presl. 282.
Cruciata L. 282.
Cruciata Willd. 282.
glabra L. 282.
muralis L. 288.
pedemontana Bellard. 283.
saccharata Gmel. 283.
tricornis Rth. 283.
triflora Lmk. 283.
Valeriana L. 288.
altissima Hrnm. 288.
angustifolia Mill. 289. 290.
angustifolia Tsch. 289.
Cardamines Beck. 289.
celtica L. 290.
collina Wllr. 289.
dioica L. 289.
echinata L. 291.
elongata L. 290.
exaltata Koch. 288.

Valeriana *exaltata* Mik. 288.
intermedia Vhl. 289.
Locusta Engl. Bot. 291.
Locusta olitoria L. 291.
Locusta β. vesicaria L. 292.
Locusta γ. coronata L. 292.
Locusta δ. dentata L. 291.
monandra Vill. 290.
montana L. 289.
multiceps Wllr. 288.
officinalis L. 288.
officinalis St. 289.
officinalis major Koch. 289.
officinalis media Koch. 289.
officinalis minor Koch. 289.
officinalis α. altissima Koch. 288.
officinalis γ. angustifolia Koch. 289.
olitoria Willd. 291.
Phu L. 289.
procurrens Wllr. 289.
repens Hst. 289.
rubra β. L. 290.
saliunca All. 290.
sambucifolia Mik. 289.
saxatilis L. 290.
supina L. 290.
tripteris L. 289.
tuberosa L. 289.

VALERIANEAE. 288.

Valerianella Mönch. 290.
Auricula DC. 292.
carinata Lois. 291.
coronata DC. 292.
dentata DC. 292.
dentata Pollich. 291.
dentata β. mixta Soy. Willmt. 291.
discoidea Loisel. 292.
echinata DC. 291.
eriocarpa Dsv. 291.
hamata Bast. 292.
laxiflora Dufr. 292.
membranacea Lois. 292.
microcarpa L. 291.
mixta Dufr. 291.
Morisonii DC. 291.
Morisonii α. DC. 291.
Morisonii β. lejocarpa DC. 291.
olitoria Mönch. 290.
olitoria β. lasiocarpa Rb. 291.
puberula DC. 291.
pubescens Mer. 291.
pumila DC. 292.
rimosa Bast. 292.
vesicaria Mönch. 292.

Valisneria L. 579.
spiralis L. 579.

Ventenata avenacea Koel. 691.
bromoides Koel. 691.

Veratrum L. 629.
album L. 629.
album A. Gaud. 629.
album α, β. D. fl. 629.
album B. albicans Gaud. 629.
Lobelianum Bernh. 629.
nigrum L. 629.

VERBASCEAE. 442.

Verbascum L. 442.
adulterinum Koch. 445.
album Mill. 443.
Alopecurus Thuill. 443.
ambiguum Lej. 445.
australe Schrad. 442.
austriacum Schrd. 444.
Blattaria L. 444.
blattarioides Gaud. (n. Lmr.) 446.
Chaixi Vill. 444.
collinum Schrd. 445.
condensatum Schrad. 442.
crassifolium Schlch. 443.
cuspidatum Schrad. 442.
elongatum Willd. 442.
floccosum W. K. 443.
gallicum Willd. 444.
incanum Gaud. 443.
lanatum Schrd. 443.
longifolium DC. 443.
Lychnitidi-Blattaria Koch. 446.
Lychnitidi-floccosum Ziz. 445.
Lychnitis L. 443.
Lychnitis β. Schrad. 443.
mixtum Ram. 446.
mixtum Thom. 446.
montanum Schrad. 442.
nemorosum Schrd. 442.
nigro-floccosum Schrd. 445.
nigro-Lychnitis Schied. 446.
nigro-phoeniceum Schltz. 446.
nigro-pulverulentum Sm. 445.
nigrum L. 443.
nigrum γ. ovatum Koch. 446.
nothum Koch. 444.
orientale M. B. 444.
pallidum Nees ab Es. 442.
parisiense Thll. 443.
phlomoides L. 442.
phlomoides Schrd. 442.
phoeniceum L. 444.
Pseudo-Blattaria Schlch. 446.
pulverulentum Sm. 443.
pulverulentum Vill. 445.
ramigerum Schrd. 444.
rubiginosum W. K. 446.
rugulosum Willd. 442.
Schiedeanum Koch. 446.
Schottianum Schrad. 445.
Schraderi Mey. 442.
seminigrum Fries. 445.

Verbascum *sinuatum* L. 443.
speciosum Schrad. 443.
spurium Kch. 444.
thapsiforme Schrd. D. fl. 442.
thapsiformi-floccosum? Koch. 444.
thapsiformi-Lychnitis Schied. M. u. K. 444.
thapsiformi-nigrum Schied. 445.
Thapso-Lychnitis M. et K. 444.
thapso-nigrum Schied. 445.
thapso-phoeniceum? Schrad. 445.
Thapsus L. suec. 442.
Thapsus Mey. 442.
Thapsus Schrd. 442.
Thapsus *α*. Whlbg. 442.
thyrsoideum Hst. 443. 444.
versiflorum Schrd. 445.
virens Hst. 444.
Verbena L. 499.
officinalis L. 499.

VERBENACEAE. 499.

Veronica L. 454.
acinifolia L. 458.
acuta Mart. 457.
agrestis L. 459.
Allionii Vill. 455.
alpina L. 458.
alternifolia Lej. 456. 457.
ambigua Mart. 457.
amethystina Willd. 456.
Anagallis L. 454.
anagalloides Guss. 454.
aphylla L. 455.
aquatica Bernh. 454.
arguta Morett. 457.
arguta Schrd. 456.
arvensis L. 458.
australis Schrd. 457.
austriaca L., M. et K. 455.
Barrelieri Schott. 457.
Beccabunga L. 454.
Bellardi All. 458. 459.
Bellardi Wulf. 459.
bellidioides Wulf. 457.
brevifolia M. B. 456.
Buxbaumii Ten. 459.
canescens Schrd. 457.
Chamaedrys L. 454.
Clusii Schott. 457.
complicata Hoffm. 457.
crenulata Hffm. 456.
crassifolia Kit. 457.
cristata Bernh. 457.
Cymbalaria Bodard. 460.
cymbalariaefolia Schmidt. 459.
cymbalariaefolia Vahl. 460.
dentata Schm. 455.
Veronica depauperata W. K. 455.
didyma Koch. 459.
didyma Ten. 459.
Dillenii Crtz. 458.
elata Hst. 457.
elatior Hst. 457.
filiformis DC. 459.
filiformis Sm. 459.
foliosa W. K. 456.
frutescens Scp. 457.
fruticulosa L. 457.
Gebhardiana Vest. 458.
glabra Schrad. 457.
grossa Mart. 457.
hederaefolia *β*. L. 460.
hederifolia L. 460.
hederifolia Schrk. 460.
hospita D. fl. (M. K.) 459.
hospita *β*. D. fl. 459.
Hostii Hst. 457.
hybrida L. 457.
hybrida M. B. 457.
Jacquini Schtt. 455.
incana L. 457.
integrifolia Schrk. 458.
Lappago Schrk. 460.
latifolia L. 455.
latifolia Scop. 454.
latifolia major Schrad. 456.
latifolia minor Schrad. 456.
laxiflora Lej. 456.
limosa Lej. 454.
longifolia L. 456.
longifolia Schrd. 456.
maritima Schrd. 456.
media Lej. 457.
media Schrad. 457.
montana L. 454.
multifida L. 455.
nana Lmk. 458.
neglecta Schm. 458.
neglecta Vahl. 457.
nitens Hst. 457.
nitida Ehrh. 456.
ocymifolia Thuill. 459.
officinalis L. 454.
opaca Fries. 459.
orchidea Crtz. 457.
pallens Hst. 457.
paludosa 456. 457.
paniculata L. 456.
panormitana Guss. 460.
parmularia Poit. et Turp. 454.
peregrina L. 458.
persica Poir. 459.
persicifolia Schott. 457.
pilocarpa Link. 455.
pilosa Schmidt. 454.
pinnatifida Lmk. 458.
plicata Pohl. 454.

Veronica polita Rchb. 459.
polita Fries. 459.
polyanthos Thuill. 458.
polygonoides Lmk. 459.
polymorpha Willd. 455.
praecox All. 459.
prostrata L. 455.
Pseudo-Chamaedrys Jcq. 456.
pulchella Bast. 459.
pulchella Guss. 459.
pumila All. 458.
pyrenaica All. 455.
romana All. 459.
romana L. 458.
romana Schm. 458.
romana Scop. 459.
rotundifolia Schrk. 458.
saxatilis Jcq. 458.
Schmidtii R. S. 455.
scutellata L. 454.
serpyllifolia L. 458.
spadana Lej. 455.
spicata Auct. 457.
spicata L. 457.
spicata *γ.* Brtl. 457.
spuria L. 456.
spuria Schrad. 456.
spuria Spr. 456.
squamosa Presl. 457.
Sternbergiana Bernh. 457.
succulenta All. 458.
tenella All. 458.
tenella Schm. 454.
tenuifolia M. B. 455.
Teucrium L. 456.
Teucrium Vahl. 456.
trichocarpa R. S. 455.
triphyllos L. 459.
Tournefortii Gmel. 459.
Tournefortii Schm. 455.
urticifolia L. 454.
verna L. 458.
villosa Schrad. 456.
Vesicaria Lmk. 51.
sinuata Poir. 51.
utriculata Lmk. 51.
Viburnum L. 278.
Lantana L. 278.
Opulus L. 278.
Opulus *β.* roseum L. 279.
Tinus L. 278.
Vicia L. 166.
angustifolia Forst. 170.
angustifolia Roth. 170.
angustifolia Sm. 170.
articulata Willd. 172.
Biebersteinii Bess. 170.
bithynica L. 168.
Bobartii Forst. 170.
cassubica Fl. Dan. 167.
Vicia *cassubica* L. 166.
cassubica *β.* Sering. 167.
cordata Wulf. 170.
Cracca Bertol. 168.
Cracca L. 167.
Cracca *β.* Koch. 167.
Cracca II. Gerardi Gaud. 167.
dumetorum L. 167.
Ervilia Willd. 172.
Faba L. 168.
galloprovincialis Poir. 167.
gemella Crtz. 171.
Gerardi DC. 167.
Gerardi Jcq. 166.
gracilis Lois. 171.
grandiflora Scp. 170.
hirsuta Koch. 171.
hirta Balb. 169.
hybrida L. 169.
incana Vill. 167.
Kitaibeliana Rb. 167.
lathyroides L. 170.
lughanensis Schlch. 170.
lutea L. 169.
lutea *β.* pallidiflora DC. 169.
militans Crtz. 167.
monantha Kch., Wlld. 171.
montana v. Frl. 169.
multifida Wllr. 172.
multiflora Pollich. 166.
narbonensis L. 168.
onobrychioides L. 168.
oroboides Wlf. 169.
Orobus DC. 167.
pannonica Jcq. 169.
pannonica *β.* Willd. 169.
peregrina L. 170.
pisiformis L. 166.
polyphylla Dsf. 167.
polyphylla Kch. 168.
polyphylla W. K. 168.
Pseudocracca Bert. 168.
purpurascens DC. 169.
sativa L. 170.
sativa *α.* obovata Ser. 170.
sativa *β*, *δ.* Ser. 170.
segetalis Thll. 170.
sepium L. 169.
sepium *β.* ochroleuca Bass. 169.
serratifolia Jcq. 168.
sordida M. B., W. K. 170.
striata M. B. 169.
sylvatica L. 166.
tenuifolia Rth. 167.
tenuifolia Ten. 168.
tetrasperma Mönch., Koch. 171.
uncinata Rb. 169.
varia Hst. 168.
villosa Roth. 168.
Vicioides uncinata Mönch. 169.

Vilfa glaucescens Presl. 678.
Villarsia Nymphoides Vent. 421.
Vinca L. 420.
acutiflora Bert. 420.
herbacea W. K. 420.
intermedia Tsch. 420.
major L. 420.
minor L. 420.
Viola L. 71.
alba Bess. 72.
Allionii Pio. 73.
alpina Jcq. 77.
ambigua W. K. 72.
angustifolia Schleich. 76.
arenaria DC. 73.
arvensis Murr. 75.
bannatica Kit. 76.
Bertolonii Pio. 76.
biflora L. 75.
Billotii Schltz. 74.
calcarata L. 76.
campestris M. B. 72.
canina DC. 73.
canina L. 73.
canina lucorum Rb. 74.
canina *α*, *β*, *γ*. D. fl. 73.
canina *β*. sylvatica Fries. 73.
canina *β*. Ruppi D. fl. 74.
canina *γ*. Bert. 74.
canina *γ*. montana Fries. 74.
canina *ε*. D. fl. 73.
cenisia L. 76.
collina Bess. 72.
Comollia Mass. 77.
declinata W. K. 76.
epipsila Ldb. 71.
elatior Fries. 74. 75.
ericetorum Schrd. 74.
flavicornis Sm. 74.
glauca M. B. 73.
gracilis Biv. 76.
gracilis fl. graec. 76.
grandiflora Hds. 76.
grandiflora Vill. 76.
heterophylla Bertol. 76.
hirta L. 71.
hirta var. aprica Spr. 73.
Kitaibeliana R. S. 76.
Krockeri R. S. 73.
lactea Rchb. 74.
lactea K. et Z. 75.
lactea Sm. 74.
lancifolia Bess. 74.
lancifolia Thore 74.
lividá Kit., Rchb. 73.
lutea Huds. 76.
lutea Sm. 76.
mirabilis L. 75.
montana Rchb. 74.
montana Roth. 75.
Viola nemoralis Kütz. 74.
nitens Hst. 71.
odorata L. 72.
palustris L. 71.
palustris *β*. Fries. 71.
persicifolia D. fl. 75.
persicifolia Hartm. 74.
persicifolia Roth. 75.
persicifolia Schkr. 74.
pinnata L. 71.
pratensis M. K. 75.
pumila *β*. ericetorum DC. 74.
Riviniana Rb. 73.
rothomagensis Dsf. 76.
rupestris Rb. 73.
rupestris Schm. 73.
Ruppii All. 74.
Ruppii Presl. Koch. 74. 75.
Ruppii Rchb. 74.
saxatilis Schm. 75.
scaturiginosa Wallr. 71.
Schultzii Billot. 74.
sciaphila Koch. 72.
stagnina Kit. 74.
stricta Hornem. 74.
suavis M. B. 73.
sudetica Willd. 76.
sylvestris Lmk. 73.
tricolor L. 75.
uliginosa Schrd. 71.
umbrosa Hopp. 72.
umbrosa Saut. 72.
valderia DC. 77.
valderia Rb. 76.
valderia All. 77.
Zoysii Wlf. 76.
VIOLARIEAE. 71.
Viscago clavata Mönch. 87.
Viscaria purpurea Wim. 92.
Viscum L. 277.
album L. 277.
album *β*. polycoccon Gaud. 277.
Oxycedri DC. 277.
Vitex L. 499.
Agnus Castus L. 499.
Vitis L. 118.
hederacea Willd. 118.
laciniosa L. 118.
sylvestris Gmel. 118.
vinifera L. 118.
Vogelia paniculata Hornem. 66.
sagittata Medic. 66.
Voglera spinosa Fl. d. Wett. 132.
Vulpia bromoides Link. 704.
bromoides Rb. 704.
ciliata Link. 704.
membranacea Link. hort. 703.
myuros Gmel. 704.
Pseudo-myuros Rchb. 704.

Vulpia sciuroides Rb. 704.
uniglumis Rb. 703.

W.

Wahlenbergia Schrad. 410.
Erinus Link. 407.
hederacea Rb. 410.
Waldschmidia Nymphoides Wigg. 421.
Waldsteinia geoides 183.
Weingaertneria canescens Bernh. 688.
Wibelia apargioides Roehl. 367.
chondrilloides Hpp. et Hsch. 376.
taraxacifolia Roehl. 374.
Wiborgia Acmella Roth. 309.
Wiestia virosa C. H. Schltz. 369.
Wiggersia lutea Fl. d. Wett. 169.
sepium Fl. d. Wett. 169.
sylvatica Fl. d. Wett. 166.
Willemetia Neck. 366.
apargioides Cass. 367.
arenaria Mrkl. 523.
hieracioides Monn. 367.
Woodsia R. Brwn. 731.
hyperborea Koch. 731.
ilvensis Bbgt. 731.
ilvensis R. Brwn. 731.
ilvensis β. intermedia Bbgt. 731.
Wulfenia Jcq. 460.
Ageria Sm. 460.
Bonarota Sm. 460.
carinthiaca Jcq. 460.
chamaedryfolia Hst. 460.
lutea Hst. 460.
Wylia australis Hffm. 270.

X.

Xanthium L. 401.
italicum Morett. 401.
macrocarpum DC. 401.
orientale L. 401.
spinosum L. 401.
Xanthium *strumarium* L. 401.
Xeranthemum L. 355.
annuum L. 335.
annuum β. inapertum L. 355.
cylindraceum Sm. 335.
cylindricum Spr. 355.
erectum Presl. 355.
inapertum DC. 355.
inapertum Willd. 355.
radiatum Lmk. 355.

Z.

Zazyntha Trnf. 372.
verrucosa Gaertn. 373.
Zahlbrucknera Rchb. 239.
paradoxa Rb. 239.
Zanichellia L. 588.
gibberosa Rb. 588.
major Bng. 588.
palustris L. 588.
palustris β. pedicellata Whlb. 588.
pedicellata Fries. 588.
pedunculata Rb. 588.
polycarpa Nlt. 588.
repens a Bngh. 588.
Zea L. 668.
Mays L. 668.
Zizia pyrenaica 54.
Zizyphus Tourn. Gaert. 127.
Jujuba Mill. 127.
Paliurus Willd. 127.
sativa Desf. 127.
vulgaris Link. 127.
Zollikoferia apargioides Nees ab Es. 367.
Peltidium Gaud. 367.
Zostera L. 589.
marina L. 589.
nana Roth. 589.
Noltei Hrnm. 589.
uninervis Rb. 589.
uninervis Vahl.? 589.

ZYGOPHYLLEAE. 124.

Druck von Philipp Reclam jun. in Leipzig.