

38/4

D E

CURANDIS HOMINUM MORBIS

E P I T O M E

PRAELECTIONIBUS ACADEMICIS DICATA

AUCTORE

JOANNE PETRO FRANK

SAC. CAES. ET REG. AP. MAJ. A CONSILIIIS MAGISTRATUS
POLITICI ET OECONOM. MEDIOLAN., FACULTATIS ME-
DICAE AC NOSOCOMIORUM PER INSUBRIAM AUSTR.
PRAESIDE, XENODOCHII PAPIENS. AD S. MATH. MODE-
RATORE, THERAPIAE SPEC. ET CLINICES IN TICINENSI
ACADEMIA PROFESSORE P. ET O. ACADEMIAR. REG SCI-
ENTIAR. GOETTING. MANTUANAE. ET ELECT. MOGUNT.
TUM SOCIET. PATRIOT. MEDIOL. ET MEDIC.
HELVET. SODALI.

L I B E R I V.
DE IMPETIGINIBUS.

MANNHEMII MDCCXCIII.

Apud. C. F. Schwan et C. G. Coetz Bibliop, Aut.



38/
4.




DE
CURANDIS IMPETIGINIBUS.
LIBER IV.

DE
CURANDIS IMPRIGINIBUS
LIBER IV

CLASSIS QUARTA.

IMPETIGINES.

GENERALIA DE IMPETIGINIBUS.



§. 369. Magnam efflorescentiae, quas *ex-* Notio.
anthematum sub nomine hucusque (Lib. III.) gener.
delineavimus, cum coeteris affectionibus,
quae humanae cutis levitatem, nitorem, in-
tegritatem deturpant, similitudinem osten-
dunt, et hanc ob rationem mox ab illis,
istarum non incongruens nobis videtur
consideratio. Sed cum exanthemata fe-
brium plerumque castra sequantur, atque
harum divicto furore plerumque dissipen-
tur et ipsa; vel saltem, dum sine febris
auxilio ad cutem illa proruperunt, bre-
viori hic mora divagentur, nec primarium
facile in pelle aegritudinem constituent;
hinc ad aliam certe morborum classem hos
diuturnos cutis humanae affectus referri
oportet; et cum nomen desit, quod illam

satis exprimat, et ab exanthematum familia distinguat; *impetiginum* illud hunc ad finem potissimum, atque cuivis tum generi, tum speciei adaptatum esse censemus. Ad *cachexias* haec classis morborum a Nosologis, ut nos quidem opinamur, sine fundamento demandatur: nec etenim morbi cutanei tam evidenter ex *malo corporis*, ut ajunt, *haaitu* originem ubique sumunt; ut non *localem* saepe, atque cum nullo humorum vitio sociatam offerre aegritudinem cernantur; ac manifesta in multis cachexia, color cutis foedus atque a naturali quamplurimum recedens, immunem ac intactam prorsus in multis pellem esse sinit.

Definitio.

§. 370. Hinc per *impetigines* propriam nos morborum classem intelligimus, quae cum cachectico, ut vocant, habitu frequenter quidem, — sed et sine hoc non raro incidit, ac in diuturnis plerumque cutis aut maculis, aut aspredine, papulis, vesiculis, squamis, fissuris, crustis, aut demum in spontanea integumentorum exulceratione, vel et variis excrescentiis consistit, ac febri, nisi *secundariam*, pro comite sat raro agnoscit.

Ipsa certe exanthemata, cum *chronicam* induere naturam observantur (§. 375.), ad *impetigines* revocari nil impedit; atque non raro illa, dum flore vix non perenni, sine febre, in cute persistunt; in istius magis contextu, quam fluidorum in vitio, originem agnoscunt. Plures quidem morbi cutanei, exanthematum in modum, febrium hinc inde *erisin* efformare, atque evidentem cum istis affinitatem ostendere videntur; sed, praeter illud, quod *impetigines* ad interiora repulsae, febribus non paucis occasionem largiantur, atque, dum naturae, vel artis auxilio ad superficiem revehuntur, non criticum exanthema, sed aegritudinis cutaneae, seu causae febrilis, ad antiquam, ex qua depulsa fuerat, sedem repristinatae nobis specimen exhibeant; diuturna hujus efflorescentiae in cute perseveratio lentusque sine febre progressus, impetiginum ab exanthemate quovis differentiam abunde manifestant.

§. 371. Cum verso sat claram *exanthema*. Doctrinae
tum imaginem quotidiana eorum in febri. ^{obscuritas.}
bus observatio, ac major circa has ipsas
medicorum industria nobis offerant; fatea-

mur opórtet, *impetiginum* illam tam densa oculis hucusque caligne nascondi: ut major eorum, qui de his diffusius egerunt, verborum profusio, difficultates rerum auxisse magis, quam solvisse videatur. Ardui scilicet laboris opus est, morborum tam inconstantium, tam longorum, tamque diversis sub formis in cute luxuriantium fidelis descriptio; atque huic rectius tradendae, *pictorum* potius peniculi, quam, cui colores desunt, scriptorum calamus, pares esse videntur. Quae non immaturí adhuc in cute morbi, ab eo, qui pleno jam flore hanc occupat, aut in eadem jamjam marcescit et excicatur, diversitas observatur!... Quam varius non unius ejusdemque morborum seminis hoc in agro progerminantis aspectus est!... Aut quam sibi similes non causarum, indole sua diversissimarum in corporis superficiem furientium effectus in hac ipsa occurrunt!... Atqui in hoc ipso, tam inconstanti, aegrotantis naturae sermone, latet morborum, qui cuti adcribantur, et causarum, quae illos inducant, in exhausta apud Scriptores multiplicatio, rerumque unius ejusdemque penitus originis atque indolis, pro

diversissimis inter se affectionibus proluxa Nosologorum enumeratio, ac indigesta prorsus nominum confusio.

§. 372. Interim, cum simpliciori *impetiginum* expositioni nos ipsi studemus; non minor nobis causarum, ex quibus illae pendent, obscuritas ac incertitudo obest, atque ea nos potissimum difficultas premit: quod cutaneorum pars magna morborum, aliarum potius affectionum *symptoma*, quam idiopathicam hujus organi aegritudinem constituent. Illae tamen *impetigines secundariae*, exanthematum symptomaticorum vix non observantes naturam, cum primariis cutis affectibus confundi non debent; atque sic integumentorum maculae, echymoses, vesiculae, ac ulcera, quae ex ictero, scorbuto, viscerum infarctu, ex luis venereae viru, ex scrophuloso, aut rheumatico acri, aut alio ex morbo, *secundariae* gignuntur, licet cutem insigniter defoedent; ad istum tamen magis; quam ad *impetiginem primariam* revocanda erunt, ac methodo non alia, quam quae morbo, ex quo pendent conducat, superantur. Hinc minor longe, ac a Nosologis recenseatur, *cutaneorum mor-*

Y. Diver-
sitas.

borum est numerus, atque pars major istorum, calido sub coelo delectatur, ac *endemicam* saepius naturam in istis observat. *Contagiosam* non paucae impetigines, quo solo potissimum dominantur, indolem ostendunt; sed in aliud transvectae, mutata rerum, quae novo incolae favebant, positione, contagium deponunt, atque vel a causis plerumque obscuris eodem sub coelo, sine illo, foventur ac persistunt; aut temporis successu extinguuntur in totum. Aliae tamen impetigines, licet multis eodem in loco communes, ex causis, tamen similibus oriundae, contagio observantur expertes: atque aliae *universam*, quo late patet, cutem adoriuntur; aliae non nisi partem istius, *locales*, invadunt, atque *fixa* ad pellem potiuntur sede; vel ex una in alteram incertae *divagantur*. *Internas* quoque dari impetigines, ex chronicarum inflammationum, quae viscerum superficiem vix penetrant, — ex macularum, phlyctaenarum, papularum, ulcerum superficialium, ex epidermidis, materiae puriformis, ichorosae, per trachaeam, nares, intestina, per urethram, copiose excretorum, — ex aphtharum, acuti licet

morbi, historia, et ex retropressae, ac redeuntis impetiginis externae affectibus, conjicimus. Non rarum est, impetigines sub certis anni temporibus redire; ac in genere tum vere, tum aestate potissimum recurrentibus, cutaneorum abundantior est seges morborum. Alii ex istis, qui tamen vix non ubique ad symptomaticos spectant, *periodice* prorumpunt, ac menstruorum, haemorrhoidumque naturalem aut consuetum typum, *habituales*, fere sequuntur. Quod ad divisionem ex causis petendam spectat, paucae quidem impetigines *primariae* praevium sibi humorum vitium, licet adultae hoc ipsum valeant inducere, necessario exposcunt; ac illarum hinc cura *internis* solícite nimis tentata remediis, plerumque successu frustratur. De *secundaria* aliud dicendum est impetigine; atque licet haec ipsa in *primariam*, longiorem post moram, abire et possit, et soleat; nihilominus princeps in hac *complicata* impetigine pertractanda consideratio medentibus incumbit; atque illa, quae efflorescentiam repellunt; aut exsiccant, sine damno administrari vix queunt. *Haereditariae* impetiginis exempla nobis non pauca occurre-

runt; atque plurimae ex istis, solidorum, seu cutis ex vitio deriventur oportet.

Ipsa vero, quam impetigines in cute sibi eligunt, sedes, non ineptum his in rebus exponendis ordinem nobis suggerit. Aliae nempe ex istis, superficiem quasi lambentes, vix ultra *reticuli mucosi* confines descendunt; aliae, profundius demersae, pellem ipsam exedunt, consumunt. Quodsi utrumque a quavis, aut neglecta aut mala methodo exasperata impetigine perpetretur subinde; est tamen manifestus cuivis ex istis a natura concessus character; quo limites sibi ipsis plerumque ponant, atque nunc modo cutem *maculare*, nunc pellem *depasci*, cribrare, ac in ipsa corii humani substantia pertinaciter nidulari observantur.

Alibi scilicet cutis modo aspectus et nitor a naturali abludunt, ac sine magno tumore, vel aspredine, in eadem *maculae* coloris albi, rubiginosi, lutei, flavi, castanei, cuprei, rubri, brunei, lividi, nigri aut variegati comparent; alibi epidermis indiratur et callet; aut informis luxuriat; vel asperatur, siccescit, finditur, ac in furfures, in squamas, aut majora in frusta secedit, ac affines huic pili, vel ungues

canescunt, finduntur, complicantur, crassescunt, emoriuntur et cadunt. Nunc pellem inter et cuticulam, in ipso retis mucosi contextu expansus humor hydati-
culas, vesiculas, vel acri tenuique, vel puriformi materia praegnantes, inducit; aut vasculorum glomeres atque glandulae sebaceae incenduntur, ac in papulas, pustulas, tubercula, abscessulos mutantur. Nunc demum cutis ipsa, cum subjecta huic adiposa inflammatur, intumescit, tenditur, distrahitur ac dolet; secretionis hoc in organo pervertitur, depravatur opus atque rancidum et infestum huic ipsi virus praeparatur; quo haec tot fibris, nervis, vasisque tam mirifice contexta tela cribri in modum exeditur, perforatur, ac in foedissimum, malignissimumque colliquescit.

Interim non singulos hos cutis affectus, peculiari quemvis tractatu, hic nobis considerandos assumimus; sed qui ex illis, ut *calli, verrucae, clavi, condylomata, excrescentiae coeterae, unguetiviosi; ulcera antiqua*, ad Chirurgiam magis pertinent; hos ista Vobis jam satis exposuit eximia scientia. De *Trichomate*;

singulari, ac *Poloniae* inprimis endemico pilorum morbo, nobis necdum ipsis conspecto, quae alii dixerunt, hic modo repetere, consultum non ducimus; atque sic omnis *impetiginum* materia duos modo in ordines divisa, hoc volumine circumscribetur.

Causae. §. 373. Quae de origine, rationibus, ac differentia *exanthematum* a nobis dicta fuerunt (§§. 274. 275. 276.), ea, si diuturniorem, seu chronicam causarum in peripheriam corporis actionem, vel primariam, vel secundariam, superaddamus, *impetiginum* generationem ac modum in multis illustrant. Multa interim, quae vitiorum cutaneorum naturam respiciunt, hic attentius considerabimus, plurima nos latent, ac futuri solertiam saeculi, — utinam non inanem! expectant. Illorum forte, quae in coeteris animalibus, ac in ipsis plantarum cortice ac foliis contingunt, attentior consideratio, non parum quondam hic lucis accendet. Ex animalibus, minora non pauca, vel ipsam quotannis pellem aut testam, sub manifesto aegritudinis, dato tempore redeuntis, apparatu, abjiciunt, novaque tunica ab ipsa cooperiuntur, non satis intel-

Iecta hoc in opere, natura. Quas plumis haec ornavit, aviculae, quo tempore illas ammittunt, obmutescere illico, solitudinem quaerere, appetitu privari, languere, ac manifeste aegrotare observantur. Sub minoribus turbis, sed non sine praevia et fere simili in pelle mutatione, hybernos belluae ac domestica animalia deponunt crines; atque ipso demum in homine communis est, redeunte vere, epidermidis hinc inde a cute, ac pilorum e capite multorum separatio. Quodsi vero haec annua naturae in pellem operatio diversos in ista morbos explicare non queat; in hoc tamen, quod varia, quae aliis animalium partibus communia haud sunt, in cute contingere demonstrent, a medicis praetervideri non meretur. Pars major morborum arboribus infensorum, primam in cortice, foliorumque externa superficie, ceu vegetabilium cute, originem agnoscit, atque cum illis, quae animalia, — et cur hac in parte patiantur, collata, cutaneorum affectum, istisque medendi scientiam ditabit.

Quae vero utrique viventium classi *Transpir.* praecipue insidiantur, sunt: tum impedita *impedita.* illorum, quae per cutis superficiem, vel

sana, vel morbosa, expelli debuissent, exhalatio, sub epidermide effusio, stagnatio, depravatio, ac multiplex a stimulante hac materia irritatio; tum amplissima *parasitarum* familia, quae, jure quodam dolendo, sed vicissim eheu! Viventibus, a natura imposito, succi vitalis cum labore ab aliis parati avidissima, beneficae sese pelli insinuat, ac, ibidem recepta, hanc ipsam depauperat, corrodit atque devorat.

Immun-
dities. Immundities hinc, frigus sudanti corpori incaute admissum, et quaecunque sensibilissima cutis spiracula constantius obturant, — tum vel communia, vel propria cuivis animalium speciei insecta, non parvam cutaneorum in illis morborum partem sibi vindicant. Alias quidem transpiratio insensibilis, quam quae cum statera aurificis examinari, queant, leges agnoscere videtur; nec homo, socialis vitae puritati renunciens, nec populus a solita nobis munditie alienus, pluribus, adeo gravioribusque cutis subjicitur affectionibus; ut non integrae Nationes contrariis conservandae salutis momentis instructae, corpus omne oleo perfundere, cutisque poros hoc ipso opplere sine damno consuescant.

Ast vero, qui continuo corpus robustum
labbore aut cursu exercent, ac in aura libe-
riori ruralis vitae fruuntur beneficiis, hi
multas morborum causas, quae aliorum
saluti insidiantur, superare, et unius par-
tis functine, alterius defectum supplere
observantur: nec vel spurcissimus aut un-
das semper fugit populus, aut, quo natura
vel pennigerum cogit descendere vulgus,
flumina abhorret. Hinc summa in ordinan-
dis balneis ac thermis tum rituum Sacro-
rum, tum Legislatorum ubique cura fuit
posita; et si forte ob lanarum apud anti-
quos, quam recentiores apud populos,
quibus lintheaminum est copia, majorem
usum, ablutionum urgebat necessitas; fa-
teamur tamen oportet, morbos cutaneos
non paucos ex neglecta corporis munditie,
ex insana mulierum, suspectis faciem jugu-
lumque pigmentis obducenti libidine, et
ex abolito balneorum usu hodiernos apud
homines esse derivandos; ac nullibi impe-
tignes, quam apud plebem mendicam, ac
impurioribus in habitaculis, frequentius
inveniri.

Plura quidem, uti coeteris animalibus, Insecta.
sic et homini molesta sunt, et cutem vel

pungendo, vel proprio, quem isti aspergunt, instillant, succo, irritare, inflammare observantur insecta; sed propria humanae cuti et duplex pediculorum est species: quarum prima, infantibus communior, est *pediculus humanus*, qui caput imprimis, et cutem, — altera, quae pubem, axillas, supercilia inhabitat, ac *peticulus pubis*, seu *morpio* vocatur. Haec ambo insecta, fertilitate insigni instructa, ac impuros apud homines ad incredibilem subinde copiam adaucta, sub epidermide sese insinuando, cutemque subjectam irritando, pruritus continuum, porriginem ac foeda ulcuscula producunt. Qua sub laesae salutis conditione *pediculus humanus* sub universi corporis cuticula, sine impuritatis suscipicione, eam ad copiam generetur, ut existius poris undique ac acervatim prorumpens, *Phthyriasis* graecorum, seu *morbum pedicularem*. Lat. exhibeat; hoc Virorum fide dignorum observationibus confirmatum morbi genus; propria, quae nobis deest, experientia illustrare non possumus. Praeter *pediculos* vero, ac communem aliis quoque animantibus, *pulicem*, *acarus* exulcerans seu *acar*i species, homini, ut videtur, pro-



pria, saltem ex *acari farinarum*, *acari domestici*, aut alterius, extra corpus humanum existentis, acari familia non derivanda, in recentibus illorum, qui *scabiae* aut *psora* infecti sunt: pustulis, ante saeculum in *Italia* reperta, atque tum ab immortalis *Sveco*, tum ab egregio et amico nobis Viro germano nuper confirmata fuit (§. 436.) Ex *musca Leprae*, *Elephantiasis Nigritarum* ab eodem illo historiae naturalis hodiernae parente, discipuli experientia suffulto, derivata est; sed cum in graecorum *Elephantiasi* seu *Arabum lepra*, vermiculum, ut vocant, celebris alter *Goettingae* examinasset, eundem hic in *muscae domesticae* larva ex ejusdem *muscae* ovis, communi ulcerum sorte, huc depositis, oriunda consistere observavit; ac plura certe ex insectis aut simplici escae animalis desiderio; aut ulcerum cutaneorum foetore sub aestivis caloribus potentius allectis, sub cuticula, vel in praesentia nec custodita satis ulcera, tum ovula; tum larvas deponunt: quae loci fotu exclusae, aut vivae, nudam jam cutem irritant et horrendo aspectu infestant.

Vermes.

Sed ex vermium quoque, cum insectis non confundendorum, classe, *Gordius*, tum *aquaticus*, vitulorum, equorum, porcorum etiam pulmonibus aliquando infestus, — tum in primis longissimus interdum *G. Dracunculus*, seu *Vena*, ut dicunt, *Medinensis*, palustrium uterque aquarum incola, tum demum *furia*, ut referunt, *infernalis*, humanam subinde cutem penetrant, ac prope ossa, ad tibias, genua, brachia, quo loco carnes fere desunt, vix unquam ad faciem, tumorem, pruritus intolerabilem, dolores, inflammationem, nisi cautius vermis extrahatur, facile funestam inducunt. In ipsa iterum elephantiasi, quae *Norvegicos* infestat, vermiculus, *Gordios* ac *ascarides* inter medios, quem *Gordium marinum* nunc vocant, et ex frequenti his gentibus piscium marinorum victu derivant, accusatus est. Interim praeter quod vermes animalis unius speciei, cui proprias jam illorum species natura commissit, alterius domicilium vix quaerant, aut in eodem diutius morari non soleant; ulteriorem haec observatio confirmationem meretur; nec ea, quae in parte aegrotante fortuito deteguntur, pro morbi causa haberi mox debent.

In genere dolendum est, historiae naturalis partem illam, quae *parasitica* et fere consanguinae homini animalcula concernit utilisimam licet magisque necessariam, minus tamen, ac alias omnes, quae res nobis non tam vicinas respiciunt, hucusque a multis fuisse excultas. Mirum quidem non est, cum *putretinis* ex fonte minora haec entia Antiquorum derivaret credulitas; majorem illis, quae fortuita putabantur, attentionem non adhibuisse; et cum microscopia deessent: eorum oculos quamplurima, quae nunc admiramur, fugisse; sed a quo tempore et futilis illa de *generatione aequivoca* theoria eviluit, et oculus nova lente armatus novum quasi in vilioris guttula liquoris orbem detexit; parum admodum hac in naturae provincia perlustranda, humana profecit industria; ac si *vermium visceralium* historiam excipiamus, utilitatem Medicina, scientiae naturalis progressibus non est experta aequalem.

Atqui haec eo quidem fine non movemus, ut *pathologiam*, quam *animatam* dixerunt, et qua morborum contagiosorum vix non omnium, ac ipsius demum pestis, causam in subtilissima, visumque fugien-

tia animalcula, — neonatorum vero, atrophiam in *Comedones*, ridicule conjecerunt, ut verisimilem denuo revocare contendamus; sed hoc unum hic nobis concedi optamus: inter causas, quae cutis morbos rebelles hinc inde producant atque exasperent, tum *insecta* quaedam eorumque ovula, larvas, tum *vermes* omnino spectare; atque plures forte, quam nunc, industriae majoris his rebus impensae defectu, suspicemur, *impetiginum* species ex *causis viventibus* originem agnoscere. Plures nunc ad viscera, quam alias credebamus, ac vix non visum fugientes, a nobis ali hospites, fatemur; ignotum forte mundum aliquando in pelle humana quis deteget; ac ignotas fortisan morborum causas propria, alieno semine populata, nobis offeret superficies.

Acria.

Aliae vero morborum causae humanae cuti insidiantur, atque huc *acre* quodcunque ex massa sanguinis hoc in colatorium transvectum, aut in hoc ipso, ignotis secretionis morbosae legibus paratum, pertinet (§. 247.) Summum apud *ictericos* in cute pruritus toties moderari, aut cessare observavimus, quoties sub illo in urinis prius pallidis, aut parum flavis, copiosa

iterum bilis, ac lateritium sedimentum comparerent. Ex assumptis copiosius aut sale, aut aromate conditis cibis, qui impetigine laborant, pruritus in cute majorem, quam sub victu minus acris, patiuntur. Magnum renes inter et cutaneae transpirationis organum, quoad secernendi copiam liquidi, commercium existit; et quemadmodum sub aucto urinarum fluxu, sudores, — ita sub transpirationis incremento, lotii imminuuntur rivi. Sed cum ea, quae per istos e corpore eliminantur, aut eliminanda fuissent, non raro ipsa, per quae fluunt, aut in quibus moram patiuntur, receptacula et canales irritare, inflammare, exulcerare observentur; sic et similes ejusdem causae, cum ad cutem convertitur, effectus esse, omnino oportet. Saepius hinc, cum urina vel cruda magis, vel justo partior per renes excernitur, saturati magis sudores, — aut, si nec hi quidem urinas supplere queant; irritatae cutis phaenomena occurrunt; et quemadmodum apud infantes crusta lactea affectos ea, quae urinarum secretionem adaugent, efflorescentiae non parum detrahare observantur; sic et in senibus, quibus parca est

lotii secretio, non paucae ad cutem molestiae, pruritus continui, herpes, ac ulcerae se manifestant. Magna hinc a lixivio illo, quod per urinas excerni debuisset, ad cutem, renibus affinem, converso, ac ne per hanc quidem rectius excreto, incommoda fluunt; et major; quam solet, dum superficies impetigine defoedatur, urinarum habenda est ratio.

Maxime vero huc acre, quod vel in corpore generatur, vel parentum, jure vel contagio suscipitur, revocandum est: a quo scilicet, valde diverso, ut scrophuloso, nereio, rheumatico, varioloso, etc. impetigines *symptomaticae* complures oriuntur.

Ipsam quidem digestionis opus, quaecunque a sanis adhibentur alimenta, in blandum ac nutrientem chylum convertit; sunt interim, quae, istis commista, huic scopo resistant, ac indolem sibi propriam nec secundis in viis deponant. Huc iterum aromatica, et alia, quae cibis superadduntur, condimenta, vel his ipsis inhaerentia acrioris aut volatilis naturae principia revocentur oportet: ut quae sanguini copiosius, longoque usu remista, nisi sub vita laboriosa continuo diffilentur, arteriosum

non modo systema stimulare, sed et corporis peripheriam inprimis petere, irritare, secretiones hic pervertere, ac lympham, otiosi saltem hominis, subtilili acredine inquinare valebunt. Hinc aut laesa diutius ciborum digestio, aut talium, quae mutari, ac animale in substantiam converti non queunt, — aut quae vel suspecto, vel stimulante principio abundant, commestio, frequentem apud divites inprimis aulicosque homines, quorum palatum alii, quam artificiali ac urenti quasi stimulo non amplius respondet, — vel ipsos apud pauperes, qui corruptis aut carnum aut piscium mytulorum edulium reliquiis, — qui pane ex farina, seminibus suspectis, aut modo alio inquinata, — qui caseo vetusto putrefaeto ac acerrimo, — vel cepis, rapis, ac allio fere solo vescuntur, frequentem utique impegitinum vel maxime rebellium rationem in se continent.

Si quis alius, — hepatis certe liquor, utpote gustum magis feriens, tingendisque partibus prae alio opportunus, inter principales morborum cutaneorum causas, cum *atra* inprimis *bile*, ab Antiquis repositus, et a Recentioribus non paucis hac in po-

Bilis.

tentia nocendi confirmatus est. Quid corrupta in abdomine bilis in producentis exanthematis possit; hoc a nobis ipsis expositum habetur (§§. 274. 290.); sed simul hujus causae fallacias non reticimus (§§. 107. 288.); ac licet cutem a felleo liquore in ictero flavedine obduci videamus; non tamen vel quaevis in pustulis vesiculisque cutaneis contenti humoris flavedo, *de bile, ut causa*, testatur, flavissimas nos, in *Clinico instituto*, ad manuum volas pedumque plantas in scorbutica virgine observavimus maculas: quae instantem alias aegrotanti haemorrhagiam per nares pulmones, supplebant, vel hac insecuta, disparebant: quin vel minimum ad hepar in cadavere defectum conspiceremus; ac in simplici ex cutis contusione echymosi, color partis ex atro in lividum, viridescentem, — tantemque in flavum, *bilis sine culpa*, mutatur. Saepius vix emissos matrum e sinu proles intense per primos a partu dies ubique rubere, et cocti quasi cancri colorem in cutte referre conspeximus: qui, erythemate quasi, ut vocant, coræptae, cutis color, post tres, quatuorve dies, in flavescentem ac fere ictericum

abivit: quin pro bilis id effectum continuo cum aliis haberemus; quod in multis neonatorum ab in assueti contactu aeris in cute sensili ac laxa contingit, ac in ipsius interdum epidermidis desquamationem furfuriam terminatur. Quae vel in sanissimo homine per cantharides exciatur vesica: ea croceo frequentius liquore, sine bilis suspicionem, turget; ac in genere, quae ex coloribus, odoribusque petitur causarum in morbis cognitio: ea falsis plerumque inductionibus fundatur.

Bilem, quae remoram in cystide fellea longam experta est, resorpta parte illius tenuiori, viscidiorum non modo ac tenaciorum reddi; sed et colorem profundiorum ac atrum, singularemque amaritiem, acredinem acquirere; atque interdum non modo vesiculam, hepar ipsum irritare, inflammare, exedere; sed et totum systema nervosum in fatalem homini consensum provocare, aut, in tubum intestinale effusam hanc amurcam, calculorum felleorum matrem, *liquefactae picis* adinstar, hunc ipsum stomachumque obducere, similisque materia vomitum aut dejectionem per alvum, sub horrendis torminibus et cardial-

Atra bilis.

gia, inferre: hoc nemo prudens negabit, atque tum frequens cadaverum sectio, tum instituta nuper ab egregio *Galliae* chymico hujus materiae analysis, abunde demonstrant. Quodsi igitur *atram* hoc ipsum *bilem* vocare velimus; aptius certe, quo morbosae hujus materiae character circumscribatur, nomen non habemus. Sed ob id ipsum, non omne illud, quod, et colore, et tenacitate huic inspissato humori simile, per oesophagum alvumque rejicitur, aut *atra bilis* est, aut ex eadem originem trahit. Nigras saepe faeces et sani deponunt homines; nigro saepius colore ciborum reliquiae ab assumptis medicamentis, vela propria particularum mistura, tinguntur; aut diuturna in abdomine mora nigredinem eadem contrahunt. Nec rarum est sanguinem ad ventriculum, intestina ruentem coagulari, seroque exutum, inspissari, et, quod in vasculum, sani hominis e vena, susceptus, ad pelvis fundum jam facit, colorem atrum, carboni similem, assumere. Atqui has quoque materias, licet atras atque tenaces, *atrae bilis*, ut faciunt, vocabulo insignire, nominum certe abusum sistit, qui majorem in Me-

dicina, quam in alia quavis scientia, noxam inducit. Sed ipsum in vasis suis fluentem sanguinem, dissipatis fluidioribus, crassescere, atque pinguem, magisque terrestrem quasi *faecem* offerre, — tunc vero *humorem atrabilarium*, *succum melancholicum* largiri, — quodsi vero, auctus copia, magisque *adustus* hic humor in partibus haerescat; eundem tunc *atram* iterum nobis *bilem* offerre, docuit Antiquitas, ac Recentiorum denuo scholae hinc inde defendunt. *Lienem* inprimis, ac renes succenturiatos seu *capsulas atrabilarias*, ut *atrae bilis* *culinam*, illa consideravit; similisque materiae officinam in venae portae systemate non pauci ponunt; ex qua, tum flavus ac cachecticus ille hominum melancholicorum aspectus, tum variae cutis maculae, — et ab aucta, atque per sanguinem diffusa *atrae bilis* *acredine*, vasculorum cutaneorum erosiones, ulcera maligna, cutisque gangraenam derivant.

Subtilius certe, quam in rebus medicis conducat, et ab fornacem excogitata magis haec de *atra bile* in sanguine generatae ac fermentantis theoria est. Nec etenim cruor per vasa circulans, sicut jus in ahenis

spissescit, et sine novi ac recentis liquidi affluxu in rancidam condensatur gelatinam; nec naturae subsidia desunt, quibus aut recenti imperato potu, aut moderatis suppressisque tenuiorum excretionibus, aut demum resorpto ex athmosphaera liquido, nimiam spissitudinem avertat. Quocunque salutis sub statu vix emissus cruor naturalem fluiditatem ostendit, atque pro varia rerum accidentalium conditione, lentius, citiusque condensatur; et quae forte contraria in siccis, melancholicisque hominibus, aut sub febre inflammatoria, instituta referuntur experimenta: ea cum sanissimo non minus, quam cum alio sanguine; nunc sic, nunc aliter, inconstanti successus, ac ab externis conditionibus pendente lege, contingunt (§. 125.) In varicibus ultra modum distentis cruorem colligi, ac forte aegrius moveri, non vero prius, nisi dempto vasorum lumine, coire, docent enormes ex illarum ruptura sequentes hemorrhagiae, fluidique sanguinis in vicina loca effusio. Cessante vero in venis fluxu quod ex umbilicalium aliorumque vasorum historia patet, inclusus cruor, tenuiori portione resorpta, sine ullo

corruptionis signo condensatur, ac in duriorē massam brevi temporis intervallo solidescit.

Ex his igitur apparet, ex fonte bilioso cutem quidem hinc inde, aut per consensum affici, aut infenso humore inundari; sed saepius a medicis impetiginum culpam in hepar insons reponi; atque uberiores certe causarum, quae in cutem invehant, numerum; et diversam admodum earundem naturam existere.

Ac revera, ipsa jam *impetiginum* cum *exanthematis* affinitas (§. 369.), atque nervorum tam evidens in ista imperium (§§. 274. 276.), *nervosam* in multis illarum originem sine dubio manifestant. Vel *aucta* scilicet praeter modum in cute sensibilitas, — vel istius, a consueta impressionum perceptione *aberratio*, — vel demum *imminuta* nervorum cutaneorum sentiendi potestas, variorum in cute phoenomenorum, in chronicis non minus, quam in acutis affectibus, rationem, intellectu licet difficilem, sat tamen apertam, in se continent,

Nerv.
actio.

Major certe in aetate infantili, ac in sexu foemineo, quam alia quavis sub vitae periodo, et quam in sexu potiori, est cutis

Sensibilitas
nimia.

teneritudo ac sensibilitas. Atqui sub hac ipsa, major utique morbosarum ad corporis superficiem adfectionum conspicitur numerus, et causarum minorum promptior est ac certior in cutem effectus. Sanissimae genitricis e sinu vix exclusa, sanissima licet, proles, cutis tamen, jam primis vitae mensibus, non paucis saepe laborat affectibus: capillata pars omnis calvariae mox squamis crustosis, prurientibus obtegitur; post aures epidermis separatur, ac foetida, copiosa sanies exesa e cute per menses destillat; aphthosis oris cavum ulceribus obsidetur in istis; facies in aliis, vesiculis sero flavo repletis, atque, crusta, quam *lacteam* dixere, defoedatur, multisque achoris et favi, et tinea prorumpunt. Cutis, inter plicas, ad collum, axillas, ad inguina et nates erosa, ichorem plorat: ac magna pustularum, papularum miliformium, rubrarum, in corpusculi superficie copia florescit. Crassos quidem hucusque viscidosque in pueris humores, ac acidam, aut aliam in istis acrimoniam, tantorum ut fontem malorum, accusant; sed in multis certe alia istorum, quam in *cutis sensibilitate morbosa*, non subest ratio: ac perperam ad

dulcificantia, evacuantia hic non raro recurrimus remedia. Nec etenim, si tanta jam fluidorum labes homuncionem tene-
ret, vel sola natura huic superandae tam saepe sufficeret; vel sola matrum solertia, ac frequens cutis tenerae cum frigida ablutio, aut balneum, in avertendis his cutis affectibus jam tanta praestarent; nec hi ipsi *dentitionis* sub opere, prout faciunt, continuo augerentur, aut liberae hucusque proli, sub hoc majoris irritationis statu, copiose succrescerent; aut delicatulos magis, quam alios, aequali coeterum sanitate instructos, aggrederentur infantes.

Vel ipsi adulti, inprimis puellae, quibus teneram ac albissimam pellem, oculos coeruleos, flavamque, aut ex flavo ruffam indulsit natura comam, vel a simplici radiorum solis verni actione jam maculis notantur, et quasi uruntur ad cutem; vel solius aurae rudioris afflatu jam epidermide spoliantur. Apud mulieres teneriores; ipsa jam conceptio defoedat faciem, ac maculas, quas modo partus abluit, ad cutem inducit. Puerperii potissimum tempore, debilior tunc sensiliorque foemina in miliare exanthema est pronior (§. 324.), atque

ab isto, in chronicam efflorescentiam converso, nonnunquam per annos obsidetur. Qui cute sensiliori cinguntur: illi vel animino aurae frigidioris afflactu erysipelate labarant; et ipse vestium, quibus superficiem ab atmosphaerae injuriis solícite nimis defendimus, abusus, ac major ab isto ad cutem inducta mollities, non parvam impetiginum, quae pellem humanam prae alia defoedant, rationem in se continet. Nec minor est animi pathematum, transpirationis in opere pervertendo, in bilis regurgitatione promovenda, ac in excitanda sensibilitate ad superficiem corporis morbosa, potentia. Vel solus terror fortis jam pilos in cute erigit, juvenisque comam, si vera sunt, quae referunt, vel temporis momento, in senis illam seu niveam convertit. Qui anxio res suas animo considerant, hi post aures pruritum experiri ac scalpere proverbio dicuntur. Ex nervorum magis, quam ab acredinis actione, chloroticarum, ac multorum, qui febre intermittente detinentur, ulcuscula et crustas ad genas, labra, aliisque in partibus, corroborantium remediorum effectum proficuo inducti, derivamus. Qui ingratum

cute insectum ex alio se suscepisse verentur; hi, etiamsi hoc desit, ad universam pellis superficiem pruritus persentiunt, et cum partem cutis unam, ob istum, vel sanus homo scalpit: in altera, vicina, vel ex solo consensu, scalpendi necessitatem persentit. Ipsae, cum cutis prurit, scalpendi voluptas, et, cum haec negatur, singularis anxietas, nervorum in superficie imperium ostendunt.

Sunt, qui ob cutis sensilitatem non tam auctam, quam a communi abludentem, vel a rerum innocentissimarum contactu, ab emplastri simplicis, aut blandi linimenti actione, jam pustulis, ac erysipelate ad cutem tententur. Sunt, qui a contusione, laesione quavis levissima, mox diuturna hunc ad locum ulcera, sola cutis, non humorum ex culpa, patiantur; ac apud multos, in chronicis etiam morbis, uti frigoris, sic et caloris extremi in pelle sola, sensum a thermometro negari, et in perverso nervorum cutis affectu consistere observamus. Hinc in tabe, in Phthisi, ardores genarum, volarum, plantarum, corporis sine aestu majori, aegrotis tam molesti, — hinc volatilis illi in hypochon-

Sensibil.
perversa.

driacis, hystericis, ad cutem ignes, ac adustionis non modo sensus; sed et quasi effectus (§. 359.); — hinc parva verticis in plaga apud histericas, glaciei aut nivis liquefactae, ibi haerentis perceptio, hoc ex perverso sensationis principio descendunt, ac impetigines non paucas hoc ex morbooso cutis statu derivari oportet.

Sensibil.
imminuta.

Sed et *imminutam* nervorum hac in parte potenciam similes effectus habere, sine dubio asserimus. Tactus certe sensus, ac diversa ab isto, seu communis sensibilitas, per cutis superficiem universam extensa, mutationibus non paucis, ad quas sad raro respicimus, subjiciuntur; et ex infracta, vel penitus delata nervorum in pellem actione, quamplurima, quae hucusque non satis examinata fuerunt, phoenomena in morbis dependent. Nec ista, ex longinquo semper nervorum, aut cerebri ipsius errore, ut in apoplecticis affectibus, originem symptomatice agnoscunt; sed ad solam interdum cutis pulpam nervosam spectare observantur, ac in parte agendi ac sentiendi inertiam manifestant. Hanc ipsam non modo jam sola epidermidis per labores inducta densitas, aut in cute cica-

trix, — sed et diuturna ejusdem compressio, extensio, frigus nimium, aut plurimus sub pelle collectus adeps, vel serosus latex, vel tumor subcutaneus, inducunt. Ea ipsa vere, quae superficiei humanae nervis vel ab intus, vel exterius admoven-
tur, potissimum huc spectant. Saepe ex alluente, aut in athmosphaera humida uliginosa, contenta, — vel sub morbis in pellem deposita, ac praecipue nervosam ejusdem potentiam obtundente materia, tum exanthemata (§. 276.), et gangraenae (§. 130.), tum impetigines, seu maculae, vitilligines, sensu quovis destitutae (§§. 452. 455.) oriuntur. Ipsi sudores, qui vel in debilioribus sine causa majore, vel in fortissimo quovis homine, vaporis in balneo, vel demum in aegrotis sub lipothymia, in moribundis, tam profusi prorumpunt: non sanguinis ex vitio, sed ob imminutam vasorum cutis resistentiam exstillant. Hanc vasorum in cute debilitatem et quasi paralysin, in aliis contagia, miasmata, venena, ac inimica nervis materia, inducunt, atque in *febris nervosis* (§§. 80. — 88.), in *Elode* (§. 85.), in perniciosa, quam *diaphoreticam* appellant (§. 35.), febre, tum

continuus ille, aut colliquativus sudor, tum echymoses, maculae, ac alia quaecunque cutis defoedatio, ex nervorum cutaneorum tenore per causas aut universo corpori, aut solis forte integumentis inhaerentes infracto oriuntur. Non aliter externa, quae dolores sopiunt, spasmosque sedant, ex opio, plantisque narcoticis, stupefacientibus, composita remedia in cutis nervos operantur; ac sicut organa gustos, odoris, ac visus in provectae aetatis hominibus labescunt; ita tactus, et quaevis cutaneorum nervorum sensibilitas, a pellis regiditate senili obsolent, ac impetiginum variarum fundamenta in illa ponuntur. Ex fracta nervorum, et, quibus vitam conciliant, vasorum, in scorbuto potentia, tot maculae aegrotantium superficiem contaminant; ac non paucae echymoses, ex eadem ratione, in hydrope provecto ad cutem comparent.

Contagia. *Contagiorum* in pellem humanum actio vel ex ipsa jam *exanthematum* elucet historia (Lib. III.), ac sola *impetiginum* cum illis affinitas, communem in multis originem, in utraque morborum classe, satis prodit. In quo interim haec *contagia* consistant; hoc a

nobis ignorari fatentes (§. 92.), fatemur simul, nos circa impetiginum, quas contagiosas dicimus, causam proximam non minus coecutire. Nec magis dubiis hinc inde caret ipsa his in affectibus contagiorum praesentia; ac mutua inter cives morborum propagatio, sicut fomiti ex uno istorum, in alterum transeunti deberi, — ita cauae ejusdem, in omnes simul agentis effectus esse potest. Hinc non paucae de morborum contagiis actae sunt inter medicos lites: quas *insitionis* nequidem; tam valido, ut credunt multi, argumento, satis direptas dolemus. Quodsi enim, cutaneorum saltem morborum, quod rationi non adeo repugnat, respectu, ex *vivis* seminibus, ac visum fugientibus animalculis aegritudinum penderet communicatio: haec vitalis morborum, ac saepe mortis humanae causa, cum liquore, quem sanis inserimus, non minus, quam contagia, a nobis posset *inoculari*; atque si cum adulta jam atque *exsiccata* prorsus, quod de *variolis* notum est, hoc opus aequae, ac cum recenti Pure, absolvi concedatur materia; *animalculorum* tamen *infusoriorum*, ut vocant, historia, et continuata, post exsiccationem

corpusculi, vitalis istius potentia, huic quoque non impar foret solvendo enigmati. Fatemur interim, nos morborum, contagio celebrium, qui interna non minus, quam superficiem affligunt, qui ex ista, recentis licet, percussi, difficiles ac diuturnos viscerum affectus relinquunt, — qui, post longas demum moras, ad cutem iterum emolumento expelli, ac istorum sic crisin constituere queunt, non facile *vivas* intelligere causas; atque ipsa, quae febribus non paucis praesunt, — quae veneream luem, jam sanato cutis ulcere, sine novo fomite, per annos continuant, quae blennorrhoeam, — quae, post multos a morsu canis rabiosi menses, hydrophobiam inducunt, *contagia*, insectorum in his necessitatem ac verisimilitudinem omnino excludunt. Alia vero contagia in solammodo pellem, — alia, in coeteras quoque partes, ac in corporis compagem universam operari cernuntur. Greges ovium integras a scabie infectas, sed alias perfecte valentes, et quarum carnes hominum saluti nec minimum obsint, in provinciis haud paucis observamus; ac ipsa, quae hominem infestant psora, pluresque species impetigi-

num aliae, nisi in longum protractae, praeter cutem, nil offendere videntur.

Ad impetiginum causas, et *plethoram*, tam *Plethora* universalem, quam potissimum *cutaneam* *cutanea*. referre, nequidquam haesitamus. Qua scilicet aetate major humoribus in cute molliori vasorum patet numerus, — qua corporis amoenius floret undique superficies, — qua magis grato haec et aequaliori calore fovetur, qua candita magis facies vel a sola verecundia rapidissimo velut ab igne accenditur: hac etiam promptior ad pellem cruoris affluxus, uberior perspirabilis ex eodem humoris secretio, atque major ad *plethoram cutaneam* dispositio, quam vestimentis calidioribus, longo mollioris lecti tepore, sudoriferis, spirituosius, volatilibus remediis, ac balneorum tepidorum abusu; non raro augemus, concurrunt. Vel a sola venaesectionis, aut haemorrhagiae, quibus adsuevimus, defectu, universalem in cute pruritum persentimus; ad hic ipse, quo lecti calore fovetur corpus, tempore, in succiplenis hominibus, ac in quavis impetiginum specie, plus minus, augetur. Frequentissime hanc *artificialem impetiginem*, qua tam vane gloriantur

tur thermarum non pauci medici, in illis *Marchionatus Badensis* observavimus; novimusque sanum ac plethoricum juvenem, qui fervidiores has aquas, per brevissimum licet tempus, incaute ingressus, mox quatuordecim, aut plures, in pelle furunculos expertus est. Copiosas ad e lescentes succipleni, aut qui liquoribus spirituosus indulgent, vel necessario corporis exercitio destituuntur, ad frontem pustulas, — et, quibus menstrua aut difficilius, aut parcius, quam par est; prorumpunt, puellae, efflorescentiam, vel periodicam, vel constantem in facie patiuntur. Insignes saepe, quibus narium haemorrhagia, aut quibus haemorrhoides instant, circa nares, ad ani confinia, pruritus accusant; ac periculosa pulmonum plethora, futuram haemoptysin, ac tussim excitante in bronchiis, trachaea, titillatione afficiuntur; quae singula, demonstrant: sensationem ingratham, calorem, ardorem, pruritum, sanguinis, humoris serosi, lymphatici sub epidermide stasin, non istorum ubique vitia, sed frequenter abundantiam, aut veram, aut spuriam, vel difficilem significare per vasa cutis progressum.

Calor.

Ipse vero, qui in cutem potentius dirigitur, *calor externus*, non exiguam impetiginum partem generare observatur. Quibus hiberno sub gelu vicinius assidemus, flammae hae largas, lividas, ac diuturnas in pelle maculas inducunt; et a suspecto carbonum accensorum igne, quem, ne flammis faciei nitorem inquinet, sexus sequior sub cruribus tunc nascondit, non foedas modo in istis maculas, sed plurasibi ad uterum mala adsciscit. Ipsa vero *solis actio*, non *caloris* modo, sed *proprios*, nec satis intellectos, effectus producit. Quamvis enim atrum Aethiopum colorem ex peculiari reticuli mucosi constitutione magis ac ab unico solis ardore, derivandum esse arbitremur; est tamen manifesta istius, non modo in cute profundius tingenda vis et actio; sed in ipsis solis radiis, ac varia, qua in pellem incidunt, directione, latet ignota, nec a sola locorum positione determinanda, potestas. In genere quidem quo calidiori sub coelo vivitur; eo major morborum cutaneorum est ratio; sed illa siccitatis in athmosphaera majoris, minoris, — illa, qua solis radii a vicinis corporibus reflectuntur, — ventorum de-

rum, habitationum, vitae generis, vestimentorumque ratio, hos effectus frequenter immutat. Alia quoque incommoda, ex solius diversitate fabricae: cutem Aethiopis, alia nostram, tenere videntur; sed donec fidelis ac diuturna; quemvis apud Populum instituta, observatio, noctem, qua res istae involvuntur, dissipaverit: impetiginum accuratior historia a mortaliū nemine expectabitur. Quis nempe; experientia destitutus, ex sola *Insubriae* positione et causarum, quibus subijcitur, communium cenfluxu, ad morbi tot ruralium strage infamis, seu *Pellagrae*, ut vocant, hac in parte felici terrarum praesentiam concluderet? Quis radiorum solis, *Insubros* longe minus ac alios *meridionalis Italiae* Populos urentium, in expositam sibi cutem tam manifestam ac simul tam obscuram actionem, et producendi hac in parte, non in alia. Erysipelatis periodice redeuntis, chronici atque maligni potentiam, ex physicae Geographiae rationibus praediceret? . . . Atque, licet *interna* nimis hoc in morbo urgeant symptomata, atque, dissipato jam Erysipelate, haec ipsa frequentius continuent, quam ut eundem ad *im-*

petiginum classem prudenter referre queamus; est tamen sat evidens radii solaris verni in accendendo apud praedispositos *Insubriae* agricultores tam flebili morbo effectus, ut in illo, solius ratio *caloris* nostrorum nemini Medicorum satisfaciat. Sed plura, quae aeris a sole calefacti in corpus humanum effectus concernunt, non minus nos latent. Nec etenim solus flante ab *Africae* littoribus vento, athmosphaerae calor, sed *nervis* inimica, et sub alio vento a majori solis ardore non observanda, nec thermometro determinanda, illus conditio, nostras, vel media sub hieme, vires inopinato prosternit, ac febris quasi malignae adventum praenunciat. Nec *aestivorum morborum*, licet hi caloris intensitatem fere sequantur, sub eodem tamen athmosphaerae aestu diversorum, causis ex manifestis semper caloris in animalia vel haec, vel illa, effectibus explicare valemus.

Sed, quae cutem calidiori sub coelo affligunt, aegritudines, hae forte non solis adeo in illam actioni, quam *secretionis cutaneae* a colore incitatae, mutationi morbosae debentur. *Inflammationis* in pervertendis, qui sub eadem separantur, humoribus, aucto-

ritatem exposuimus (§. 121.); sed et sudor abundans, quo continuo inundatur, ac fere maceratur pellis, istius contextum aggreditur, tenorem infringit, sensibilitatem adauget. Vel sanissimi hominis sudor ad pedes, axillas, sub aestivis caloribus, — non ob humorum, ut putant, in sanis corporibus non admittendam, corruptionem; sed, vel ob auctam in folliculis cutaneis, qui suum sudori liquorem commiscent ac proprium odorem conciliant, vel ob mutatam exhalantium vasorum in liquidum perspirabile potentiam, — foetore majori infestatur. Quam scilicet morbosa sanorum; si hic, vel oris foetor, ex sanguine corrupto scaturiret, massae circulantis conditio, — et quam infelix hominum illorum, optime licet valentium, status foret, qui, vel hiberno sub frigore, ob peculiarem constitutionem, intolerabilem ex faucibus, axillis, aut pedibus odorem spargunt! Quantum non foetoris ex ulcere cutaneo a causa externa non ita pridem generato, continuo, et sine morbi interni suspicionem, spirat cujus in sanguine principium non haeret? In ipso hinc secretionis cutaneae ictu, illud, quod acredine, quod

foetore obest, in multis generatur, ac major humorum in pellem sudoribus perpetuo madentem appulsus, facilisque illorum, ab occlusis vel levi etiam frigore cutis ostiis, stagnatio, aut in vicinum rete mucosum effusio, hanc pellis admorbosas secretionem dispositionem, atque ipsas demum impetigines non paucas, aestatis tempore, inducunt. Ipse jam sudor, licet parvus, morbus tamen est; ac vasa, quae, praesente illius causa, hunc per extrema oscula expellere non possunt: lateraliter ac per poros, ut vocant, inorganicos, vel inter cuticulam ab rete mucosum, vel inter istud et cutem, vel demum in arctam istius cellularem, eundem, aut purum, innocentem, aut, si major cutis stimulus accedat, excretionis legibus morbosae submissum, et acrem, irritantem, effundunt: atque nunc pruritum majorem, nunc maculas, nunc vesiculas sero limpido, vel turbido liquore repletas, nunc pustulas, atque phymata, vel abscessulos, in corporis superficie, squamis saepe arescente, inducunt.

Interdum ex causis allatis nulla subesse, sed ex primario atque *congenito*; nec expli-

Impet.
congen.
haered.

cando cutis vitio originem habere impetigines videntur. Saepius per *haereditatem* ex parentibus in proles tam infelix scaturit dispositio: ac visae sunt familiae, — aliae, quae, perfecta in coeteris valetudine instructae, excrescentias tamen in cute, aut maculas, in quavis prole easdem offerebant; — aliae, quae impetigines simul cum vita ex istis miserabili in filios, licet modo non eodem viventes, propagabant. Quas ex utero matris deformitates, huic ipsi non proprias, ferunt neonati; has facile praegnantis *imaginationi*, ac denegatae gravidis rei desideratae, cui forma similes esse interpretantur, impressioni adscribunt, et cum in cute vitium subsistit, *naevi materni* nomine salutant; sed cum hanc quidem rerum originem ob validas rationes admittere recusamus; verisimilem tamen aliam, quae parentum non modo imaginem ac lineamenta, sed et certos partium defectus in prolem transfundat, licet experientia de his testetur, proponere aequimus. Interim solidorum magis compagi, ad parentum similitudinem, lege nobis ignota, in filios ex utero transvectae, quam fluidorum in isto cum prole commercio, *congenitorum vi-*

tiorum originem, ac haereditatem morbosam adscribere jubent copiosae prolium sanissimarum ex matre infecta genitarum historiae, ac *tardissima* in multis, et ad certam usque vitae periodum dilata, haereditariae aegritudinis manifestatio. Atque in hac certe, tam obscura, natura lege, *dispositionis* illius *cutaneae*, qua, sine causis manifestis, ac sine humoris morborum praevii in massa sanguinis contenti auxilio, stato fere tempore impetigines in una eademque familia eadem in cute efflorescunt, latet impene- trabile hominibus mysterium.

§. 374. Causarum, quae impetigines pro- Prognosis.
ducunt, diversitas, prompta illarum cogni-
tio, ac temporis, quo cutis laborat, lon-
gitudinis, aegrotantis aetas, coeli conditio,
efflorescentiae in coeterum corpus ac in
viscera effectus: — cutaneorum malorum
pericula et curae difficultates determinant.
In genere cuius diuturnae per cutem ex-
cretionis, tum sano in corpore, a causis
externis nascenti, tum solidorum, fluido-
rum ex vitio oriundae, facile tandem na-
tura assuescit, ac, si incaute hic fluxus sup-
primatur; nunc ob retentae materiae mor-

bosae actionem interioribus insidiosam, nunc ob *habitudinis interruptae* pericula, a nervorum, ut videtur, imperio derivanda, innumerae hominibus minitantur miseriae; atque ars medici saepe major in iudicio, *num* praesens cutis vitium exstirpari *conveniat*, quam in promptiori ejusdem sanatione, consistit. Sed vel sub locali prorsus, ac solius pellis a vitio pendente impetigine, si diutius continuaverit; vel a resorpto quotidie ac in sanguinem deducto ichore, vel ob functionis cutaneae defectum, subvertitur sanitas: ita ut, quam sub initio absque internis, curare licuisset aegritudinem remediis; hanc, infecta jam jam humorum massa, externis modo auxiliis tractare sine damno nequeamus. Interim per longum interdum tempus naturae viribus internae partes ab infectione defenduntur, et sub variis impetiginum speciebus, quod miremur, sanitas non modo seros in annos illaesa persistit; sed quaedam quasi ab aliis morbis *immunitas*, sic affectis concedi videtur. Quae *crisis* alterius aegritudinis constituunt impetigines; has caute externis tractare lex esto! Sed quemadmodum febres ipsae frequentius ex illis,

quam impetigines ex febribus, oriuntur: sic, ne, quae istarum forte causa fuerunt morbi pro effectu habeantur et curari differantur, oportet. Major vero hic medentis requiritur perspicacia, eo quod ab instante non minus, quam a praesente jam febre, impetigines non raro promptissime *dispareant*, et sic morbum, quem modo *praenunciarunt*, fecisse videantur. Ipse etiam, qui impetigines praecessit, morbus, quin semper ad cutem quid morbosum deposuerit, mutationem in ista, efflorescentiis faventem, ac morbosas secretiones, inducere valebit: quae singula, iudicii his de rebus fallacias, — et cur Empyricis audacter his in morbis militantibus, cautioris interdum medici tentamina superare concedatur, ostendunt. Quae per *haereditatem* acquiruntur impetigines, aut certa in easdem dispositio: hae, solidorum, non vero contagii forte cogniti, innixae vitio, radicatus auferri vix unquam possunt. Similis *congenitas* difficiles premit impetigines; ac si pellis universa in morbosas excretiones hac lege inclinet; exsiccato in una cutis plaga istarum fonte: in altera mox eadem repullulant. Locale, seu ad parvam modo

integumentorum regionem restrictum vitium, *extirpationem* subinde admittit; sed exempla non desunt, ubi institutae aegre tantem poenituit curae; ac, lege nobis haud perspecta, vel mediocris, ut vocant, *naevi* sectionem incommoda secuta sunt insignia. Quae pubertatis ante tempus in cute contingerunt: ea, hac vitae revoluta periodo, maturiori sub aetate sponte nonnunquam disparent. Senilis impetigines aetatis, nisi a causis externis inductae, curationem difficulter, si unquam, admittunt, atque indies exasperasae sub extremis cruciatibus, ad mortem usque persistunt. Similis impetiginum universalium multarum, quae per plures jam annos superficie roserunt, exitus observatur; ac lenta febris, et tabes tandem, quod superest virium vitalium, consumunt.

Cura prophylactica.

§. 375. Pars vitae major ab animalibus, quae cutem pilis aut plumis a natura ornata tenuerunt, in illa ab impuritatibus mundanda, et ab inimicis insectis defendenda consumitur; atque ad mutuas has inter viventia pugnas, sua quivis arma concessa fuerunt. Quo haec non pertingunt,

illinc rudior corporis ad lapidem, vel ad arborem affrictus, aut balneum, nunc vicino a flumine, nunc a subtiliori arena subministratum, in auxilium vocatur; ac si haec aggressoris insecti non deludant insidias: tunc inutiles animal in furias raptum, vel escam illius, vel nidum, et quasi ovarium constituit. Si tamen has externas impetiginum causas excipiamus; vix tantis coetera animalia, ac humanum genus, ad cutem aerumnis laborant. Etsi nempe hoc ipsum, tum vestimentis ex pellibus animalium vel alia e materia consutis, tum manuum mobilissimarum beneficio, insectorum ausus a cute propria, fere nuda, facilius avertat; pars tamen causarum (§. 373.) hominem longe major, ac alia animalia, tangit; et quam insectis praedam subtrahere conatur, hanc coeteris impetiginum occasionibus quotidie exponit.

Primum igitur in cute ab impetiginum causis praeservanda curationis momentum consistit. Has maxime illa avertunt, quae hominis superficiem contra nimias a parvo stimulo impressiones, vel a *sensibilitate morbosae*, defendant; et quae robur cutis sustentare, nimiamque tum molitiem, tum ri-

ginitatem in eadem impedire valeant. Ab ipsa quidem totius corporis sanitate haec potissimum pendent: sed matura cutis cum atmosphaerae impressionibus consuetudo, frequens infantum in frigidam immersio, quotidiana cum hac ipsa superficie abstersio, et moderata frictio, vestium calidiorum, comprimentium depositio quamplurima hic praestant.

Hac ipsa jam methodo munditiei necessariae satisfacimus praeceptis. Haec scilicet tam cutem ipsam, quam illa, quae huic admoventur, concernunt. Unctuosa illa, quae nascentes obducit, materia, ut facilius abluatur, tepidam praeter aquam, alia, quae utramque combinent, requirit. Similes fere illorum, quae pellem impregnant, aut conspurcant, et in adultis et conditio: et ut rectius cum aqua uniantur, saponem interdum, ac illius teporem exposcunt. Summa hinc balneorum tum frigidorum, tum calidorum in quavis civitate est necessitas, ac istorum institutio, in calidis praecipue regionibus, non exiguam Magistratus curam sibi quondam promeruit, ac eandem sibi hodie apud omnes meretur. Nec etenim sola cutis mundities in censum

hic venit; sed repentina, ac saepius repetita frigidae in nervos, non modo cutis, sed omnes, ac in vasa singula, actio, — transpirationis insensibilis, ac resorptionis restauratio, augmentum, — ipsa corri humani humectatio ac jucunda pertractatio, hujus subsidii naturalis beneficia multiplicant.

Ipsa vero cutis puritas ab illa linteaminum, quae hanc involvunt, at a vestium munditiae quamplurimum pendent. Frequens hinc istorum, pauperioribus eheu! nimis denegata, permutatio, atmosphaerae, in qua vegetamus, ac habitationum sollicita purificatio, ad cutis integritatem summopere contribuunt.

Maxime fere interest, in prima jam hominis aetate, caput pueri, quod impetiginis tot speciebus exponitur, non modo sensim sensimque atmosphaerae mutationibus assuesceri; sed capillos quoque frequentius tondi, et a nimio sic humorum affluxu non minus, quam a pediculorum caterva inimica liberari.

Sic et ab alimentorum, potuumque tepidorum, ac illorum, quae principio volatili, aut acriori in cutem prae aliis ten-

dunt, abusu abstinendum est. Ipsa jam potentiorum calidorum in stomachum actio, digestionis, a quo cutis integritas non parum pendet, infringit officium; et ista non minus, quam spirituosae, aromaticae, acridae, volatilia, quemadmodum sudorem facile sollicitant: sic et plenitudini cutaneae, et morborum hac in parte secretionibus favere observantur. Non tam stricte interim haec sumenda sunt, ut non contrarii subinde calefacientium effectus in calidis regionibus ab experientia suggerantur. Vel sub coeli non tam ardentis caloribus aestivis, superadditum frigidae spiritus Vini paulillum, eorum, qui sub sole labores pertractant, et sitim, et sudores egregie moderatur. Aromaticum, quibus Africae Asiaeque populi solis aestu vexati utuntur, copia, languenti stomacho non parum conducit, ac nimios forte in illis sudores coercet. Ast vero condimentorum tam acridum frequentiori sub usu, a potu calido, quo ista magis ad cutem diriguntur, prorsus abstinent hae gentes, in frigidam quotidie descendunt: quibus auxiliis ac celeriori stimulantis materiae per cutem diffusione, noxii condimentorum in cutem moderantur effectus.

Oleo superficiem, quod Antiquis in usu fuit, frequentius perfundi, et cutem strigili, qua longe patet, perfricari, ad potiora, licet neglecta, hanc a morbis praeservandi auxilia pertinet. Ipsa jam natura ab innumeris cutis folliculis sebum, quo necessariae ejusdem flexibilitas ac mollities obtineretur, secerni jussit; et ab aucto corporis partiumque motu, hoc smegma majori ex illis copia exprimitur, frictionem imminuit, ac siccitatem, rigiditatem avertit. Sub aetate juvenili hoc oleum animale in cute abundat, et ad loca, quae pellem aut cartilagini aut ossibus superimpositam agnoscunt, copiosior illius proventus, ac pinguis splendensque integumentorum habitus observatur. Apud adultos, senes, atmosphaerae calidiori expositos, aut continuo exercitio exhaustos homines, siccitas, induratur cutis, ac non modo vasa exhalantia quamplurima, sed et folliculorum sebaceorum, ut videtur, ductus obliterantur, ac functionum hoc in organo pars major languescit. Hinc omnes fere Africae populi in cute cum oleo, aut pinguedine animali pertractanda continuo versantur; atque per hanc propria superfi-

ciei curam, non tam nimios sudores, quam cutis exsiccationem, asperitatem, lentamque phlogosin, ac demum inimica insecta avertere, experientia didicerunt. Hinc senum inprimis, hominumque adustorum seu macilentorum superficiem non exigua ex oleo beneficia expectant; atque cum hujus sub usu praesentes jam impetigines non paucas illico disparere videmus: hoc saepe, non tam effectibus, quam istotium causis, resistendo, ab unctionibus praestatur. In conservanda pilorum, qui caput ornant copia, pulchritudine, vis magna in adipe, quo calvariam quotidie ungunt, habetur; ac pars magna virtutum, quas linimentorum, unguentorumque in profundiores partium affectus penetranti adscribimus essicaciae, ex superficiali protinus illorum in cutem actione derivanda videtur.

Potissimum vero in dirigendo *secretionum* opere, sanitatis, tum corporis universi, tum illius, quae cutem concernit, ponitur momentum. Prima quidem ex illis ea est. quae, insensibilis sub specie vaporis, per cutem absolvitur: et hujus integritas ab allatis non minus rationibus, quam a pro-

vido vestimentorum usu, a corporis exercitio, a ventriculi, et ab animi pathematum regimine quammaxime pendet. Sed et aliarum secretionum, atque excretionum, tum naturalium, ut urinae; bilis, lactis, seminis, inprimis vero illius, quae per uterum periodice absolvitur, — tum morbosarum quidem, sed ex causarum latentium ac habitudinis lege fluentium, ut haemorrhoidum, haemorrhagiae narium, fonticulorum ac ulcerum, non minor est auctoritas; et recto istarum moderamine cutis nitor ac sanitas praecipue conservatur.

Praecipuum vero impetiginum curandarum in eo haeret punctum: ut, quae causa has produxit, quam citissime eruatur, atque haec ipsa, priusquam morbosae secretionis consuetudinem cutis ineat (§. 374.), quanto cyus extirpatur. Quodsi nimirum in hominibus perfecta in coeteris salute instructis, ab *externis* laesionibus, ab insectis, a contagio, velsolius modo cutis actione morbosa, impetigines oriantur: *internis certe tempus terendum non erit remediis*; et sicut vanus istorum usus esse consuevit: ita promptioris procrastinatio auxillii, prae-

Cura
general.

ter majores tandem impetiginis auferendae difficultates ipsius quasi necessitatem mali saepissime inducit. Si causa forte *interna* cutis morbo subfuerit: tunc omnis primum attentio in *iliam* convertenda, ac impetigo, ut alterius *symptoma* morbi, ad leges huic proprias, vel salutaris interdum ut crisis, tractanda est. Non raro interim, qui profundiores agnovit originem, non tamen internis in totum cedit, morbus cutaneus, atque vel continuato istorum usu exasperatur; vel locale tandem, sive externum sibi auxilium, ut sanetur, exposcit.

Magnae interim his in rebus difficultates medentem premunt. Morbosa saepe hominum dispositio ac latens in lymphæ vitium, non prius, quam accedente læsione ad cutem violenta, vel contagie, evolvi, atque tunc non aliis comitari symptomatis observatur; quam quae vel in sanissimis corporibus, ob majorem modo partis affectae sensibilitatem, simplicissimum subinde cutis vulnusculum sequantur. Atqui cum, hoc ultimo in casu, externa promptissime aegrotis conducant remedia; in illo certe, ob complicatam læsionis cutaneae, licet satis recentis, natu-

ram, cum damno subministrantur. Sic octogenarii nobis exemplum viri occurrit, qui, cum perfecta omnino salute, pro aetate, frueretur, contusionem ad tibiam, et exhinc ulcus molestum expertus est. Per sex modo hebdomadas hoc ipsum, sine alio sanitatis detrimento, abunde fluxerat: cum impatiens morbi senex, consilio chirurgi, exsiccantia medicamenta, — dum vero haec non prodessent, fasciam constringentem adhibuit: atque hac incauta sub methodo, paucarum modo dierum intervallo apoplecticus expiravit. Qui diathesi scrophulosa, aut scorbutica laborant, his superaccedens forte, externa ab origine, psora, nisi citius auferatur, mox complicatum, nec solis amplius externis, sine periculo, dissipandum cutis morbum accersit; atque sic nec recens satis impetigo mox, quovis in casu, sine praeviae constitutionis examine percuranda erit; nec ea semper, quam profundius latentis causae comitari signa videntur, internis ideo subsidiis indigebit.

Alteram in curandis cutis affectibus difficultatem, *remediorum internorum*, quae propria his virtute opponantur, *inopia con-*

Int. remed.
incertitud.

stituit. Quodsi nempe symptomaticas; easque non multas, excipiamus impetigines, quas *specificas*, ut ajunt, methodo per interna dissipari medicamenta conceditur; in coeteras, vix ulli tam certum est, ut externis illae carrere queant, remedio imperium. Actionem prae aliis manifestam, sub debita atmosphaerae conditione, antimonialia, refractis dosibus porrecta, in cutem ostendunt; sed ipsa haec virtus partim ex longinquo magis abdominales in nervos effectu, quam ex *specificis*, ut vocant, stibii in pellem actione pendere, nec aut istius secretionem morbosam, aut latens in humoribus vitium corrigere videtur. Quae principio subtiliori atque aromatico instructa, cordis, vasorumque vires intendunt, ac simul nervis amica sunt remedia, sales volatiles, olea aetherea: haec equidem, tepidis inprimis, praeter atmosphaeram, potulentis, aut balneo, fomentatione locali, suffulta, sudoris, quem promovent, testimonio, prae coeteris ad cutem appellant; atque tum aquae thermalis, sulphureae, tum evolutum ex ipso sulphure principium, ad hanc usque potentius penetrare videntur: sed peculiaris, aut *specificas*, ut

appellant, virtus, paucis, quod sciamus, ex istis concessa est, et laudata toties *dulcificantium, involventium, corrigentium, viperarum, lacertarum viridium, lignorum, sarsaparillae, solani scandentis aliorumque* actio, impetiginum aliquid vix detrahit ferociae. Sic et acidorum mineralium usus, non alia, quam quod nimiam haec irritabilitatem infringant, ratione impetigines, quae cum *suppuratione* incedunt, moderare dicendus est. Mercurialia, efflorescentias cutaneas; nisi veneram forte indolem agnoscant, vix mutare observantur. Quae alvum, aut urinam potentius movendi virtute instruuntur; ea, sicut vasorum lymphaticorum actionem indendunt, ac stagnantis ad pellem acris resorptionem secundant: ita impetigines exsiccare, aut e superficie protinus dissipare cernuntur; sed aut nec causas istarum satis auferunt; aut, si hoc praestent, abdominalem ac symptomaticam potius illae, nec secundas ad vias extensam, originem habuere.

Quodsi vero istorum per experientiam quotidianam confirmata sit veritas; fatendum tamen est: aut paucas certe alias, quam *symptomaticas; et criticas*, solis internis

superari remediis impetigines, aut, si contra *primarios* cutis affectus interdum ista quid possint vix alia, quam complicationis causarum ratione, et actione *secundaria* id ipsum efficere.

Externa
remedia.

Alia omnino remediorum, quae corpori *exterius* applicantur, contra impetigines *primarias* est auctoritas; ac licet istarum non paucae illis modo pertinaciter resistant, modo cum damno totius dissipentur; hoc tamen vel tardiores topicorum ob usum, ac dilatatum jam ad interiora vitium, vel ob neglectas in cura morbi habitudinis leges, sic evenire consuevit.

Externa vero, quae ad impetigines *primarias* adhibenda sunt, remedia, licet odioso *repellentium* sub titulo vix non omnia veniant; non sola tamen adstringentium ex classe, sed, pro variis illarum indole ac causis, nunc ex illis, quae cutem humectant ac emolliunt, nunc exsiccantium, stupefacientium e numero, nunc ex familia excitantium, roborantium repetuntur, ac multorum ex istis ad solam corporis peripheriam non limitantur officia. Vel salivae solius externo usu impetigines haud raro dissipantur, ac animalia, quae cum lingua

attingere queunt, cutis ulcera lambendo sanant; nec ideo, quod de succi gastrici, a saliva vix distincti, virtute expectant, hoc vel istius, vel *aquae simplicis* ac purioris superabit efficaciam. Sordidissima crurum cutisque ulcera in *thermis*, quae saepe vix majori, quam ista, virtute pollent, sanari conspiciamus, et a solo recenter mactati animalis, cui, ut balneo, partem herpete affectam committimus, vapore, hunc di *Balnearum.* sparuis se experientia commonstrat. Sub majori cutis ab impetigine tensione, ac rosionis quasi sensu, mucilaginoso certe magis, ac emolliens fomentatio, nec non balnea tam simplicia, quam cum lacte commista atque tepida conveniunt; et ab istis non modo symptomata sedantur; sed ipsam hinc inde efflorescentiam dissipari observamus.

Qua demum agendi ratione *oleosa* et pin- *Pinguium.* guia, dum cuti inunguntur, impetigines tam saepe ex ista dispellant, ignoramus, sed partem certe remediorum, quae contra efflorescentias cutaneas vix non omnes a vulgo adhibentur, principalem, oleum pingue constituit: a quo, non modo rancido, sed etiam recente atque blandissimo,

impetigines, saepe nimis cum summo aegrotantium damno ad superficiem disparent. Ipsa certe, quae sub unctione adhibetur, frictio, licet vasorum, nervorum cutis actionem abhinc excitari fateamur, hos effectus non explicat; et poros ab oleo, ut plures defendunt, obturari, experientia populorum refutatur (§. 373.). Quodsi cutaneorum pars major affectuum ab *insectis* nasceretur; non difficiles tunc foret, actionis, quam oleum, his animal culis infensissimum, in hanc morbi causam exerceret, explicatio; nisi altera, ex curationis effectu tot aegrotis funesto, difficultas reluctaret. Sed et ista disparebit, si cutis morbos, qui *symptomatice* prorumpunt, aut quibus, ob adultam secretionis morbosae indolem, natura jam *adsuevit*, aut a quibus forte jam aliquod in lympham vitium redundavit, a *primariis*, nec vetustis efflorescentiis separare velimus: ut in quibus, aut vivens, aut inanimis earundem supponatur origo, oleosorum frequenter utilissima esse solet applicatio. An forsitan relaxatis per pingua integumentorum fibris, tum istarum, tum vasorum, nervorum, quae morbosae secretioni praefiguntur, sedantur motus,

ac, sicut ab effuso super procellosas maris undas oleo placantur aquae, ita partium, quae cutem constituunt, frenantur impetus? .. an haerens in cute acrimonia oleosis involvitur, nervorumque obtunditur sensibilitas? . . . an tristes aliquando pinguium, aliorumque externorum in *primaria* licet impetigine, effectus a suppressis quidem in cute, sed ad viscera transvectis solidorum turbis, ac sicut violentos hominis convulsi motus per fascias sistendo, ad interna hos ipsos augemus: ita ab irritatione a superficie corporis aversa, majores partium internarum agitationes excitantur? . . . Ast, quaecunque his subsit effectibus ratio; certum tamen est, innumeras a pinguibas impetigines *primarias* medicinam habere, methodique istius non ex remedium natura, sed ex perversa eorum applicatione, infamiam venisse.

Summos quoque *sulphur* exterius adhibi- Sulphuris:
tum in varias impetigines imperium exercet: quod, licet partem et pingua, quibus illud plerumque commiscetur, habeant; ex cognitis tamen vel illius, vel istorum qualitatibus, nisi ubique iterum insecta pro morbi causa statuuntur, explicare ne-

quimus. Ipse quidem sulphuris, vel hepatis, ut vocant, sub forma, vel cum adipe remixti foetor, principii, cutem, ac vasa inhalantia penetrantis praesentiam testatur; ex cujus in illam actione, hujus remedii effectus interpretari viderentur; sed, sicut ex *psorae*, seu scabiei, per sulphur curatione apparet, non hanc, sed peculiarem illius, in viventem morbi causam agentem, virtutem hos effectus producere: ita; cum idem remedium et in aliis quibusdam impetiginum speciebus prodesse observamus, ad eandem et in istis causae viventis traheremur suppositionem: nisi argumentorum, quae solo remediorum effectu nituntur, in causarum mobosarum indagine fallacias nosceremus.

Plumbi. Conspicuos in cutem effectus edit *plumbum*: cujus tamen copiosae praeparationes ad omni fere aevo ad impetigines adhibitae non aequali ubivis ratione operari videntur. Salis certe sub forma, acidisque saturatus, *Saturnus*, adstringentem in solida potentiam exercet; sed aut oleo, muco animali remixta, aut pulveris sub specie adhibita, et a vapore cutaneo ex parte soluta calx plumbi, tam fortiter vix partes, ut

contenta repellant, aut ab istis infarciantur, strangulentur, constringit. Aliud vero hoc in metallo continetur, quod nervis blandiatur quidem, sed, vaporis potissimum sub forma his admotum, insidias saepe struat, ac, dirissimis ad inetstina excitatis cruciatibus, vitalem in extremitatibus potentiam frequenter extinguat, principium. *Sedantem* interim in plumbum exterius adhibido virtutem experientia testatur, atque hoc magis, quam alio, impetigines *primarias* non paucas dissipari, ac radicatus interdum sanari, lubentur fatemur. Ex insidioso plumbi principio a vasis lymphaticis ad cutem resorpto, internorum stragem complures verentur: ac certe tristes impetiginum plumbeis tractatarum, qui illorum ab istis aversionem explicent, non desunt exitus; sed cum hi ipsi, in *secundariae* potissimum impetiginis speciebus, aliorum non minus sub usu remediorum occurrant, ac certum, quo nocivi plumbeorum effectus ab aliis distinguantur, signum non existat, hinc facile injustum his de rebus fertur iudicium, ac summa rei dignitas, ne insons forte et non parva agendi potentia instructum, criminis damnetur.

remedium, nobis cautelam injungit. Certe non omne, quod interno usu sanitatem laedit, — hoc, extus admotum, cessat esse remedium; nec idem semper a re eadem, vel ore, vel corporis superficie suscepta, in hominem effectus obtinetur. Aliorum nos quidem, prout decet, experientiam veneramur; sed si nostram simul, certe non paucam, hoc de argumento consulamus; fatemur, nos plumbeorum externo ab usu, quotiescunque haec nobis indicata videbantur, non semper quidem bonos, sed nec tam flebiles, ac multi recensent, effectus observasse.

Mercuralia-
lium,

Salium quoque *mercuralium* celebris in multas, diversas licet a venereis, impetigines est actio: et in illis, vel aqua solutis, vel unguento receptis, istarum non paucae medicinam agnoscunt. Nec tamen adeo in fluida, quam in solida agendo, mercurium, ut qui ore assumptus, in impetiginem, sub media licet salivatione, saepe non agit, hic operari censemus; ac singularis et hujus medicamenti in necandis insectis potentia, *viventem* impetiginum plurimarum causam iterum confirmaret: nisi *excitante* magis, aut caustica interdum, quam alia in pellem virtute hoc idem,

saltem in multis impetiginum speciebus, operari videretur.

Optimos interdum ex *malis balneo* in mor- Sallum
bis cutaneis effectus experimur: atque ab coct.
illius virtute tum stimulante, tum simul,
ob undae frigus, roborante, morbosa cu-
tis actio mutari, ac languens diu transpi-
rationis opus excitari, promoveri videtur.
Sed et *acidorum* tum vegetabilium, tum mi-
neralium, cum aqua communi dilutorum,
quin ipsius adeo *urinae*, non raro conspicua,
ac forte similis maris balneo, ad abigendas
imdetigines est virtus.

Nec vanae ubique sunt laudes multo- ob orant.
rum quae cutem manifesto condensant, adstring.
adstringunt, ac orientem ex vasorum debili-
tate humorum impetum non minus, quam
sensibilitatis excessum a parte aegrotante
avertunt. Hinc solo *fasciarum* usu non pau-
ca crurum ulcera radicitus auferuntur; ac
ipsum jam atmosphaere *frigus*, aut cutis
cum aqua frigida fomentatio, nunc meliori,
nunc pessimo sub rerum eventu, efflo-
rescentias coercescit. Eadem est tum alumi-
nis, tum vitrioli albi, cupreorum, saccha-
rique saturni conditio: ut quae singula,
nisi rectius indicata, atque vel in sympto-

matica, vel jam in consuetudinem deducta impetigine, aegrotantis quidem interitum; sed sub attenta causarum indagine, soloque cutis sub vitio, sanationem promovebunt.

**Escharo-
ticor.**

Ea ipsa interdum, quae fortiori cutem stimulo exasperant, alienum in eadem motum excitare, ac morbosam in pellis particula secretionem invertere, delere valebunt. Hinc tum cantharidum, ipsi, quem impetigo defoedat, loco applicatio, — tum escharoticorum, ipsiusque ignis, aut solaris aut artificialis, in ulcus, ejus superficiem consumit, atque corrigit, actio, antiquas non raro impetigines perfecte sanarunt.

**Vegetabi-
lium.**

Quae vero in cutem impetigine correptam, manifestam satis actionem exercent, aut amara, aut acria, vel et stupefaciente, ac sedante instructa principio vegetabilia; ea, sicut morborum, qui ab insectis oriuntur, causae viventi resistant; ita solidorum in cute actionem, vel augendo, vel deprimendo, immutare videntur. Hinc summos ex seminum Delphinii satphisagriae, Sabadillae, Apii petrosellini, ex Hellebori nigri, Ledi palustris; Nicotianae tabaci, Cicutae virosae, Veratri albi, Menispermii cocculi, Juniperi sabinæ, etc.

externo usu, in cutem vitiatam effectus observamus; et sicut alia prorsus medicamentorum, cum extus applicantur, quam cum ore hauriuntur, in hominem est actio: ita optandum foret, ut, qua ratione potentiora ex illis vel solam in pellem, tam sanam, quam aegrotantem, vel in universum systema operentur, experimentis sat fidis innostesceret.

Quemadmodum vero ex suppressa sanguinis evacuatione aut naturali, aut in habitudinem conversa, — vel et sine hac causa, ex peculiari vasorum cutaneorum plenitudine impetigines interdum gignuntur (§. 373.): sic non infrequens in curandis cutis affectibus tum venaesectionis, tum scarificationum necessitas occurrit. Jam ipse cutis irritatae pruritus aut dolor, affluxum sanguinis vel in illis adeo impetiginum speciebus, quae ex cruoris abundantia originem non habent, ad pellem in multis adauget; ac spasmodica hac in parte contractio facilem humorum circuitum in eadem impedire non raro videtur. Hinc major saepe in cutis affectibus, quam ab inexpertis crederetur, cucurbitularum scarificatarum observatur utilitas, atque tam

V. S. et
scarificat.

importunum hae ad peripheriam pruritum, quam facilem ab externis remediis, quae cutem roborant ac vel minime coarctant, phlogosin, his praemissae avertunt.

Fontical.

Maxima in morbis cutaneis, quos tandem externis tractare coguntur, in *ulcera artificialia, setacea, fonticulos* multorum collocatur fiducia; ac desumpto ex hydraulici argumento, quam illinc aquarum obturare scaturiginem, — hanc, excavata in carnibus fossa, humiliorem ac declivem ad locum derivare nituntur. Ast vero, quem sibi forte natura locum, quo peccantem expellat materiam, hac in parte eligit: hunc ab arte, in aliam, quo lubet, transferri, tam facile non sinit; nec sola pellis incisio, et excitata, cum peregrino, quod huic committunt, corpore, ejusdem exulceratio, conditionem, sub qua noxius illinc humor fluebat, novo fonti ubique concedit. Jam dictum est, frequentius solidorum; quam fluidorum e vitio impetigines oriri (§. 373.); ac si ille, qui ex fonticulis quotidie distillat, humor, et manifestam prodere acrimoniam, et foetorem intolerabilem spargere observatur; hoc ipsum in sano non minus, quam aegrotante

in corpore contingit; atque insignem iterum cutis laesae aut irritate in contentos humores, sub ipso, quo hos secernit, actu, pervertendos, potestatem ostendit. Non alius certe, quam qui per singula humani corporis vasa circumfertur, liquor ex artificiali integumentorum apertura utplurimum expellitur; sed inflammata, vel exulcerata istius superficies peregrinum ab illo, qui in vasis agitatur, humorem sibi prae-
paret: cujus excretio saepe non aliter, quam si fluidorum quid forte abundet, ad sanitatem conferre, — saepe vero praesentem jam machinae debilitatem augere, irritationem vicinis partibus infensam communicare, aut resorpto intendum, has ad oras corrupto, liquore, internis obesse observatur. Quae ex clausis incaute his, diuturno jam fluxu confirmatis, ulceribus propullulant, lethalia non paucis, infortunia; haec saepius non tam ob retentam in sanguine acrimoniam, quam ob infractas cum impetu *consuetudinis*, quae altera natura est, leges, in hominem redundant, ac impetiginis cujusvis primariae quidem, sed jam inveteratae, sequuntur pericula (§. 374.).

Summos interim setaceorum, fonticulorum in medicina usus, quos sola ratio non satis explicat, experientia persaepe confirmat; atque sub cutis ipsius forte magis, quam partium profundiorum sub affectibus, conspicuam artificialia haec ulcera virtutem, non paucos apud homines manifestant. Non ipsis adeo in vasorum canalibus, quam in cellulosa, quae istos, nervosque cutis, — aut quae hanc ipsam cum musculis ac ossibus colligat, acrimoniae colliguntur et stagnant. Atqui, ut ex *anasarca* hydrope docemur, ad inflictum cuti vulnusculum, non modo vasculorum, quae in hoc ipsum hiant, sed cellulosae vicinae diriguntur ac continuo destillant humores; atque sic pellis infarctae depletio, ac irritantis ex cretio materiae per praescriptum ab arte colatorium obtineri, impetiginisque symptomaticae causa breviori via eliminari e corpore potest. Profundius, quam primo quidem aspectu crederetur, hoc beneficium descendere: ex summo fonticulorum in *cyphosi* propespinam positorum effectu, — ex artificialis in nervosa, ut ajunt, ischiade ulceris prope poplitem virtute, — et ex

moxae, in rheumate pertinaci actione comparet; atque si forte ob excitatem magis in parte sana inflammationem, quam ob peccantis excretionem materiae, haec ulcera prosint; fatendum tamen est, in hoc ipso, illud, quod impetiginum sub cura quaeramus, consistere; et quocunque demum haec ulcera modo operentur; secretionem tamen in superficie morbosam ad parvum saepe ac circumscriptum ab arte ulcus limitari, ac stimuli prius incogniti indolem in cogniti illam, seu in simplicem fonticuli phlogosin atque supurationem permutari.

Non vana hinc ulcerum artificialium in affectuum cutaneorum medela ubique dicenda est theoria; atque tum in *symptomata* impetigine, quae, priusquam morbi fomes extinguere valeat, externum sibi promptumque auxilium aliquando exposcit, — tum in primario quidem, sed *inveterato* cutis vitio, fonticulus in vicina impetigini parte, et antequam spontanea ac morbosa in cute secretio supprimatur, excitatus, ad potiora securitatis majoris ac desideratae sanationis momenta referendus est. Non tamen igitur, fonte licet novo ad cutem

vix aperto, impetuosa nimis antiqui vitii curatio suscipienda, aut naturaliam excretionum negligenda sunt subsidia; sed fluxu ulceris jam satis confirmato, et abactis, in quantum hoc licet, morbi causis, a mitioribus initium faciendum, et ad fortiora gradatim ascendendum est.

Quod vero de ulceris artificialis ab impetigine ipsa, quam forte, alias tam rebellem, sine alterius auxilio remedii exsicavit, differentia testatur, est summa illius, licet jam vetusti, ad *spontaneam* sanationem dispositio, ac diversa multum ab impetigine in cicatricem prefectam promptitudo. In eo quidem utrumque mali genus conspirat: quod ex praepostera fonticuli non minus, quam ex incauta impetiginis suppressione, ob dictas jam alibi rationes, non exiguae sanitati ac vitae struantur insidiae; sed praeter haec, aequalia sibi, pericula, singularis ab impetigine provecta remediis opponitur resistentia: quae reducto in fonticulum cutis vitio, vel ab ipsa, quovis certe ulcere facilius, superatur natura. Major scilicet in pelle non in totum soluta, sed ad superficiem modo, vel ad dimidiam quasi substantiam, ab im-

petigine distracta, erosa, et inaequaliter lacerata, irritatio occurrit; atque difficilior humoris iniqui in cellulas cuti subjectas simul effusi, per corium impervium, quam per ulcus hoc ipsum penetrans, expectabitur separatio. Nec ideo tam *perpetua* sunt, ut ajunt, fonticulorum incommoda, quin sub iisdem, quas pro impetigine inveterata, ac in consuetudinem deducta jam praescripsimus, cautelis, circumspectam ac lentam sanationem in multis admittant.


His igitur de impetiginum natura, diversitate, causis et cura generali praemis-
sis, ad specialem earundem pertractationem descendimus: atque primum de *maculis*, seu coloris proprii in parte cutis una vel altera vix, aut modo parum super sana elevatae, mutatione morbosa disseremus.

O R D. I.

IMPETIGINES MACULOSAE.

G E N. I.

E P H E L I S.



Solis
effectus.

§. 376. **A** levissimo cutis vitio *Ephelide*; impetiginum ordimur historiam. *Solis*, in cute hominis non modo, sed in fructuum horreorum pellicula, petalisque florum tingendis potestas, quocunque demum, a calore certe diverso (§. 373.), nitator principio; insignes in gentium diversarum superficie, ac in hominum eodem sub ceelo viventium pelle, colorum differentias inducit. Ipsa Aethiopum, retis mucosi sub epidermide peculiari structura suffulta, nigredo, hac a causa intenditur; ac vestium in conservanda partium albedine effectus, quas cutis hoc a sydere mutationes patiatur, abunde demonstrat. Nec

tamen ideo vel quaevis humana pellis eandem a sole eodem actionem agnoscit, vel quaecunque, in cute eadem, particula cum eodem effectu a solis iisdem percutitur radiis; sed aut tenerior, ac pervia magis integumentorum, vel in toto, vel in parte, textura, aut major hinc illinc sensibilitas, aut certa demum ac incognita dispositio, diversos, a causa eadem, in superficie humana effectus inducit.

§. 377. Qua igitur in circumscripta cutis Definitio. parte color nativus a sole, magis, quam ad vicinam, in subflavum, aut fuscum, aut fere nigrum mutatur: in hac ipsa nascitur *ephelis* vela *sole macula*, quae vix aliam in cute, quam coloris mutationem, nec tumorem, nec aliud, quam laesae venustatis, incommodum producit.

§. 378. Nunc vero sat largam in cute pla- Diversitas. gam haec macula, et densam quasi umbram, in longum, latumque diffusam, nec interruptam, praesentat: *umbrosa* hinc a nobis *ephelis* dicenda; — nunc partes tot Eph.
umbrosa, quasi punctis subflavis, fuscis, mox densius, mox rarius, quasi guttatum impersis,

Eph.
lentigo.

lenticularum figuram et colorem aemulantibus obsidentur, quod cutis vitium *ephelis lentigo* vocatur. Sed et ignis actione, qui vicinius huic assident, similes ephelidi maculas, subflavas, obscuras; pertinaces et amplas ad tibias et crura experiuntur, quibus *spuriae* nomen *ephelidis* impertimur.

Eph.
spurta.

Extensio
ephelid.

§. 379. Infantes, foeminae, et qui fulvo, rubroque capillo, cute vero tenera, albidiori instructi sunt, *ephelidi* tum *umbrosae*, tum *lentigini*, prae aliis, subjiciuntur. A prima solis ad nos redeuntis, licet debilioris, in pellem actione, fere major, quam aestivis a radiis, macularum in facie, jugulo, ad superiorem thoracis partem, atque ad manus, prorumpit copia. Nec teneriora quidem plantarum folia, nec fructuum, qui ab illis pendent, cuticula, hac impetiginum a specie sunt immunia; ac licet ab insectis haec frequenter conspurcentur, maculentur; post tenuissimas tamen pluvias, quas solis urens mox excipit radius, tot puncta fere nigra, quot aquae guttulae, in iisdem comparent. Nunc vero segregatae ab invicem lentigines, nunc racematim congestae, aut ubi-

que partium dictarum tam confertae existunt: ut intermedia vix cutis albedo transluceat, et color hujus obfuscetur in totum.

§. 580. Nec tam levis quidem in cute Causa. mali originem sat clare intelligimus. A bile quondam, solis a radiis exusta, ut vix non omnes coloris nativi mutationes sic et ephelides immerito derivarunt. Sanitate coeteris hominibus aequali gaudere illos, qui ruffo, fulvoque capillo signantur, tum ratio, tum experientia confirmat. Atqui cum hi ipsi, prae aliis obtectam nobis ephelide superficiem exhibeant, — cum haec ipsa verno magis, quam alio quovis tempore, e cute progerminet; oportet aut in tenera magis ac sensibiliore integumentorum his in hominibus compagine, aut in copiosiore ac magis foetido, qui horum e cute propellitur, sudore, veram ephelidis causam latere. Quae in foliis plantarum, fructuumve in extrema pellicula a sole nascuntur, subtiliorem post imbrem, lentigines, hac ex illius radiis ab aquae guttula, quasi a lente vitrea, aut speculo, ut vocant, ustorio, in centrum, seu fo-

cum collectis, producantur. Au similis et *lentiginum* in homine subsistit ratio? Ad poros certe eorum qui copiosius transpirant, invisibilis haerens sudoris guttula, non minus, ac plantarum in foliis, a solis percutitur, penetratur radiis: et qui ex istis, aqueam post lenticulam, in focum collectis, concentrati adinstar ignis in cutem agerent; hi similes in ista, quam in vegetabilibus, maculas relinquere, ac lentigines formare possent. Nec obest, nullam hujus ignis in cute sensationem excitari, aut effectus causae ejusdem in alios, qui fusco ornantur capillo, non similes haberi; aut aestate, qua solis magis urget ardor, qua sudor copiosius porumpit, vix tantas in cute lentigines formari; ac demum illaesam in lentigine epidermidem subsistere. Nam primo, celerior, ac nimis superficialis radiorum solis in summam cutem, quam dolorem ut inferat, actio hic est; secundo, fuscorum minor cutis observatur teneritas; tertio, sub aestivis caloribus, sudoris, et copia, et impetu majore propulsi, guttulae mox diffluunt: neque cutem, calori jam magis, quam verno tempore, assuefactam, lentis vitrae in modum

perurere queunt, ultimo vero, qui epidermidem transgreditur, et ad rete mucosum formatur, — non illam certe, sed istud, pro *foco* agnoscit, radiorum concursus. Quod vero aliquam huic opinioni probabilitatem conciliat, est velorum tenuissimorum quidem et cribriformium, sed solis radios divertentium in praeservanda, non a calore, sed a maculis cute, formosis non ignota puellis potestas. Rete igitur mucosum in cutis punctulo solis igni subiecto, pro stagnantis atque coactae in eodem lymphae conditione, colore nunc subflavo, nunc fusco transparens, lentigines, easque mox perennes, mox vagas; ac redeunte solisastro redeuntes, formaret. Cui praedicta lentiginum non arridet derivatio; hic citius forte nodum discindet, si esdem non aliter, ac *petechias* (§. 317.), in cute oriri contendat; ac sub delicatulo istius contextu, radii solaris, ut ex vasculis cutaneis humoris guttula coagulabilis hinc atque illinc transudet, lentiginemque creet, jam fortisan sufficit violentia. Hoc saltem modo *ephelides umbrosa*, ac *spuria* oriri videntur; et cutis a sole, aut ab igne rubor, ariditas et quasi erysipela-

cea constitutio, praeviam ephelidi, levio-
rem licet: sub epidermide phlogosin, aut
echymosin confirmant.

Pognosis.

§. 381. Nulla quidem salutis hic pericu-
la, — sed plurimae; nec injustae, apud
foeminas, fugientis ab ephelide formosi-
tatis sunt curae. Vix multum hoc cutis in
vitio ab arte sperandum est; ei innumera,
quae hic celebrantur, auxilia, venientis
potius efficaciam hiemis, quam propriam
virtutem, in ephelides confirmant. Spes
major in praecavendis, vel saltem in illis,
quae vix semel apparuere, dissipandis, po-
nenda est maculis. Quod interim Medicina
non aufert, — hoc mulierum astutia fuco
occultare jam nimis edocta est vitium.
Quo tempore *lepra* domicilium in Europa
fixerat, nec *lentiginosa* quidem in cute *ma-
cula*, dum *sensu* simul *privaretur*, ad il-
lius morbi non pertinebat, diagnosin (§.
451.).

Cura.

§. 382. Ad ephelides avertendas, quod
eripi foeminis cura cultus sui non possit,
tum radiorum solarium, flammaeque vici-
nae fuga, tum sollicita partium per vela-
menta custodia requiruntur; et verni po-
tissimum solis, et, ab instituta vix faciei aut


manuum lotura, aeris rigidi in cutem evitanda est actio. Hanc ipsam praevertit, qui has partes cum ovorum albumine, aut seminum cydoniorum, gummi tragacanthae, arabici mucilaginis, in frigida solutis, defendit.

Contra praesentes jam ephelides interna nil possunt remedia; externo vero, quae interdum hic prosunt, in sequentibus consistunt. Cutis primum cum sero lactis, vel aquis destillatis, iisque tepides, aut cum massa saponacea (N. XXXIX.), cremore lactis dulci, ac similibus, emollienda et abstergenda est. His vero peractis, ad illa, quae cuticulam magis penetrant, extravasatam sub ista, condensatamque materiam eliquent: ac vasculorum lymphaticorum in hanc ipsam actionem promoveant, recurrimus. Hinc vapor aquae et aceti, quibus sambucus infunditur, — aqua distillata, aromatica, cum aceti salisque ammoniaci pauxillo remista, linimentum camphoratum (N. XXXVII.) superaddita salis volatilis portione, — acetum camphoratum (N. XIV.), aut mitior compositio (N. XL.), — ac disparente demum ephelide, fomentatio cum frigida, cui iterum albumen ovi,

ac aluminis, vet sacchari saturni portio
superaddi potest, tentari merentur. For-
tiora, et quae cutem nimis irritant, re-
media, non sine majoris, quam quod au-
ferre contendimus, mali administrantur
periculo.

O R D. I. G E N. I I.

C H L Ó A S M A.



§. 383. Non aequo satis consilio, quas *gra-* Definitio.
vidae maculas, sine ignis aut solis effectu,
 in cute patiuntur, has *ephelidum* (§§ 376. 377)
 subordinare familiae, — et alias, quae ab
 hepate originem vix ducunt, has et *hepa-*
ticas nominare, et ad *vitiliginem* referre vo-
 luerunt. Hinc *chlóasma* has, affines sibi im-
 petigines vocare, ob coloris et causae com-
 munionis rationem, arrisit: atque hoc no-
 mine intelligimus maculas ex flavo viri-
 descentes, aut pallidas, subinde fuscas,
 et ex flavo nigricantes, nunc faciem, nunc
 peetus, abdomen, aut inguina occupantes,
 in longum ac latum extensas, indolentes,
 saepe leves, alias paullisper asperas, quae
 suam ex causis internis originem, mitio-
 rem plerumque, agnoscunt, ac alia, prae-
 ter cutis foeditatem, vix afferunt incom-
 moda.

Differen-
tiae.

Chloasma
gravidarum.

§. 384. In *gravidis* frequentius, quam in aliis, hac maculae comparent (*chlóasma gravidarum*), atque frontem potissimum, ac genas, sed et collum similiter et manus, ad pollicis, vel et palmae latitudinem, fere luteae, sub virides, aut fuscae, interdum subnigrae, aspredinis plerumque expertes, deturpant. Incertum quidem factae conceptionis hac maculae signum constituunt; nec prolis, ut ajebant, hac sexum manifestant; non paucae interim mulieres, si utero non ferant, hanc ignorant, — si ferant, mox patiuntur impetiginem, nec desunt aliae, quae, *puero* onustae, his semper maculis carere, — quae sinu *filiam* occultant, ab eisdem continuo obsideri, aut licet, *miri ratio* nos lateat phoenomeni, contrarium affici in modum cernantur.

Chloasma
amenorrh.

Sed et foemina non praegnans, et vidua, et virgo *chlóasmate* non raro laborant; quod, cum ex suppresso plerumque fluxu menstruorum oriatur, *amenorrhoeicum* vocari nil impedit.

Chloasma
pseudo
porrig.

Et menstrui sine vitio mulieres, ac viri adeo non pauci, ad partes, non tam nudas, quam vestimentis munitas, ad pectus in-

primis et ad inguina; a chloasmate, per amplam cutis superficiem extenso, quidquam aspero, atque pruritus, caloris externi sub augmento, interdum summi, non semper experte, foedantur. Haec est *hepatica*, ut injuste appellant, *macula*: quam, ob aliquam cum porrigine (§. 413.) similitudinem, *chloasma pseudoporriginem* vocamus.

§. 385. Velut primo impraegnationis jam tempore, aut tardius in aliis, hae maculae (§. 384.) comparent; sic vel cum coeteris, quae gravidas infestant, incommodis, post primos jam menses dissipantur; vel ad partus ipsam periodum, et ultra, rebelles subsistunt. Major vero illis in foeminis macularum esse numerus consuevit, quae praegnationis sub statu esculenta fastidiunt et vomunt, vel quae subtumido et chlorotico fere corporis habitu hoc tempore incedunt Sic et pallidis aspectu, languidisque, aut menstruo privatis mulieribus, puellis, similia contingunt, et circumscriptam, ac unius quasi plagae in cute chlorosin hae maculae praesentant. In tertia demum chloasmatis, indicata vix specie,

Morbi
nata.

sicut major interdum pruritus occurrit; ita volubilior macularum conditio, ac facilis in loca dissita transitio est. Sic *Clinicum* nuper adiit vir robustus *institutum*: cui et pectus et axillae hac impetiginis a specie pridem undique obsessa, vix pallida hujus vitii vestigia offerebant; sed diuturna ad fauces, et ad palatum phlogosis, et magna deglutitionis difficultas successerant: quae ab illita thoraci cantharidum tinctura, revocato hic loci chloasmate, brevi mora disparuerunt.

Causae. §. 386. Quae ratio in gravida his maculis subsit, difficilis est quaestio. Nec enim menstruus, qui fluere hic desinit, sanguis acredinis prudenter accusari, — nec plethora, nec uteri, humorum circulo adversa moles, in morbi causam, apud omnes, et quavis praegnationis in periodo, revocari queunt. Ipse hinc uteri cum pelle consensus, et mirum nervorum hujus visceris in corpus omne imperium hic attendi prae aliis merentur. Hac certe ex causa, periodicus ille sub oculis *livor*, ac singularis in facie mutatio, mulieri, cui menstrua prorumpent, vel quae utero vix concepit,

contingunt; et ex principio non alio, in puellis hoc fluxu privatis, quo tempore hunc expectant, tot in fronte tubercula, tot postulae, maculae ad labra, ad mentum, efflorescunt. Sic ulcusculum in fronte foeminae quadragenariae per duos fere annos conspeximus rebelle: cujus perfecta, ut videbantur, cicatrix, quotiescunque menstrua, sat abundans, *successit* excretio, iterum iterumque aperta est; atque sic non sanguinem ab utero repulsum, et copia peccantem; sed peculiarem ac periodicam hoc ex viscere in cutem faciei actionem, pertinacis ut causam ulceris, manifeste indicavit. Similia in *chloroticis* hinc inde occurrunt: ut quae, licet menstruis fere careant; minus tamen cruoris plerumque ob copiam, vel acrimoniam, quam ob singularem, atque symptomaticam in cute irritationem, pustulis ad superficiem crustosis obteguntur, quae veram, — non in sanguinis missione, non in rebus acrimoniae observis, sed in solis corroborantibus, et restituto menstruorum fluxu, medicinam agnoscunt. Suppressas, quibus jam-jam assuevimus, haemorrhoides, non ab simili principio in cutem operari, suspi-

camur: et hoc quidem sensu, ex opposito sanguini venae portae ad *hepar* obstaculo, corporis interdum superficiem maculis, si ita lubet, *hepaticis*, foedari concedimus. Interim, non tam simplex forte chloasmatis *pseudoporriginis*, quam macularum in gravidis, chloroticis, natura est; ac latens aliquando, quocunque demum in viscere, defectus, aut acre rheumaticum, scrophulosum, aut aliud, hoc porriginosum subinde ac inconstans in cute vitium generare valebit.

Prognosis.

§. 387. Nullum gravidarum in maculis, nisi spontaneum, vel primos post menses, vel tardius, ex partu veniens, auxilium, — sed nullum quoque ex istis, nisi faciei defoedatae, est incommodum. Quin ipsa interdum foetus exclusio, has, in illis, quae saepius citiusque concipiunt, non delet maculas. Quod ex amenorrhoea, haemorrhoidumque suppressione procedit chloasma: hoc morborum, quos comitatur, insequitur, — vix auget, pericula. Difficilior plerumque *pseudoporriginis*, si ab acri incognito, viscerumque oriatur vitio, sanatio est, Nec haec quidem impetigines spe-

cies, ad *leprae* quondam signa revocata non est.

§. 388. Nihil est, quod certas praegnan- Cura.
tes his a maculis praeservet; et vix ullum
habetur, quo praesens jam cutis vitium
depellatur, auxillium. Nec enim causae ex
utero in cutem imperantis indolem, mo- Chloasma
dumque agendi tam bene perspicimus: ut gravid.
internis hunc debellare queamus, vel sat
tuto audeamus, remediis; et quae in illam
vix reagit, externorum ad cutem applicatio,
subsidiis haud multum hoc rerum sub statu
promittit. Baccarum lauri hic interim, si
decorticentur, subtilis, cum melle sub-
actus pulvis, — vel unguentum (N. XLI.),
quo facies a balneo illinatur, a quibusdam
proponitur. Cum pomo subacido, aut ci-
trino, per medium dissacto, aliae hic pel-
lem, quo loco foedatur, quotidie perfri-
cant; aut cum emulsione ex canabis semi-
nibus et lacte parata frequenter abluunt:
quae singula remedia: a nobis quidem, ut-
pote propria hic experientia destitutis, nec
laudari, nec tamen ut noxia damnari cum
fundamento queunt.

Quae vel a partu supersunt, vel gravi- Chl.
ditatis sine causa, oriuntur, maculae, hae, amenorr.

si languentium, aut suppressorum forte monstruorum: haemorrhoidum ex culpa propullulent: tunc sanguinis missione, hirudinibus, — interdum vero contrariis quasi, ac reborantibus auxiliis tolluntur.

Si viscerum forte abstructio, aut latens in humoribus acre, chloasmatis pseudo-porriginis in causae videatur: tunc, pro varia istius indole, resolventia, antimonialia, mercurialia, antiscorbutica, vel demum alia indicantur, atque externis praemittenda sunt auxilia.

Chl. His vero aut praemissis, aut, si cutis pseudop. modo in culpa sit, depositis, ad externa transgredimur, tum allata jam supra, tum paullo fortiora, remedia. Hinc aut illud ex sinapi (N. XLII.) aut cantheridum emplastrum, aut unguentum ex mercurio (N. XLIII.), impetigine applicamus; atque irritatione moderata, et a causae morbosae stimulo diversa, subjectae pellis debilitatem auferre, agendi modum immutare, et alienam a sanitate secretionem corrigere, exsiccare contendimus.

O R D. I. G E N. I I I.

E C C H Y M O M A.



§. 389. Succorum effusionem, *suggillatio-* Definitio.
nem, Ecchymoma aut *Ecchymosis* significat;
 sed cum plurimas hoc nomen, significatione
 tam lata, aegritudines exprimeret: hinc
 modo sanguinis ex vasis propriis sub cute
 effusionem, atque maculam in illa, ex
 cruore transparente, cum tumore plus,
 minus conspicuo, oriundam, hoc nomine
 intelligunt. In multis quidem cutis, aut
 universae, aut in parte circumscriptae,
 rubor, naturalem superare, atque primo
 in casu, *phoenigium*, — in altero vero ma-
 culam, quam, forte congenitam, *naevum*
 nominarunt, constituere observatur; sed
 quemadmodum ille, ex vasorum sangui-
 ferorum in cute teneriori quantitate aut
 repletionem majori, ac fere universali, hic
 vero, nunc ex structura cutis in parte, a
 naturali abludento, nunc ex retibus vaso-
 rum cutaneorum varicosis pendere viden-

tur: ita *maculae morbosae* materiam in cutis telam cellularem, praeter naturam, effusam, et colore suo a fluidis in sano homine hic loci excretis diversam, nunc liquidam, nunc vero densiorem, atque cum cellulosae telae lamellis concretam, subesse testantur. Sic ex lymphâ coagulabili inter *cornae* transparentis lamellulas in ophthalmide deposita ac solidescente, *albuginem*, seu *leucoma* explicuimus (§. 150.); atque sic ex quavis materia, radios lucis aliter, ac serum sanguinis, ac humor lymphaticus ab hoc ipso solutus, vel quam adeps, reflectente, nunc sub epidermide, nunc ipsa sub cute stagnante, oriuntur maculae, quae, si cruoris secum commisti quid offerant: ad *ecchymoma* referri merentur.

Nat.
ecchym.

§. 390. Haec vero species impetiginum (§. 389.) sine febre plerumque, ac sine dolore incedit; interim nec ista ab ecchymomate perpetuo excludi, tum *petechiarum*, *vibicumque*, jam exposita historia (§. 316.), tum luxationum, vulnerum, inflammationum, ecchymosi junctarum, exempla demonstrant. Hinc pro morbi, *cum quo*, — vel pro causae; *ex qua* haec, aut major, aut

minus extensa, descendit, diversitate, oportet esse diversa, atque nunc violentiora, nunc pauca ecchymomatis symptomata. Nec ipsius adeo coloris sat constans in isto natura est; sed, pro varia cruoris sub cute effusi quantitatae, — pro loci, quo confluit, ab epidermide distantia, — pro materiae aut liquide, aut congrumatae consistentia, — ac demum pro temporis, quo vasa dereliquit, conditione, color maculae nunc coccineus ac laetus, nunc profunde ruber, sublividus, aut niger, vel tandem viridis, flavescens, ac pallidus observatur. Pro ipsius vero cellulosae telaee, inundationi cruentae aut resistentis, aut in longum latumque cedentis ratione, ecchymomatis tam figura, decursus, quam elevatio, durities, ac tensio variatur; et pro vasorum lymphaticorum, quae fluidiora in parte laesa resorbent, numero, liberlate, actione diversis; humoris effusi et tensitas, et color, et natura mutatur.

§. 391. Plures igitur ecchymomatum sunt *Diversitas*, formae: quae tamen, nisi causae diversae ratione; non tam *species* distinctas, quam *varietates* offerre videntur. Sic certe color

maculae aut ruber, aut niger *ecchymosin* inter et *melasma*, differentiam vix constituit; et *vibex*, alia, quam formae ratione, a *macula* nequamquam distinguitur. Frequentissime alterius modo *symptoma* est morbi *ecchymosis*, atque contrarios inter se corporis affectus constantia aequali comitatur. Ipsa certe inflammatio, tum phlegmonosa (§. 123.), tum erysipelacea (§. 283.), cruoris in cellulosa, cum rubore partis, effusi exemplum largitur; ac in scorbuto, hydrope, febre tum intermittente, tum continua, in spurio aneurismate, insignis macularum rubrarum, nigrarum est numerus: quae licet *ecchymosi consanguineae*, ac origine consimiles; vix tamen sortem illius, methodumque medendi eandem sequuntur. Potissima hinc causarum in eruendis *ecchymomatis speciebus* est auctoritas; et ex illarum consideratione diversitas istius non obscure comparebit. Hae vero, aut *exteriorius* in corpus operantur, atque *ecchymoma traumaticum* nobis exhibent; aut, ab internis mutationibus orientes, *ecchymoma spontaneum*, quod alterius nunc morbi *symptoma*, nunc *primariam aegritudinem* constituit, praesentant. Frequen-

tius, ac vulgo creditur *internas* ecchymomata partes, sine causis externis, circumdant; ac saepius, cum *intimam vasorum majorum* in cadaveribus examinavimus *superficiem*, ad cordis vicinias prae aliis, hanc undique et per longos satis tractus sine phlogosi *suggillatam* conspeximus. Post mortem forte haec magis, quam in vita contingunt; nec ulla nobis, quae sub ista hanc vasorum affectionem, ut propria, comitentur, symptomata innostescunt. Frequentissima puerperarum in uteris, rudiori obstetricantis a manu, vel ab instrumentis sine cautela introductis, observatur suggillatio.

§. 392. Quaecunque vero, aut partium, *Causae.* aut totius, *externa* laesio, contusio, concussio, distensio, compressio, laceratio, vulneratio, vasorum, superficiei non minus, quam viscerum, integritatem infringere, et canales sanguiferos aut nimis dilatare, aut penitus aperire, destruere, ac liquidi contenti vel in solam cellularem, vel in cavum vicinum, vel simul per vulnus, effusionem excitare valebit. Quae tegumenta quidem penetrant, ac vasa plura, aut majora offendunt; sed cutem non satis

aperiunt, aut vulneris oras collabi atque claudi mox sinunt, laesiones, ut illae, quas instrumente acute, quas sclopetum; inferunt: hae, latiores non modo ecchymoses, sed partium tumores, tensionem, majores inducunt. Quae istarum magis tenorem, concutiendo, contundendo, afficiunt: hae nervorum sensibilitatem, fibrae carneaе irritabilitatem, et vasculorum lymphaticorum actionem aut imminuunt, aut prorsus auferunt, atque effusi humoris corruptioni spontaneae, putredini, gangraenae sphaceloque vel maxime favent.

Ad *internas* suggillationum causas referri praecipue merentur, quaecunque vasorum resistantiam a fluidis superari faciunt: ac eandem vel diminuunt, vel auferunt. Si humorum aliquando tenuitas hic subesse videatur; haec ipsa solidorum prius infracto tenori attribuatur oportet. Hinc major sanguinis in vasa sua; vel a cordis imperio pendens, vel modo haec ipsa in parte quadam afficiens, impetus, hinc febris violenta, exercitium musculorum immoderatum, tussis impetuosa, aut vomitus violentus, nixus fortior, contractio fibrarum spasmodica, oppletio vasorum et sangui-

neae excretionis suppressio, — hinc vel sola cutis suctio, vel cucurbitula superimposita, vel aeris vicini subitanea ac major rarefactio, — hinc vasorum atonia, paræsis, aut totius systematis vasculosi, et nervosi, ut in febribus malignis, debilitas, et nunc propria, nunc a consensu derivanda inertia, — hinc demum suppuratio propinqua, vel ulcus, aut acris et corrodens, vel stupefaciens materia, præcipuam ecchymomatis rationem in se continent. Quanta sit *nervorum* in cute maculande potestas, tum ex dictis (§§. 274. 386.), tum ex terroris ab incubo, a phantasmate effectu te maculis in pelle, inprimis vero ex scroti in strangulatis suggillatione, et ex morientium ecchymosibus, comparet.

§. 393. *Ecchymomata symptomatica*, ip- Prognosis.
sius morbi, ex quo nascuntur, discrimina, partim sub exanthematum historia exposita, sequuntur. Quae vero ex causis sibi propriis oriuntur, *primaria*: haec, istarum, ac loci, quem occupant, pro indole, — pro sanguinis effusi, vel liquidi, vel coacti, quantitate, — pro febris, aut inflammationis forte conjunctae ratione, — pro va-

sorum resorbentium, nervorumque in parte, quam tenent, integritatae ac robore, exitus diversos, atque vel nulla, vel maxima interdum pericula agnoscunt. Hinc saepius ut *signum*, quam ut *morbis*, ecchymosis timenda, et non tam color, quam origo macularum attendenda est. Qui vero, in cellulosam effusus, diutius hic stagnat sanguis: hic nunquam in *pus verum*, sed aut in propriam corruptionem, quae putrida est, cum gangraena partis, abire, aut solidescere et cava cellularum delere conspicitur. Mira interim naturae in his avertendis supersunt subsidia; ac si modo aeris accessus denegetur, ac partis affectae non labescat vitalitas; per longas saepe moras immutatus hic sanguis delitescit, ac tandem, licet, sume compactus, fere ligneam in parte, ut in scorbuto ad crura, duritiem inducens, inexpectato resorbetur, ac a massa circulante, labe quavis immunis, reassumitur. Pertinacissima interdum, licet indolens, ad oculi albugineam ecchymosis occurrit, ac plures post menses vel sponte disparet. Diuturna quoque sub unguibus suggillatio (*hyponichon*) esse solet, ac illorum corruptionem nonnun-

quam inducit. Neonatorum calvaria sub partu difficili, obliquo, aut vectis ab impetu, frequenter ecchymomate, et conspicuo tumore afficitur, qui, fluctuationem cum prodat, per cultrum apertus, in mortem non raro terminatur. Sub aponevrosi effusi humore, nisi cito aut resorpti, aut sectione educti febres, violentas inflammationes, deliria, convulsiones, ac mortem hinc inde producunt.

§. 394. Quae ecchymosis exanthematicae Curationem concernant, ea satis a nobis (Lib. III.) exposita fuerunt; et quae alias suggillationes *symptomaticas* respiciant, haec ex morborum, quos comitantur, historia patebunt. In ecchymomate *primario*, tum febris ac inflammationis, si quae hoc ipsum circumdet, tum causae praecedentis, habenda est ratio. Si major partis extensio, distractio, contusio, ecchymosin praedicant; tunc cita illius in frigidam immersio, fomentatio cum nive, aut cum glacie contusa, ac interdum compressio, suggillationem ac tumorem avertunt. Si ipsa sub venae sectione in cellulosam subcutaneam sese cruor infiltret: tunc fasciae de-

tractio, ac brachii, seu pedis in situm, in quo, cum cutis incidebatur, haerebant, repositio indicatur. Sub ipsius ecchymomatis a causa externa pendentis praesentia, in robustis ac plethoricis hominibus venaesectio praemittenda, ac, nisi inflammatio et partis laesae jam tumor ac durities impediunt, fomentatio cum posca, sale ammoniaco et nitro, vel acaetum lithargyri, saccharum saturni, cum frigida, et alcohole, — vel radicis bryoniae recentis rasura, cum aequali spiritus vini portione, conducent. Si fortior contusio, aut ictus sclopeti, partis, quae suggillatur, vitalitatem imminuerit: tunc calida et spirituosissima fomentatio cum sale ammoniaco et aceto, requiretur. Si major forte sanguinis, quam quae commode resolvi, ac prompte resorberi speretur, copia, aut cruor in grumos coactus, sub cute integra, vel parvo tantum, aut jam collapsio vulnuscule perfossa, vel sub tensa aponeurosi, stagnaverit tunc pellis, aponeurosis, sine mora incidenda, aut vulnus dilatandum, vel profundae scarificationes, ut liquidum cruentum exstillet, ac tandem externa, quae diximus, remedia, et fasciae


comprimentes, in auxilium trahenda sunt. In casu majoris a sanguine in tela cellulosa putrefacto corruptionis, ea, quae ad gangraenam commendavimus, auxilia (§. 136.) indicantur. Nec tamen ob atrum ecchymomatis colorem, de gangraena imminente mox cogitandum est. Nigerrimum undique abdomen, sclopeti, quo scrotum perfossum erat, ab ictu, observavimus. Huic phoenomeno accesserunt et vomitus copiosus, et singultus sonori, et summa anxieatas. Ter interim venam aperiri, fomentationes aromaticas cum vino et aceto calide imponi, ex mox largam opii dosin imperando, nigredo ventris in viridem, ac tandem in flavum, pallescentem colorem mutata, et sanitas moribundo, ut credebant, homini restituta est. Apud tene-ros, calvariâ a partu suggillatos infantes, sectionem, hac in aetate vix innocuam, vini spiritus cum camphora, infusum aromaticum, vinosum, et calor aequalis, per impositum tumorigos, sypium obtinendus; supplebunt.

Quod ecchymoma *spontaneum* concernit, si menstrui forte, aut haemorrhoidum excretio impedita suggillationem induxerit;

adaptata morbi causae auxilia conveniunt. Si spasmodica macularum observetur origo: tunc opium cum potu aromatico, ac haustu salino propinandum, cutis mador, aut sudor lenis excitandus, ac tepida fomentatio ex infuso chamomillae, roris marini, salviae, cum sale volatili et opio, exterius imponenda est. Quae sanguinem stagnantem *specificè* resolvant, vix noscuntur remedia, et *arnicae* hoc in casu adscripta virtus, ab irritante, vasorumque lymphaticorum actionem augente principio pendere videtur. Vix aliquid a *calaguallae*, ab *Hispanis*, et nuper apud nos, laudatae, radice exspectamus. Si major in parte vasorum inertia ecchymoses inducat: tunc corticis peruviani decoctum cum vino, vel aqua calcis, vinum camphoratum (N. XL.), unguentum cum sinape (N. XLII.), tinctura catharidum, vel emplastrum ex istis, conducent. Si forte primis in viis, prout exanthematum occasione jam monuimus (§. 274.), suggillationis in pelle, causa latuerit: tunc emeticum, aut purgans, quod istam evacuet, ac resorptionem simul augeat, indicabimur remedium.

O R D. I. G E N. I V.

E R Y T H E M A.



§. 395. Non sine taedio, morbum cutis, Nominis
ratio.
quem *Erythema* appellant, et cujus, sub
erysipelatis descriptione, mentionem jam in-
jecimus (§§. 280. 285.), ab ista, tam affini,
aegritudine divellimus, et alii morborum
classi subordinamus; sed haec est *impetigi-
num* conditio: ut cum *exanthematum* saepe
confluant et ex hac ipsa oriantur familia
(§§. 275. 315. 316.): quo in casu, si, ob com-
munem in multis originem, similitudinis
quid maternae retineant; non tamen ideo,
aut sine ordinis desiderati laesione, aut
curationis sine damno, cum illa confundi
mox queunt. *Erythematis* igitur nos titulum
ad *chronicam* cutis efflorescentiam referi-
mus: quae, erysipelati, externo habitu, simil-
lima (§. 279.), eodem tamen constantior;

aut frequenti reditu importunior, hujus quidem, si ita lubet, *habitualis*, *apyretici* denominatione, ut ipsi nos fecimus (§§ 285. 290.). potest insigniri; sed ad *impetigines* melius, istarum ut genus, quod *guttam*, ut vocant, *roseam* pro specie agnoscat, referri meretur.

Definitio. §. 396. *Erythema* hinc est macula superficialis, a cutis phlogosi non febrili, vel in longum extendi solita, vel habitudinis lege recurrens; cum rubore, aut colore ex rubro flavescente, a compressione albescens, cum pruritus, ardoris, tensionis sensu, tumore plerumque parvo, diffuso, supurationis, saltem benignae, experte, cute frequenter levi, pustulis interdum obsessa, frequentius ab epidermidis in furfures separatione exasperata.

Diversitas. §. 297. Nunc vero partem fere semper eandem, nunc aliam atque aliam erythema infestat. Frequentius hoc ad faciem et crura, quam aliis in partibus, non tamen raro et in istis, efflorescit: atque cum in illa, cum ad nasum praecipue, vel ad genas, frontem, aut mentum, rubore pro-

fundo, fere livido, ingratae splendente, interdum pustulis intermistis, longo tempore, sine magno saepe pruritu, aut incommodo, comparet: insulso satis nomine *gutta rosea* appellatur (§. 399.). Quae ad manus et pedes praeprimis, vel ad aures nasumque, a frigore praegresso, oriuntur, — insigni, quavis hieme redeunte, et a calore lecti aut ignis vicini adaugendo pruritu instructae maculae: haec, conspicuos, ac in taediosa cutis ulcera satis pronos, tumores in multis efficiunt, et *pernionum* sub nomine ad erythema revocandae sunt. Nec minus huc spectant cutis, ad *plicas*, quas, apud infantes, praecipue ad collum, axillas, aures, inguina, nates, ad poplites efformat, lenta et in partis exulcerationem inclinans phlogosis, et cognita *intertiginis* sub nomine affectio.

Eryth.
varic.

Eryth.
Pernio.

§. 398. Vix magnis hoc morbi genus, nisi forte a superficie repulsum, symptomatis se prodit. Interdum quaedam anxietas, morositas, torpor, horripilationis et caloris interni sensatio praecedunt. Haec, levis in parte tensio, calor, aut pruritus insequuntur. Mox cutis rubor, aut floridus

Mat.
morbi.

aut profundus, plerumque pallidus, comparat: qui cute compressa, aufugit; liberata, revertitur. Tumor quidem, si *per-nionem* excipiamus, vix ullus, nisi plana, et late diffusa pellis elevatio; interim a frequente erythematis accessione cutis ipsa crassescit, induratur, molemque informem et acquirit, et retinet; aut pustulis hinc inde obsidetur: quae tenuem acrem, ve ichorem fundere atque irritantibus male tractatae, ad nasum praecipue, carcinomaticam interdum naturam assumere cernuntur. Diutius erythema, quam erysipelas, persistit; ac in multis per vitam, nasi, genarum regionem non dimittit; aut facile, ac fere periodice, sine ullius coeterum functionis laesione, recomparet. Non ubi-vis, sed plerumque, cuticula arescit, ac terrei coloris in furfures tenuesque squamulas separatur, majorque partis sensibilitas, ac prona in malum idem dispositio reliquitur.

Causae. §. 399. Sicut erythematis natura ab illa erysipelatis, — ita causae utriusque mali non multum, nisi violentiae; atque constantiae ratione, inter se differunt. Orig-

nem scilicet, nisi forte *externam*, a frigore, ab urinae, faecum, transpirationis acrioris reliquiis, a fucatis saturno linimentis, pulveribus, — plerumque perennem ac rebellem erythema agnoscit (§. 288.); mulieres, senescentes, iracundos, tristes, bibaces, debilesque homines frequentius, quam alios, invadit. Ex menstrui, haemorrhoidum suppressione, ex pedum, axillarum suppresso sudore, ex viscerum infarctu, ex acri latente, specifico, ut quondam, *leproso* (§. 459.) aut alio, ex spirituosorum abusu, ex frigore majori extremitatibus admoto, et adhibito mox istis ab igne, ex cutis debilitate, irritabilitate morbosa, locali, interdum nativa, frequentius hic morbus descendit. Ex matre, crurum ulceribus perpetuo fere obnoxia, filium, et ex ista nepotem, cum cute pedis, in illo, dextri, in isto vero, sinistri, ad melleolum crassiori, tensione, calore ac aliquo rubore frequentius affecta, observavimus. Qui Bacho indulgent, hi ad nasum praecipue, ac in vultu, perpetuo rubore pustulisque frequentius notantur. Haec diuturni species erythematis, si per lentem examinetur, ex vasculorum, quae

cutem innumera percurrunt, minimorum habitu *varicoso* principium, remediis rebelle agnoscit, atque hinc *erytema varicodes* a nobis nominatur. Similis interdum *avalio-lis* ad mentum relinquitur macula, quae nitidam puellarum faciem saepe nimis defoedat. *Intertrigo* puerorum, hominumque adiposorum, ex cutis, inter plicas, immunditiae originem sine dubio in multis agnoscit; sed certe *lymphaticorum* vis insignis *vasorum*, qua, in partes sibi appositas et vicinas, *erosionis* actionem exercent, quam plurimum huc facere, nobis videtur.

Cura. §. 400. Diversam erythema, pro varia morbi causa, medendi methodum expostulat: quae partim ex dictis de *erysipelate* habituali (§. 290.), partim ex regulis, quas (§§. 388. 394.) tradidimus, eruenda est. Rarius, ac in *erysipelate*, *venaesectionis* hic confert. Interdum *cucurbitulae scarificatae* conducunt; sed in causas magis, et quae aequali humorum circulo in visceribus, et excretionibus naturalibus, aut solitis resistendo, corporis ab illis inundari faciunt superficiem, respiciatur oportet. Hinc ressolventia frequenter, et ea, quae men-

struorum, haemorrhoidumque fluxum, quae sudorem naturalem, licet copiosum in multis et foetore ingratum, ad pedes, axillas restituant, — maxime vero prudens animi pathematum directio, sobrietas, ciborum acrium, aromaticorum, potusque spirituosum fuga, — tum ea, quae intestina a collecta forte saburra, aut bile acri liberent, leniora ac repetita evacuantia, semicupia, — aquarum mineralium, martialium usus, rectumve corporis exercitium, potissimam hic opem largiuntur. Eadem, ac in erysipelate (§. 290.), cum cautela, externa subministrantur oportet remedia; in locali tamen affectu, et si forte sola cutis laxitas, aut nimia sensibilitas, erythemati pro causa subesse videantur: tunc proposita jam alibi (§§. 382. 388.) auxilia prae aliis conducent. Ad *perniones*, in hominibus alii lymphae vitio, ut scrophuloso, scorbutico, subjectis aliquando sat maligno, et ad ulcera impura, ipsamque subinde gangraenam dispositos, ab extremitatibus evertendo, tam frigus nimium, quam subitanea partis ab isto correptae calefactio, evitanda sunt. Incipienti vix malo, affecti membri in frigidam repetita immersio,


frictio cum nive, fomentatio cum aqua alcoholis portioni remista, cum aqua marina, aut cum spiritu terebinthinae, cum puro vini spiritu, aut cum muria, salis ammoniaci volatilis portione superaddita, conducit. Si haec adhibendi jam aufugerit occasio, et dolor fortis et phlegmone partem occupent: tunc impositum gossypium oleo olivarum recenti imbutum, emolliens fomentatio, cataplasma anodinum, interdum venaesectio, scarificatio, hirudines, succus hyosciami assidue illitus, — si forte minor hic phlogosis, sed major subsit partis affectae laxitas; fomentatio cum decocto herbarum aromaticarum vinoso, aut cum vino, et aequis portionibus aluminis ac farinae indicantur. Si evitari hac in parte suppuratio non queat; fugienda sunt, quae partem ultro debilitant, cataplasmata emollientia; ulcusque fungosum cum unguento digestivo, cui mercurius praecipitatus ruber commistus sit, potissime tractandum est.

Ad intertriginem curandam summa cutis mundities, et frequens cum frigida, plicas inter, suscepta lotio, deterasio, auxilium supeditant; sed in pinguioribus, et quibus

cutis tenerior est, pueris, nisi haec ipsa linteo, aut filis mollioribus, aut pulvere farinae, lycopodii, cretae, cerussae, plis cutaneis interpositis, a mutuo contactu praeservetur; superficiei erosio, exulceratio evitari vix poterunt. Si haec ipsa apud infantem jam diutius continueraverit: tunc usum externorum et hic loci circumspectum esse oportet. Ad *erythema varicodes*, praeter allata, acetum distillatum cum quinque fere partibus aquae purioris, vel saccharum, acetum saturni cum frigida remista, — et si forte tubercula simul cutem obsideant, unguentum saturninum, vel rubrum mercuriale (N. XLIII.) conducent.

O R D. I. G E N. V.

V I T I L I G O.



Nominis §. 401. *Cutis* firmitas, mollities, crassities, flexibilitas, aequalitas, in variis non modo animalibus, prospeciei, sexus, aetatis, coeli ratione diversa est, sed et ipsos inter homines, aetate, sexu sibi similes, et partium, quas circumdant, et temporis, et valetudinis respectu, quamplurimum differre observantur. A nativo scilicet huius organi contextu, ab atmosphaerae, vestium, etrerum coeterarum, externa, interna in cutem actione, ac musculorum huic ipsi suppositorum exercitio, inprimis vero a *telaе cellularis*, quae pellem cum partibus colligat, laxitate, firmitate, repletionem diversis, haec singula dependent; et mutua communis involucris *cohaesio*, cuiusvis partis, quod propria vi sua non posset, et formam et habitum determinat, Hinc *telaе cellularis* lamellulis, pellem inter et partes alias, aut firmitus contractis,

concretis, aut modo quovis destructis, aut propriis demum succis, inprimis adipe, privatis, ingratis, oculo mox cutis in foveas collabitur, morbosu nexu cum ossibus aut musculis concrescit, tenditur, corrugatur, et amoeno nitidoque colore spoliatur in totum; et hinc abolito semel vel a vulnere, vel a laceratione, suppuratione cutis nexu, prompta licet istum *cicatrix* restituat; foeda tamen, et vix unquam delenda superficiem macula infestat: quae depressa, inaequalis, varioque et a sano abludente colore notata, aut et pluribus hujus indolis stigmatibus conflata, aliquando exsanguis, et insensilis, *vitiliginem*, licet eadem haud apud omnes significatio huic nomini tribuatur, constituit.

§. 402. *Vitiligo* igitur nobis maculam, aut Definitio.
macularum minorum congeriem in corporis superficie significat: quae, mutata, a causis vel internis, vel externis, cellulosa subcutaneae, vel integrae, vel exesae, actione, cum pellis aliqua depressione, naturalem istius colorem, mobilitatem, levitatem, sensilitatem, et functionem hoc in loco, aut ex parte, aut in totum pervertit.

Diversitas. §. 403. Nunc vero cutis hoc vitium in eadem sola generatur, et non tam partium internarum, aut humorum a sanis aberratione, quam ex propria pellis affectione, producitur (*Vitiligo primaria*). Nunc alio a morbo, et ab acri in cellularem subcutaneam, vel in cutem deposito *symptomatice* exoritur (*V. secundaria*, *carcinomatica*, *leprosa*, *scorbutica*, *venerea*, *scrophulosa*, etc.). Utraque ex istis nunc *sicca* est; nunc *humida*, ichorem foetentem et acerrimum profundit: qui ipsam, ex qua distillat, cutem aggrediens, epidermidem in furfures ac in squamas comminuit et separat (*V. squamosa*); vel pellis superficiem exulcerat, pilorum bulbos, quod et *sicca* interdum *Vitiligo* jam facit, infestat, colorem habitumque immutat, aut prorsus e cute evel-
lit (*V. ulcerosa*).

Morphaea Ipse vero hujus impetiginis (§. 402.)
alba. color interdum fere *lacteus* aut et *niveus*, aut superficialis modo, aut profundius demersus, ac pilos albos, lanuginosos ostendens, habitu fere subaspero, vel ut quaedam quasi guttae dispersae videantur, — subinde umbrarum in modum *nigrescens*, squamulis obtectus et pruriens, eandem a

Graecis, Arabibus, curiose nimis, distinguere, ac primo in casu *alphon*, *morphoeam albam*, — in altero, *melan*, *morphoeam nigram*, vocari induxit. Vitiligo demum *cicatrix* est macula, nunc depressa, nunc aspera, quasi consuta, a continui laesione, et praegressa ut plurimum suppuratione, post illius reunionem, relictæ.

Morphæa
nigra.

§. 404. Vitiliginis origo ex dictis (§. 401.) Causæ, quodammodo elucet. Quidquid scilicet aut cellulosam sub cute telam delere, destruere, ac pellem arctius cum causæ, aut ossibus connectere, aut naturalem hujus involucri communis contextum in se ipsum contrahere, et sanguinis influxu, aut nativæ sensibilitate privare potest: hoc vitiliginis ad causas pertinebit. Materno subinde ex utero, quasi dissectæ ac resanatæ cutis, aut vitiliginis, amplioris, *naevorum* iterum sub nomine, vestigia depressa comparent; et famosa sunt vetularum *stigmata* multarum: quæ superstitionis injuria, cum, ab acu perfossa, nec sanguinem effunderent, nec dolorem sentirent, pro *Sagis* illas, rogoque dignis veneficis, declarari jam pridem fecerunt. Ad abdomen

mulierum, quae saepius pepererunt, non simplices modo rugae, sed maculae albescentes, cicatricibus fere similes, atque cuti profundius impressae, nascuntur: quae istam, hinc in plicas relaxatam, illinc arctius cum musculis subjectis concretam ostendunt.

Quodsi tamen illarum vitiliginum, quae a suppuratione, a vulnere, ulceribus, vario-
lis, compressione diuturna in utero, aut a cutis nexu cum subjectis partibus vitioso, oriuntur, non difficilis intellectu sit indoles; fateamur oportet, illarum, quae fere *spon-
te*, pluribusque simul in locis, ad pellem nascuntur, disparent, revertuntur, et morbum gravissimum, vix superabilem vel praenunciant, vel ipsaemot constituunt, obscurissimam esse vitiliginum originem! Cum vero tum istae, tum aliae difficultates, ad *lepram* magis, quam morbi praesentis historiam, pertineant; sub illius descriptione (§. 454.) hanc iterum quaestionem, pro viribus, tangemus.

Prognosis. §. 405. Si a leprosa, carcinomatica, aliaque symptomatice praescindamus vitiliginem, nulla quidem a coeteris speciebus pe-


ricula, — sed curationis difficultates forte aequales expectandae sunt. Nec enim exesam sub cute cellulosam sic affectis restituere, aut morbosas cutis adhaerentias, et male tractati vestigia vulneris, nisi talia ope chirurgica avertendo, delere valeamus. Indelebillis a confluentibus, et a malignis *variolis* ad nasi, menti, genarum confines, — et ab *ulceribus venereis* circa pudenda, et a *scrophulosis* ad jugulum ac faciem; vitiligines generantur.

§. 406. Vitiliginem a vulnere, aut a phlo- Cura.
gosi cutanea instantem praeveniunt: illius, recentis, reunio sat prompta, aequalis, et integra, inflammationis majoris, suppurationis aversio. Quae a puris, vel sub cute adhucdum illaesa, vel in abscessu aperto, aut in ulcere collecti effectu, et a cellulosa subcutaneae concretione, consumptione timetur vitiligo: hanc, pro varia materiae illinc haerentis acredine, et pro loci, quo colligitur, indole, prompta maturatio, puris, ichoris latentis evacuatio, ac cita demum et aequalis cicatrix, moderabunt. Jam factam ab his causis vitiliginem, nunc oleum, balneum animale.

fotus emolliens, vapores ex aceto et aqua, — nunc blanda et frequens cutis collapsae agitatio, sublevatio, dilatatio, — nunc aliqua in parte sana, circa maculam, compressio, — nunc sicca huic ipsi hinc inde apposita cucurbitula, aut frictio, et quae vasorum, nervorumque hoc in loco vitam excitent, conducunt. In vitiligine *secundaria*, remedia morbo ipsi, ex quo haec scaturit, adaequata indicantur. In humida, aut in squamosa vitiligine, tum alia atque alia, ratione causae, subsidia, tum ea, quae (382. 388. 400.) proposuimus, auxilia tententur.

O R D I. G E N. V I.

A L O P E C I A.



§. 407. Quo loco pars corporis, quam pi Alopecia.
lis natura obtexerat, hac veste animali, fere
plantis parasiticis non absimili, spoliatur:
eo nascitur, non vera quidem in cute ip-
sa macula; sed humane superficiei deco-
rem offendens et morbosa mutatio, quam
graeci *alopeciam*, *ophiasin*, *aream* Latini,
dixerunt. *Alopecia* sub qualibet figura di-
latatur; si vero in longum et tortuose in-
ter capillos area proserpuit, *ophiasis* tunc
nomen a Veteribus obtinuit. Si forte sin-
ciput, vel omnis calvaria capillis priven-
tur, *calviciem* solutant.

§. 408. Ipse quidem pilus sine sensu re- Pilorum
scinditur; sed praecipua, quae volatilia, ratio.
dum plumas, quadrupeda, cum pilos quo-
tannis deponunt, patiuntur symptomata

(§. 373.), et gravissima ab evulsis vibrissis mala, — et mentis in soporosis per pilorum evulsionem excitatio, — et istorum a summo furore erectio, — a morbis certe, ac, si fides est historiae, a terrore canities, nervorum in bulbos sub cute pilis concessos imperium non parum demonstrant.

Causae. §. 409. Hinc et fortior cephalaea, et febris nervosa (§§. 87. 88.), et puerperii incommoda, pilorum defluvio favere cernuntur. Ob ignotam corporis conditionem, in certis familiis praematura constantur calvities occurrit. Quo loco viscida et oleosa collulosam, folliculis copiosis stipatam, impraegnat materia: hoc major latiorque pilorum proventus est; atque hinc auctus sub febre quavis calor, et quae hoc smegma adipemque consumunt, exsiccant; tabes, senecius, ignis, a fero crispandis capillis admoto, in cutem frequenter agens, pilorum jacturam inducunt. Acre quodcunque, inprimis venereum, leprosum, purulentum, atque aliae, quae cutis contextum, ut pediculi, tineae, profundius corrodunt, exulcerant causae, in teneros pilorum bulbos agendo, calvitiam aut

areas relinquunt: ex quibus apparet, pel-
lis magis culpa, quam vitio pilorum, alo-
peciam in multis oriri; hanc que ipsam
pro aliorum saepe magis symptomate mor-
borum; quam pro morbo primario, esse
habendam. Plerumque certe a parte, quae
pilos, non aetatis, sed morbi ratione, am-
mittet, epidermis in furfures delabitur,
aut acris ex area distillat humor; aut cru-
stosus innascitur herpes; aut demum cutis
glabra colore mutatur, et subsidet; vel
subpinguis et densa tumescit. Interim non
ita pridem vir juvenis se nobis, ob *alopeciam*
universalem, conspiciendum exhibuit, cui,
si luem veneream, 13 jam ab hinc annis
superatam, excipiamus, morbosus vix quid-
quam in vita, nec acciderat, nec sub exa-
mine inesse videbatur; licet per *menses* jam
duos sibi barbam protinus decidisse, ca-
pitis, ciliorum, pubisque pilos vix non
omnes defluxisse, et ungues manuum
emortuos, ac sicca quasi carie exesos osten-
deret. Vox erat immutata; potentia coeun-
di, in homine uxorato, a pristina non di-
versa; ac omnia, excepta debilitate a pau-
cis modo diebus accusata, de illaesa va-
letudine testimonium edebant.

Prognosis. §. 410. Pro causae, quae alopeciam, aut ophiasin produxit, differentia, judicium hoc de morbo, vel morborum magis signo, diversum est. Quae senem calvities prehendit, aut quae bulborum destructionem agnoscit affectio: haec artis superior et subsidio. Simile de alopecia, quae elephantiasin comitatur, aut indicat, feratur judicium. Cute licet detracta, capillus renascitur interdum; quem vero cicatrix locum defoedat: hunc pilus nec unquam ornabit. Quod lues venerea, aut tineae induxit capillorum defluvium; hoc, morbo primario per artem devicto, novae spem comae relinquit. Si pallida, aut insensilis est area, nec adhibita frictione rubescit; tunc ab arte, ut in ipsa *morphaea*, vix quidquam praestabitur.

Cura. §. 411. Nemo certe mortalium, quo cutis loco pili radix non subest, aut quo haec ab aeri exesa consumpta fuit; eo, crines per artem educet. Cum vero praesentis forte sub cute bulbi propriae, ob quas pilus a sua radice secedit, affectiones nos lateant: hinc facile intelligitur, cur nullibi tam empirice, quam his in rebus tractandis

et versati sint medici, et versari vix non ubique debuerint. In symptomatico pilorum defludio, morbi; qui huic ut causa subest, curatio instituenda est. Coeterum, quae pellis pilosae integritatem, nutritionem, munditiem, transpirationem aequalem, ac robur concernunt, et nimiam irritationem, sensilitatem, debilitatem, siccitatem, ab eadem avertunt: haec crines, et ex quibus nascuntur radices seu bulbos conservare, ac ammissos jam pilos resarcire, experientia confirmat. Hinc locorum, quae pilis ornantur, mundities; sudorum, pinguis, viscidaeque materiae, quae illos conglutinant, et acredinem conspicuam mox contrahunt, sollicita obstersio; ferri calidioris, quo crines crispantur, et farinae, quam his inspergunt, corruptae, aut cum calce, vel oleis acrioribus copiosius remistae, fuga; frequens pectinis et levis frictionis, tum unguenti blandioris, cunctemque subjectam lubricantis usus, pilorum jam nimis longorum, extenuatorum, aut in apice fissorum, recisio, commendari merentur. Nil melius est, quam novacula quotidie radere, quia, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur


tur pilorum radiculæ. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Labentes ob nutritionis necessariae defectum, vel ob debilitatem, — per alimenta, facilia, frequentius subministrata, aut per roborantia restituimus pilos. Acre specificum, aut aliud, quod pellem infestat, remedia sibi propria alibique trahenda exposcit. Ab adstringentibus vix tanta exspectamus remediis.

O R D. I I.

IMPETIGINES DEPASCENTES.

G E N. I.

P O R R I G O.



§. 412. Inter eas impetiginum species, quae Extensio-
 cutem non modo commaculant; sed su-
 perficiem simul depascuntur ac lambunt,
Porrigo, hic primum spectanda est. Hanc
 vero ad capitis integumenta, non coeteram
 ad pellem, reducere, complures, non satis
 apte, ut videtur, maluerunt: ut quae ad
 illa quidem interque capillos, inprimis
 densiores, frequentius, — sed certe et ad
 supercilia, et ad barbam, ad alas, et pubem,
 et in omni, qua patet, superficie, corpus de-
 foedat: nec ratio est, cur in ista, quod ad ca-
 put *porrigo* est: hoc, non diversum, nisi gra-
 du ac loco, malum, *lichenem* appellemus; aut
 quod in pelle affecta *humiditatem* ostendit,
 hoc, ob istam, ad *herpetes*, reducamus.

Definitio. §. 413. *Porrigo* hinc erit, cum epidermis a cute aspera, nunc furfuris, nunc squamularum sub specie, praevio plerumque pruritu, citra manifesta vel phlogosin, vel papulas, vel vesiculas, vel ulcuscula, copiose resolvitur, et pellem, nunc siccam, nunc acri, vel et foetido humore madentem, subtumidam, nunc pallidam, nunc ex luteo rubescentem denudat.

Diversitas. §. 414. Ex his (§. 413.) apparet, non parvam hanc inter affectionem, et *Erythema* vel aliorum (§§. 280. 285.), vel nostrum (§§. 395. 396.), affinitatem subesse. Interim nec tam derepent e porrigo invadit; nec rubor partis adeo in ista conspicuus, nec dolor ardens, aut calor magnus, ut in illo, separationem epidermidis praecedunt; sed modo pruritus, interdum vix ullus, aut tensio, ac levis dolor in cute affecta occurrunt: quae decidua modo cuticula, et cum frictio adhibetur, rubicundior apparet. Nunc ad parvam modo plagam porrigo, quasi *fixa*, limitatur; atque vel incertam, vel *circularem* omnino, cum centro rubente, figuram assumit; nunc *volatica*, et inconstans est, aut ad vicina dilatatur ac *proserpit*;

nunc certis fere anni *periodis* recurrit; nunc *universalis* ac *congenita* a quibusdam scriptoribus, et magno certe exemplo, in septem ejusdem et sanissimae familiae prolibus, a nobis observata est. *Internam* quoque dari porriginem, licet tunc furfures sub forma *sicca* separari non queant, complura nobis persuadent. Sub aphthis certe, quae stomachum, intestina obducunt, epidermis, nunc illarum sub habitu, nunc in squamulas et quasi fufures comminuta, per alvum secedit (§. 365.). In dysenteriis, ac drasticorum effectu, licet materia puriformis, coagulabilis alimentari a tubo morbose secreta, hic interdum solidescat, et membranae sub specie per anum ejiciatur; intestinorum tamen villosa interdum ab istis separari, ac furfuris levioris sub forma per alvum excerni videtur. Quod *scabiem vesicae* Antiquitas vocavit; hoc in furfure copioso ac levi in urinis suspenso, ab aegrotante hoc viscere excreto consistit. Sub catarrho tracheali, et sub specie illa cynanchis, quam *trachealem* appellavimus (§. 173.), nisi ipsa epidermis, similis saltem huic pseudomembrana, aut integra, aut squamularum furfurumque sub spe-

cie, in sputis comparet. Quodsi quidem haec a quavis, et plerumque ab erysipela-cea, superficiei secernentis inflammatione leviori contingant; fateamur tamen, quod porriginis a causis, his locis admotis, non absimiles effectus oporteat oriri; et quod nunc herpes, nunc porrigo, pro externis, quas derelinquunt, internas, in trachea, in bronchiis, in vesica, etc. sibi sedes nonnunquam eligere videantur. Sed et causae ratione in porrigine diversitas occurrit: quod scilicet mali genus nunc cutis e vitio *primarium* existit; nunc indolem ab aliis distinctam, *symptomaticum*, ostendit, et significationem diversam assumit. Sic ipsam elephantiasin praevia haec quondam praesagiebat impetigo; nec rarum est venereae hoc signo prodi luis praesentiam; et in genere porrigo speciebus se aliis impetiginum frequenter adsociat.

Decursus. §. 415. Potissima porriginis sedes capillata pars capitis est, ac neonatis infantibus, quo tempore capilli emergunt, epidermis in densas ac duras saepe squamas elevatur, et sub intenso pruritu in furfures copiosos resolvitur. Cephalaea in adultis quibus-

dam vehementior, nonnunquam periodica, praecurrit, et furfure permulto inter capillos decedente terminatur. Post febres, praecipue nervosas, petechiarum sub decursu interdum, sese capitis manifestat porrigo: quam defluvium capillorum non raro comitatur, aut sequitur. Qui, pelle subtiliori instructi, rudiori verni temporis atmosphaerae se exponunt, aut, lota vix facie, siccior frigidoque a vento perflantur; his epidermis sine pruritu in farinas dehiscens mox vultum deturpat. Ad tibias frequenter, ac fere sine pruritu aut rubore, epidermis in furfures secedit, et ad inguina scrotique confines similia cum scalpendi desiderio quibusdam contingunt. In ea, quam supra tetigimus (§. 414.), familia, epidermis in tribus ex pueris, continuo cutem asperem, duriozem, quercus cortici non multum absimilem, ac sulcis notatam, ex luteo rubescentem et siccam, sine quovis dolore, aut pruritu, in albidas farinas conversa, obsidebat. In tribus ex sororibus, non tanta, ac in quarta et juniore, cutis erat asperitas; sed frequens in parte nunc ista, nunc illa, porrigo. Una quidem ex illis, rachitide affecta, gib-

bosa, capite praegrandi ac informi, asthmate ac strumis, mente simul imbecilla, laborabat. Ex pueris, unus a phthisi pulmonali enectus est; ab asthmate alter, — ac tertius, hypochondriacis effectibus adhucdum tenentur.

Plerumque partes, quae porrigine laborant, siccescunt ac asperae tanguntur, saepe interim sub squamulis ichor paucus, lymphaticus, sub specie madoris, ex cute integra scaturit: quin diversa, ob id, mali utriusque natura sit, aut *lichenis* illinc, hic vero *porriginis* magis nomen conveniat. Vel in ea ipsa, quam *siccam* appellant, affectione, furfures tam copiosi apud multos secedunt; ut, nisi lymphaticus; qui hic continuo per morbum secernitur, et mox, ab aeris attactu, vel sponte, solidescit, liquor suppleret; epidermis non sufficeret. Quo loco squamulas, ne prompte decidant, capilli prohibent: eo, tenax, sub illis collectus, ichor hos conglutinat, corrumpitur, et acredine, quae subjectam saepe cutem arrodit, instruitur. Alibi, tenuis, et in furfures mox abitura, hoc ex liquore crusta generatur.

§. 416. Ex illis, quae (§§. 414. 415.) dicta Causae sunt, jam plures porriginis causae elucent; et qui cutem inter et epidermidem nexus intercedit, hic certe ob rationem non unam aboletur. Nunc etenim liquida, vel ob vasculorum cutaneorum lacerationem, erosionem — ob infractam resistantiae potentiam, vel ob morbosam, ex haerente hic stimulo, secretionem, sub epidermide effusa, nec promptius resorpta, hanc ipsam a cute divellunt, et in punctis nunc minimis, nunc largas per plagas, aut in miliaris hydaditulas, phlyctaenas, aut in amplas vesicas ac bullas attollunt; quae diffluente, vel denique consumpto humore, arescunt, ac tenuis, lataeque pelliculae, aut squamularum ac furfurum sub specie, a cute separantur; nunc vi morbi continuo uti arborum e cortice *gummata*, exsudans humor lymphaticus ad partis, quam inundat, superficiem dispersus, expanditur; in alteram novamque epidermidem, aut crustosum, informe operculum ab atmosphaerae attactu solidescit, inaequaliter siccatur, mox finditur, retrahitur, separatur, ac farinosum in pulverem fatiscit. Si nullus in porrigine *sicca* humor stillari di-

catur; potius intelligeudum est non satis extillari, ut cutem tactui madidam offerat, difflato prius, aut solidesciente humore, quam cuticula decidat.

Quaecunque hinc causae in cutem, aut in rete mucosum agentes, et istorum cum epidermide nexum dissolvunt, et, proprio in pellem stimulo, loco tenuis, subsalsi madoris, liquorem in coagulum pro-niorem, morbosum, acriorem, aut et foetidum excerni, aut aliunde huc deponi faciunt: eae *porriginis*, tum primariae, tum illius, quae coeteras impetigines, exanthemata non pauca comitatur, rationem largiuntur. Non igitur specifica hic materia, aut praevium semper in humoribus vitium, et criminis ubique veteribus damnata bilis, sed vel acre, nunc illud, nunc istud, — vel, mitior lentiorque erysipelate, ac herpete (§. 420.), aut pellis aut reticuli mucosi phlogosis, — vel glutinis nutrientis in cute aut copia, aut defectus — vel morbosa in pellis contextu sensibilitas ac perversa secretio, — impedita cutis, ob pilos numerosos, aut spurcitiem, transpiratio, — pulveris cyprii acrioris, aromatici usus, radiorum solis actio in

cutem diuturna, porriginis ut causae prae-
cipuae accusari merentur.


§. 417. Variarum hinc porriginis, ejusque **Prognosis:**
a causis repetenda, est prognosis; atque
nec ubique sine aliquo vitio corporis nasci-
tur, vel ex toto in omnibus inutilis est;
nec solius modo pellis a culpa non inter-
dum occurrit; aut majorem, quam ipsa
sit, morbum subinde non indicat impeti-
ginis haec species.

§. 418. Qui ad diversas porriginis causas **Cura.**
(§. 416.) respexerit; is non unam, sed
aliam aliamque, cuivis ex istis oppositam,
curationis sibi eliget methodum. Hinc alio-
rum, ex quibus haec affectio pendet, mor-
borum fomes in genere tollendus, et actio
in cutem praevertenda sunt (§. 375.). In ea,
quae istius modo culpa prodit, aut quae
ab acri hic eleborato, aut collecto induci-
tur, porrigine, illa, quae pellis aut sicci-
tatem, regiditatem, aut laxitatem, sensi-
bilitatem perversam, aut plenitudinem
corrigant, et quae stimulantem per poros
cutaneos expellant materiam, conducunt.
Summa hinc cutis puritas, et frequens
pectinis ad sordes inter capillos removen-
das usus, indicantur. Densiore forte,

importunamque comam, inprimis si tenax illam foetidusque ichor conglutinet, rescindere, — sed simul, ne capiti, resecto vix pilo, frigus obsit, cavere oportet. Ariditatem, rigiditatem pellis, decoctis seminum lini, herbae malvae, partium animalium et pinguium, lactis balneo, aut fotu, axungia recente, corrigimus. Laxitatem, frictio, frigidaeque usus, aut vini alcohol cum ista conjunctum, aut corticum quercus, vel chinae decoctum, solutio aluminis, salis saturni, aut fascia, tollunt. Perversam cutis sensibilitatem, ac pendentem forte ex hac ipsa secretionem morbosam, si praedictis, aut internis remediis non cedant; oleo hyosciami cum opii portione illito, — vel et stimulo contrario ex cantharidum tinctura, ex urina recente, sero lactis cum aceto remisto, moderamur, plenitudinem cutaneam scarificatio dispergit (§. 375.). Quo vero tempore externis porriginem primariam agredimur auxiliis, excretionum naturalium, transpirationis scilicet, urinae atque alvi habenda est ratio; quae, si recte succedant, ac moderate augeantur, porriginis curationem eximine secundant.

O R D I I. G E N. I I.

H E R P E S.



§. 419. *Epidermidem modo porrigo* (§. 413), *Affinitas.*
 — mucosum vero reticulum, et cutis ipsius superficiem *herpetes*, arrodunt. Quam vero illa cum *erythemate* (§. 396.) formae affinitatem manifestat (§. 414.): hanc isti, cum *erysipelate* pustuloso (§. 282.), ejusque imprimis specie, quam *zonam* appellavimus (§. 287.), febre tamen plerumque expertes, ostendunt; et communissimum in civitatibus, lateque per familias expansum cutis morbum nobis exhibent: qui propria nominis diuturnitate, quam natura rebellis, ac insidiis, quas visceribus saepe struit, infamis est.

§. 420. *Herpes* vero est species impetiginis, *Definitio.*
 quae papulis exiguis, aut rubris, aut pelucidis, subflavis, aggregatis, cum pruritus, tensionis, ac ustionis quasi sensu, ad cutem, subtumidam, ac subduram, efflorescit; his vero vel sponte, vel scalpendo

disruptis, pertinaciter ulceratur, sanientque acrem, vicinas saepe partes arrodentem plorat, ac squamis, vel crustis informibus obtectae in lemas atque furfures resolvitur.

Differentiae. §. 421. Herpetis solita in *miliarem*, *rodentem*, ac *phagadenicum* divisio, formae potius, ac vehementiae, quam diversae hoc in morbo naturae: fundamento innititur. Nec alia, nunc temporis, *Mentagrae*, quam *herpetis*, nisi loci, quem illa occupat, differentiâ, est indoles; ac si propius haec singula describi nihilominus mereantur; non tamen ideo pro morbi speciebus distinctis, quae gradu violentiae, aut sede, modo differunt, declarari debuissent. Alia vero causarum (§. 423.), quae haec singula producant, est ratio; ac ipsa medendi methodus hac a morbi tam multiformis divisione dirigitur: eo quod scilicet nunc cutis ipsa, injuriis occultis agitata, *primarium*, nec ab aliis pendentem, secretionis vitiosae effectum, sibi morbum elaboret (§. 416.); nunc vero ab acri quocunque ad superficiem *symptomatice* invadatur; ac illius magis, ut ab hoste liberetur, quam sui ipsius, nisi jam *complicata* morbi indole, curam exposcat. *Conge-*

niti in quibusdam, — *haereditarii* in aliis, — *epidemici* aliquando, exempla *herpetis* occurrunt; ac demum in aliis, hiemali hic tempore disparere, solis aestu redeunte, redire, et quas illinc in viscera furias exercuit, has ad pellem hinc, quadam fere *periodo*, ac *metestasi*, seu *crisi imperfecta*, converte observantur.

§. 422. Sed, qua sub forma herpes in cute compareant, et quas illa mutationes, eodem in morbo, patiatur, dicendum nunc est.

Descript.
herp.

In parte scilicet nunc hac, nunc illa, pruritus ingratus, ac sensus ardoris, tensionis percipitur; et mox papulae vel rubrae, vel flavae ac pellucidae, circa limbum rubellae, sat copiosae, sed dispersae, sine cutis intermediae phlogosi, ac sine febre, comparent; quae papulae vel sponte, vel unguibus disruptae, mox squamis obteguntur; quas latens sub eisdem superficiale ac urens ulcusculum mox adjicit, mox renovat; donec lento hoc ipsum decursu siccescat, ac in lemas, furfures, et albescentes quasifarinas, fatiscat. Ad faciem; praecipue pone aures, mentique confines, circa poplitem, et collum, ma-

H.
simplex.

nūum ad palmas, plantasque pedum, hic *simplex*, vel et *farinosus*, ut appellant, *herpes* frequenter occurrit, ac internos saepe partium dolores, et nervosos, ut vidimus, affectus hinc inde dispergit.

H.
Miliaris,

Milarem herpetem, pustularum seminibus milii similium a forma, — ac si paulo majores observarent vesiculas *phlyctaenoden*, vocarunt illum; qui majori, quam *simplex*, pruritu, calore, tensione tumore partis his a papulis copiosius obsessae, ac rubore per interstitia extenso, incederet. Insignes non raro, hoc sub statu, cruciatus, digestionis sub tempore, lautiores post epulas, et ad noctem cum vigiliis crescentes, experiuntur aegroti, ac interdum, licet rarius, febricitant. Tumor splendens ac ruber, ustionis quasi sensus, manifestam hic phlogosin, ac magnam cum *circini* (§. 287.) symptomatis similitudinem, sed longiorem ac pertinacem magis decursum, ostendunt. Brevi tempore vesiculae, ad fundum jam erosae, ad apicem subalbae, rumpuntur, ichor acris, qui effluit, saepe foetet, et partim in crustas sat tenues, inaequales, scabrosas, colore nunc cinereas, nunc luteas, nunc a sanguine commisto,

vel ex fissa epidermide squamosa stillante, subatras, concrescit. Ad manus (facile utriusque) dorsum, ad brachia, crura non raro ad scrotum, perinaeum, vel quavis alia in parte, si forte faciem excipiamus, haec impetigo frequenter prorumpit, ac saepe per menses, et ut vidimus, per annos, renovato saepius pustularum reditu, moderato hinc inde furore, nunc eodem, nunc alio in loco, nunc in pluribus simul, ferocissima continuat.

Minori plerumque violentia *herpes ro-* H-
dens, vel *serpigo* incedit; sed conspicua rodens.
rapiditate extenditur, atque a crustis eodem sat densis oblecto, contentus sub istis ichor in vicinas sibi partes invehitur, ac faciem inprimis, aut partes quasunque, exulcerat quasi larva, obducit; atque cutis vestigia exesae hinc inde relinquit.

Huic ipsi herpetis varietati, vel et *leprae*, Mentagra, ubi mentum, aut vultum fere totum defoedabat, *Mentagrae*, si recte iudicemus, et nomen impositum. Solius menti herpetem squamosum et quasi farinis conspersum, in *Clinico Instituto* observavimus, in eo certe singularem: quod viri ab eodem affecti

barba, pilos, prope cutem, penicilli in modum unitos, mox vero divergentes, crassiores ac asperos ubique exhibuerit.

H. *Herpetis phagadenici* non alia, quam
phagaden. *h. rodentis*, ejusque peioris, aut cutem, in tumorem elatam, profundius ac fere integram exulcerantis, nec ideo in vicina tam late serpentis, conditio est.

Quod vero hic adducta herpetum divisio non nisi varios ejusdem mali gradus nobis offerat: vel ex eo, quod illorum unus, in alterum saepe transeat, conjicere, licebit. Pro varia scilicet sensibilitatis cutaneae, ac pro rerum aliarum positione diversa, a causa prorsus eadem herpes, nunc simplex, nunc miliaris, nunc rodens, aut ulcus herpeticum, eodem in homine nascitur. Quo fortior irritatio hoc a malo inducitur: eo plura tum localia, tum a consensu derivanda, excitantur symptomata. Ad internas saepe partes, ut per nares, laryngem, etc., herpes proserpunt; ac disparens, aut repulsum a cute malum, eventu non raro lethali, convertitur ad viscera. In eodem homine, ad iras effrenes proclivissimo, ac simul kypochondriaco, vertigines et salutis alia non pauca incom-

meda ab herpetis *simplicis* ad pedum plantas eruptione mox cessasse conspeximus. Hunc tamen spirituosus et acribus tractari aegrotanti placebat. Nascitur hydrocele: quo, per sectionem testiculi sanato! exvulneris jam clausi superficie serum acre, ad plures in die uncias, per binas fere hebdomadas, cum emolumento, exsudat. Sed hunc quoque fontem vir consiliis rebellis exsiccatur, et primum hepatitis, — hac vero persanata, maniaca per menses insequuntur deliria. Ipsa iterum ad scrotum cicatrix aperitur, ac humor acris effunditur: quo, fluere cessante, in manus utriusque dorso herpes *miliaris*, ac tandem *depascens* compareret, et immanes rebellis dolores producit. Externis iterum abacta impetigine, periculosa otitis se prodit: qua feliciter dissipata, ad tibias herpes, ac pristina cum illo valetudo revertitur. Ex venereo ad perinaeum herpete percusso, dolorem in thorace punctorium, sputa sanguinis ac tandem purulenta, cum macie extrema et singulis pulmonalis phthiseos symptomatis, mercurialium virtute superare nobis licuit. Vel ad pulmones, vel uterum, vesicam, vel alia ad viscera aberrantis, vel

istius, ex illis, ad cutem, felici cum omine, transvecti, copiosa occurrunt exempla: quae singula herpetem ad internas non minus laete, quam externas ad superficies florere, ac symptomata pro sede mali diversa excitare, luculenter ostendunt.

Causae. §. 423. Ipsius certe cutis extremis in oris, ac reticulo mucoso, sicut *porriginis* (§. 416.), ita et *herpetis primarii*, praeparatur, aut nascitur, ac fovetur, incognitae licet naturae, materies. Nec forte magna inter illam, cum pellem pertinaciter, quasi arborem lichenes, deturbat, — ac herpetem nisi majoris ac fere causticae in ista acredinis, differentia est. Quid vel sola in vasculis cutaneis *secretio mutata* in mutantis humoribus valeat; hoc, simplicioris ex vulneris, pus inodorum ac blandum fundentis, — sed forte neglecti aut stimulati, ac in *ulcus* conversi, ichorem foetidissimum ac vicina rodentem, ex sanguine sanissimo, separantis, historia elucet. Forsitan non tam male diceremus: herpeticam, vel aliam, specificam, atque acrem, tunc in cute, sanguinis sine culpa, generari materiam; cum ejus vascula, per causam peculiarem, mo-

Secretio
morb.

do sic, modo aliter, incitata, prout vasa *melois vesicatorii* sponte ac sine morbo pro aliis, — ita rodentem atque crusticum sibi ipsis, liquorem secernant. Hujus certe sic, humorum sine vitio, praeparate fomes materiae, modo cutem, ex qua stillat, ac vicinias arrodit, exulcerat; modo copia adauctus, et ad sanguinem resorptus, — aut forte in isto non mutatus, aut transpirationis urinaeque per vias non rejectus, perpetuam herpetis causam constituit; quae, nisi ad cutem expulsa, febres nunc lentas, sive hecticas, — nunc glandularum, viscerumque infarctus, — ad pellem vero delata, propriam in ista, irritationem, secretionem morbosam, ac impetiginem analogam, vix tamen, ut nobis videtur, in alios contagio, nisi forte symptomaticus, ut venerus, sit herpes, transiaturam, constituit. Quid hominis integumenta, fluidorum sine vitio, ut herpeticum ichorem, loco blandi madoris, secernant, inducat: hoc equidem determinari non potest; sed vix *unum*, vel, ut vocant, *specificum*, hoc esse; causarum aliarum, quae similem in cute impetiginem producunt, effectus commonstrat.

In *bile* praecipuam herpetis causam antiquitas quaesivit: et negari non potest, hoc fluidum, aut exuberans, aut mora, vel aliter corruptum, in cute, tum ex hepate regurgitans ac resorptum, tum solo abdominis in pellem consensu, istus integritati non parum obesse (§§. 274. 373.). Major forstian herpetum in iracundis, quam aliis in hominibus, frequentia occurrit; in ictero rebelli tum pustulae cutaneae, tum insignis pruritus comparent; et quae de chronico ac habituali jam dicta sunt erysipellate (§§. 288. 290.), haec, sectio pathologica de herpetibus aliquando confirmat. Sed reticendum simul non est. Veteres ex flavo magis contenti in pustulis liquoris aspectu, ac insana de *quatuor humoribus* theoria, quam ex alio fundamento, herpetum, aliorumque affectuum, qui cutem defoedant, originem a bile derivasse. Nec etiam, cum abdomini consensus in cutem conceditur: hic idem est isti, in illud, negandus est, — nec detecta post mortem in hepate labes, pro causa magis, quam pro effectu herpetis, ubique declaranda fuisset: cum vel ipsa sub psora, seu scabie, quam ex hepate nemo jam derivat, jecinoris ob-

structio, quae impetiginis inveteratae aut male tractatae effectus est, subinde occurrat.

Nil interim aptiorem generandis herpe- Diaerae
vitia.
tibus materiam, quam longa in cibis, aut rancidis, corruptis, aut aromate acriori conditis, ac potu spirituosio intemperantia, largiri videtur: cui, si otia, animique curae graviores superaccedant; nascitur singularis illa in lymphâ hominum aulicorum vel procerum ad herpetem, ut altera, in podagram, huic coetui, prae alio, fere propria, dispositio.

Illud ipsum vero, quod vel affectibus Acria
diversa.
rheumaticis, vel scrophulis, vel scorbuto, lui venereae, vel crisis imperfectis; subest, — herpetis non raro in pelle condit principium. Ex acri inierim *veneres degenerante, herpeticum* oriri, non minus, quam pomorum e semine prunos expectare, absurdum videtur. Ex parentibus herpetes, vel fluidorum, vel solidorum ex culpa, in filios, haereditatis sub specie, transire, experientia confirmat. Quid excretionum naturalium, vel illarum, quibus jam absuevimus, suppressio in pellem queat, jam satis expositum est (§. 274.), et

copiosa mulierum, quibus aut menstrua, aut fluor albus, — multorum, quibus haemorrhoides, aut sudor pedum solitus, aut ulcus artificiale, vetustum, — inprimis senum, quibus et urinae et cutanea simul excretio, aut languent, aut suppressa sunt, exempla, herpetis originem ex uberrimo hoc fonte non parum illuttrant.

Sed quod frequentes herpetis ex locali cutis stimulo natales demonstrat; illius, vel a simplici foeminarum *collari*, ex pilo humano, — vel a praesbyterorum illo, ex lino scilicet confecto, oriundi, exemplum est. Jam solae, quas oculus inflammatus cystillat, lacrymae, et genas arrodunt, et phlyctaenas in illis quasi herpeticas attolunt; quid igitur mirum est, si cutis, quocunque demum modo, stimulata, humorem, quem continuo expirat, insonte licet sanguinis massa, in acrem ac fere causticum ichorem convertat?

Coeterum et cutis immundities, et lanarum, pannorum, vel oleo impuro ac rancido, vel rebus acribus imbutorum, tinctorum, tractatio, sartoribus, textoribus, atque aliis, qui impura et uliginosa

simul loca inhabitant, hanc foedam impetiginem hinc inde communicant,

§. 424. Sicut varia herpetis natura et ori- *Prognosis.*
go, ita diversa quoque prognosis hujus mali est. In genere, herpes gentilicius, congenitus, pubertatis post epocham continuans, inveteratus, difficulter, si unquam, superatur. Quae alterius symptoma et morbi, aut istius quasi crisin constituit, herpetica affectio, illius, nisi vitii primarii recisa radice, vel certum aegrotantis in damnum, vel sine magno successu, suscipitur curatio. Nec symptomaticus quidem herpes, ablata licet causa principali, si natura jam ulceri adsueverit, sine quovis respectu, derepente per externa suffocandus est; ac majora plerumque sanationis perversae, quam ipsius externi herpetis, pericula cernuntur. Quo tempore menstrua apud mulieres suspenditur, aboletur excretio: eo, herpes non raro malignam, et carcinomaticam quasi, naturam assumit. Qui recens est, et a solo cutis vitio exoritur herpes; hic non modo facilius, et sine noxa, externis tractari, sanari mox potest; sed internae infectionis ob

metum, extirpari celeriter debet. Quo major coeterum herpetis in cutem et impetus, quo magis hanc penetrare, exedere, ac crustis defoedare cernitur: eo major plerumque in eodem sanando difficultas, et factae retrocessionis fortiora timenda sunt pericula.

Cura. §. 425. Sub cura herpetis, ad illa inprimis, qua alibi (§§. 375. 418.) jam dicta sunt, respici tur; — mox vero, num primaria, vel secundaria, num recens, vel antiqua impetiginis sit indoles — et qua ex origine haec fluat, inquiratur necesse est. Prima igitur et hic erit regula: ut quae causa interna herpetem pro effectu agnoscat: haec, oportuno regimine, ac remediis huic ipsi oppositis corrigatur. His vero peractis, aut etiam, si cutis modo vitium subesse videatur, ommissis, sub debito habitudinis jam fortisan contractae, respectu, ad externa mox subsidia (§. 375.) recurrendum est.

Quam sibi *herpes secundarius* curandi rationem exposcat; hoc aliis hujus operis ex locis eruendam relinquimus. Cum vero non una, sed alia aliaque sit herpetis ma-

teria, quin vera ejusdem indoles ex clari-
riori, quam solius cutaneae affectionis,
signo ubique eluceat, atque hinc multa in
corrigendo incognito hoc fomite difficultas
nos premat hinc generales saltem in eo cu-
rationis amplectimur regulas: ut, habita
causarum ratione, cutis potissimum natu-
ralem excretionem, ac stimulantis exha-
lationem materiae, per summam illius
munditiem, depitumque atmosphaerae
regimen promoveamus. Frequentior her-
petum origo ex eorum, quae per cutem
vel renes excernenda fuissent, retentione
derivanda videtur; vel saltem illa, quae
urinas, cutaneam transpirationem adau-
gent, ab experientia hoc in morbo proficua
esse docentur. Hinc corporis exereitia,
frictionis, balnea, indusia quidquam aspe-
ra, ex lana puriori confecta, et ea, quae
prae aliis in cutem agere videntur, medi-
menta, antimonialia inprimis refracta dosi
porrecta, autimonium crudum, aethiops
antimonialis, vinum antimoniatum, sul-
phur antimonii auratum, cum gummi resi-
na guajaci vel mercurio dulci conjunctum,
flores sulphuris, cum successu nonnun-
quam adhibentur.

Qui vero acre herpeticum sui generis supponunt, hi certis, ac specificis ut vocant, hoc ipsum medicamentis corrigere ac subjugare studuerunt: atque tum stipites dulcamare, seu *solani scandentis*, tum corticem *ulmi campestris* internum, pulsatillam nigricantem, seu *anemonem pratensem jaceam*, seu violam tricolorem, vel et *alcali volatile causticum*, in auxilium vocarunt. Laus dulcamarae ad magnas satis doses in decocto (N. XLIV.) vel in debiliore hoc ipso extracto porrectae, a sat multis hucusque confirmata est, et sub forma pilularum cum aliis (N. XLIV.) remista medicina tentari meretur. Fatemur interim, frequenter in vanum haec singula praescribi: nec major est virtus illorum, quae ad acre, ut sibi persuadent, involvendum, dulcificandum, ut sarsaparillae, saponariae, chinaeque radicum, aut viperarum, aut testudinum, ranarum decocta, aliquando per menses aegrotantibus ingeruntur. Seri lactis, vel solius, vel cum succis plantarum, fumariae, cichorei, rumicis acuti, seu lapathi, menyanthes trifoliatae, seu trifolii fibrini, remisti effectus haud magnos in herpete conspeximus; interim, si viscerum ob-

structio huic ansam porrigere, aut biliosa colluvies, aut scorbutica dispositio subesse videantur: tum ad ista, tum ad alia, quae his causis opponantur, confugere licebit. Quibusdam rebellem salis acidum marini herpetem profligavit.


His vero, atque aliis, pro morbi causa, vel adhibitis vel ommissis remediis nisi herpes superetur, ad externa veniendum est auxilia. Sic diuturna ac in habitudinem jam conversa impetigine, huic ipsi vicinus non sine fundamento, priusquam illa persanetur, excitabitur fonticulus. Sub fortiore herpetis phlogosi, tensione, dolore, aut si crustae densiores hunc efformant: emollientia et anodina, vaper tepidae, cataplasma ex lacte cum pane, oleum, butyrum recens, fomentatio cum malvae decocto, adhibeantur necesse est. Si febris, quod rarum est, urgeat; venaesectio, vel sopiens dolores ex opio remedium, conducunt. Sedata vero quidquam irritatione; ad illa, quae secretionem morbosam vel exsiccent, vel protinus immutent, veniendum est. Extractum saturni liquidum cum aqua remistum, vel cataplasma ex ista, et pane confectum, vel unguentum saturnium,

hic multis auxilio sunt; atque damna, quae a plumbo derivantur, praeposteræ herpetis sanationi non raro tribuenda fuissent. Quibusdam interim in casibus tensionem, ac dolores hac a methodo adauctos observavimus. Similia de usu externo mercurii sublimati in aqua soluti nunc summopere proficuo, nunc nimis irritante, dicenda sunt. Unguentum mercuriale album (N. XLVI.) vel citrinum (N. XX.), his in die ad pisi magnitudinem herpeti illitum, vel aliud ex zinco (N. XLVII.), hunc saepius dissipavit. Sed haec singula tam a succo Nicotianae tabaci, emplustri sub forma (N. XLVIII.) applicito, quam inprimis ab aceti distillati fortioris usu, superari conspeximus. Corticis quoque nucum juglandium viridis, sed prius siccati, decoctum (N. XLIX.) ad ulcera herpetica laudatum est. Interdum rebellem aliis herpetem, vesicans ex cantharidibus emplastrum huic ipsi impositum radicatus exstirpavit; nec aliter Antiquitas, quam urendo, suppurationem, et tandem cicatricem inducendo, hoc mali genus obstinati pertractabat. Summos non raro in dissipandis herpetibus effectus maris balneum habuisse ob-

servavimus; nec minora eosdem in thermis sulphureis subsidia expectant. Sed quocunque demum externo remedio herpetem dispellere conemur: opus est, ut secretionis cutaneae ac renalis simul ratio habeatur; atque multis, nisi aliter forte jubeat debilitas, lenis ac repetita per alvum evacuatio conducit.

O R D. I I. G E N. I I I.

H I D R O A.



§. 426. Non absimile forma herpeti sim-
Definitio. plici cutis vitium *hidroa*, seu phlyctaenae,
 grano milii plerumque aequales, interdum
 majores confertae, vix cohaerentes, le-
 vioribus ex causis derepente cum pruritu
 oriundae, fugaces, aut brevi mora in
 squamulas aut furfures resolvendae, nobis
 sistunt.

§. 427. Aliae vero ex istis (§. 427.), pellu-
Diversitas. cidam, sphaericamque hydatitulam prae-
 sentant: quae, nunc diaphana, ut cutis
 ipsa albescit, — nunc figurae magis coni-
 cae, levi phlogosi ad basin suam cincta est,
 ad apicem subturbido, flavescente liquore
 turget, et, origines ratione, *hidroa sudamen*
 vocatur. Aliae sub febribus tum acutis, ut
H.
sudamen. illa, quae peripneumoniam comitatur (§.
 193.), tum in ipsis intermittentibus, ad
 pectus, labra, vel alias ad partes, nunc

evidenti cum fructu, nunc sine isto, cum pruritu et ardore, copiose prorumpunt, et sponte disruptae, herpetum adinstar, in crustas exsiccatae; brevi tempore in squamulas resolvuntur: *hidroa febrile* ^{H.} ^{febrile} dicitur. Vel a solo terrore, oris circa ambitum, phlyctaenae prodierunt, et apud hystericas, chloroticasque virgines, apud hypochondriacos, similia hinc inde sine causa manifesta occurrunt. Ipsa demum foeminis delicatulis miliaria, quae febris sine impetu per menses in cute teneriori florescunt (§. 312.), — atque illa, quae ex tendinum laesione, ex ossium fractura, vulneribus, hinc inde oriuntur (§. 324.); huc spectant; ac singula nervosae prosapiae phaenomenon nobis offerunt: quod *hidroa nervosum* ^{H.} ^{nervosum} appellabimus. Alia phlyctaenarum, rariorque est species; quae, coloris nunc albi nunc lividi aut subnigri, circa limbum inflammata, ac in vesiculis lenticulae, vel et fabae magnitudinem aequantibus consistens, vel *noctis* modo tempore ad cutem erumpit, vel eodem dolores acerbos, diluculo remittentes inducit, et *Epinyctidis* ^{H.} ^{Epinyctis} sibi nomen a veteribus obtinuit (*hidroa Epinyctis*). Ipse forte *pemphigus* (§. 357.

359.), cum sine febre comparet, hoc ad genus morborum referri meretur.

Decursus. §. 428. *Hidroa sudamen* aestivam atque calidis regionibus magis propriam, levioris momenti, cutis affectionem constituit. Frequentior sudaminum, sub aere simul calido ac humido proventus est, et, qui huic necdum absueverunt, coeli frigidioris incolae; hi prae aliis a pruriente hoc pellis affectu per annos bene multos, sub quavis aestate, tenentur. Infantes prae adultis, et ex istis, illi, qui cute teneriore obteguntur, sudamina patiuntur: quae in facie non minus, quam ad manus, totamque superficiem, sub forma descripta (§. 427.), nunc alba, nunc rubra, cum summo, et ad noctem praecipue crescente pruritu, efflorescunt, et a quovis corporis exercitio, vel frigidioris ab aquae potu, mox numero augentur. Saepe qui sub fervida aestate undae frigidae solatia sibi quaerunt, mox a balneo ad cutem copiose his a pustulis obsidentur. Quemadmodum vero hae phlyctaenae ad pellis superficiem quam citissime erumpunt; sic a moderato atmosphaerae calore ex eadem

promptissime disparent; ac licet ab istis plerumque nil damni observetur; non tamen desunt exempla illorum, qui, pruritus ad cutem impatientes, sudores salutaris arcendo, vel flumina petendo, in febres, diarrhoeas ac alia incommoda non pauca inciderunt. Post paucas modo dies sudamina arescunt ac in squamulas resolvuntur; sec donec solis aestus dissipetur, in cute mox nova succrescunt, ac somnum vix ullum sic effectis sub stragulis concedunt.

Hidroa febrile, morbi primarii, cujus comes est, decursum vel totum obsolvit; vel, ut crisis salutaris, huic finem imponit.

Similia de *hidroa nervoso*, alterius plerumque morbi symptomate, dicenda sunt.

Epinyctis hidroa, nisi *circinum* aut *zosterem* (§. 287.), aut *pemphigum* (§. 395.), pro ista, Auctores, ut dubitamus, describant, perraram, nec visam nobis, forte eandem cum *termintho* Graecorum, aegritudinem constituit: sine sexus, aetatis aut roboris ratione, nunc praeviis, nunc exclusis, torpore, lassitudine, anxietate, pallore, anorexia, ex cute tenera vel transparentes et albae, vel lividi, aut atrii coloris phlyctae.

nae, nunc discretæ, innumerae, nunc largam cutis plagam occupantes; ad lentis, sive fabae magnitudinem, raro magis, extensae, ad noctem, plerumque cum febre, erumpunt; vel, si solis ab ortu nascantur; sub illa tamen vehementius, et supra magnitudinem ulceris, aegrotum torqueut. Singulas phlyctaenas rubor urens circumdat; atque dum illa rumpitur, humor plerumque transparens, et cui lividum vel atrum fundus ulceris latentis colorem impertiverat, effluit. Spoliata humore contento epidermis collabitur, atque cum ipso demum ulceris fundo post paucos jam dies arescit, et in squamas, non sine cutis erosae vestigio, resolvitur.

Causae. §. 429. Non sanguinis certe, sed sudoris, calidiori sub coele copiosioris, foetidioris, acrioris, et ad pellem sensiliorem a causis minoribus retenti ex vitio, sudamina nascuntur. Contractis scilicet a frigore incaute admisso cutis spiraculis, impulsus his ipsis liquor transpirabilis, lateraliter, rete inter mucosum ac epidermidem, transudat, hanc ipsam ab illo divellit, vesicula miliformi inclusus, tensionem, stimulum.

que hic concitat, ac specifica acredine a morbosa secretionē, vel propria natura, instructus, subjectae pellis nervulos, ut cantharidum huic impositum acre, irritat istamque exulcerat, vel in sanguinem cum violentia et in copia revector, nunc in canalem intestinalem, nunc alias in partes in vehitur, ac choleras, diarrhoeas, aut febres, anxietates, catarrhos, ac rheumata inducit. Nullibi certe major ex suppressa transpiratione, quam illinc morborum est cumulus: ubi fervidae atmosphaerae aestus ac humiditas continua affluxum humorum ad cutem laxiorum simulque magis sensilem, perpetuo invitat, et ubi major coeli inconstantia maceratae pellis opus suspectum interioribus frequentius ac cum impetu transmittit. Non alia phlyctaenarum ex terrore, ex affectu quovis nervoso, qui vasa cutis impetuose constringunt, ac majorem in cute sensibilitatem inducendo, secretiones in eadem morbosas inducunt (§§. 276. 359.), origo videtur. In *hidroa febrili*, ac *epinyctide*, eas ipsas, quae nunc miharia (§. 324.) nunc erysipelas (§. 288.), nunc pemphigum (§. 360.) progenerant, ratione subesse arbitramur. Quid in se-

cundo ex illis, tam graves noctu dolores excitet; hoc non magis, quam venerorum ad ossa dolorum augmentum nocturnum, intelligimus.

Prognosis. § 430. Sudaminum nulla, nisi, quae diximus (§. 428.), retrocessionis subitaneae, discrimina existunt. Qui plures per annos coeli calidioris in cutem actioni assueverunt, hi tandem sudamina, quam advenae, pauciora patiuntur. Phlyctaenae febriles nervosae, ex morbis, quos ut crisis, vel symptoma sequuntur, iudicium desumunt. Epinyctidis, ut naturam, sic et prognosin ex propriis observationibus indicare nequimus.

Cura. §. 431. Ab adversis modo rebus in sudaminibus abstinendum est; et qui causas hujus incommodae magis, quam morbosae affectionis evitare non potest; hic, ne talis demum haec fiat, sudorum non impatiens, a subitaneo corporis refrigerio, et frigidis a balneis, atque illis, quae cutis poros obturent, sibi caveat. Sub majori puritu, quies corporis, atque regimen, ut vocant, antiphlogisticum, conducunt. Si


post subitaneum phlyctaenarum retorces-
sionem internae irritationis symptomata
sequantur: in robustis interdum venae-
sectio, ut plurimum vero balneum, quod
cutem reaperiat, tepidum, infusum sambu-
ci cum oxymelle, ac similia indicantur.

In *febrili hidroa*, et in illo, quod *ner-
vosum* est, remedia primario, unde pen-
dent, morbo adaptanda sunt. Si crisin
istius effecisse videantur; ab externis, nisi
fotu emolliente si dolor urgeat, abstinен-
dum est.

Epinyctidis nos curam, experientia des-
tituti, hic tradere abstinemus. Fortiorem
interim, si nobis occurreret, phlyctaenae
dolorem, tum anodino cataplasmate, tum
opii externo, internoque ad noctem usu
inoderato, atque illis, quae nimiam in
pelle irritationem sopirent, tractandum
fore crederemus.

ORD. II. GEN. IV.

PSORA.



Nominis
ratio.

§. 432. *Scabiem* Latini nominarunt morbos fere omnes cutaneos, qui, ob majorem pruritus, ad *scabendum* invitarent aut coegerent infectos. Graecorum *psora* non minus vagam, ipsique *leprae* subinde concessam; significationem agnovit; sed quod a tam communi, tantasque impetigines comitante scalpendi pruritu derivationem non sumat; hoc nobis nomen ad morbum, de quo nunc sermo erit, designandum, prae illo scabiei, arridet.

Definitio.

§. 433. *Psora* vero impetiginis est species, quae, vel proprio, et contagioso a fomite, vel potius ab *acaro*, humanae cuti infesto, contagii praemissi sub aspectu, sed sensim sensimque, et ex parte in partem, productu, in pustulis exiguis, miliaribus, hinc illinc majoribus, solitariis, ad fundum duris ac rubellis, ad apicem pelluci-

dis, albescentibus, excepta fere facie, ubique, — sed manuum inter digitos et ad carpos praecipue: conspicuis, super cute elevatis, voluptuose sub modum aestuque corporis, et ad noctem imprimis, prurientibus, ac disrupta cuticula, crustosis, ulcerosis, in squamulas abeuntibus consistit.

§. 434. Impetiginum haud paucae (§. Diversitas. 439.), externo quidem habitu, cum *psora* conveniunt, et confundi cum ista perfacile queunt; set, sicut origo: ita species hujus morbi videtur *una*; et quae pustularum, ab habitu nunc arido, nunc puriformi, in *siccam* et *humidam* suscepto est divisio: haec, licet illa, prae ista, magis pruriant; rem protinus eandem et modo forma diversam, scientiae sine fructu, bipartit. Cum aliis quidem *psora* affectibus hinc inde *complicatur*: et a scrophulis, scorbuto, a venerea, aut rheumaticae materiae, vel ab epidermiae constitutionis plenitudinis cutaneae, aliorumque effectu, exasperari, mutari observatur; sed ex istis, modo *acarus* si desit, non illa, sed similis huic aspectu morbus, generatur. Quae *erisipela* hinc inde constituuisse refertur *psora*; ea vel haec

ipsa impetigo haud fuit; vel ab hominis infecti, aut rei ab eodem tractatae contactu, clandestine profecta est, vel ut quaevis alia cutis, non specifica, exulceratio aegrotanti conduxit. A febribus non raro, ut aliae impetigines, sic et psora, e cute dispareret; vel quod morbi causa, *insectum*, aegrotante in solo incrementum viresque non habeat, et febricitantis superficiem, ut morituri caput hominis pediculi, mox deserat; vel quod stimulus a latente sub cuticula animalculo, ob totius laborem, non, ut sana in pelle, respondeat. Ut vero rebus inanimatis quibusvis, — sic et corpori aegrotantis, diutius haec insecta interdum adhaerere, — vix autem a succo animali sustentari videntur: quo tandem, sub restitutae valetudinis conditione, ut prius, et cum pristinae exulcerationis, et quasi *crisis* effectu, uberrime fruantur. De *psora epidemica*, observationes (non interim sine magna alterius impetiginis cum illae confusae suspicione), testantur; sed ut vermes intestinales, atque varia in campis insecta, hac sub anni constitutione longe melius, ac sub alia, sobolescent: sic et *acarus exulcerans* non minori, quam ista, pri-

vileligeo gaudebit. Sub certis atmosphaerae constitutionibus, psora non aliter *epidemice* grassari videtur; quam quod pauperum familiae, a frigore vel pulviis in angustis tuguriis longo tempore in unum coacervatae, morbi fomitem ab infectis facilius suscipiant. *Endemica* certe *psora*, in civitatibus populo refertis, in pistrinis, nosocomiis orphanotrophiis, monasteriis, castris, novo fomite vivente continuo infectis, dicenda est. Interim saepe alia est impetiginis, quae pro *psora endemica* declaratur, natura.

§. 435. Ad partes primum infectas, prima pustularum (§. 433.) rudimenta comparent, ac sensim sensimque propagantur in alias, et volumen acquirunt. Praecipuum in psora symptoma, crescens ad noctem, a calore, et a cibis acrioribus *pruritus* est: ex quo, pro varia pellis affectae sensibilitate, plenitudine, ac pro ipsa infecti hominis constitutione, aut sana, aut morbosa, diversa pustularum forma, exulceratio aut minor, aut major ac latius extensa, inquietudo nocturna; anorexia, pallor, macies, ac interdum lebricula, curaeque

Symptoma.
mata.

difficultas dependent. A frigore, et a quovis cutis spasmo, psora; nisi multa, sub ista nascondie videtur. Plures aliquando vicinae sibi pustulae inter se confluunt, ac satis amplum in cute ulcus, aut omnem fere pellem erosam, et crustis defoedatam ostendunt. Hoc a totius peripheriae affectu, transpiratio non parum cohibetur, ac licet pruritus ad recentes et exiguas modo pustulas longe major, quam ad amplas has plagas sentiatur; latens tamen ad istas et sub crustis ichor, vix *acaris*, qui illinc modo resident, onustos, ut sanies quaevis in cutem subjectam operatur: pars ejus resorpta cum sanguine miscetur, visceribus tandem et glandulis, nisi a sanis expulsa, separata; insidias structura. Apud alios in toto fere corpore nascuntur parvi, rubicundi et rodentes furunculi: qui mox purulenta materia repleti, circa basin quasi circulo inflammato cinguntur, ac sponte aperti, in atas, densasque crustas exsiccantur. Interim tempore sat longo *psora non nisi cutis solius aegritudinem et affectionem prorsus*, ut vocant, *localem* constituit; et quaecunque demum erosionis in ista indicia compareant; vix tamen pellis celeriter de his

quidquam cum internis participat. Sat lentos scabies incipiens progressus in multis agnoscit, ac interdum extremitatibus per menses contenta videtur. In aliis celerior impetiginis istius expansio, ac citior pustularum in ulcera transitus est: quae diutius nutrita, vel a psorae causa jam abacta, cum iisdem, quam ista, remediis persanari vix queunt. Non quavis pellis ab eodem contactu, facilitate eadem a psora invaditur; sed neque pediculos fert quaevis caesaries; et ipsa contagia, ob rationem non minus obscuram, non quovis tempore in omnes agunt. Qui farinas tractent, aut inter equos ac in stabulis versantur, vel spirituosos liquores destillant, hi psorae minus subjecti videntur, juvenilis aetas, teneraque cutis, huic morbo, qui pluries hominem eundem non raro invadit, prae aliis favent.

§. 436. Ex dictis (§. 433.), quae causa *Causae* psoram inducat, jam satis elucet. Haec vulgo prius, quam ipsis innotuit medicis, et ex amplissima *acarorum* familia descendit. Distinctus scilicet ab illis, qui farinam caseumque inhabitant, *acarus humanus*, aut

acarus exulcerans, non inaturas ac pure jam plenas vesiculas, sed pustulas vix cutem egressas, limpidoque sero recenter impletas inhabitat, ac epidermide tectus, ad vicinas sub hac ipsa partes, quasi perfodinam, macularum, striarumque rubrarum, filiformium aspectu detegendam, divagatur. Incognitum hoc extra corporis humani confines insectum, in aliis, quam psorae, vesiculis nequaquam reperiundum, nec fortuito hic nascitur, nec eandem, quam forte larvae muscarum in ulcere neglecto ac vetusto, originem agnoscit; sed ab aegrotante, aut re quavis ab isto infecta, in sanos transfertur, et pustulas, quas inhabitat fecisse credendum est. A calore externo, interno, pruritus augetur; a frigore, cum imminuta insecti agitatione, hic idem imminuitur, febrisque ipsa saepe pustulas exsiccat. Ab immundis difficilior, facilius ab illis, qui puritati magis student, haec viva morbi causa, quod cum contagio non liceret a cute avertitur. *Pthiriasis* vero historia hanc ultro confirmat de *acaris* theoriam Hic de contagio, ut pruritus, pustularum, ulcerumque causa, cum *pediculum humanum*, aut *pubis*, sub cuticula detegimus, a

nemine cogitatur: cur de *acari* in *psora* mox ob istius principio non minori domicilii jure habitantis, ac hanc ipsam *praecedentis* potentia aequali dubitemus, vix ratio superesse videtur. Celeritate aequali tum pediculus uterque, tum acarus, cum interna vix curent, ab *externis*, ejusdem fere indolis remediis, extemplo, et actione longinqua, enecantur; ac *psora*, quo citius, eo facilius, aufertur: felices, qui talia, tamque multa, tam certa, pro *unico contagio* possiderent antidota, Mortales! A *psora*, ut vocant, *retropressa*, non pauca certe mala derivantur; sed praeterquod saepius *effectum*, cum morbi *causa*, a medicis confundi, nimis contest; non specificum ad *psorae* vetustae, aut complicatae, celerius aut incaute sanatae, noxas explicandas, requiritur contagium; nec ipsa, quae pediculi ad caput produxerunt, ulcera, si diutius jam fluxerint, — nec innocens, cui sani licet, jam *assuevimus*, fonticulus, sine damno ubique, celerius exsiccantur. De *psorae*, quam *criticam* appellant, fallaciis jam supra (§. 434.) mentionem injecimus. Quae *sartoribus*, quam aliis opificibus, communior esse dicitur, et ex *lanae* infectae

contactu derivatur, psora, ea vel aliam impetiginem symptomaticam (§. 440.) constituit; vel ex *vestibus* laceratis, quas renorant atque consuunt, *jā infectis*, non ex lana, originem agnoscit.

Prognosis. §. 437. A spora, nisi cum aliis affectibus complicata, aut diutius neglecta, aut hoc tandem sub statu incaute suppressa, periculum haud imminat. Difficultas curationis apud pauperes, in nosodochiis, aut in castris, a necessariae puritatis defectu, et continua cum infectis societate, derivetur oportet. Exempla psorae, quae *sponte* in totum disparuerit, perpauca habentur; sed licet haec existant, si *contagium* aliquando sic deleri dicamus, cur *acaros* ob causas ignotas aliquando disparere, aut in pelle mutationem, quae istorum actioni resistat, contingere, negemus, ratio non apparet. Post psoram longiorem, interdum abcessus glandularum, viscerumque infarctus succedunt: quae singula non tam exspecifici morbi causa, quam ex ichore, diutius, vel copiosius resorpto, vel ex vitio alterius naturae in corpore praeeistente, ac per psorae stimulum evoluta, derivanda esse censemus. Interdum alios psora dissi-

pavit effectus morbosos, et eosdem suo stimulo ad cutem invitando, visceribus imunitatem restituit. Interdum morbos alios, cum spora hic accedit, quamplurimum exasperat haec ipsa.

§. 438. Primum certe curationis momen- Cura-
tum in vera hujus morbi diagnosi consistit. Si psora (vel a *contagio specifico*, vel ab *acaris* haec pendeat) et *recens*; ad externorum mox usum, cum interna nil possint, sine temporis jactura recurrendum est. Si hominem infirmum ac allo affectu detentum haec impetigo corripuerit; tunc videndum est, an per stimulum et ulcus superficiale tam late a psora in cute excitatum, natu prior affectio emolumentum habuerit; et antequam hic psorae medeamur; artificialis in cute exulceratio, quae illius virtutem suppleat, excitanda est. Si per longam jam moram a psora cutis male affecta est, et aegrotus cum hac, morbosa licet, excretionem habitudinem contraxisse videtur; tunc lentior et cautior morbi cura esse debet; ac iterum artificialem fontem, quae internis minarentur, mala, ab istis derivanda sunt. Si cum alia impetigine, interno forte ex vitio pendente, psora

complicetur: tunc illi per interna occurrendum, et istius per externa, sanatio differenda est. Sub eorum vero, quae ad psoram simplicem conducunt, usu, non alia, quam ea, quae sanum in aliis hominem decet, vivendi ratio requiritur; nec ulla, quae, si balnea rerumque infectarum depositionem excipiamus, ad curam praeparent, vel psorae retrocessionem impediant, indicantur auxilia.

Insignis eorum, quae ad psoram laudentur, est numerus; sed, praeter summam munditiem: pauca in malo simplici sufficiunt, interque ea, *sulphur et mercurius* praeferrī merentur. Primum igitur totius corporis superficies ope balnei vel communis, vel saponem remisti, ab immunditie ichorosa et a crustis depuranda, aut prope saltem cum spongia abluenda, et ad istas, donec decidant, fovenda est. Nil juvat, prius, quam adhibitis per aliquot jam dies remediis, apud pauperes, quibus copia vestimentorum non est, tum haec, tum lintea mutare; quod tamen post tres, quatuorve frictiones necessario suscipitur. Sic et omne cum infectis commercium, rerumque ab istis tractarum usus fugiantur oportet.

tet. Sub cutis plenitudine majori, ac ardore, pruritu ex eodem insigni, scarificatio praemissa conducit.

Ipsam vero *sulphur*, tum vaporis, tum balnei, tum unguenti sub forma, aequali cum successu adhibetur. Non parva interim ab hoc ultimo, ex foetore, et maculis ad lintea relictis incommodo sunt. Vapor sulphuris sub ipso psorae principio, et cum pustulae exiguae ad partem comparent, cum debita cautela, aliquoties in die adhibitus, ulteriorem hujus morbi progressum praescindit. Pauperiorum vestimenta ac lintea in acre aperto hoc fumo impraegnata ac furno demum calidiori commissa, egregie durgantur. Sub thermarum sulphurearum defectu, vel hepar pulphuris ad uncias fere duas, — vel calcis aequae ac sulphuris libra una, in aquae fluviatilis mensuris septem vel octo decocta, pro balneo, adhibentur. Unguentum ex pulvere florum sulphuris uncia una cum axungiae recentis quantitate sufficiente, vel si pinguis cuti non conducat materia, cum ovi vitello, praeparatur. Sunt, qui huic unguento salis ammoniaci, vel hellebori albi drachmam unam aut alteram adjiciant; sed in

multis ab usu istorum in cute irritatio excitatur, ac solum jam sulphur bene tritum hic sufficit, si pars quarta, aut minor unguenti, prope ignem, quotidie ad noctem, nunc digitorum interstitiis, nunc carpo, nunc alias ad partes, illinitur. Tanta vero est sulphuris in viventem psorae causam potentia: ut corporis vel unam modo partem cum eodem frequentius unxisse, jam sufficiat. Hinc magnam sibi famam unguentum (N. L.), quod soli manus volae, ad nucis avellanae magnitudinem, affricatum, non parvo certe commodo, jam scabiem non raro dispergit, acquisivit. Vix interim nisi sulphur hic agere, ac vanae laudes, quod hoc unguentum psoram et expellat, et dissipet, nobis esse videntur.

Mercurius, sub quavis demum forma, aut cum adipe remistus, aut, salis sub specie, in aqua solutus, in psora causam, exterius admotus, cum aequali, ac sulphur, nisi forsitan majori, potencia operatur. Interius, ad ipsam licet salivationem usque; porracto huic remedio, psorae (si modo haec, et non alia impetigo, subfuerit), causa reluctari et visa; sed pauca hidrargyri portio exterius admota, uti *pediculos*,

tum capitis, tum pubis, sic et *acaros* in psora, veneni adinstar, mox trucidat. Ad meliora praeparata *unguentum album* (N. LVI.) omnino pertinet, quod ad fabae, vel avellanae magnitudinem quotidie ad loca indicata ilinitur; ac, salivationis sine metu, vel psora jam disparente (quod de aliis quoque auxiliis retinendum est) per quasdam adhuc dies subministrari oportet. Non absimiles et *unguentum citrinum* (N. XX.) et solutio mercurialis vel simplex (N. LI.), vel *phagadenica* (N. LII.) cum qua partes infectae semel, aut his quotidie laventur, in psoram effectus exercent.

Sed praeter sulphur ac mercurium, quamplurima, cum successu interim non semper aequali, contra sporam adhibentur. Huc inprimis pertinent decoctum vel succus tabaci nicotianae, balneum ex reliquiis a distillatione spiritus frumenti aqua vegeto mineralis, aqua maris, lixivium, decoctum rumicis acuti, inulae helenii, cum unguente ex eadem radice ac butyro parato, et alia; a quibus tamen, ut magis incertis, melioribus instructi, lubenter abstinemus. Observandum vero hic est, quod unguentorum sulphureorum sub

usu interdum novae ad cutem pustulae, quae ad psoram non pertinent, sed ab ipso unguento nascuntur, prorumpant. Has, unguento suspenso, balneum ex tepida dispellit. Interim non mox a psora exsiccata, medicamenta cito nimis seponenda, sed aliquamdiu post illam continuanda, — aut, si ex morbi semine ad cutem non integre destructo nova series pustularum efflorescat, resumenda sunt.


Si hominem, ut vocant, cachecticum, aut vitio quocunque alio laborantem, *psora recens* in vaserit: non ideo in istius, ut quae *critica* non est, curatione cunctandum, ac summa malorum in eodem augenda est. Aliter se res habebit, si alia impetigo, psorae aspectu modo similis, sed indolis diversae (§§. 439, 440.), — aut si haec ipsa jam diutius in cute haerens, fonticuli aut ulceris artificialis quasi vices cum emolumento aegroti assumpserit; — aut si ipsius psorae stimulus, forte latens in corpore vitium scrophulosum, aut aliud, excitaverit: quo in casu, ut monuimus, vel symptomata affectio cum remediis internis corrigenda, — vel psora ipsius effectus non specificus, sed fortuitus, per artificialem exulcerationem,

ac interdum per auctas alibi secretiones, supplendus est. Similia de ea, quae sanum alias hominem diuturno jam tempore afflixit, psorâ dicenda sunt: ut quae, materiae suae, non ut specificae, sed ut ichorosae, ex pelle continuo resorptae, actione internis simul obest, ac simul, suscepto jam habitudinis jugo, ad illam derepente sanari sine damno non potest, quin praedictas sibi curationis cauteles exposcat.

Ex his vero artis praeceptis aut non satis observatis, aut prorsus neglectis, non pauciora, nec minus, ac ab impetiginum aliarum incauta tractatione, lethalia incommoda propullulant: quibus iteram ad regulas jam satis alibi (§§. 290. 326.) expositas occurrendum est. Cum vero morbi a psora male tractata et praepostere exsiccata orundi, non ex ipsa psorae causa *specific*a ad interiora repercussa, sed ex repentina ichoris, habitudinis ad legas fluentis, suppressione nascantur: hinc nulla est ratio, cur *sporam*, foeditate, ac transitu in alios tam facili infamem, per *insitionem* aegrotanti communicemus; sed illa certe, quae sub exanthematum, impetiginumque aliarum infausta dissipatione commendavimus, sufficiunt.

O R D. I I. G E N. V.

P S Y D R A C I A.



§. 439. *Psydraciae* sub nomine, diversae
Definitio. apud Graecos affectiones cutaneae veniebant. Nos eodem pro significandis variae originis pustulis, psorae (§. 433.) modo habitu externo, vise non similibus (§. 434.) contagio plerumque carentibus, solitariis, ad basin rubris ac duris, in apice pellucidis, serosis, albescentibus, prurientibus, utemur.

Diversitas. §. 440. Numerosa; et distinctu difficilis hujus impetiginis familia est.

Nunc etenim non modo, communi psydraciis sorte, cum psora quoad formam conveniunt; sed a causis etiam viventibus, mox acri, quem vulnuscule inflicto instillant, succo, — mox ovulis, quae huc deponunt, — mox stimulo mechanico, tum plantis, tum animalibus summopere infensis, ad partes nudas, teneriores oriuntur: ut scilicet pustulae prurientes, ardentes, quas *culex*, tum *pipiens*, tum *reptans*, quas

pulex penetrans, tropicorum incola, vel et *cimex lectularius*, ac alia, non satis nota calidarum humidarumque regionum insecta inducunt; et quae pustulae dum, scabendo irritatae, sat largos primum ac elevatos tumores praesentant, post paucas modo dies in papulas vix a psora distinguendas mutantur.

Nunc acre *venereum* in cute psoram ae- *P. venerea*, mulatur, ac pustulas non tam prurientes, quam, noctis potissimum tempore, dolentes, universo in corpore, nec facie quidem excepta, producit.

Alias *hypochondriacis* solemne est pruri- *P. hypoch.* tum in cute, et maculas, et pustulas, a scabie vix abludentes, cum coeterorum symptomatum levamine, experiri.

Sed interdum post febres, sub morbo- *P. critica*, rum chronicorum decursu similia cum insigni aegrotantis emolumento contingunt: quae *psorae criticae* ideam frequenter derunt.

In *scorbuto*, apud illos, qui carceribus, *P. scorbu-* aut navibus angustis detinentur, aut in locis *tica*, uliginosis, impuris, vitam ducunt, ad cutem pustulae oriuntur, quae, etsi psorae figuram ac pruritum habentes, non tamen a methodo in psora laudata superantur.

P. period. Interdum *periodice* ad pellem pustulae comparent: quae, sub imagine psorae, apud illas, quibus menstrua sistunter istorum quasi vices ac decursum absolvunt.

P. Artificum. Qui lanas impuras rancidoque oleo imbutas, *textores, sartores*, tractant; hi ad manus digitosque, — vel ad corpus universum, abdominali, aut scorbutico, aut alio ex vitio, impetiginem a *psora* diversam patiuntur (§. 436.).

P. ab im-mund. A cutis *immunditie*, et apud illos, qui liutea ob miseriores conditionem cum aliis mutare non queunt, nec minus ab unguentis acriori cum oleo paratis, non raro pustulae, quae psoram fere referunt, ad cutem efflorescunt.

P. infant. *Infantes* non raro, vel a primis jam mensibus, vel dentitionis sub opere, universum per corpus, nec facie quidem excepta, a pustulis prurientibus, ac psorae aspectu, non indole similibus obteguntur.

P. plethor. Juvenibus, pubertatis sub principio, plethoricis, aut cursu luctaque exercitatis, — puellis, quibus menstrua aut instant, aut fluere recusant, rubentes saepe pustulae ad cutem, ac inprimis ad faciem, erumpunt.

Qui *Venere* abutuntur, hos ad cutem *P. Neogamor.* subinde quasi psorae effectus ac pustulas experiri ex observationibus constat.

In *senibus* interdum, ut herpes (§. 423.), *P. senilis.* sic et psorae simillima impetigo observatur: quae, remediis plerumque rebellis, ad mortem usque sub immani cruciatu continuat, atque indolem longissime a psora distantem manifestat.

In *thermis* forte calidioribus, ad omnem *P. thermal.* superficiem pruritus ac pustulas, quae psoram inexpertis referre videbantur, vel in illis adeo, quibus nulla cutis vitia praeiverant, frequenter conspeximus.

Nec tam rarum est, apud homines, vel *P. ab acri.* *scrophulis*, vel *rheumate*, vel alio demum acri laborantes, similia in cute, vel ad certas modo partes, quasi vitio *locali*, vel ubique, ut in *hypochondriacis*, *melancholicisque* aegrotis, contingere.

§. 441. Vel ex sola jam specierum *psydrac.* *Causae.* *ciae* (§. 440.) expositione, diversa illarum, tum a *psora*, tum inter se ipsas; natura ac origo intelligitur; ac plurimae ex illis, quas omnes hic adducere vix licet, aliorum potius morborum *symptoma*, quam mor-

bum *primarium* constituunt. Neglectum interim causarum, quae talia in cute producunt (§§. 273. — 276. 373.), studium, ac affectuum, qui, vel internorum, vel istius ex vitio, ad corporis superficiem se prœdunt, non observata distinctio, fecerunt, ut saepius pro *psora* haberentur, et cum externis sine quovis respectu tractarentur impetigines, quae, fontem *internum* agnoscentes, non potuerunt non a tanto Medicorum errore frequenter exacerbari, repelli; et quae methodum ad psoram propositam (§. 438.), tam male sibi ipsis adhibitam, toties infamem reddiderunt.


Prognosis. §. 442. Morborum, ex quibus suam trahunt originem, psydraciae symptomaticae sequuntur prognosin. Pauciores illae, quae ex primaria cutis affectione oriuntur, vix periculum agnoscunt. Quas interim pellem a multo jam tempore defoedavit, psydracia; haec, remediis externis derepente suppressa, sanitatem periculosa subvertit. Ex omnibus fere peior est quae exsucca senum corpora consumit.

Cura. §. 443. Pro tam diversis origine malis (§. 441.), non una, sed multiplex medendi

est ratio. Quae causam internam non agnoscit, et modo *localem* in pelle affectionem constituit psydracia: haec externis solum tractanda est auxiliis, et pro originis differentia, sibi alia, aliaque exposcit. Molestos insectorum ausus, tum Africae, tum Americae meridionalis populi averunt igne per nemora ac domos accenso, fumoque tabaci, nec minus oleo, succisque plantarum diversis, quibus corpora quotidie inungunt. Praesentem ab ictu insecti dolorem, extracto vesparum apumque aculeo, cum aceto, limonum succo, oleo, linimento volatili, theriaca, impositis moderamur. *Penetrantem culicem* (§. 440.), sub tropicis, cum acu solícite effodiunt, ac cineres tabaci ulceribus inspergunt. Quas cutis impuritas induxit psydracias: has balnea tepida, cum sapone, vel hepate sulphuris remista dispellunt. Psydraciae *symptomaticae*, ut venerae, scorbuticae, etc. ex aliis hujus operis locis repetenda est cura.

O R D. I I. G E N. V I.

T I N E A.



Nominum
diversitas.

§. 444. Herpeti (§. 420.) affinis fere, sed ad partem capitis capillatam, vel ad faciem defixus, ac aetate infantili magis proprius est morbus, quem Veteres, *achorum favorum, ulcerum capitis manantium*, — posteriora vero tempora, *lactuminis, crustae lactae, scabiei, leprae capitis ac tineae*, magis barbaro adhuc, nomine salutarunt.

Definitio.

§. 445. Interim hoc ultimum, seu *tineae*, civitate jam potitum nomen pro impetigine retinemus: quae in ulcusculis prurientibus, serpentibus aut capitis, aut faciei, humorem viscidum, copiosum ac foetidum, in coagulum fere melleum properantem, fundentibus, mox crusta friabili, granosa ac molli, mox duro, crassiore, cinereo quasi cortice, abductis, consistit.

§. 446. Capillatae partis ad caput af- Divisio.
fectio, tenuissimis foraminibus cutem per-
forans unde glutinosus humor excernitur,
achor Graecis dicebatur. Achores.

Favus autem vocabatur simile fere ac- Favi.
horibus vitium: cum foramina meatuum,
unde humor manabat, majora, *apum fa-*
vis respondebant.

Tineam adesse docebant, cum sanies ex Tinea.
cute cranii capillata exstillans, ad pillorum
radices, in crustas friabiles, aut tenaces,
ac albas coiret.

Si, qua ubera sugunt pueri, aetate, ad Crusta
lacteas
tinea faciei.
genas istorum prius calentes, rubentes,
splendentes, vesiculae nascerentur pru-
rientes, ac flavae, quibus disruptis ichor
effluens in crustas friabilis, ex flavo luteas
cum pruritu ac dolore cogeretur, *lactu-*
men, *crustam lacteam* appellarunt.

Rebellem magis *tineam*, et quae ad ossis Tinea
maligna.
usque substantiam descenderet, cariemque
excitaret, *malignam*, — quae plurimum
ichores effunderet, *numidam*, et quae duras Humida.
ac fere saxeas modo crustas offerret, hanc
siccam nominarunt. Non interim tam di- Sicca.
versa mali, quam nominum natura est;
ac sede magis, aut aspectu, atque gradu,

quam indolis ratiene, in illo nascitur differentia.

Sympto-
mata.

Achor. fav.

§. 447. Qui achoribus aut favis subjiciuntur pueri, his pruritus inter capillos molestus, cutis tensio et ardor, vel et porrigo, praecedit; nec rarum est, glandulas lymphaticas circa collum et occiput his tumere, ac tensionem, dolorem ab attactu, inferre. Apud alios cephalalgia hos affectus annunciat. Augetur jam pruritus et scabendi necessitas: quo sub opere a digito aegrotantis aut *tumor* latus, calescens acensus, aut *papula*, seu *pustula* inter capillos percipitur. In illo, vix ulcus, sed dilatati quasi canaliculi, seu ductus folliculosi ostiolum, ex quo humor glutinosus lente distillat, conspicitur, in ista, quae tuberculum super cute elevatum, circumscriptum, folliculosum, pisiforme, vel conicum, ad basin satis durum, cum apice molliore, albescente constituit, liquor albidus, flavescens continetur: quem foramine ampliori, aut exeso, aut exilibus, subrotundis excrescentiis obsesso, inaequali, foetentem, ac pigrum eructat. Hic ichor vicinos inter capillos effusus, impura quasi

palude eosdem inundat; mox ab aeris at-
tactu coagulatur, ac pilos, quos amplecti-
tur, conglutinans, mox tubera crustosa,
exterius squamosa et sicca, interius mol-
liore, granosa, quasi cerea, putrescente
materia repleta; ac securum fertilissimum-
que pediculorum nidum efformat.

Si plures ac sibi vicinae, aut confluen- Tinea.
tes forte pustulae capillitium defoedent:
tunc uberiori ex fonte destillans ichor vi-
cinas plagas sub tecto crustoso abcondit,
aut, quicquid liquefactae super cranio effusae
adinstar, quae late patet, capillatam, et fron-
tis adeo vicini regionem obducit; ichoris
unda, quae sequitur, primam, jam solide-
scentem, secundam, tertia, repellit, findit,
ichore novo fissionem replet, incrustat, ac
singula in durum, squamosum, interjectâ
capillorum substantia horridum, crassum-
que coperculum compingit. Interea latens
sub isto sanies subjectam pellem aggredi-
tur, capillorum radices hinc inde effodit;
vix tamen bulbos istorum, sed cellulosam
magis telam vicinam erodit, consumit
ac, si forte virus venereum accedat, sub
dolore atroci, nocturno, vel ipsis calvariae
ossibus perniciem minatur. Hinc major

hoc sub vitio inquietudo, ac pendens ab ista nutritionis defectus maciesque, — apud alios: vix magna salutis laesae symptomata occurrunt. Interdum locum vix tineae mutat; sed in situ eodem aut sicca, aut humida, vix aucta, persistit, seceduntque pili, quos alba in quibusdam lanugo restituit.

Tinea
faciei.

Tinea faciei, seu, ut male satis vocant, *crusta lactea*, in pueris sextum vix aetatis mensem adeptis, vel ultra annum haud natis, — interdum, licet raro, et tardius, occurrit. Infantes haec affectio prehendit, qui, *dentitionis* sub opere versantes, albidiori, subrotunda, ac pingui simul facie, genisque profunde, aut ex flavo rubris instruuntur; qui scrophulosis ex parentibus descendunt; qui lautius et lacte crassiori nutriuntur. Ut plurimum ad genas, non raro ad frontem, species haec tineae principium sumit, et sese calore, rubore, splendore, ac partis pruritu manifestat. Mox pustulae, parvaeque, nunc latae, nunc acutae vesiculae, liquore pellucido, ex albo flavescente repletae, efflorescunt. Hae, vel sponte, vel, scabendo disruptae, tenacem, flavum, et in crustas ex luteo

subrubras, friabiles abiturum liquorem effundunt. Interea novus mox ichor primo succedit: qui mollem fissumque jam corticem penetrans, ac per loca declivia decurrens, haec ipsa obducit, ex alio propinqua pustulae impuro fomite augmentum sumit, et in larvam, hinc flavam, obscuram illinc, densumque in corticem mutatus, modo genas ac mentum, modo faciem, exceptis oculis, universam, sub insigni infantis pruritu, inquietudine, ac non sine corporis pendente ex istis macie, desoedat. Nec tamen palpebris ubique parcit hic morbus; aut ad partes longe alias, ad aures, ad artus, vel ad truncum non divertitur: quin ideo vel minimam aut in facie aut alibi cicatricem relinquat. Cum aliqua *periodo*, tum eruptio, tum exsiccatio pustularum in multis contingit, atque tot fere dies ad primum, quam ad secundum hoc opus consumuntur. Eruptionis sub stadio, vegetior ac hilarior puer esse, — cum pustulae siccantur, languere, observatur. Eundem infantem *bis* haec ipsa affectio tenuisse observata est; sed tandem, sub urinis, ut febris illae, foetentibus, copiosis, sponte, licet tardius, disparet.

Causae.

§. 448. Aegritudinis tam late inter primae aetatis homines extensae causas vix satsi perspicimus. Nec etenim parentum, nutricum hic vitia vel ubique praecurrunt; vel tam certe prolis sanguinem, ut vulgus credit, inficiunt. Nec in ipso hoc vitae exordio, sub victu tam simplici, ac mente a pathemate fortiori tam libera, humorum tanta, ac volunt, acredo supponitur prudenter. Contagia in tinea tum capitis, tum faciei, si veneream illius aliquando originem excipiamus, non firmo satis argumento nituntur. Accedit, quod tinea faciei, dentitionis vix absoluto negotio, vel sponte dispareat; quod illa capitis, modo paucis adultis pubertatis a tempore, nisi lue venerea detentis, adhaereat; et quod tinea communis externis, plerumque sine damno, remediis, quod interna vix unquam possunt, tollatur auxiliis. Veteres, ut ubique, sic et in chorum favorumque explicatione, ad *bilem*. — Recentiores ad *mucosos, acidos, acresve humores*, pro more saeculi confugerunt; sed quo subtilius his in rebus ratio cinari, — eo minus ad lectulum feccisse videbantur: ut tandem ipsis a medicis, difficultatum curandae tineae

pertaesis hic labor vetulis ac empyricis hominibus committi debuerit. Istorum ausibus instructi, non pauci morbum, de quo agimus, non ex fluidis, ut pridem, sed solius corii capillati ex vitio locali, curationis externae melioris successu suffulti, derivarunt.

Jam solus hic experientiae sermo, seu rerum eventus pristinae lopsuacitatem theoriae abunde resellit; sed cur demum vix gremio emissus puer tot morbis ad caput inprimis laboret, et cur tinea tum istius, tum faciei, ad certos fere vitae humanae annos limitetur: hoc, sicut obscurum, ita perscrutatione medentis indignum non est. Major capitis neonati ad corpus coeterum proportio, vasotum cerebri, calvariae totius, majora lumina, hanc supremam hominis partem prae aliis eo celerius, quo vicinior est ortui, nutriri, ac humorum quantitate uberiori perfundi, demonstrant. Hanc naturalem capitis plenitudinem in prole jam utero exclusa saepe augent tum velamenta, quibus illud obruitur calidiora, tum fasciae, quibus pueri corpusculum etartus tam stricte involvunt, at alia circulationi humorum per ista, op-

posita obstacula. Accedit magna parvulorum multorum voracitas, ac lactis uberioris et nutriente principio ditioris sat felix digestio: quae specialem vasorum capitis repletionem in multis augere, ac ad morbos ex ista, praedisponere valebunt. Quo vero tempore dentitionis ingruunt molestiae, nemo est, qui ex capitis calore aucto, ex rubore genarum, ex salivae ac muci uberioris effluxu, ad majorem hac in parte irritationem, et humorum ex ista pendentem derivationem concludere recuset. Quid vel sola partium sensibilitas adaucta in producendis ad cutem morborum secretionibus valeat, jam satis evicimus (§§. 228. 274. 276. 359. 373. 386. 394.); ac illa, cum indicata jam vasorum capitis repletionem, istorum vires excedente, tum frequentes encephali sub aetate infantili hydropes, tum innumeros aurium, oculorum, oris nariumque affectus, tum denique singularem systematis lymphatici hac in parte irritationem, ac secretionis in cute, tum capillata, tum ipsius faciei, vitia, ad certam modo aetatem restricta, non parum illustrat.

Interim non unam ideo ac eandem semper istorum originem subesse dicamus; Venereae, quae adultos, vel et ipsos infantes divexat, tineae exempla, — causarum, quae porriginem inducunt (§. 416.) auctoritas, — pediculorum noti effectus, materiae morbosae facta ad caput metastasis, — scrophulos a haereditaria dispositio, diversam impetiginis, de qua agimus, scaturiginem abunde demonstrant; sed hoc unum, communem scilicet tineae tum capitis tum faciei, causam plerumque non internam, sed universo nunc capiti, nunc corio capillato, nunc dentium viciniis fere propriam ac *localem* esse, ex dictis eruimus. Quae ex retropressis, ut ajunt, vel proficuis forte alio sub morbo tineis, ad comprobandum causae illarum *internam* originem afferuntur, exempla: ea non aliam plerumque, ac de psora vetusta, vel complicata, praepostere topicis remediis exsiccata attulimus (§. 436.), explicationem admittunt, ac fallaci nimis argumento superstruntur. Forsitan haud aliter sensilioris, pinguesve infantes ac pueri, qui lautius nutriuntur, ad caput, lymphaticum, con crescentem ichorem, — quam

arbores junioris solo fertili commissi ad corticem sua *gummata*, plorant; et accedens his succi nutritii divitiis, dentitionis ab opere, irritatio, in tineris pusionibus ad faciem vesiculas crustasve, — in pueris sub immunditie, pediculorum inter capillos stimulo, nisi narium haemorrhagiae, coryza, aliique fluxus, aut citius forte corporis incrementum, materiam divertant, achores, favosque producit. Si pauperum non minus, quam divitum progeniem hi morbi invadant; cogitetur oportet ex pane secalino non pouciorem, quam ex tritico nutrientis copiam materiae a sanis hauriri; nec egestas parentum, quod sibi, — hoc parvulis dilectis, miseriarum ac laborum adhucdum ignaris, detrahare consuescit. Lac igitur nutricis adultae vel crassum, copiosius ingurgitatum, si a pueri sugentis ventriculo superetur; non ob viscidum: aut acidum, quem sanguini abhinc induci contendunt, mucum, — sed ob nutrientis, quo abundat, principii exuberantiam, ad crustam quam lacteam appellant, infantem disponere dicendum est. Urinae, hujus morbi sub fine excretae foetor nec ubique se manifestat, nec

magis de mali causa per has vias ejecta, quam de turburam praegressarum effectu testimonium largitur, ac in genere tum sudorum, tum urinae, ut alterius, morborum sub fine secedentis materiae vel odor, vel alia conditio, de morborum causis sat aequum ferri non sinit iudicium (§. 7.).

§. 449. Ad secundam valetudinem puc- Prognosis.
rorum, capitis impetigines plerumque con-
tribuere, opinio est vulgi. Nec vulgus
tam saepe, ac medici opinantur, de mor-
borum successibus iudicando, a vero aber-
rat. Non quidem in eo, qui sanus est, ut
sic esse continuet, requiritur morbus; sed
talis est *multorum* infantum voracium, suc-
ciplenum conditio ac vitae modus: ut a
nutrientis principii copia, nisi corporis
incremento sat rapido, vel aurium, vel
narium alvique fluxu dissipetur interdum;
cellularis tela omnis subcutanea, imprimis
ad collum ac faciem mire turgat, et suc-
cis, a vero adipe distinctis, infarcta, cruoris
motui per laxa vascula potenter resistat;
aut data quavis occasione, vel sponte, con-
tentos humores, ac humana quasi gum-
mata regurgitet. Quod si talia contingant:

mox major in pueris hilaritas, ac functionum oppressarum libertas observatur; quae singula, dum salutari huic exuberantis principii nutrientis stillicidio per artem, vel repente nimis, vel sine quovis ad causam respectu, resistitur; cum damno — non ob retentam, quae corrupta sit, materiam, sed ob luxuriantem, quae consumi omnis a corpusculo sat cito non possit, nutrientem materiam, languebunt. Si aliam et complicatam magis originem, ut veneream, metastaticam etc. haec impetigo agnoscat; tunc utique, sicut topica remedia non sufficiunt: ita, donec ipsa morbi causa superetur, periculosus eorum usus esse potest. Sed vel communissima, simplexque tinea, si diutius persistat, ob continuos pruritus ob vigilias, inquietudines protractas, interdum vero ob nimiam sueci nutritii per larga haec ulcera jacturam, debilitatem ac maciem, vel et lentam febriculam inducit; qui tamen ipsi effectus, licet aperte morbosi, ob contractam jam forte habitudinem, sine damno derepente auferri non queunt; vel, si hoc ipsum tentetur: tum asthmata, hydropes, tum viscerum glandularum infarctus, suppurationes, metastases, coecitates, ac tabem ipsam relinquunt.

§. 450. Hinc primus hujus morbi signis Cura. occurri, causasque illius latentes investigari oportet. Si venereae, scrophulosae, aut alterius symptomaticae affectionis indicia compareant: ad primarii curationem morbi veniendum est. Si ex lactis crassioris, voracitatis ac plenitudinis effectu haec vitia oriantur: tunc ubera mutanda, lactis copia gradatim restringenda, transpiratio promovenda sunt.

Quibus caput ab ulceribus manantibus, Tineae cap. aut a tineae affectum est: his primum, victus moderatus, corporis exercitium, ac summa capitis mundities imperanda, capilli, quin frigus repentinum noceat, rescindendi, radendi, ac pediculi, si abundant, cum axungia, vel sapone molli ac albo, cui olei distillati, vel anisi, vel lavendulae guttae aliquot adduntur, — cum butyro, seminibus apii petrosellini, in formam unguenti, remisto, — aut cum semine sabadillae, cucuphâ, quae caput arcte circumdet, recepto, per noctem aliquoties impositis necandi sunt. Jam vero crustae, quae curam ulceris manantis impediunt, emolliri, ac, ut decidant, prae-

parandae sunt. Favorum achorumque illae, difficultatem non afferunt; sed vel praedictis unguentis, vel decoctis emollientibus jam cedunt. Ast crustas tineae rebellis fere saxeas ac profundas, unguenda sola vix penetrant; et pars exterior ac durior illarum cum novacula caute radenda, auferenda est. His praestitis, cataplasma (N. LIII.) molle, ac tepidum continuo imponimus, et quotidie, donec omnes fere crustae deciderint, renovamus. Alii, solutione mercurii sublimaticum pane in cataplasmatibus formam redacta, alii, arcano quondam, ex bufonibus calcinatis pulvere hoc scopo utuntur: quorum primum, glutinosum nimis, — alterum, nullius virtutis esse remedium, experientia aliorum testatur.

Patentia nunc ulcera cum urina recenti ac sana quotidie lavantur, ac mox unguento populeo, vel unguento albo (N. XLVI.), aut rubro (N. XLIII.), aut demum citrino (N. XX.) mercuriali, obtecta, tali methodo simplicissima ad sanationem perducuntur. Aliis, solutio phagadaenica (N. LII.), aut simplex mercurialis (N. LI.), vel decoctum tabaci, rebelle ulcus depurat. Si dura quae-

dam loca his auxiliis domari non possint: haec ipsa, vel unguento simplici, cui octava pars pulveris cantharidum remista sit, vel caustico interdum remedio, ut butyro antimonii, cum aequali spiritus sulphuris portione, vel et lapide infernali prudenter tangenda, et mox carptis filamentis, quibus butyrum simplex illitum sit, obtegenda, — cum vero e chæra deciderit, cum unguento Egyptiaco, vel mercuriali albo, vel rubro, depuranda, ac tandem ad cicatricem perducenda sunt. Totius ulceris exsiccationem aqua saturni, vel calcis tandem sine damno coadjuvat.

Non tamen omnis sic tinea sine crudeli pilorum evulsione ad finem constantem perducitur; ac in casu mali pertinacioris, ad hoc demum recurrendum est subsidium. Si paucas modo capitis plagas occupat tinea: tunc volsella capillis prope radices apposita, hi ipsi cum bulbis extrahendi sunt. Si nimis extensa est affectio: tunc ex pice alba, ad ignem liquefacta, cum pauxillo farinae secalinae, ac olei olivarum, emplastrum paratur: quod linteis, digito vix latioribus, sat longis, hinc pluribus, commissum, ac leviter calefactum,

tineae, resectis prius capillis, imponitur, et post horam sine impetu, ac lente, cum sat multis, qui huic adhaerent, solutis jam a morbo, capillis detrahitur, ac pro re nota iterum aliquoties imponitur. Alii, emplastrum ex pice nigra plures per dies his crustis imponunt, atque illud cum istis, ac pilis repente detrahendo, caput omne cum impetu quasi decorticant. Hanc methodum non parva saepe partium insequitur inflammatio: quam butyro; baete foliis inuncto, sedare contendunt, et quae interdum venaesectione ac aliis indigebit auxiliis.

Alia quidem, ut diximus, in tinea primaria vix indicantur, quoniam *localia* remedia. Interim in adulto jam malo vel fonticulus, vel alia, per emplastrum vesicans ad nu-
cham, ad brachia, vel per corticem thimelae inducta exulceratio, vel et alvum purgans hinc inde remedium, ac pulvis antimonialis ex aethiope (N. LIV.), aut alter ex sulphure antimonii (N. LV.) ad securitatem majorem, commendari merentur.

T. faciei. Ad *tineam faciei* quod spectat, ea quidem, quod vel sponte tandem dispareat, ac damna vix habeat, remediis, ut illa capi-

tis, violentis non indiget. Interim cum continuus pruritus, ac vigiliae infantem disturbent ac emacient: in causis hujus incommodi (§. 448.) auferendis, et ad citiorem, quam quae a natura praestetur, morbi curam obtinendam, auxilia requiruntur. Experti et clari in arte Viri consilio, a multis jam annis hoc rerum in statu confirmato nos quoque *jaceam*, seu *violam tricolorem* hoc in morbo tentavimus, ab variis in casibus haec planta spem nostram implevit; in aliis, vix tantum praestitisse est visa. Exhibetur vel *recens*, in lacte decocta (N. LVI.), quod mane ac vespera infanti porrigitur; vel *sicca*, in pulvere, ad drachmam dimidiam quotidie: quo sub usu tum alvus non raro, tum inprimis urina, cum foetore, qualem jam descripsimus apud varios cum fructu, moventur. Foliorum quoque *farfarae tussilaginis* decoctum, omni, bihorio ad unciam dimidiam per menses porrectum, alterius sibi Viri laudem, quam in scrophulis jam dederant, promeruit; ac de primulae veris saturato decocto similia, a nobis necdum tentata, referuntur. Plura interim, quae, tempore *longiori* porrecta, hoc in morbo utilia dicuntur, an hic

vel sponte vel per artem recesserit, nobis dubium relinquunt. Externis hac in tineae remediis vix locus est; et quae illam exsiccant, cum damno admoventur. Fortiori tamen a crustis durioribus tormento vel malvae decocto, vel lactis cremore dulci occurrimus, ac simul alvum cum syrupo cichorei cum rheo, vel cum manna, sine stimulo movemus. Si utriusque sub tineae decursu, vel ob incautam melalem, vel ob alias rationes, alterius forte mali peioris symptomata occurrant, et ab illius suppressione pendere videantur: tunc habita tum causae supprimentis, tum praesentis affectus ratione, ex traditis in casu simili praeceptis (§§. 290. 326.) consilium petendum est.

O R D. I I. G E N. VII.

L E P R A.

○○○○○○○○○○

§. 451. **V**ix una ex descriptis hucusque Notio.
 impetiginis peciebus existit, quam Veteres,
 et aevi medii Scriptores, — non modo cum
 fortius urgeret, sed et mitiori sub habitu,
 interdum non declarassent pro morbo,
 quem nunc veris ac distinctis coloribus de-
 pingere, ob hujus raritatem, tam ardui
 res laboris est. Etsi vero haec ipsa diffi-
 cultas in sermonis apud Antiques de *lepra*
 obscuritate, in *Arabum* garrulitate taediosa,
 ac in *Arabistarum* hos coeca fide exscribendi
 consuetudine fundamentum agnoscat; in-
 signis tamen symptomatum, quae illam,
 vel ut futuri *indicium* morbi, comitabantur,
 vel ut frequentior effectus, circumfluebant,
 copia, — ut in altera nunc *lue*, quae *lepram*
 in Europa paulatim excepit, ad imaginis
 manu Veterum delineatae ambiguitatem
 summopere contribuit. Vel sola cutis ma-
 cula, vel pilorum desluvium; vel porri-
 go, vitiligo inprimis, herpes siccus, vel

squamis, tuberculis, ulceribus obsessae pellis conditio, quin solae in cruribus varices, suspicionem de *lepra* apud eos movebant: apud quos, vel ob contagii perpetui, vel ob causae communioris ac in plurimos eundem ad sinem conspirantis rationem, impetigo leprosa cutaneorum et principium et finem morborum formare solebat.

Interim vix tanta rerum confusio ex Veterum hoc de morbo doctrina nasceretur; nisi infelix eorundem de *quatuor humoribus* theoria, et insignis Doctorum in morbo prorsus eodem, nunc ex formae, nunc ex solius coloris diversitate, subtilius distinguendo pruritius accessissent. Sed et illud non parum hujus morbi historiam obscurat; quod, sicut semina vegetabilium diversa, hoc sub coelo, plantam inermem, — in illo, fruticem altiore, efingunt: ita *leprae* contagium, aut formes, hac terrarum in parte, sub ista, — alibi, sub alia magis, forma excreverit; quin verus atque constans morborum floris character ex Veterum laboribus sat tuto ad nos usque pervenisset. Sic *venereae* quoque luis symptomata, sub coelo multum di-

verso, insigniter inter se differunt, ac morbos observatori incauto, ac originis primariae ignaro, fere quosvis mentiuntur. Quo vero tempore ultima haec lues Europam invasit, non mirum est, si tum istius, tum declinantis tunc *leprosa*e affectionis, quae plurimum inter se conspirant, symptomata, a multis commisceri, et aegritudine, ab una, ad alteram transferri videantur: quae singula sine dubio morbi apud nos quasi dispersi ac cessantis reliquias cum temporum obscurorum descriptionibus conferre, opus perdifficile nobis redderent; nisi Viri eximii susceptus nuder, *de lebra Occidentis*, utilissimus labor hoc sibi pensum assumere, felici cum ausu voluisset. Nos quidem morbum, quem *Elephantiasin* Graeci dixerunt, semel ipsum, — sed oculo juvenili, in Veterum monumentis necdum satis versato, ac brevi temporis concessa mora, conspeximus: quam vero *lepram* hi proprie vocarunt, hanc pluribus exemplis inpressam mente tenemus.

§. 452. Morbum tam proteiformem angustis definitionis cancellis circumscribere, res ardua est nimis. Nec enim natura, Definitio.
sed re vehementiae modo gradu sedisque

ratione, *Arabum Graecorumque lepras* inter se differre putamus; et innumera symptomata, quae diversos apud Populos, atque sub coelo eodem, aegritudinem eandem, alia aliaque, circumdant, constantiam vix ullam, — sed cujusvis fere morbi atrocis phenomena, ordine nunc isto, nunc illo, disposita, in hac una ostendunt.

Quodsi tamen ad praecipua hujus tetrae affectionis signa diagnostica sub variis *leprae* formis respiciamus: hanc dicemus atrocissimum impetiginis genus, cute aut *vitilagine* (§§. 402. 403.) *diffusa*, — aut *piscium* quasi *squamis*, *ulceribusque crustosis*, *orbiculatis*, *pertinacibus*, — ad demum *tuberculis nodosis*, ad faciem inprimis, ad manus ac pedes, inquinata, insigniter pruriente, aspera, rugosa, unctuosa, lividaque, cum dispnoea, voce rauca, nasali, morositate, anaesthesia ac stupore: salacitatae morbosa, alvo sicca, pedis deformitate, tumore alephantino, ulceribus profundis, ad ossa, articulos, sub paucō dolore, extensis, haec ipsa separantibus, foetore, ac aspectu totius horrendis.

Differentiae. §. 453. Haec vero (§. 452.) totius aegritudinis tum lenta primordia; tum limitatos

ad cutem quasi solam progressus, tum summos ex ista in universum systema furoris generatim concernunt; nec ubique tam atrox erat leprae natura, quin illam, quae *psorae* ferocioris in modum incederet, pro morbo ab *Elephantiasi* diverso complures declararent. Qui interim considerat, morborum incrementa, tam coeli, victus, quam diversae apud homines constitutionis ratione: quamplurimum differre, ac in ipsa *Graecorum Elephantiasi* saepe cutem non aliter, ac *Arabum* in *lepra*, ulceribus foedari: non difficulter hic sibi persuadebit, inter morbum utrumque non aliam, quam vehementiae in *Elephantiasi* majoris differentiam intercedere (§. 452.).

Non tamen ideo vana est *leprae* divisio, qua hunc morbum diuturnum tum in diversa sua stadia, — tum in praecipuas varietates, quibus corporis aut modo partem (*L. localis*), aut omnem compagem (*L. universalis*), aggreditur; — aut superficiem commaculat, exasperat, obtundit (*L. alba*, s. *Leuke Graecorum*); — aut eandem exulcerat, ac crustis squamisque defoedat (*L. squamoso*, *L. Graecorum*); — aut pellis omnem, cum subjecta adiposa, substantiam in tubera

nodosque atollit, corrugat, enervat (*Le Elephantiasis L. Arabum*); — aut, ad manuum, pedumque articulos conversa, ea in crassas ac informes columnas infarcit, stupelacit, corrumpit, ac separat (*L. Elephantia*); — aut denique in simplicem, vel cum aliis affectibus complicatam (*L. rubra*), distinguimus.

Morbi
historia.

§. 454. Ut impetiginum, quas novimus crudelissima, sic inter omnes antiquissima, ac coeli ardentioris, Indiarum, Aethiopiae, Arabiae, Aegypti, primogenita quasi morborum filia, est *lepra*. Hic etenim locorum, quod Scriptoris tum sacri, tum profani, ex vetustissimis, indicarunt — sed forte et ad frigidioris septentrionalis oceani litera, exstructum primitus, et ad nostra usque tempora intactum, figitur dirissimae hujus luis habitaculum. Ex Aegypto haec in Asiam ac Graeciam, ob mutui commercii rationes forte prius, quam alias ad gentes, migravit: sed quo sibi tempore Romani Orientem Victores submiserunt, per Italiam haec pestis ac per omnem Europam propagata est. Vix interim temperatum hoc orbis solum peregrino morborum semine diutius favere, sed et ipsum

in illo, nisi alio, recenti, suffultum, languere ac suffocari videbatur: cum primum pietatis ambiguae instinctu Orientem visitandi, ac demum hac parte terrarum potiendi commune Europaeis desiderium, hanc stragem Populorum, donec, altera, non minus peregrina, eandem imperio expelleret, revocasset. Eo scilicet a tempore, si modo pauca, quibus infaustum illud leprae seminium adhucdum adhaeret, loca excipimus, vix multa hujus morbi, provecti exempla in Europa occurrunt; sed novae infectionis pericula ex incauto cum populis hac ac lue notatis commercio instare, infelici parentum nostrorum sorte admoniti; veremur.

§. 455. Stadia hujus morbi (§. 453.) ex symptomatum successione, ac leprae tum principio, tum incremento manifesto, tum summo fastigio, divisionem admittunt.

Signa
prodroma.

Quae a fomite hujus luis suscepto contingant; non minus ea, hoc ipso, ac viis, per quas corpus ingreditur (§. 460.), obscura sunt et dubia, Lassitudinem generalem, morositatem, horrores cum caloribus ac aestu interno commistos, aut interdum quar-

tanac quasi typum observantes, *formicationis* inter cutem carnesque, inprimis *faciei*, *sensum*, et locales adeo affectus, hic plures accusarunt; sed morbi tam lenti sub decursu, forte plura, quae ad ipsum non spectent, contingunt; nec leprosus a febribus, aut ab alio contagio prorsus immunis videtur. Interim recens adhuc morbi virus febrem interdum accendisse, et per hanc ipsam subinde cum impetu ad cutis superficiem mox depositum fuisse, observationes tum aliorum, inprimis de lepra *elephantia locali* (§. 458.), — tum propria de lepra *squamosa* (§. 457.), testantur.

L. acutae
hist.

Sic, elapso vix anno, foeminam triginta circiter annorum hoc ad *Clinicum Institutum* suscepimus: quae duarum licet jam prolium mater, nec tamen in vita fluxum experta erat menstruum, et lochia paucissima post partus excreverat. Haec, per qua, draginta quinque jam dies, a febre, ac simul ab impetigine crustosa, squamosa, universam ad cutem, correpta, nosocomium petierat. Faciei rubor insignis, ac plurimae tum in ista, tum ad partem capitis capillatam, ad collum, pectus, abdomen, dorsum, extremitares, crustae, tum fla-

vae, tum subnigrae. Inter istas; cutis undique sulcata, aridissima, hinc inde fissa, asquamis majoribus, cinereis oblecta. Dolor ingens, et calor ad attactum tam insignis, ut similem nobis nunquam in aegrotante alio observare contigerit; tumor pedum, ac genum inprimis. dolentissimus; arteriae centum et triginta ictus, minuto primo, interdum plures, durissimosque et contractos obsolvebant. Tres igitur venaesectiones brevi temporis intervallo instituae; nobis sanguinem denso corio oblectum obtulerunt. Ingens squamarum copia quotidie in lecto reberiebatur, et quo loco cutem deseruerant: eo rubor ac cruda quasi caro, non ulcus, subjacebat, humorque tenax ac foetidus stilabat. Quamplurima hos ad acrius extinguendos porrecta sunt, quae hic omitimus, tum interna, tum externa remedia, ac in balneum aegrotam demissimus frequenter, hoc effectum: ut trium fere mensium, a quo Clinicum petierat, intervallo, ab atroci hoc morbo restituta, sine ullo pellis vitio, ad suos redierit laetabunda.

Plerumque febris nulla hunc morbum aut praecedit, aut, si finem excipiamus,

comitari videtur. Incipientis vero tunc morbi signa ab aegrotantibus celata, vel, ad partes obiectas istorum collocata, vel nimis exigua, vel pro varis aut naevis declarata ac saepius nullo aegritudinis sensu sociata, medicorum haud raro cognitioni subtrahuntur. Altera iudicii difficultas huic primae, ex ipsa signorum multitudine, et significatione ambigua aliquando accedebant. Nunc etenim lentigines, nunc panni, nunc macula rotunda vel alba, vel rubra, subflava, vel et nigra, pruritus expertes, — nunc porrigo alopecia, aut ulcus, aut alia, hanc labem, — in aliis, modo simplicem benignumque cutis morbum indicabant.

Praecipue vero macula, plerumque una, vel et plures, figurae potissimum rotundae; aut parum, aut nihil elevatae, ad faciem, axillas, pel pubem, vel ubique sub descripto colore, — ac vitiligines (§. 403.), extensionis nunc minimae; nunc lenticularis, aut interdum amplioris, — dum ambitus earundem vel in latum, vel in profundum, nunc citius, tardius augeretur, — dum pili, si quos fundus macularum haberet, aut subtiliores, breviores, rariores,

lanuginosi, aut albi redderentur, vel et protinus defluerent, — ac demum cum locus hic inaequalis, depressus, aut acutius perfossus, vel igne tractatus, nequidem *sensu* consueto gauderet, negritudinis latentis testimonium dederunt.

Color igitur in cute, aut partis, aut corporis totius, mutatus, ac *sensus* in macula recenti, *decrementum* — in adulta, atque profunda, *abolitio*, si adsint: potissimam in lepra diagnosin constituunt. An deficiens aut macula, aut anaesthesia, lepram semper excludat? hoc major, ac nobis esse potest, experientia docebit; nec in lepris, quas vidimus, tam scrupulose ac forte decuisset, cutis omnem superficiem examinavimus.

Interim et aliorum signorum, simul scilicet collectorum, cum aliam originem non agnoscere viderentur, suo tempore non parva habebatur auctoritas. Ipsae certe *maculae* nunc a cute recedebant, atquae, iterum iterumque redeuntes, superficiem, in parte vel ista, vel illa, jam interdum majores, elevatiores, magisque obscurae (panni), foedabant; nunc cum majori constantia sedem sibi vel unam, vel ad plura

simul loca defixam eligebant. Interdum non tam maculae, quam pustulae, aut siccus ac orbiculatus herpes praecedere lepram solebat. Animi corporisque segnities insolita; morositas, facilis iracundia, vel in dolos, suspicionem, dispositio, — insomnia tristissima, tædifica, ephialtes, — lascivia insueta, ac major viribus coeundi potentia, — oculorum albedo obfuscata, turbata, vel rubra, aut livida, ac in nigrum declinans; figura oculi rotunda, *lecnina*, — vox rauca, vel, rarius, acuta et subillis cum anhelitus, foetentis; strictura, — narium, exterius rubrarum, livescentium, interna angustatio, vel ulcus, frequens sternutatio, et privatio olfactus, — faciei inflatio, cum magna validaque rubedine, ac pelle super fronte quasi tensa, et lucente, nodosa, aspectu torvo, — capitus, superciliorum ac menti porrigo, pilus rarior, mutatus alopecia, — sudoris foetor, alvi tarditas; eructatio perpetua; lotium subjugala; ac turbidum, interdum tenue, a quosum, — pulsus parvi ac lenti, — praecipua venientis leprae symptomata constituebant. Alia superadidit insulsa hoc de morbo ejusque ex cholera nigra origine,

theoria: quae singula ex Veteribus referre, humanae mentis esset satyram conscribere.

Per longos saepe annos hic morbus, vix uno alterove signo stipatus, mediam quasi per salutem, translucebat, ac hominem, ad extremas jam miserias damnatum, quas-cunque functiones, illibatae libertatis fraudulento sub aspectu, exercere sinebat: donec vel in pueris pubertas, vel in adultis, alia rerum mutatio, latentem sub cineribus ignem, attonito aegrotante, rapaces in flammis eveheret, ac lepram vel in parte, vel universo in corpore diffusam ostenderet.

Hunc igitur jam provectae aegritudinis statum sequentia, sub quibus utpote leprosum a Populo separari curabant, in genere comitari solebant. Vitiligo incrementum jam sumit, ac in profundum latumque, nunc citius, nunc lentius diffusa, sensum omnem ammittit. Nunc singula, quae morbum hucusque obscurius indicaverant, augentur phaenomena: crescunt segnities motuumque difficultas; insomnia terribilia, morositas raucedo, faciei circa nasum rubor, livido, ac inflatio, turgent, dilatantur exterius, angustantur

L.
confirmat.

interius, nares; tument genae, labia, protuberant supercilia, ac tubercula cinnabarino, subflavo, vel et livido, colore notata, has partes non minus, quam aures, frontem ipsumque interdum palatum, exasperant, defoedant. Intermedia his cutis crassescit, et in plicas rugasque unctuosas contrahitur: unde facies, ut vocant, *leonina* efformatur, nigrescit, ac humanae imaginis delentur vestigia. In pluribus cutis undique ulceribus foetidissimis, crustosis; albis, et squamosis, cum pruritu ac ardore, dolore, cum tactu licet obtuso, insignibus, obtegitur. Corpus integrum, si modo partium dictarum tumores excipiamus, tabescit.

Summum
vastigium.

Atque nunc fere hic morbus ad summum fastigium (§. 458.) ascendit. Vox penitus extinguitur, foetorque animae et corporis, cum spirandi labore continuo increscit; sub lingua grandinosa, raninarum venarum varices, quae et alibi, ad pectus, ad tibias oriuntur, subnigrae comparent: secedunt pili vix non omnes, et caput, et supercilia praetumida, liminaque palpebrarum, et mentum, et axillae, et pubes, tibiaeque glabrescunt; findun-

tur, incurvantur, et corrupti labuntur ungues; musculorum torositas omnis disparet; inprimis illorum, qui inter pollicem et indicem digitum sunt positi; ciborum digestio prava, ac flatuum incommoda, vel et fames in quibusdam canina, augentur, vix faeces alvus, — ac jumento-sam continuo vesica urinam, expellunt; infausta veneris cupido ac tendigines in consumpto ac morituro jam homine intenduntur; extremitatum articulos, phalanges, a carie latente erosa, tumores iusensiles, alii juxta alios, circumdant; vet et ulcera sicca, profunda, sensuque vix praedita, deturpant; et cutis, hinc in plicas crassiores, nodosas elevata, — in sulcos ac rugas asperas, profundas, aut fissas alibi contracta, *elephantini* magis, quam humani pedis figuram aemulatur; interdum nares, intermedia cartilagine erosa, collabuntur; aut prorsus, ut digitorum phalanges, aut integra quoque membra, a vivis, vel sponte, ac sine dolore separantur.

Haec fere morbi truculenti, pront diversis in locis comparet, ac *leprae* inprimis *nodosae* (§. 458.), horrenda est facies. Interim non ubique haec singula in omnibus

leprosis occurrunt symptomata; sed in aliis ut dictum est, superficiem, in aliis, cutem integram, extremitates et articulos in aliis, pro sede sibi eligit furorum. Hinc ob varios ejusdem aegritudinis aspectus, interdum ob solas theoriae de *quatuor humoribus* rationes, in quatuor tere species (§. 453.), aut in illas, ac aspectu impetiginis, desumptas ab Auctoribus distincta est lepra: quas morbi farietates, modo paucis coloribus depictas, trademus.

L. alba. §. 456. *Lepra alba, zaraab* Haebraeorum *Baras* Orientis, *Leuke* Graecorum. Antiquior longe aliarum leprarum notione, atque clarissima istius *plagae* in Sacris paginis descriptio est. *Morphaea alba* (§. 403.) frequentissimum hujus principium fuit, et sicut ista, modo cutis superficiem maculare, — sic *lepra alba* profundius per cutem, carnes, et ad ossa usque descendere, hasque partes immutare, ac se ipsam dilatare consuevit. In vitiligine *morphaea*, quam *albam* vocavimus, si qui pili ad plagam, quam illa occupabat, aut sanam prius, aut cicatrice ab igne aut alia laesione violenta foedatam, haersebant: hi colorem non mox a principio, sed tardius mutare, —

macula rotunda, plerumque depressa, albescens, nec sensu iu totum privari, nec incrementum habere solebant. Quodsi vero lepra his e signis prodibat; tunc ex lacteo, calor niveus ac splendens morphaeae, ipsique pili albedine, tenuitate distincti, asperitas, porrigo, stupor, anæsthesia, dilatatio macularum manifesta cernebantur. Interdum et pustulae, nunc rubrae nunc citrinae, nunc durae ac lividae, nunc albae, molles, ac cito puriformes, vel et maculae coloris non albi, hanc lepram praecurrebant. Cum magno aegritudinis augmento morphaea, dum locus fricaretur, ruborem non contrahere, aut ferro punctus, hic nonsanguinem, sed humorem albescentem, sine sensu, ex profundo plorare, pilosque canescentes, aut albos, vix non omnes dimittere cernebantur. Aliquando universa hominis leprosi cutis nunc ulceribus pustulisque obtegebatur: quae in crustas albescentes, et squamas conversa, si modo carnes fungosae sub istis non laterent, *leprae quasi crisis* constituere videbantur. Cum vero sub laxiore solidorum contextu, ac facie inflata, morphaea, hucusque depressa, aut plana,

cum cute ipsa, pallida, subtumida, molli, sed et sicca et aspera, in altum surgebat, ac furfures, vel squamas, ut pellem serpens (*L. tyria*), deponebat; et rhagades, et ulcera viscosa et caro luxurians hac in parte nascebantur; cum glandulae, sub cute alba, in mollem tumorem adauctae, oculi lacrymantes ac fatui, gingivarum, labiorum erosio, fungositas, palpebrarum inversio, narium oppilatio, emunctio frequens, salivae effluxus copiosus, venter laxus, urinae albae, crassiores, pingues, et saniosi quid habentes, unguium corruptio, pilorum defluvium, pedumque tumor hydropicus, in conspectum prodiebant: tunc summum jam fastigium haec lepra attigisse, ac plura nunc morbi universalis symptomata communia huic ipsi conjungi videbantur.

L. squamosa.

§. 457. *Lepra squamosa, L. Graecorum* Difficilis et fallax hujus varietatis leprosa a *psora* inveterata (§. 435.), — a *psydraciis* diversis (§. 440.), imprimis a venerea, scorbutica, scrophulosa, senili, — et ab *herpete rodente, phagadencio* (§. 422.), diagnosis est; et sicut lepram haec mala interdum mentiuntur: sic ista hinc inde originem, alte-

rius impetiginis sub aspectu, leprosam agnoscunt. Nullum certe, quod satis constans esset, hanc ad lepram Graecorum signum perducit, etsi *morphaeam nigram* lubentius ac frequentius in istam, quam in aliam, abivisse dicendum sit; nulla tamen cutis defoedatio, aut porriginosa, aut pustulosa, occurrit, quae vitii illius praecurso-rem non saepius egisse videatur. Quae interim ad pellem crassam, coriaceam, inflexilem, tensam, asperam, aridam, inaequalem, sulcatam, ardentem, ac insigniter prurientem, nec facie excepta, crustae, pertinaces, vix non callosae, verrucosae, nunc cinerei aut obscure albescentis coloris, nunc ex flavo subrubrae, vel subnigrae, ad corpus modo integrum, modo crura vel brachia potissimum, vel et partem quamcunque, sine causis alterius impetiginis manifestis, nascuntur, ac in piscium quasi squamas majores, ratundas, siccas, copiosas, vel et corticum testarumque, quasi nive aut farina conspersarum, sub forma, a cute sub- tus aut cruda, rubente, aut fissa, sanguinolenta, aut erosa, resolvuntur, ac iterum iterumque redeunt, dilatantur, — in primis quae junctum hinc inde vel in con-

finiis stuporem, tactusque sensum obtusum, articulorum rigiditatem, unguium corruptionem ac lapsum, et pilorum ex parte affecta defluvium, aut colorem mutatum agnoscunt, — quae cum sudore nocturno et cum macie extrema incedunt: hae ad *lepram Graecorum* non immerito referuntur, et nunc solae, nunc ipsius morphaeae, vel elephantiasis sociae, incedunt. Si, malo prorsus locali, vel coxae tibiaeque, vel brachia crustae densiores, elevatae, aridae, variique, saepe nigri, coloris, cum pauca sanie ulcus lividescens cum partis stupore, subinde cum inguinalium glandularum tumore, obtegerent: tunc *mali mortui* sub nomine veniebat. Interdum et haec species impetiginis, si copiose ad pellem effloresceret, *leprae crisis* constituere credebatur.

L. Eleph. §. 458. *Lepra tuberculosa, nodosa universalis, Elephantiasis Graecorum*. Haec morbum, de quo agimus, in summo gradu constituit, ac aliarum varietatum symptomata, una cum illis, quae supra (§. 455.) indicavimus, fere singula complectitur. Non quidem haec lepra, *Aegypto* endemia, sub tropicis nec nostris temporibus

rara, in Europa vix unquam tam frequens, nec prorsus tamen exul, ut in homine se prodat, aliarum varietatum decursum, aut formas illarum absolvat, necesse est; nec prodroma ei signa, nobis quidem nota, habentur, ex *Elephantiasin*, non lepram aliam, futuram esse, sat tuto concludatur; sed praeviis, modo febre, imprimis vero maculis, vitilagine morphaea, erythemate varicode (gutta rosea), modo pustulis, herpete sicco, orbiculato, jam cutis, ad faciem plerumque, sed et alias ad partes, potissimum ad articulos, ad manus atque pedes, nodosa, tuberosa, cum descripto istorum *elephantino* tumore, aliisque jam satis (§. cit.) enarratis phoenomenis, segnitie totius corporis spontanea, mentis ignavia, proclivitate in somnum, per insomnia turbatâ, stupore anaesthesia, atque squamis pertinaciter adhaerentibus, ulceribus nunc aridis, nunc rodentibus, subflavis, vultuque nodoso, rugoso, terribili (*L. leonina*), comparet.

L. Lèonia.

Interdum lepra nodosa *localem* magis, L.
quam universalem, ut diximus, affectio- elephantia.
nem constituit, morbique materia cum totius emolumento ad articulos, manuum,

inprimis pedum crurumque, vel ad ungues, abinde foedos et *globosos*, deponi videtur. In plurimis, sub morbi principio, febris manifesta, cum rigore, calore, deliriis, inguinisque dolore, tumore glanduloso, occurrit. Mox cruris hac in parte, aut utriusque, inflatio, rubedo, ac dolor; interdum cum stria rubra, sat lata, vasorum lymphaticorum decursum indicante insequuntur: quo tempore et febris et tumor glandularum inguinalium subsidere observantur. Saepius, sed tempore incerto, haec febris revertitur; et in crure, post quemvis insultum, incrementum tumoris, oedemati consimilis, sed magis re-nitentis, conspicitur: donec, sub melioris valetudinis, si modo *sitim* in quibusdam intensam excipiamus, aspectu, pedis elephantini figura, nunc aequalis, nunc per sulcos plicasque divisa, emergat; et sub pelle crassiori, squamosa, humor tenax, glutinosus cellulosa dilatata, tenaciori, ac varicibus depicta circumseptus, in substantiam lardaceam concreseat; vel ex cute disrupta, per fissiones, per ulcera impura, fungosa distillet; aut pars ipsa, sine sensu, post longos modo annos, a vicinis separe-

tur. Interdum localis hic tumor nunc manus, nunc brachium, nunc aures, vel nucham, nunc dorsum, vel lumbos, nunc ipsa pudenda, occupasse est visus; sed frequentior ad pedem ejus sedes est; ac tandem se ex isto, universum per corpus dilatasse describitur.

§. 459. *Lepra alopecia. L. rubra. L. L. rubra. complicata, scorbutica.* Hujus varietatis ab *erythemate varicode*, s. gutta rosea (§§. 397. 399.), principium desumi, est veterum doctrina. Hoc, insons plerumque nunc temris, faciei nariumque vitium, nunc leve, nunc pustulis, aut siccis, aut saniosis, crustosis distinctum, interdum non dissimiles aliis in partibus rubores, — ut *lepram elephantiasin* (§. 458.), sic et eam, de qua nunc sermo est, varietatem, praecedunt aut pessumdant. Facies hic, et genae, et nares, a tumore profunde rubicundo, pruriente, pustuloso, crustisque saniosis defoedantur; maculae aut flavae ad cutem comparent, ac sponte recedunt: gingivae fungosae ab attactu leviori mox cruorem emittunt, halitusque ac sudor, ac urinae subpingues, aut crassae et rubrae, vel et sanguine com-

mistae, foetorem exspirant; ulcera saniosa et rubra superficiem inquinant; supercilia ciliaque pilos in totum amittunt, inflantur, et oculos rubentes lacrymantes nascondunt. Quod nisi facies potissimam hujus morbi sedem formare videretur; nisi tumor superciliorum pilorumque ex istis desluvium accederent; non tam *leprae*, quam *veri scorbuti*, hac in descriptione ex Veteribus deprompta imaginem haberemus. Interim et suam leprae cum scorbuto, venerea cum lue, cum scrophulis, etc., *complicationem* concedimus lubenter; quin ideo aut *rosam*, aut appellant *Asturiensem*, aut endemicam Nostratibus *Pellagram* huic leprae varietati pro argumento esse, hucusque ex rationibus, suo tempore referendis, opinemur.

Causae. §. 460. Quid lepram in homine producat; hoc, nis principium esse dicatur, quod ex parentibus per haereditatem in proles, aut ex infecto quovis, ut contagium, in sanum se transfundat, difficulter eruitur. Vel ex victu perverso atque piscium corruptorum ex usu, vel aquarum locorumque ex infausto imperio, vel ex

terrore majori, ac fortunae adversitatibus hunc morbum popularem derivari, vetant rerum earundem, sub eadem positione, in gentes diversas ac plurimas effectus non idem, et causarum tam communium non expectanda tam singularis in paucas modo tribus operatio. Ipsa interim contagia, ut ad alius propagentur, certas sibi rerum conditiones omnino exposcunt: atque sic coeli, tum calidioris, tum frigidioris ac humidi constitutio haec ipsa fovere, atque cutem habitantium hoc pro semine recipiendo disponere videtur. De *haereditario* leprae ex genitoribus in prolem, aut saltem in ipsos nepotes, transitu: copiosa, et hodierna adeo, exempla sine dubio testantur. Non eadem de *contagio* certitudo habetur, et innumeri leprosi cum sanis uxoribus, insatiabili quidem cum libidine, sed sine damno istarum manifesto, concumbunt. Mulierem a *Idpra squamosa* jam multos per annos insigniter affectam, ac non modo *prolium*, hoc a tempore genitarum *sanissimarum* matrem, sed cum proprio marito, eodem in lecto sine noxa istius, cubantem, nos ipsi conspeximus. Non vanae interim sunt leges, quas ad lepram

Hebraeorum (§. 456.). Legislator antiquissimus tanta cum sapientia, — et quas Populi vix non omnes, ad horrendam hanc luem a civibus avertendam, ubique tam solícite tulerunt: et vel ipsa, quo hic morbus Europam repetito invasit, modus, — tristissima ac recens insularum variarum inter tropicos positarum historia, ac infustum cum infectis *Africae* incolis in servitute conductis commercium, nec minus complura leprae ex longa, atque intimiori cum infectis consuetudine contractae exempla, abunde docent: *contagium* huic morbo, licet *lentum*, ac modo paucis praedispositis nunc quidem infestum, subesse; nec ob insons hodie apud plures cum *leprosis* commercium, posse leges, quas quondam neglexisse Europam non semel poenituit, sub tam incertis rerum mutationibus, humanitatis sine damno aboleri. Quo tamen modo, et per quas demum vias hoc ipsum contagium suscipiatur a sanis — quas partes id primum invadat et inficiat; hoc non minus, quam ipsius virus natura ac indoles; nos protinus latet. Infantes hoc minus foeminasque: ac viros, infestasse, — et quibus *testes* ex istis resecti

fuissent, hoc aut nunquam, aut mitius affecisse contenditur (§. 462.). An, quod minora infectionis pericula, quam alii sub coitu, incurrerent *Eunuchi*? an ob rationem eandem, qua lepra *haereditaria* pubertis sub tempore potissimum, — nec sine insigni ac fere proprio partium genitalium, atque generis nervosi stimulo, prorumpit?... ignoramus; sed certe et *impuberes*, a parentibus leprosis oriundi, leprae signis maculati incedunt. *Blennorrhoeam* ex lepra sola apud quosdam venisse, ob utriusque antiquitatem mali suspicio esse potest; certitudo non habetur. Ab *insectis*, quae utique sua ova aut larvas ulceribus, quae patent, quibusvis non raro committunt, lepram derivari, vix certa satis observatio concedit; nec illa, quae impetiginum origini adversantur, haec, ut psoram, sic et lepram, seu *albam*, seu *nodosam*, dispellunt. Interim non minus tumores in lepra *Elephantiasi* sub cute conspicui, quam *porcorum* in morbo proprio cutaneo, ut experimenta recentia, praeter ullam veritatis suspensionem, docuerunt, *causam agnoscere viventem* possent. Quae ex unico sub cute nidulante *gordio*, in primis lisrupto, symptomata ner-

vosa oriantur, experientia pernoscimus. Quaevis sibi *taeniae*, nec cerebro excepto, pro sede viscera certe eligunt: an in *tela cellulosa subcutanea* apud leprosos similia contingunt? an potius *glandulosam* tumor originem agnoscit, et *systematis lymphatici* lepra morbus est? experimenta illorum, quibus occasio se offeret, docebunt.

Prognosis.

§. 461. Vix quidam Medicinam in leprae curatione praestitisse, vulgaris est opinio: cui, quotquot hanc artem vel quondam exercuerent, vel hodiedum profitentur, si de morbo jam provento loquamur, non difficulter accedunt. Aequivoca signorum, quae hanc luem praecedunt, natura (§. 451. 455.), sollicita eorundem ab aegrotantibus occultatio, causarum ignorantia, et singularis, quo nervosum systema hic laborat, stupor, hanc artis impotentiam excusant. Incipientis tamen leprae, ac morbi jam satis manifesti cum successu dissipati, aut saltem mitigati exempla non prorsus deficiunt, ac in genere, *squamosae*, quam aliarum leprarum, faciliior, aut saltem minus ardua est curatio Vitiligo morphaea, in quantum nec numero, nec in latum, nec

in profundum crescebat, nec latentem in suo ambitu pilum aut colore immutabat; aut graciliorem, breviorum, lanuginosum reddebat, aut prorsus emortuum expellebat, nec sensu vel calore carebat, sed a frictione rubebat, et ab acu perfossa, doloris non expers, cruorem fundebat: legrae metum praesentis deponi, ac morbi, nisi nimis jam adulti, sanationem sperari concedebat. Contraria, de morbi augmento, ac de fomitis morborum dilatatione plerumque funesta testimonium exhibebant. Morphaeam *albam*, ad lepram hoc a calore vocatam (§. 456.), — morphaeam *nigram*, ad *squamosam* (§. 457.) plerumque conducere, experientia suffulti, praedicebant. Hinc *albam* prae *nigra* infamem declarabant, si diutius praesisteret, morphaeam. Quid *lepram nodosam* (§. 458.) signorum praecedat? an quasi ex improvviso, ac sub dubiis modo indiciis prorumpat; hoc, ut verisimile vix est; ita maximis adhucdum tenebris involvitur. Interdum universalis ad cutem efflorescentia, leprae, ut diximus, quasi *crisin* constituisse videtur.

§. 462. Nemo est, qui pro morbo nunc De methode
temporis tam raro occurrente, et suas med. L.

quoad causas tam obscuro, medendi methodum ab experientia, quod magis interest, desumptam, a nobis tradendam expectet. Juvat interim, quam tum alii ingressi sint, tum nos ipsi hoc in morbo tentaverimus sanandi, viam hic brevibus indicare. Ad *lepram squamosam* (§. 457.) quod pertinet, hanc eadem, quam ad *herpetem rodentem* proposuimus (§. 425.), ratione, aliquoties sanavimus; ac potissimum, in atmosphaera puriori ac tepida, pro internis, antimonialia, hepar sulphuris cum acidis porrectum (N. LVII.), decocta rumicis seu lapathi acuti, dulcamarae, ulmi campestris, ligni guajaci, cum lacte copiosius haurienda, — aut, quae causae forte cognitae, vel complicationem facienti, potissimum opponantur, tentari merentur. Interdum venaesectio, scarificatio, aut purgans medicamentum, praemittenda sunt. Interim spes major in externa et hic ponenda est auxilia; atque balnea tum sulphurea, tum ex aqua marina, — vel, sub majori ardore, ex lacte, emollientibus, vel ex partibus animalium pinguioribus cum aqua decoctis parata, pro virium ratione subministranda, — unguenta, linimenta, vel ex

simplici butyro, aut oleo, aut cremore lactis dulci, vel, cum certa, ob mercurium contentum, cautela, alia, jam in aliis cutis vitiis laudata (NN. XLIII. XLVI.), vel cum succo nicotianae tabaci, aut cum acido muriatico confecta, aut linimentum saponaceum (N. LVIII.), in opem vocanda sunt. Mercurialia vix unquam cum fructu, sed saepius manifesto cum damno, in lepra *interius* foerunt porrecta.

Qui lepram elephantiasin aut et albam tractandi quotitiana quondam occasione fruebantur, hi, pro temporis hoc de morbo theoria, ex quo humore aegritudinem generatam esse credidissent, hunc, victu, ac remediis contrariis aggressi sunt; aut potissimam in cute condecoranda, ac in maculis, per *cosmetica*, vel adeo per *caustica* remedia, delendis operam collocarunt. In primis vero omnem, quam potuerunt, in *diaeta* ordinanda sollicitudinem posuerunt, et a carnibus diversis, leporina, asinina inprimis, atque porcina, quam ultimam *Legislator Divinus*, ut impuram, rejecerat, — et a cibis crassioribus, flatulentis, viscosis, a piscibus, qui squamis destituerentur, in genere ab alimentis aut sale, aut aromate




acriori conditis, — sed a Venere quam maxime, abstinendum, — corpus vero pro viribus exercendum esse docebant. In cura morphaeae, quae antiqua non esset, ut nostro nos tempore, mos a suscepto a sanis contagio faceremus (§. 94.), et vomitum frequentem, et sudores in balneo, theriacam, et frictiones commendarunt. Nec sanguini (quod demorbo, cui febris fere deest, miremur) licet multum non mitterent, parcebant; ac, praeter sacrificaciones, cauteria, *varices in elephantia* (§. 458.) comparentes incidebant, extrahebant, eradicabant; reprimentia, atque ipsas demum fascias, a calcaneo usque ad genu, vel ad inguinem, applicari curabant; atque alvum nunc fortioribus, si phlegma, aut melancholiam supponerent, stimulare, nunc blandis, ut sero lactis, remediis, movere studebant. Nec ad ipsam *castrationem*, ut hunc morbum aut averterent, aut ejusdem progressus praepedirent, descendere verebantur. Quas interim laudes haec operatio mereatur, recentiorum, nisi contrariis, experimentis destitui, ignoramus. Ipsa in *elephantia*, suscepta cruris tumefacti amputatio, quin labes ad alteram mox tibiam

verteretur, ut recentior experientia monstravit, non potuit impedire; sed profuit ab initio, et cum febris quasi *intermittentis*, *anomale*, natura subesset, peruviani usus corticis, qui sequentes insultus, pedisque tumorem monstruosum impedivisse videbatur. *Viperinae* quoque carnes, et decoctum ex iisdem paratum. Veterum medicorum omni potita sunt fiducia. Ad *arsenicum*, cum *piperis* sex partibus remistum, apud *Indos* jam pridem medici Sacerdotes confugerunt, et adhucdum his ipsis, ut referunt, cum successu utuntur. *Cusculae* quoque (*americanae*?) in aqua infusae, maceratae, contusae, cum succo limonum remistae, maculisque leprosis, tuberculis ac nodis quotidie illitae, — *ledique palustris* saturatum infusum ulceribus impositum, quorundam hoc in morbo sibi laudes promeruerunt. Nos nostrum his de rebus, donec certior experientia loquatur, suspendimus iudicium.

FORMULAE MEDICAE

IN. §§. ERAECEDENTIBUS CITATAP.



Num. XXXIX.

Massa pro cute depuranda.

Recipe amygdalarum amararum uncias
novem,

Pinearum uncias tres.

Terantur in pollinem subtiliorem, cui
adde Vitellos ovorum sex.

Misce.

N. XL.

Vinum camphoratum.

℞. Camphorae rasae drachmas duas;
Terantur cum aliquot alcoholis gut-
tulis, Adde succum Citri unius re-
center expressum,

Vini optimi libram unam.

Coletur.

N. XLI.

Linimentum Camphoratum.

- ℞. Camphorae drachmam unam,
Nitri puri drachmas duas,
Mellis quantum sufficit, ut fiat lini-
mentum.

N. XLII.

Unguentum cum sinape.

- ℞. Pulveris seminum sinapis subtilissimi
uncias tres,
Olei amygdalarum unciam dimidiam,
Succi Citri acidi quantum satis est, ut
fiat unguentum.

N. XLIII.

Unguentum mercuriale rubrum.

- ℞. Butyri recentis uncias duas.
Cerae albae, liquefactae drachmas tres,
Mercurii praecipitati rubri,
Camphorae, ana drachmam unam
cum dimidia.

M.

N. XLIV.

Decoctum dulcamarae.

Rx. Stipites dulcamarae a drachmis duabus
usque ad sex.

Concisos infunde cum aquae libra
una cum dimidia, et in Vase
clauso leniter ebulliant, refrige-
rata colentur.

N. XLV.

Pilulae antimoniales.

Rx. Aethiopis antimonialis,
Gummi-resinae guajaci, ana drach-
mam unam,
Extracti stipitum dulcamarae drach-
mas duas,
Misce fiant cum syrupo simplici pi-
lulae granorum duorum.

N. XLVI.

Unguentum mercuriale album.

Rx. Mercurii praecipitati albi drachmam
unam,
Axungiae porcinae unciam unam.

M.

N. XLVII.

Unguentum zinci.

℞. Pulveris zinci calcinati drachmas duas,
Axungiae porcinae drachmas sex.

M.

N. XLVIII.

Ceratum tabacinum.

℞. Succı nicotianae tabaci,
Cerae flavae, ana uncias tres.
Resinae unciam unam cum dimidia,
Terebinthinae unciam unam,
Olei myrrhae quantum satis, ut fiat
ceratum.

N. XLIX.

Decoctum corticum nucis juglandis.

℞. Corticum viridium nucis juglandis
unciam unam,
Infunde cum aquae libra una,
Post tres horas, infusio ebulliat per
horae quadrantem; refrigerata co-
lentur.

N. L.

Unguentum jassori.

℞. Pulveris subtilioris florum sulphuris,
Vitrioli albi,
Bacarum lauri, ana
partes aequales.

Misce, fiat cum oleo lini, vel olivarum,
unguentum.

N. LI.

Solutio mercurialis simplex.

℞. Mercurii sublimati albi grana sexa-
ginta,
Solve in aquae distillatae libris dua-
bus.

Misce *pro usu externo.*

N. LII.

Solutio phagadaenica.

℞. Aquae calcis recenter paratae uncias,
octo,
Mercurii sublimati,
Dulcis, ana grana viginti.

Misce *pro usu externo.*

N. LIII.

Cataplasma ad tineam.

- ℞. Pulveris herbae malvae uncias quatuor,
Coque cum lacte; sub finem adde
Pulveris herbae cicutae, unciam unam,
Butyri recentis uncias tres.
Misce, fiat cataplasma molle.

N. LIV.

Pulvis aethiopicus.

- ℞. Aethiopis antimonialis grana tria,
Sacchari scrupulum unum.

M.

N. LV.

Pulvis antimonialis.

- ℞. Sulphuris aurati antimonii tertiae prae-
cipitationis granum unum,
Sacchari scrupulum unum.
Misce fiat pulvis.

N. LVI.

Decoctum jacea.

- ℞. Herbae jaceae, seu violae tricoloris,
recentis manipulum unum.
Coque in lactis vaccini libra una.
Post brevem ebullitionem coletur.

N. LVII.

Hepar sulphuris calcareum

- ℞. Ostrearum,
Sulphuris, ana partes aequales,
Per strata committantur crucibulo, et
per horae quadrantem candefiant.
Massa refrigerada minutim con-
tundatur, et in vitro epistomio
munitio servetur.

N. LVIII.

Linimentum saponaceum.

- ℞. Olei tartari per deliquium,
Olei amygdalarum recentis, ana par-
tes aequales.

M.

Finis Lib. IV.