

1	Wiarygodność oraz przydatność diagnostyczna klinicznego badania ortopedycznego	1
2	Staw skroniowo-żuchwowy	13
3	Kręgosłup szyjny	65
4	Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy	137
5	Okolica krzyżowo-biodrowa	213
6	Staw biodrowy i miednica	261
7	Staw kolanowy	311
8	Stopa i staw skokowo-goleniowy	385
9	Staw ramienny	435
10	Staw łokciowy oraz przedramię	513
11	Nadgarstek i ręka	539
	Skorowidz	599

Klucze interpretacji przydatności diagnostycznej oraz wiarygodności

Klucz interpretacji przydatności diagnostycznej

+LR	Interpretacja	-LR
≥ 10	Duża	< 0,1
5,00–10,00	Umiarkowana	0,10–0,20
2,00–5,00	Miała	0,20–0,50
1,00–2,00	Rzadko istotna	0,50–1,00

Klucz interpretacji wiarygodności

ICC lub κ	Interpretacja
0,81–1,00	Znaczna wiarygodność
0,61–0,80	Umiarkowana wiarygodność
0,41–0,60	Przeciętna wiarygodność
0,11–0,40	Niewielka wiarygodność
0,00–0,10	Brak wiarygodności